

5,116 / B

coll. ypl.
MD

A x o . 2

177 (4)



Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30505768>

49950

MEDICINA HIPPOCRATICA

EXPONENS

APHORISMOS HIPPOCRATIS,

AUCTORE

JOHANNE DE GORTER,

A. L. M. Medicinæ Doct: & Prof: Ord.

LIBER PRIMUS.



S. Fokke del. et fec. 1739.

AMSTELODAMI,

Apud Hæredes J. RATELBAND cum Sociis. 1739.

MEDICAL
HISTORICAL

1882

WELLCOME

1882



1882

1882

1882



1882



L. S.

QUæ nunc publici juris fiunt Commentaria, non erant Disputationibus destinata, at Studioforum desideriiis satisfacere volens, antequam in lucem prodeant, ventilanda speciminum nomine exhibui.

Specimen primum, continens *Aph: I. ad IX.* censuræ publicæ submisit JOHANNES BON Harderovico-Gelrus, ad Diem 30 Maji 1739. Alterum vero, continens *Aph. X. ad XXV*, THEODORUS DE GORTER Enchusa-Batavus, ad Diem

21 *Junii* 1739. Sed ut aliis quoque Medicinæ cultoribus infervirem, curavi tot imprimi Exemplaria, quæ ad alicujus Libri editionem sufficiunt.

Cum vero Aphorismorum Hippocratis Primus Liber esset ventilatus & impressus, eum nunc in lucem emittere volui, deinceps vero reliquos, quamprimum Publice ventilati fuerint, animus est, ut ita Disputantium & Lectorum desideriiis simul satisfaciam.



P R A E F A T I O.

I.

AD artem Medicam perveniendam duæ ten-
dunt viæ, altera est Experientia, quam in-
ter medendum comparamus, altera est Doctrina
seu Dogmatica, qua quis instruitur, antequam
Medicinam profitetur.

Medicina
quibus mo-
dis compa-
ratur.

II. Sed quia experimentum est periculosum,
& ars nimis longa, quam ut possit exercitio
unius hominis comparari; oportet eum, qui Me-
dicinam profiteri satagit, prius addiscere præcepta
& fundamenta hujus artis.

Experien-
tia.

III. Illa autem præcepta variis modis tradun-
tur: arrisit Hippocrati per breves, sed tamen so-
lidas sententias, quas vocat Aphorismos, hanc
promulgare artem, ut sit quævis sententia abso-
luta, non respiciens ad priora vel sequentia.

Doctrina.

IV. Complectuntur hi Aphorismi sententias seu
regulas generales, quas paucis verbis proposuit
Hipp. Num istas detexerit experientiâ propriâ,

Aphoristi-
ce.

P R A E F A T I O.

num desumserit ex aliorum observatis, scientiæ Medica nihil interest. Sufficit enim in Medicina veritates cognoscere, sed quisnam istas promulgavit, nihil facit ad usum Medicum. Laudandus autem est, qui tales posteritati consecravit, ne cogamur semper novas detegere cum hominum detrimento.

V. Præstantius foret, ad formandam doctrinam, certum aliquem sequi ordinem, ille enim facilius in memoria retineri potest, sed rerum multitudine, & permistione, auctor cogitur recedere ab ordine, puras atque absolutas proferens sententias.

VI. Illæ autem sententiæ sæpe admodum obscuræ sunt, variasque patiuntur interpretationes, & vix intelligi possunt ab indoctis, quare ampliore explicatione egent. Ita potest Medicinæ discipulus paucis verbis concipere Medicinam, & si quid dubii, sit aut obscuri consultare Commentatorem.

VII. Non omnibus autem Commentatoribus idem est scopus: quidam enim, uti Literatores, sensum verborum explicant: alii cuncta congerunt in laudem Auctoris, sive sententias veras sive falsas divulgaverit, non multum curant.

Deni-

P R A E F A T I O.

Denique alii ad ampliandam scientiam unice contendunt, minime curantes, num Hipp: vel quivis alius eam sententiam divulgaverit.

VIII. Inter hos ultimos me profiteor, an recte vel secus fecerim, aliis dejudicandum relinquo. Ego semper existimavi, nos non ad gloriam vel honorem alicujus, sed ad usum & utilitatem in Medicina scribere debere. Quare vitio non vertat Lector Benevolus, si interdum a sententia Hippocratis recedam, non ut hujus viri eximii censor esse velim, sed quia post istud tempus multa præclara sunt detecta, quæ hunc virum latuere.

IX. Non miretur Lector Benev: me sententias non firmare Locis ex aliis auctoribus compilatis, multa equidem congeffi, ut perspicerem quid alii sentiant, recitare autem nolui, nisi quædam, quæ ad honorem vel gloriam Auctorum adduci possunt; ne videar aliorum labores vilipendere, vel animo malerolo carpere, cum expertus sim, istud remorari scientiam, ad quam excolendam unice contendo. Neque ad firmandam meam sententiam aliorum dicta adfero, quia auctorum sententiæ apud Medicum nullam habent auctoritatem, sed

P R A E F A T I O.

*experientia & ratione firmanda est veritas:
in his ad maiorem fidem hinc inde auctoris
locum recitabo.*

M E D I C I N A H I P P O C R A T I C A,

E X P O N E N S

A P H O R I S M O R U M
H I P P O C R A T I S

L I B R U M P R I M U M.

A P H: I.

I. *V*ita brevis, ars longa, occasio celeris, experimentum periculosum, iudicium difficile. Oportet autem non modo se ipsum exhibere, quæ decent facientem, sed etiam ægrum, & præsentem, & quæ externa sunt.

I.



Phorismus hic duas res complectitur, prima est, qua demonstratur, scientiam medicam difficile comparari posse, quia longa serie observationum est stabilienda, ad quod vita nimis brevis, occasio præceps, & non liceat in viventibus hominibus impune facere experimenta. Altera regulam generalem suggerit, secundum quam Medicus, æger, adstantes & res externæ se gerere debeant.

II. *V*ita hic accipitur pro illo curriculo temporis, in quo homo aptus est addiscere præcepta Medica, eaque valet
Vita brevis.
A
oppor-

opportuno tempore ad cognitionem & curationem Morborum adhibere: ita excluditur pueritia & decrepita senectus, quibus per vitam hominis scientia Medica nihil emolumenti accipit. Imo maxima pars ætatis infumitur, antequam homo possit aliquid addere ad artis perfectionem; quam diu enim ad fastigium scientia non pervenerit, artem non valet augere; at laborat sibi comparare, quod alii observaverint vel detexerint: adeo ut pauci restent anni in ætate nostra, in quibus aliquid addere possumus ad perfectionem scientiæ; imo vix sufficit unius hominis ætas ad addiscenda ea, quæ in arte medica inventa sunt, quare Hippocr: non sine vera ratione pronunciavit, vitam brevem esse; præprimis si comparetur ad ea omnia, quæ in arte Medica sunt addiscenda.

Ars longa.

III. Admodum disputant Medici, num Medicina sit *Scientia* vel *Ars*. Quia vero in scientia sufficit habere rei cognitionem, etiam si nihil efficimus, sed in arte supponitur cognitio, quæ quoque operationem exsequitur, magis convenit Medicinam, vocare artem quam scientiam, quia Medicina nullius est, nisi aliquid præstet ad salutem humanam. Eam artem esse longam quisque fateri cogitur, si respiciat tempus, in quo illa exculta fuit, si ad tempus, quod infumitur, antequam quis possit omnia sibi comparare, quæ in Medicina sunt addiscenda: atque longa est, si comparetur ad hominis vitam. Quippe ars Medica una cum Morbo habuit originem; quam primum enim homo corripiebatur Morbo, auxilium quæsit, hoc autem tempore tam imperfecta fuit, ut vix mereatur artis nomen. Et quoniam ad nostram quoque ætatem duravit, nulla potuit esse ars longior. Cum nunc ars Medica ad tantam perfectionem venerit, longum quoque tempus est inpendendum, antequam possumus cuncta addiscere: non sufficit enim, ut Empirici, quædam prompta possidere medicamina, sed ars Medica ex scientia anatomica, ut habeatur cognitio fabricæ; ex Chemicis, ut cognoscat humorum mutationes; ex Physica, ut intelligat actiones firmarum partium, est petenda; dein per experimenta & observationes in corpore

pore humano addiscere oportet, quid speciale sibi vindicet Morbus. Hucusque versatur in scientia Medica, sed ut artem excolat virtutes Medicamentorum sunt addiscendæ, ut istis, atque instrumentis, aliisque rebus in Diæta tradendis, valeat præsentem morbum tollere, futurum avertere, incurabilem palliare. Antequam hæc omnia cognoscuntur, longum tempus infumi debet. Interim labitur ætas, ut vix aliquid supersit temporis, in quo ars Medica incrementum posset capere. Hoc quia viderunt multi, aliquam duntaxat partem excoluere, tota ars nimis multa complectitur; in qua quoque aliquem progressum fecere. Laudanda sunt eorum opera, sed qui artem Medicam exercere vult, debet omnium habere notitiam, quod autem paucis contigit.

IV. Opportunum agendi tempus a morbo dependet, qui non omni tempore idem agere permittit; imo in morbis acutis, aliisque præcipitibus casibus prompta sunt adhibenda auxilia, ne cunctando moriatur æger, vel in deterius ruat: at vero in chronicis non tam accurate temporis momentum est observandum, quia subitaneis mutationibus minus obnoxii sunt. Si vero in præsentis tempore aliquid boni præstare possumus, imprudentia esset expectare in crastinum. Monet igitur sapienter Hipp: occasionem esse celerem, ne ex culpa nostra per cunctationem aliquod detrimentum fiat homini. Constat ex observatione hac, Medicum in omnibus oportere versatum esse, ne cogatur primo consulere libros, quo forsan tempore effluxisset occasio agendi, sed habere debet omnia auxilia in promptu, quibus levare potest æger.

Occasio
celeris.

V. Non omne experimentum est periculofum, ita enim Physici, & Chemici multa experimenta faciunt, ut ad majorem perfectionem deducant scientiam, in quibus nihil periculi subest. In medicina autem Experimentum est periculofum, cum temerariæ periclitationis finis sit mors. Experimenta in arte Medica raro bonum effectum fortiuntur, si enim quis medicamentum incognitum propinat in morbo incognito, ut multi faciunt Empirici, si juvat, casu juvat; & ex decem ne unus curabitur; ita erat in primordiis

Experimentum
periculofum.

diis artis, sed postquam cogniti sunt morbi & cognita atque detecta medicamina, temere foret hominis vitam & sanitatem periclitari. Etiam non caret periculo exhibere in morbo cognito medicamentum, cujus virtus non satis perspecta est, ut multi faciunt, qui novis student, & præstantiam ex pretio, aut multis laboribus ad præparandum medicamentum, impensis demetiunt: neque ad curationem aliquid valet virtus medicamenti cognita, si lateat morbi causa. Sed ut ex arte & sine periculo curetur æger, morbi causa cognita esse debet, & quomodo illa potest tolli: atque cognitæ debent esse virtutes in medicamentis, quæ causam illam tollere valent. Tale autem exercitium non vocatur experimentum, sed est experientia, multis experimentis confirmata. Qui sine prævia harum rerum notitia artem Medicam aggreditur profiteri, pestis est in Republica censendus, multos enim trucidat, at paucos servat. Dolendum sane est in Republica bene constituta ferre, idiotarum periclitatione & experimentis temerariis multos infantes letho dari, & hominem, arcem animæ immortalis temerariis experimentis committi. Utinam nemini, nisi in arte Medica eruditissimo, hanc artem profiteri esset licitum.

Judicium
difficile.

VI. Judicium in Medicina nititur præmissis, ex quibus perpensis Medicus judicat, quænam sit istius morbi causa, & quomodo tolli possit aut debeat. Causæ antecedentes, natura ægri, & apparitiones suggerunt istas notiones, ex quibus Medicus conclusionem formare debet. Sæpe vero causa præcedens latet, ut sit in aëre, cibo, potu, vel aliis rebus: quare Medicus & æger nesciat sæpe eam causam antecessisse; interdum æger quadam idiosyncrasia ipsi tamen ignota laborat. Et apparitiones seu phænomena non semper eandem causam latentem significant. Ex his tamen absconditis & sæpe incertis Medicus certum judicium debet proferre, quam difficile hoc sit, neminem latere potest. Triplex est judicium in curationibus faciendum; primum, ut veram causam, quantum humanum ingenium valet, ex dictis absconditis sæpe, inter se comparatis, eruat. 2º Si post cau-

cau-

causam detectam quædam nascuntur symptomata, ut judicare valeat, bona sint an mala, quæ vocatur Crisis bona vel mala: ea cognitio ex experientia multiplici in causa simili hauritur, sine qua in morbis nemo valet decernere verum: ad hanc partem excolendam requiritur homo experientia admodum instructus. 3^o Denique perpendere debet, quid sit in ea causa agendum, vel sequitur tunc naturam, quæ sæpe hanc vel illam molitur evacuationem, qua sustulit morbum, eam tunc imitari oportet; vel examinat curationes in simili causa cum felici eventu factas, istas tunc sequitur. Sed in his omnibus non errare aut decipi, humanum ingenium fere superat; quare multos deterruit harum omnium rerum difficultas, ut potius experimento vago & experientia empirica, quam dogmatibus certis voluerint exercere artem Medicam, cum summo scientiæ & hominum detrimento.

VII. Altera pars hujus Aphorismi breves sed solidas suggerit regulas, quas Medicus tenetur observare, ut feliciter suam artem exerceat. Auctor ad quatuor personas suam orationem dirigit: primo ad Medicum ipsum; 2^o Ægrum; 3^o Adstantes, qui auxilium ferunt; 4^o ad Res externas quæ incidere possunt.

Altera pars.

VIII. Medicum oportet 1^o ut sit magno ingenio præditus, qui potest ex omnibus istis obconditis eruere verum, qui vero in judicando sentiat se ineptum, se potius abstineat, ne multi ægri ex ejus inscitia detrimentum capiant. 2^o non præmature se accingat exercere artem, cum multa sint addiscenda, antequam quis vera a falsis decernere valeat. 3^o sit religiosus, ut nihil in ægris faciat sciens, quod non fecisset in semetipso ab eodem morbo correpto. 4^o habeat in agendo auctoritatem & constantiam, quia sine auctoritate æger nullam in Medico fidem habet, & si fluctuat, semper aliud quid agendo, existimabit æger, Medicum morbi esse inscium. Multo plura sunt in medico notanda, quæ in officio Medici proponuntur.

Medicus
qualis esse
debeat.

IX. Adstantium officium est curam ægri gerere, quia ipse impotens aliorum auxilio eget, illi igitur ægro succurre-

Adstantium
officium.

re debent, & Medicorum præcepta exacte obsequi, ut omnia rite apud ægrum peragantur.

Aeger quomodo se gerere debeat.

X. Nisi æger fideliter narrat, quæ sentit & patitur, quænam præcesserit causa, in Medico non est veram morbi causam eruere: requiritur quoque in ægro, ut mandatis Medici obtemperet, aliter enim frustra laborat Medicus.

Res externæ quales esse debeant.

XI. Res Externæ neque sint impedimento curationi, neque turbare debent crisin in acutis; lectus sit consuetus: absit rumor, strepitus, omneque animi pathema, Medicamenta rite sint præparata, odore, colore & sapore quantum fieri potest grata.

LIB. I. APH. II.

2. **I**N perturbationibus alvi & vomitibus sponte contingentibus, siquidem qualia purgari oportet, purgentur, confert, & leviter ferunt: sin minus, vice versa. Sic & vasorum vacuatio, si quidem talis fuit, qualis fieri debet, confert & bene ferunt, Sin minus, vice versa. Inspecere itaque oportet regionem, & tempus, & ætatem, & morbos, in quibus convenit, aut non.

I.

Hipp: in hoc Aphorismo præceptum generale præbet in evacuationibus copiosioribus ultro abortis, per alvum, vomitum & alia loca, num illæ sint permitteendæ, promovendæ vel sistendæ: & ut Medicus sciat, quid sit faciendum, adjicit cautelas, nempe facilem & difficilem tolerantiam evacuationum; sed quoniam hoc solum non sufficit, ratio habenda est Regionis, temporis, ætatis & Morborum. In expositione igitur hujus debemus primo respicere ad spontaneas istas evacuationes, quibusnam ex

cau.

causis oriantur. Dein quænam cautelæ sint observandæ, ut promoveatur vel moderetur illa evacuatio.

II. Si per Emunctoria naturalia major humoris copia evacuatur sine Medicamento assumpto, & sine causa externa hanc evacuationem concitante, quam in sanis fieri solet, vocamus spontaneam vel ultroneam Evacuationem. Complectimur quoque sub hoc nomine omnes reliquas evacuationes, ruptis vel dilatatis vasis, factas e locis, ex quibus in sanis nulla fieri solet evacuatio.

Evacuatio
spontanea.

III. Hæ evacuationes modum excedunt primo, si in corpore est humoris morborum abundantia, sive ille humor ex nimis ingestis fuerit genitus, sive ex morbo factus, sive bonus tanta copia collectus, ut destruat æquilibrium inter causas agentes & molem movendam. In his omnibus casibus si natura faciat copiosiores evacuationes, qua educitur id morbosum, vel quod abundat, salubris talis est statuenda, homo enim liberatur a morbi materia, & redigitur corpus ad æquilibrium.

Evacuatio
copiosior
salubris.

Ex abun-
dantia.

IV. Ultronea etiam 2^o fieri potest evacuatio in humorum abundantia, quæ tamen non aufert morbosum, sed eum relinquit humorem, educens sanum: vel tam magna & subitanea est evacuatio, quam vires corporis ferre nequeunt, illa autem non est laudanda, cum novum sæpe inducat morbum priori pejorem: ita aqua hydropicorum ex rupto umbilico; vel pus nimis copiose evacuatum in empyematicis, subitaneam mortem induxit.

Corposior
mala.

X. Denique 3^o natura sæpe molitur evacuationem copiosiores, etiam si nulla adsit abundantia; vel quod humores sint colliquefacti, aut putredine liquati, ut sponte effluant: vel oscula emunctoriorum nimis relaxata, cunctos transmittunt liquores. Tales evacuationes ultroneæ semper sunt damnandæ.

Copiosior
sine abun-
dantia.

VI. Ut autem sciamus, quænam ex his tribus evacuationibus accidit, observandum est, num fiat cum *Euphoria* vel *Dysphoria*, id est, num ægri vires per evacuationem hanc augeantur, & morbi vehementia minuatur, quando dicitur evacuatio fieri cum *Euphoria*, & vocatur Critica, ut fit in

Unde cog-
noscitur bo-
na vel ma-
la.

primo casu. Sed si æger nihil emolumenti ex tali evacuatione percipit, imo vires minuuntur & morbus magis exasperatur, talis evacuatio fit cum Dysphoria, & vocatur symptomatica.

Regulam
curationis
suppeditat.

VII. Hanc observationem facilioris & difficilioris tolerantiae instruere medicum, num sit evacuatio permitenda, augenda, aut moderanda, sponte liquet. Scimus enim, nisi evacuatione tollatur morbi materia, vel abundantior humor, nos non debere talem permittere, & adhuc minus promovere evacuationem, quare ex observatione hac certum sumus, num conducat, aut non. Hinc recte præcipit Hipp: si fiat evacuatio cum Euphoria, eam esse promovendam, sed si fiat cum Dysphoria, eam sistendam esse, quia Medicum oportet minuere, non augere morbum.

Regio quid
faciat ad
cognitio-
nem.

VIII. Unicum hoc signum cum interdum potuisset fallere, vel non satis observari, ut æger non percipiat, num ex bona causa levantur vires, cum sæpe evacuationes fiant, quas mox sequitur mors, quæ tamen magnum videtur adferre levamen, ut sæpe in moribundus experimur, necesse itaque est alia quoque consulere, ut simus certiores. Inter ea primo recenset *Regionem*. Quædam regio enim non solum majorem evacuationem fert, sed & sine ea homo vix sanus vivere potest: aliis autem in regionibus quævis evacuatio copiosior damnum infert. Hic autem loci non possumus omnes percurrere regiones, ut præcepta tradantur de evacuationibus, quare hoc observare sufficit, si exercemus medicinam in quadam regione, ut in ea observemus, quid boni aut mali eo in loco faciat evacuatio. Si deteximus in tali regione facile tolerari evacuationes, eas quoque permittimus fieri, sin vero secus sit, quantum fieri potest istas evacuationes compescimus, & raro excitamus artificialem evacuationem.

Tempus
quid faciat
ad cognitio-
nem eva-
cuationis.

XI. Addit secundo loco *Tempus*, quod distinguunt in vernale, æstivum, autumnale, & hyemale, aliter in solstitium & æquinoctium. De his autem temporibus suis locis agitur: hoc loco sufficiet observare, id tempus tolerare evacuationes copiosiores, quod in corpore collexit humorum abundan-

dan-

dantiam, quæ vix tolerari potest in inevitabili instante temporis mutatione: ita ver ferre potest copiosiores evacuationes, quam autumnus, quia instans æstas suo calore partes firmas relaxans, non potest æqualem ferre liquoris quantitatem, corpora sana enim hyeme ponderosiora sunt, quam æstate; ergo vernali tempore hæ copiosiores sunt salubriores, quam aliis temporibus.

X. Non sine gravi ratione *Ætatem* addit, quamdiu enim multum increscit homo, uti infantes & pueri, talis ætas non habet humorum abundantiam, quia quod confectum est, in corporis incrementum cedit: huic itaque ætati non convenit evacuatio larga: neque in senibus copiosior evacuatio est toleranda aut facienda, cum corpora senectute debilitata, vix valeant tantum conficere, quantum ad sustentationem sui requiritur. At constans ætas, præprimis si non amplius corpus increscit & valens est, largam patitur facile evacuationem, hoc enim tempore ætatis natura in mulieribus concitat menses, & in viris sanguinis fluxum ex naribus, facileque copiosior evacuationem sustentat, & frequenter incidit in morbos, qui ex majori humorum copia nascuntur.

Aetas quid faciat ad cognitionem evacuationis.

XI. Non omnes *Morbi* vetant aut exigunt evacuationes, sed quidam ex his: neque illi, qui in principio ferunt evacuationem, circa finem eandem exigunt. Omnes autem percurrere morbos, non est hujus loci, pro generali regula sufficit notare morbos inflammatorios, acutos, calidos, cum motu humorum validiore, & qui humorum abundantiam arguunt, expostulare evacuationem largiorem, quæ si non fiat, arte est facienda: morbos autem suppuratorios, putridos, pituitosos, frigidos, cum motu minore, vel in quibus antecessit copiosior evacuatio, ut in puerperis, omnem respuere evacuationem.

Morbi omnes neque vetant neque egent evacuatione.

XII. Denique distinctionem proponit inter evacuationes, quarum tres proponit, 1 vomitum, 2 alvi egestionem, 3 alias reliquas evacuationes. In quibus omnibus sponte contingentibus, qualia purgari oportet, purgentur, confert, & leviter, ferunt. Id est per dicta emunctoria talis debet

Evacuatio per convenientem emunctorium.

evacuari humor, qui emunctorio convenit minime alienus. Nam si verbi gratia sanguis redditur copiosior, aut mera-
ca egeruntur vel revomuntur, quamvis copiosior evacuatio
fuiſſet laudabilis, nunc vero damnatur, quia non evacuantur,
qualia oportet.

Vomitus
quando per-
mittendus.

XIII. *Vomitus* igitur ſpontaneus copioſus permittendus &
promovendus eſt, ſi reddat cacochyliam in ventriculo col-
lectam, in morbis inappetentiæ & ſtomachi vitiati in ſua
coctione, ſi tum per vomitum levantur ſymptomata, & au-
gentur vires, ſcimus, eum vomitum ſuſtiliſſe Morbi mate-
riam: ſed ſi illa abſint indicia, vel quod aliena reddantur
per vomitum, vel morbus a vomitu augeatur, abſit credere,
vomitum allaturum levamen.

Alvi egeſtio
quando
permitten-
da.

XIV. Id quoque ſentiendum eſt de ſpontanea copioſiori
alvi egeſtione. Hipp: enim hoc loco utitur vocabulo, quod
perturbatam alvi egeſtionem ſignificat non mediocrem: quia
naturale eſt, ut alvus exoneretur, quod de vomitu dici ne-
quit. Talis immodica alvi egeſtio debet reddere materiem
in inteſtinis collectam, vel in ea confluentem, cujus mate-
riæ educatione tollitur morbus: ſæpe hoc in caſu per purgantia
evacuationem adjuvamus, ut corpus ab omni alieno liberetur.
Sed ſi evacuatio hæc non conveniat morbo, ut Phthiſi, im-
pyemati, aut ſi aliena emittantur; aut ſi æger difficile fert
hanc evacuationem, non eſt illa evacuatio promovenda, ſed
moderanda vel cohibenda.

Evacuatio-
nis regulæ
obſervan-
dæ.

XV. Per vaſorum vacuationes reliquas intelligit evacua-
tiones. Solummodo ex primis viis per vomitum vel ſeccef-
ſum poſſunt reddi humores; ſed reliquæ evacuationes natura-
les, artificiales, vel quæ ſolutis vaſis contingunt, ex com-
muni maſſa deducuntur. Ergo de evacuatione per urinam,
ſudorem, ſalivationem, & de ſanguinis miſſione eædem ſunt
obſervandæ regulæ, quæ ſuperius fuere notatæ.

LIB. I. APH. III.

3 **I**N Exercitantibus boni habitus, ad summum progressi periculosi sunt, si in extremo fuerint. Non enim manere possunt in eodem, neque qui scire. Quum vero non quiescunt, non amplius in melius augescere possunt; reliquum est igitur ut in deterius. Ob has igitur causas bonam habitudinem non tarde solvere confert, quo corpus rursus renutritionis principium sumat. Neque vero collapsiones ad extremum ducere oportet, periculosum enim est. Sed qualis natura est ejus, qui perferre debet, ad hoc ducere convenit. Similiter autem & evacuationes ad extremum ducentes periculosæ sunt: & rursus renutritiones in extremo existentes, periculosæ sunt.

I.

UT Hipp: in præcedenti Aphorismo tradidit generales cautelas in evacuationibus ultro obortis, ita in hoc præcipit canones observandos in corporibus sanis, si arte facienda sit evacuatio aut renutritio, ne utraque modum excedant. Evacuacionis necessitatem ea ratione firmat, quam ex athletarum bono habitu desumfit. In expositione hujus occurrit. 1 Num corpora sana egeant præternaturali vel artificiali evacuatione, & quousque illa permittenda. vel facienda 2. Qui modus servandus est in refectione. 3 Ponderanda est ratio, quam adduxit Hipp:

II. Antequam determinari potest, num corpora sana per evacuationes sint ab eo laudabili statu depellenda, inter Medicos primo constare debet, quid intelligant per *Sanitatem*. Sanus autem tunc dicitur homo. qui omnes suas actiones exercet vel exercere valet cum constantia & oblectamento, cui nihil est alienum in corpore, cui quoque inter actio-

Evacuatio
in sanis.

Sanitas de-
finitur.

Sanitas an
egeat cura-
tione.

actiones & humores habetur æquilibrium. In tali igitur corpore nihil est, quod sui ablationem exigit, cessat igitur Curatio Curatoria ut vocant Medici, quidquid enim facimus, in deterius ruit. Sed de Curatione præservatoria inter Medicos maxima lis est, & fere omnes sequuntur auctoritatem Galeni & Hippocratis, non quod ex experientia id defumtum sit, sed ex ratione.

III. Agedum, si rationibus est dimicandum, cessat auctoritas: & quia his temporibus accuratior est anatomica cognitio, & plura sunt facta experimenta chemica & physica, audeo sine arrogantia profiteri, Medicos his temporibus plus valere rationibus, quam Hipp: aut Galenus, vel alii veteres. Nemo tamen existimet, id antiquis vitio dari, quod multa nescivere, quæ serior ætas detexit: forsan hi viri præpolenti iudicio fuere præditi, sed defectu experimentorum non raro fuere allucinati. Quomobrem, si veteres rationibus utuntur, non sumus coacti eorum auctoritatem sequi.

Nutritionis
necessitas.

IV. Corpus vivens sanum in se habet motum vitalem, semper aliquid deterentem & inutile facientem, quod detritum & alienatum per emunctoria naturalia expellit: inde generatur refectionis seu nutritionis necessitas. Nutritur autem assumtis alimentis, quæ eodem illo motu vitali convertuntur in similia ea, quæ ablata fuere inevitabili lege. Quamdiu in ætate constanti, (nam quamdiu homo crescit, plus conficitur, quam corrumpitur & evacuatur) tantum boni ex assumtis præparatur, quantum motu vitali deteritur, & corrumpitur, & expellitur, perfecta manet sanitas, & nulla eget Medicina. Sed si nimium conficitur, generatur humorum abundantia, qua destruitur æquilibrium: in hoc casu necesse est vel naturalem augere evacuationem, vel artificialem facere, aut minus ingerere, ut ita corpus redigatur ad suum æquilibrium. Talis autem status non est sanus, sed est morbus ex abundantia, etiamsi non sentiatur. Sæpe enim adsunt morbi, qui nulla præbent indicia, ut varices vel vomicæ internæ, quæ tamen a morbis non excluduntur.

Evacuatio-
nis necessi-
tas.

V. Ad præveniendos autem morbos sæpe coacti sumus humoris copiam minuere. Ita fœminæ ad pubertatem venientes necesse est ut menstruas purgationes habeant, quibus id abundans evacuant: ita juvenes cum euphoria hæmorrhagiam patiuntur, sed licet non contingunt, manent tamen sani, nisi a longo tempore, fuere assueti. Tantum valet consuetudo, ut etiamsi fuerint deteriora, indulgendum sit: sed tunc non deducitur indicatio ex sanitate sed consuetudine. Præstantius autem est malis non assuescere, aut si assueti sumus, sensim a concepta mala consuetudine recedere. In fœminis autem alia est ratio, quæ a Deo ita sunt creatæ, ut sua corpora valeant, si gravida sint, incrementum præbere fœtui, & post partum suppeditare lac sine corporis debilitatione: quæ necessario sequeretur, si corpora fœminarum non plus nutrimenti conficerent ex assumtis, quam ad nutritionem sui requireretur. Menstrua igitur purgatio in fœminis inter naturales evacuationes est recensenda. Quæ si fiat, aut si gravida vel lactans sit, non eget evacuatione præternaturali. Si vero fœmina in principio gestationis abundantia sanguinis laborat, quod embryo minus convertit in incrementum sui, quam fœmina ante prægnationem eodem temporis termino solebat evacuare, expedit venam secare.

Evacuatio
ne boni
sæpe præve-
niuntur
morbi.

Menstrua-
tio est eva-
cuatio na-
turalis.

VI. In istis igitur corporibus, quæ ex assumtis alimentis plus boni conficiunt, quam deteritur & expellitur motu vitali, (excipimus autem fœminas, nisi menstrua purgatio inter naturales evacuationes admittatur) tandem generatur morbus ex abundantia, quæ præternaturali evacuatione tolli debet, ne ex destructo æquilibrio pejores generentur morbi.

Quibus ex
abundantia
fit morbus

VII. Ad evitandam in hujusmodi corporibus æquilibrii destructionem & inde nascendos morbos, solam evacuationem sine cunctatione faciendam Hipp: præcipit, & merito: præstantius enim est quantitatem detrahare, quam morbos ex destructo æquilibrio expectare. Id autem mali est in hac medendi methodo, quod homines tunc nimis assuescant huic artificiali evacuationi: quam tamen consuetudinem potuissimus

Evacuatio
facienda in
abundantia.

mus evitare parciori diæta, & laboribus durioribus, quibus vel minus suppeditatur, vel magis consumitur, ut non sit necesse corpus arteficiali evacuatione laceffere.

An sola
sanguinis
missione
minuenda
abundan-
tia.

VIII. Omnes fere Commentatores hic præcipiunt sanguinis missionem. Videtur autem mihi Hippocratem quamcumque voluisse evacuationem, ut in præcedenti Aphorismo indicavit: nam per vomitoria & purgantia quoque valemus minuere abundantiam. Qui enim frequenti vomitu, aut alvo turbata laborant, tandem pallent, quibus constat, has evacuationes etiam posse minuere sanguinis rubri quantitatem.

Evacuatio
ne immo-
dica an Au-
ferenda a-
bundantia.

IX. Multum quoque se fatigant hunc locum de mediocri evacuatione conciliare cum L. 1. Aph. 23. ubi præcipit ad animi deliquium esse ducendum, quasi Hipp: sibi metipsi obloqueretur, sed si inspiciatur ratio eo in loco proponenda, facile constabit ita fieri debere. Hoc loco præcipit enim *evacuationem* faciendam in humorum abundantia, ne fierent inde morbi, sufficit igitur tantum ducere, ut restitua-
tur æquilibrium, sed non ultra: peccare enim æque possu-
mus defectu humorum, quam abundantia: quare modus non
est excedendus per nimiam evacuationem. Hoc quoque
novit Hipp: neque vero collapsiones, inquit, ad extremum
ducere oportet, periculosum enim est. Id est in sanis ce-
teroquin corporibus sola abundantia laborantibus, non debe-
mus per immodicam evacuationem facere, ut vasa inanita
collabantur, seu evitando malum ruere in deterius.

Refectio
quanta de-
beat esse in
defectu.

X. Ut est modus servandus in evacuatione, ita etiam in *Refectio* seu *Renutritio*, quam Hipp: ἀνάσσειν vocat. Supponitur homo vel ex inedia, vel multis laboribus, vel morbo præcedenti, ita humoribus privatus, ut quoque ab hac parte destructum sit æquilibrium, sed ceteroquin sanus. In tali casu præcipit Hipp: Refectionem non fieri debere subito, seu magna copia simul. Hujus rei ratio est evidens, nam si appetitui indulgeamus, qui sæpe nimius est, ut post curationem quartanæ febris per antidotum, tantum ingeritur, quantum a corporis viribus jam adhuc infirmis subigi nequit. Id igitur ingestum, sua copia supprimit ulterius vires, &

quia

quia actione vitali non subigitur, in sibi propriam corruptelam convertitur, quæ corruptela multos morbos in nobis producit. Necesse igitur est, non plus ingerere, quam quod viribus istis infirmioribus vinci potest: præstantius enim est famem pati, & sensim recuperare vires, quam nimia ingurgitatione magis debilitari, & in novos ex corruptela morbos incidere.

XI. Restat examinare Hippocratis Ratio, quæ est tanquam fundamentum, cur debeat fieri evacuatio in perfecta sanitate. Non potest, inquit, bonus habitus ad summum progressus in eodem statu permanere, quia natura semper aliquid moliatur, quare, si actio hæc nihil boni præstare possit, malum facit. Vera illa esset ratio, si per motum vitalem, qui hic vocatur natura, duntaxat fieret confectio in melius. At oblitus fuit, vel nescivit Hipp: eodem illo motu humores quoque bonos corrumpi, & partes firmas deteri, quare natura, etiamsi corpus ad summam perfectionem deduxerit, semper tamen habeat aliquid elaborandum: nempe ut id alienatum concoquat & expellat; & ut nova ingesta assimulet bonis humoribus. Nulla ergo est ratio, cur corpus a perfecta sanitate sit deflectendum, sed præstat eandem conservare sanitatem.

Habitus
bonus an
persistere
nequit.

XII. Qui vero genio nimis indulgent & pancreatice vivunt, corpora sua nimia alimentorum copia saginant; & tamen parum exercent, ut illa abundantia motu corporis consumatur, quemadmodum *Athleta*: his expedit aliquando detrahare sanguinem, ut conservetur sanitas, quia humorum bonorum abundantia laborant. Sed inde non potest in omnibus sanis generalis deduci regula, nam qui parcius vivunt, & suum corpus magis exercent, non egent evacuatione hac & manent sani, ita multi temperate viventes ad summam senectutem sani manent, sine ulla evacuatione præternaturali, hæc ergo cautio ad sanitatem conservandam referenda est ad istos, qui sua corpora saginant, sed non est propterea generalis regula.

Athletis
cur expedit
facere eva-
cuationem.

LIB. I. APH. IV.

4. **T** Enues & exacti victus, & in longis semper affectionibus & in acutis, ubi non expedit, periculosi sunt: & rursus victus ad extremam tenuitatem progressi, difficiles sunt. Et repletiones ad extremum progressæ, difficiles sunt.

I.

V Ersatur Hippo: in tradendis regulis generalibus, ita in *Aph.* 2. præcepit, quid esset agendum in spontaneis evacuationibus; In *Aph.* 3. autem proposuit evacuationes artificiales in hominibus sanis. Hoc autem loco tradit regulam generalem de Diæta, qualis oporteat esse in morbis, deinceps acturus est de Diæta moderanda in hominibus sanis.

Diæta quæ
dicatur.

II. *Diæta* seu victus Latam & strictam significationem habet: Late si sumitur, indicat sex res non naturales, quæ hodie numero quaternario absolvuntur, ut sunt 1 ingesta, 2 gesta, 3 retenta & excreta, 4 applicata. Strictiori significatione accipitur pro usu alimentorum, in quo sensu hic ab Hippo: sumitur, quoniam hic solummodo verba facit de nutritione.

III. In nutritione autem hic duo extrema attingit, nempe nutritionem plenioram, & parciorem & observat, quid victus hi maxime distantes faciant in morbis acutis & chronicis. De reliquis autem victus speciebus aliis locis agit.

Diæta tenuis.

IV. De *Tenui & Exactæ Diæta* dicit Hippo: eam in longis morbis semper periculosam esse; in acutis interdum, quando nempe non expedit; in sanis autem extreme tenuem difficilem esse. Ergo præcepta tradit de tenui victu in tribus casibus. Initium facturi ab ea, quæ statuitur in sanitate,

te, 2° in morbis longis, 3° in acutis, ita meliori ordine sequetur doctrina.

V. *Extrema Tenuis Diæta* proxime accedit ad jejunium, eam dicebant fieri veteres, si parum admodum ingerebatur de alimentis facilis admodum materiæ, atque hoc per longum tempus: eam dicit difficilem esse. Hoc præceptum opponi videtur Celsi effato & multorum, abstinencia & quiete multos morbos præveniri & curari. Sed etiam si parum comedimus, aut mediocrem copiam ingerimus, pergit tamen motus vitalis deterere partes firmas, & corrumpere humores: si vero parciori ingestione tantum non potest restitui, quantum consumitur & corrumpitur, id merito difficile dici potest, quia homo inde debilitatur. De hoc autem victu in sequenti Aphorismo amplius agendum.

In sanis

VI. Si exacta diæta, quæ nutritioni non sufficit in morbis longis instituitur, periculosa est. Morbi enim longi sensim debilitant vires, & victus exquisitus detrahit necessarium nutrimentum, quare homo talis binis causis debilitantibus afficitur, quarum una sufficiebat ad inducendam debilitatem, quare periculum est, ne sufficiat æger, qui mediocri victu erat sustentandus, ut posset ferre morbum illum longiorem. Non debemus vero in oppositum incidere, imperando his pleniorē victum, uti multi existimant, quo plus ingerimus eo magis nutriri, cum morbo longo corpora debilitata, neque copiosiora, neque concoctu difficiliora, in nutrimentum convertere possunt, sed in corruptelam spontaneam abire permittunt. Ex hoc autem præcepto deducimus, summam medelam non queri oportere in strictissima Diæta, ut multi contendunt in morbis chronicis.

In Chronicis.

VII. In morbis autem *acutis* passim Hipp: & alii exactam seu parcam Diætā præcipiunt, hic vero loci dicit periculosam esse, si non expedit. Quare regulariter in Acutis convenit Diæta parcior: sed invenitur casus, in quo non conducit: hunc casum quia non exprimit hic Loci Hipp: ex aliis locis supplendus est. Intelligi autem potest ex iis, quæ mox sequuntur in Aph: vii. *ubi vero non* (est morbus

In acutis.

peracutus) *pleniore victu uti necesse est.* Si enim homo ceteroquin sanus corripitur morbo, qui ex sua natura desiturus est inter quatuor dies, ille homo tantum chylosi habet in suo corpore, ut non sit periculum, eam defectu alimenti debilitari tam brevi tempore: adeoque motus vitalis hoc tempore unice elaborandam habet morbi materiam, cum non divertatur novorum alimentorum concoctione. Si vero morbus ille acutus ultra quatuordecim dies sit perseveraturus, tam diu non restaret chylus in nutrimentum vel bonos humores convertendus, quare aliquid est exhibendum, quod non eget multa corporis actione, & quod vires non superat sua copia, ne circa morbi finem, & morbi vehementia, & defectu alimenti debilitetur æger. Ille itaque est casus acutorum, in quo exquisitissima diæta non caret periculo.

LIB. I. APH. V.

5. **I**N tenui victu delinquentes ægrotantes, magis læduntur. Omne enim delictum, quod committi poterit, magis magnum committitur in tenui quam in paulo pleniore victu. Quapropter etiam in sanis periculosus est valde tenuis, & constitutus, ac exactus victus: quoniam delicta gravius ferunt. Ob hoc igitur, tenuis & exactus victus periculosus est magis quam paulo plenior.

I.

Supponit in hoc Aph: 'Hipp: omne nimium naturæ inimicum esse, fieri posse damnum ex parciore & largiore victu: sed comparisonem nunc facit inter excessum & defectum, quid majus damnum inferat, tam in sanitate quam morbis: & concludit, majus malum fieri ex defectu alimentorum quam ex abundantiore.

II. Ut

II Ut conclusio hæc refutetur vel comprobetur. 1º inspicienda est regula generalis omne nimium naturæ inimicum esse & nocere. 2º. Quid faciat victus abundantior. 3º. quid victus parcior. Denique producta horum inter se sunt comparanda, ut constet, quid majus malum induxerit.

III. Neminem latet, Deum ita nostrum creasse corpus, ut sit definitis actionibus limitatum, quos limites si transgrediamur, statim deflectamur de statu bono: in his autem quædam observatur latitudo, ut possimus decedere aliquomodo a mediocri assumptorum copia sine sanitatis detrimento; potest enim homo paulo plus & minus comedere quotidie sine ulla noxa: quia vero mediocritas non est adstricta ingestioni sed viribus corporis, eadem itaque quantitas, quæ mediocris est debilibus & ociosis, nimis parca est robustis & operariis, & vice versa. Quæ igitur quantitas habita ratione virium corporis, mediocritatis limites excedit, sive fiat in excessu sive defectu nimium dicitur. Id nimium, quia vel tantum non suppetit vel plus suppetit, quam requiritur, ut maneat sanitas, semper detrimentum adfert, atque hoc non solum in alimentis porrigendis, verum etiam in aliis quoque rebus obtinet, ut demonstraturi sumus (ad Aph. LI. Lib. 2.)

Alimenta
nimia.

IV. Victus plenior non solet ita ex copia æstimari, sed ex natura assumptorum, diluta enim etiam si sint copiosiora non faciunt victum plenior, cum in minori copia alimentorum difficilius digestionis, sæpe plus nutrimenti habeatur. Si itaque plus alimentosi assumitur habito respectu virium corporis, quam corpus istud possit mutare in suos humores, plenior est victus. Id autem quod a viribus vitæ non subigitur vel ita manet, ut assumebatur, quando vocatur *Crudum*: si vero assumpta diutius retenta in loco calido & humido, quæmadmodum fit in nostro corpore. per spontaneum motum, sive fit fermentationis, sive putrefactionis, mutantur in alienam indolem, humor tali modo natus vocatur in primis viis cacoehyia, & per totum corpus dispersus cacoehymia. Qui liquor natus varios morbos inducit. Si vero æger deinceps se abstineat a tali copiosiore ingestione

Plena digestio.

stione, non suppeditatur Materia, ex qua cacochylia vel cacochymia formari potest: itaque pergente motu vitali id alienum sensim subigitur & expellitur, quoniam non habet scaturiginem; ergo per Diætam solam valemus morbos ex pleniore victu natos curare: ita recte præcipiunt, per abstinentiam multos morbos curari, illos nempe, qui ex pleniore victu fuere nati.

Tenuis
Diæta.

V. Tenuis autem seu strictissima Diæta tunc statuitur, si minor alimenti copia suppeditatur, quam potuisset viribus corporis in proposito casu præparari, non respicimus hic ad quantitatem ingestam, sed ad comparisonem virium corporis, & consumptionem corporis nostri. Ita homo se multum exercens tenui victu fatigatur, si non ingerit plus, quam alius otiosus: ita robustus tenui victu utitur, si iisdem alimentis & eadem copiâ utitur, ut homo debilior. Si minus suppeditatur itaque, quam deteritur & corrumpitur actio vitæ, necesse est, ut tale corpus laboret defectu, qui quoque simul inducit debilitatem: & quia non suppeditatur novum, id quod corruptum & detritum est, omne non evacuatur, sed portio relicta bonis mista, etiam generat cacochymiam. Si tunc ille homo pleniore victu utitur, ea quæ ingesta sunt ob vires debilitatas non convertuntur in bonum succum, sed tunc sæpe laborat duplici genere cacochymiae; nempe ex humoribus propriis inutilibus factis, & ex crudis vel sponte alienatis alimentis. Id quoque incommodi accedit, quod quæ a bona sua indole per nimiam actionem degenerarunt, deinceps nequeunt in bonum succum converti, sed fiunt actione vitali sensim deteriora, ut semper debeant evacuari: interim succurrere non possumus substituendo bonum succum, quia ingesta non præbent bonum succum, nisi præcesserit concoctio virium vitæ, quæ cum nimis debiles sint potius ex assumptis suppeditatur crudum vel corruptum, quam bonus humor. Inde toties reconvalescentes ex morbo ex pleniore victu in cacochymiam & cachexiam incidunt: & nisi ægri vires restaurentur, & mediocrem victum fervent, diu manent valitudinarii.

VI. Si nunc conferamus ea, quæ ex parciore & largiore victu eveniunt, sine hæsitatione pronunciare possumus *Delinquentes in Tenui victu agrotantes magis lædi*. Quippe producta ex victu pleniore sponte potuere emendari, & expelli, si autem restitissent in primis viis, aut per purgans potuissent eliminari, & ex tota massa per diuretica & sudorifera; imo sola abstinencia morbi causam eradicare valet detracto pabulo; vel motu musculari id crudum quoque subigi potest & expelli: sed alienum ex tenuiore diæta natum, & inducta debilitas, neque motu, neque largiore victu tolli potest. Quare si sit peccandum, minus malum esset, in abundantia quam in defectu committere errorem. Hoc quoque verum esse in morbis Acutis & Chronicis, superius demonstravimus.

Tenuis
victus ma-
gis lædit.

LIB. I. APH. VI.

6. **A**D Extremos morbos, exacte extrema curationes optimæ sunt.

I.

IN tradendis regulis de victu hunc interposuit Hipp: Aphorismum, ut sit pro fundamento generali, cujus species etiam illa est curatio, quæ per victum curat. Si ergo generalis regula procedit, specialis de victu quoque est admittenda, quod nempe debeamus tenuissimum victum vel perfectam inediam imperare in morbis extremis.

II. *Extremus, ultimus, postremus* aut *summus morbus*, ita ut nihil supra sit, tunc dicitur præsens, cum morbus minatur interitum, cui nisi succurramus promte, breve vel certe interficiat. Tales morbi sunt 1° acutissimi, qui tanto impetu exagitant corpus, ut nisi compescatur, omnia destruat: in hoc præcipiti casu largiorem mittimus sanguinem, & ducimus

Morbus
extremus.

Curatio
extrema.

mus alvum, & abstinemus ob omni victu; quæ omnia in mitiori malo non essent facienda. 2° Chronici tales multi sunt, quorum causa vi vitæ tolli nequit, neque solita medela emendari. Ita os carie infectum respuens medelam, extirpationem exigit; Cancer si fieri possit, simul & semel abscindendus; angina quæ minatur suffocationem, bronchotomiam indicat; pus in pectore paracenthesin; fractura cranii terebrationem. Ita *curationes* omnes dicuntur *exacte extrema*, quia violentes sunt & nunquam nisi in summo discrimine adhibentur; cum præstantius sit truculentam subire operationem, vel amittere aliquam partem, quam ut homo moriatur. Regula igitur est generalis, violentæ & extremæ curationes sunt adhibendæ, si malum neque vi vitæ, neque mitioribus superari queat, & minetur interitum vel majus malum.

LIB. I. APH. VII.

7. **U**bi quidem peracutus est morbus, statim etiam extremos labores habet, & extreme tenuissimo victu uti necesse est. Ubi vero non, sed pleniore victu uti licet, in tantum sub descendendum est, in quantum morbus extremus mollior fuerit.

I.

Diaeta in
morbo acuto.

IN hoc aphorismo determinat victus quantitatem ex morbo præsentis, & ex omnibus morbis eam eligit classem, quæ est acutorum; hos iterum acutos distinguit in peracutos & minus acutos, vel molliores. Et in peracutis imperat tenuissimum victum; in molliore autem seu remissiore victum plenior.

II. Omnes morbi, qui brevi tempore vel cessant vel ad interitum vergunt, sive cum sive sine periculo sint, vocantur

Acuti

Acuti. (vid. T. 53. XLVII.) modo non durant ultra viginti quatuor, vel ad summum quadraginta dies; qui vero ante diem quartum terminantur, *peracuti*, & *acutissimi* vocantur.

III. *Peracuti* sunt vel cum laboribus, id est validissimis symptomatibus, quæ ab irritata vi vitæ concitantur, quales hic ab Hippocrate proponuntur; vel sunt sine laboribus multis, uti morbus *peracutus* benignus, *Ephmera febris* vel *Synochos simplex*; vel *peracutus* malignus, uti *Pestis*, & aliæ *Febres malignæ* brevi tempore interficientes; vel *peracutus* periculofus, uti *Apoplexia*, *Lethargus*, *Angina*.

Morbi peracuti.

IV. Si incipit morbus acutus cum magno æstu, siti, siccitate, pulsu duro, respiratione frequenti, magna molestia, anxietate & aliis vehementioribus symptomatibus motus validioris circulationis, cognoscimus eum morbum fore *peracutum*; nam initia tam valida sensim incrementa diu tolerari nequeunt, quin omnia sint destructa: apposite itaque adjecit Hipp: *statim etiam extremos labores habet*, ut cognoscamus speciem morbi acuti, & eum *peracutum* futurum esse.

Peracutus
futurus
conjectur.

V. In tali *peracuto* morbo expertus est Hipp: tenuissimum victum prodesse, quoniam tenuissimus victus, & ob minorem quantitatem, & qualitatem facile superabilem, non eget multa virtute agente corporis, quare conducit corpori debilitato ex morbo. neque verendum est ex defectu alimentorum, uti in chronicis, cum corpus diu ferre debeat morbum: & in *peracutis*, ubi vires sunt debiles, & tempus breve, non est verendum, defectu alimentorum vires debilitari.

Tenuissimus victus
in peracutis.

VI. *Ubi vero non.* Ubi scilicet morbus ille acutus non statim incipit cum multis laboribus, ex quibus judicamus, morbum diutius duraturum & simpliciter acutum fore. In tali statu non debemus victu tenuissimo uti, quia tunc tantum alimenti est ingerendum, quantum sufficere potest ad sustentationem corporis.

In quo
acuto veratur
tenuis-

VII. Differentiâ victus expositâ, quæ est inter victum morborum acutissimorum intra quatuor dies desinentium, & inter victum acutorum diu durantium ultra viginti imo

Qualis dicta
in acutis.

40 dies, Hipp: voluit reliquos quoque intermedios determinare. Ad hoc dicit, quo acutus morbus magis accedit ad acutissimorum genus, eo parciori diæta est utenda; quo vero ad diuturniores accedit, eo meraciori & copiosiori victu utendum, ne vires cadant defectu alimenti. Nam in morbis acutis, qui prope accedunt ad acutissimorum genus, tantus defectus ex parciori victu non est expectandus, quam in iis, qui ad longissimum genus accedunt: & in his minor est vehementia symptomatum, quæ victum largiorem vitarent, quam in illis; quare quo acutior est morbus eo parcior debet esse victus; & vicissim quo morbus est longior eo largior victus est concedendus.

LIB. I. APH. VIII.

8. **Q**Uum in vigore fuerit morbus, tunc tenuissimo victu uti necesse est.

I.

* Tenuissimus in morbi vigore.

IN præcedenti demonstratum est, qualisnam victus debeat esse in vehementiore & mitiore morbo; nunc proponit sine discrimine omnem morbum acutum, sed in eo vult distinguere tempora morbi, quæ accuratissime passim ab Hipp: citantur. Ex temporibus morbi eligit *Vigorem* seu *Morbi statum*, qui vocatur ἀκμή; in quo tempore morbi causa validissima infert symptomata; id est quando ab initio morbi symptomata non amplius crescunt, sed nunc persistunt, post quod tempus, vel moritur æger vehementia causa obrutus, vel morbus declinare id est mitescere incipit, prævalentibus viribus vitæ, quibus superatur & denique expellitur morbi causa.

II. In hoc temporis articulo summum est discrimen, & maxime laborant vitæ vires, quæ si deficiunt, æger succumbit.

bit. Per se itaque patet, Medicum nihil agere debere, quod vires avocare vel suppressere potest. Si nunc probari possit, alimenta ingesta vel avocare vires vel istas suppressere, dicti veritas constat. In præcedentibus demonstratum est & nemini quoque dubium esse potest, quin alimenta ingesta subigenda sint viribus nostri corporis; itaque hoc dum peragunt, a duabus causis urgentur vires, a materia nempe morbi, & ab alimentis ingestis, quare eæ vires, quæ vix sufficiebant ad superandam morbi materiem, nunc deficere debent, cum desiderantur insuper ad alimentorum subactionem.

III. Neque hoc tantum, sed in morbi vigore materia morbi disponitur, si supervicturus sit æger, ad crism seu evacuationem criticam, quæ debet fieri ad naturalia emunctoria, ut præparata materia eliminetur: si vero hoc tempore contraria fiat humorum determinatio ad interiora, salubris critica evacuatio perturbatur, retinetur materia, obsidet interiora, homo non liberatur a morbo, sed materia retenta, vel opprimit, vel novam facit exacerbationem, ut hoc semper pronunciatur, si ex signis constat, post morbi vigorem, materiem criticam non evacuari.

IV. Restat itaque probare, ab alimentis sumtis determinationem fieri ad interiora. Hoc deducimus ex generali lege in nostro corpore observata, qua constat, si alicubi quædam functio sit peragenda, copiosiores eo versus derivantur humores. Ita inter masticandum affluit saliva in os; dum ventriculus est plenus, copiosior succus pancreaticus & bilis funditur in duodenum: omnesque humores conspirare videntur, ut commune adferant auxilium ad elaboranda alimenta. Hoc naturale in sanitate non desinit, dum morbus quoque adest: Imo ita creatum est corpus, ut, si alicubi noxium hæreat, eo mandet copiosiores humorum fluxum, oculus enim irritatus lachrymas fundit & acria masticatoria salivam eliciunt, imo anus vellicatus suppositorio rejicit contenta. Hic quoties fit alia secretio, evacuatio solet minui; quare vomitorium & purgans a cute ad interiora derivat liquores, non quod copiosiores faciant evacua-

Alimenta
ad interiora
determinant.

tionem, sed quod partes agitatæ eo versus derivent humores. Inde naturalis crisis, quæ expectanda erat per emuntoria, aliam directionem patitur, atque materia ea cum humoribus copiosius ad ventriculum confluentibus post cibum sumtum, eo ducuntur, quo motu inverso perturbatur ea crisis salubris, retinetur materia, & derivatur in interiora loca.

V. Quamvis itaque Hipp: constanti observatione didicit, victum pleniorē hoc tempore obfuisse & ægros aggravare, non caret ratione, ut non solum dicta Hipp: quotidiana observatione videamus confirmata, sed & ratione quoque comprobata. Ne autem nimius esset alimentorum defectus, selegit talia alimenta, quæ vix egent aliqua corporis actione.

Tenuissimus in paroxysmo.

VI. Quæ dicta sunt de vigore morbi acuti continui, optimo jure ad *Paroxysmos* quoque referri possunt, cum in febribus intermittētibz singuli paroxysmi tanquam integri morbi acuti haberi possint. Cautē propterea evitant Practici in vigore paroxysmi largius nutrire, sed eligunt apyrexiam, ut nutrant, quando corpus minus vexatur vehementia morbi.

LIB. I. APH. IX.

9. *Simul autem conjectare oportet, an ager ex victu durare possit ad morbi vigorem: & utrum ille prius deficiet, & ex victu durare non possit: aut morbus prius deficiet ac obtundetur.*

I.

Diæta in morbi incremento.

DE Diæta in morbi vigore egit in præcedenti, nunc vero de *Diæta in morbi Incremento* vult agere. At certam regulam proferre non valet, sed exigit conjecturam vel judicium, ex quo concludere debemus, num parcius vel largius æger in Morbi Incremento nutriendus.

II. Præ-

II. Præmonendum est, vires nostri corporis æque debilitari ex defectu alimenti, quam superari multitudine: nam ita est nostrum corpus creatum, ut suis actionibus se destruat, quod nutritione nova est resarciendum; quæ resectio si non satis fiat, minuuntur vires, quod tam in sanitate quam morbo verum experimur. Itidem plus ingestum quam quod viribus vitæ potest vinci & in bonum succum converti, vires opprimit, & in corruptelam abit.

Quantum
alimento-
rum dan-
dum in
morbis.

III. In morbis itaque, qui vi vitæ sunt superandi, tantum debet dari, quantum sufficit ad conservandas vires, ne ex defectu alimenti debilitentur; neque plus dandum, quam a viribus superari possit, ne suprimantur vires, & ingesta malum succum ex defectu præparationis suppeditent. Ad hoc Medicus præcipue attendere debet in morborum acutorum Incremento, cum tempus, nempe *αἴμα*, instat, in quo maxime laborare debent vires ad morbi causam subigendam: quod si tunc diminutæ sint vires ex defectu, vel oppressæ ex majori copia assumptorum, periculum erit, ne vincat materia morbi & pereat vel succumbat æger.

IV. Ut medicus itaque cognoscat, quanta quantitas sit danda, hoc sola conjectura assequi potest, nam quo acutior est morbus, eo parcius nutriendum; quo vero diuturnior morbus est, eo largius nutrire debet (ut ex Aph 7. constat) inde victum in morbi incremento debet determinare ex signis morbi acutioris vel longioris futuri.

V. Quia vero hoc iudicium desumitur ex vehementia symptomatum, quæ validiora sunt, si acutissimus futurus est morbus, sed mitiora, si longior morbus expectatur, cautelam necessariam adjecit ad evitandum errorem in supputatione his verbis. *aut morbus prius deficiet ac obundetur*. Quippe mitia conspiciuntur symptomata ex bona & mala causa. Si causa morbi est parva, mitia symptomata conspiciuntur, cum vis vitæ non multum instigatur ad vehementia symptomata inferenda: ex hoc iudicaret itaque medicus largius nutriendum esse, quia vires valentes facile diætam largiorem ferre possunt, & quia acmé longe distat. Sed fiunt etiam mitia symptomata ex mala causa, si nempe vires vitæ a morbi cau-

Ex symp-
tomatu
vehementia

causa superantur. Quippe non est in nobis morbi causa, quæ vehementia symptomata infert, sed vires corporis instigatæ per morbi causam. Si igitur tam valida sit causa, ut vires emergere nequeant, pauca & mitia conspiciuntur symptomata, non quod morbi causa sit parva, sed quod superentur vires. Hoc prudentissimos sæpe fefellit medicos, non attendentes, num mitia fiant symptomata ex bona vel mala causa, quare sæpe ægri moriuntur, extra opinionem medici. Tale quid fieri, perpetua observatione in morbis acutis constat, qui abeunt in sphacelum; præcedentia symptomata validissima mitia incipiunt fieri, & ita ægri cum summa spe levaminis, & futuræ sanationis, ex improvviso moriuntur. Hoc monet Hipp: ne decipiamur lenibus his symptomatibus, dum morbus deficit vel obtunditur. Nam si tunc largius nutrimus, magis obruentur vires, quæ forsan eluctatæ fuissent.

Quid sympto-
mata vehe-
mens &
mitis.

VI. Ut melius intelligatur quid *Hipp:* intelligat per mitia symptomata, discrimen ponendum est inter symptomata Vehementia, Maligna & Benigna; nam si in corpore notabilis observatur mutatio in actionibus, aut actiones admodum auctæ, illæ actiones conspectæ vel observatæ dicuntur Symptomata Vehementia; non quod signa illa conspecta ex morbi causa proveniant, sed actione vitæ mutata vel aucta; inde in vehementibus symptomatibus non ita veremur interitum ex morbi causa, sed ex actione vitæ destruyente omnia. Symptomata autem Maligna tunc fiunt, quando a causa morbi actiones vitæ minuuntur, quare cum vix ulla fiat actio in corpore exigua quoque fiunt signa; sed quoniam illa oriuntur ex magnitudine causæ morbi, adeoque verendum est, ægrum non sufficere posse; & inde constat, quo sunt mitiora symptomata, eo periculosiora esse; nam declarant eo majorem esse causam. Mitia autem & Benigna tunc fiunt, si præcessere vehementia symptomata per auctam vim vitæ, quæ nunc, minuta instigante causa, sensim leniora fiunt.

LIB. I. APH. X.

10 **Q**uibus igitur statim vigor est, his statim tenuis victus exhibendus est. Quibus vero vigor posterius, his ad illud & paulo ante illud tempus subtrahendus est. Antea vero uberius ager victu tractandus est, quo durare possit ager.

I.

Praeceperat Hipp: (Aph: 8.) in acutissimis morbis tenuissimum victum praescribi debere, eandem quoque in vigore (Aph: 8.) & in praecedente vero regulam praebuit, qua evitatur error ex mitioribus symptomatibus: nunc istud nutriendi genus ulterius inculcat in morbi Incremento: proponit quidem in Incremento acutissimorum tenuissimum victum; in Principio autem acutorum plus dandum esse: hujus victus rationem istis locis dedimus.

Dieta in morbi incrementi principio.

II. Sed in hoc loco differentiam victus describit in principio incrementi, ejus progressu & circa finem seu initium status. Statuit in principio incrementi, post datam regulam generalem victus tenuissimi in acutissimis, & victus largioris in acutis, largius nutriendum esse, quam circa finem hujus stadii, rationem addit, ut *sufficiat ager*.

III. Regula est generalis, ex alimentorum defectu vires cadere, & ex abundantia in morbis vires supprimi. Ex hac causa in morbis acutissimis, qui sunt brevis durationis, tenuissimum victum praecipit, & quandoque perfectam inediam; ita etiam in morbi vigore, quia tunc vis vitae ad morbi materiam coquendam multum laborat: quo ergo incrementum morbi propius est ad ἀκμήν, eo magis de cibo est detrahendum, ne tamen deficiat.

E

IV. Ne

Diata in
duobus ge-
neribus a-
cutorum.

IV. Ne autem de victu regula in omni morbo acuto accipiatur generalis, parcius vel uberius in morbi incremento esse nutriendum, duo genera morborum acutorum proponit, unum quod brevi tempore ad statum venit, alterum autem quod ad quatuordecim dies & ulterius sit duraturum, antequam ad vigorem pervenerit; in illo tenuissimum victum vel inediam imperat, in hoc largiorem victum concedit, qui sensim minuendus, quo magis morbus ad statum venerit. Regula hæc est utilissima, quoniam circa statum tenuissimus victus esse debet, ne vires corporis premantur in elaboranda materia morbi & alimentis assumtis: sed si non nisi post aliquot dies sit vigor expectandus, æger defectu alimenti nimis esset debilitatus, ita ut circa vigorem ob defectum alimenti non sufficeret ad subactionem & expulsionem materiæ morbi.

V. Hæc pulchra regula paucis potest esse usui medicis, nam medicus ad ægrum vocatus in principio morbi acuti, præscire debet, num brevis vel longus sit futurus morbus: si enim brevem expectat, tenuissimum, si longiorem, pleniorrem victum concedere debet: at paucis datum, hanc differentiam ex præcedentibus phænomenis eruere, propterea, nisi simul indicetur futura longitudo vel brevitās, nihil emolumenti ex hac regula habet æger.

Brevitas
morbi.

VI. Febris acuta continua brevis solet observari, in juvenibus, robustis, æstate; calida & tenuia præbens excrementa; statim in initio, si signa critica apparent in urina & sudore; si morbus ex sua natura brevis est, ut febris scarlatina, Ephemera, morbilli; si in pleuritide & peripneumonia statim apparent sputa cocta. Ne igitur multitudine ingestorum laudabilis concoctio & expulsio materiæ morbi turbetur, tenuissimus victus est concedendus: nam æger talis cum exiguo victu sufficere potest per paucos istos dies, donec subacta & expulsa sit materia.

Longitu-
do morbi.

VII. In morborum acutorum initio cognoscimus, longiorem fore morbum ex dictorum (vi) absentia; si morbus vehementioribus symptomatibus incept, sed statim delitescere videtur sine ratione, id est sine laudabili evacuatione;

urina

urina intense rubra, tenuis, clara, spumosa; frigida & crassiora excrementa; inconstantia in omnibus signis; evacuationes per inconsueta loca; in morbis pectoris sputum nullum; corpus vehementer pallidum aut citrinum; sudores frigidi, exigui, vel nulli: hæc si adsunt, paulo largius nutriendum, donec ex signis coctionis in urina vigorem instare, sciamus, quando parcius dandum, ne perturbetur crisis. Quamobrem autem dicta signa brevitatem & longitudinem præfagiunt, aliis locis exponetur.

LIB. I. APH. XI.

II. **I**N exacerbationibus cibum subtrahere oportet. Exhibere enim noxium est. Et quicumque morbi per periodos exacerbantur, in exacerbationibus subtrahere oportet.

I.

Versatur Hipp: in tradendo victu morbis acutis accommodato, sed quoniam duplex genus est acutorum, unum, quod eodem tenore increfcit, stat, decrefcit & finitur, qualis *febris* hodie vocatur *Continua*: alterum genus autem totam periodum illam non æquali vigore absolvit, sed uno tempore symptomata magis urgent, quam alio, ita tamen, ut nunquam æger a febre integre liberatus sit, quam *febrem* hodie vocant *Remittentem*. Itaque si morbus acutus nunc occurrat per exacerbationes ingravescent, sciendum quoque erat, an non ipsæ exacerbationes & remissiones aliquam facere debuissent in victu mutationem.

*Diæta in
& Inter pa-
roxysmos.*

II. Traditam hanc regulam in victu morbi acuti remittentis etiam ad ampliorem usum adducere vult, quamobrem in fine hujus aphorismi repetit priorem regulam, & eam applicat ad reliquos quoque morbos, tam febriles In-

termittentes, quam Chronicos, qui per paroxysmos fiunt. Quare non parum allucinantur, qui existimant, Hippocratem eandem rem bis repetere, cum repetitione hac hanc regulam de victu ad multos morbos utilem facere, quod sine repetitione non potuisset fieri.

Dieta in
Remittenti-
bus.

III. Quid sit Paroxysmus in morbis, exposuimus (Comp: T. 53. XXI.) Tunc vel nullo vel tenuissimo victu uti debere, superius (Aph. 8. VI.) notavimus. In hoc nunc casu ita est accipiendum; omni tempore exhibere potuit cibum ab initio morbi ad statum, sed sensim parcius; verum si morbus increseat per paroxysmos sensim graviores, non est licitum omni tempore dare cibum, sed præcedenti regulæ id insuper est addendum, nos in vigore istius particularis paroxysmi quoque cibum detrahare debere, & si quid dandum sit, id exhibendum esse, dum paroxysmus quiescit, ne corpus paroxysmo graviore pressum, magis aggravetur a cibo sumto.

In Inter-
mittenti-
bus.

IV. Alterum genus febrium est Intermittens, quæ inter paroxysmos aliquod tempus permittit, in quo nulla febris symptomata sentiuntur, quod proprie vocatur Apyrexia. Uti est febris quotidiana, tertiana, quartana & semitertiana, in his instante paroxysmo corpus non est nutriendum, sed finito paroxysmo, quia non solum corpus a paroxysmo & cibo onustum magis laborat, sed etiam ingestus cibus per motum turbatum febrilem in succum alienum commutatur. Idem quoque sentiendum in Intermittentibus protractis, induentibus naturam remittentium; possunt hujusmodi febres, ut sæpe experimur in quartanis autumnalibus reduplicatis & prolongatis, per longum tempus durare, ut æger tam diu inedia vexari nequeat, sed cogantur in ipso paroxysmo cibum capere: eligendum tunc est tempus decrementi paroxysmi.

In Inter-
mittentibus
Chronicis

V. Morbi Chronici intermittentes, ut Epilepsia, Podagra, si periodos regulares habent, eandem regulam exigunt, quæ præcepta est in febribus; si enim instat paroxysmus, a cibo abstinendum; & in paroxysmo podagræ tenuis diæta concedenda, quoniam paroxysmus diu durans, non permit-

tit tam diu a cibo abstinere: sed Podagræ generalis paroxysmus aliis curtiore paroxysmis, ut recte observavit Sydenham, componitur, quare secundum hanc regulam in generali paroxysmo id est observandum, quod superius in remittentibus (III) notavimus. In Epilepticorum paroxysmis, quia ægri nequeunt cibum capere, non est opus hanc regulam adducere.

LIB. I. APOPH. XII.

12. **E**Xacerbationes autem & constitutiones indicabunt morbi & anni tempore, & periodorum ad invicem collata incrementa, sive quotidie, sive alternis diebus, sive longiore fiant tempore. Sed etiam iis, quæ mox apparent, eadem indicantur, velut in pleuritidis sputum, si statim appareat veniente morbo, abbreviat: si vero postea appareat, producit. Et urinae, & alvi excrementa, & sudores, cum apparent, vel iudicatu faciles, vel difficiles, vel breves, vel longos morbos fore indicant.

I.

Sensum huius Aphorismi quia quidam non recte capiunt, non erit inutile aliis verbis perspicuum facere. Morbi iudicatu faciles & difficiles, longi & breves desumuntur: sed 1 ex exacerbatione seu modo invasionis morbi: 2 ex morbi constitutione seu natura: 3 ex anni temporibus: 4 ex paroxysmis se invicem excipientibus longiori, breviorive intervallo: 5 ex epiphænomenis, signis nempe post morbi invasionem apparentibus in sputo, urina, alvi excrementis, sudoribus.

Morbus
facilis &
difficilis.

II. Morbi faciles & difficiles duobus modis a medicis accipiuntur. 1^o Morbi ex sua natura raro multum damni inferentes, uti febris ephemera & tertiana vernaes, alique morbi sponte desinentes vel medicamentis facile abigendi, dicuntur iudicatu faciles: verum qui sæpe hominem interficiunt, aut diu durant, multa & gravia inferunt symptomata, medicamentis & diæta vix obtemperant, dicuntur iudicatu difficiles; ut omnes morbi maligni, putridi, acuti vehementes. 2^o Morbi nomen servantes, licet sint benigniores vel vehementiores, ita habetur pleuritis, peripneumonia, febris, morbus acutus & chronicus facilis & difficilis iudicatu, ad quod detegendum, & præcipiendum multa signa attulit passim Hippocrates.

Longus &
Brevis.

III. Duplici quoque modo accipitur morbus Longus & Brevis. 1^o Quidam morbi ex sua natura Breves sunt, cum vel sine periculo, ut ephemera, apoplexia, phrenitis. In quibus scilicet vel morbi materies actione vitæ facile superari & expelli potest, vel tam multa & valida, ut vim vitæ superet: alii vero sunt longiores ex sua natura, uti quartana febris, phthisis, scirrhus, cancer, omnesque morbi chronici; in quibus non respicimus ad periculum, sed ad solam durationem. 2^o Morbi autem ejusdem brevitatis & longitudo multis signis passim proponitur ab Hippocrate & aliis Practicis, ut in morbo, qui diu durare potuisset & breve finiri signa habeamus, ex quibus talem exitum præfagire valeamus. (*Conf. Aph: 10. VI. VII.*)

Longus &c:
ex Invasione.

IV. Quinque fontes proponit Hipp: ex quo derivat cognitionem morbi Longi & Brevis, facilis & difficilis iudicatu. Primus est ex Invasionis modo. Utinam observatione practica constaret statim ex invasione morbi num longus, brevis, facilis aut difficilis esset expectandus morbus. Hoc autem didici observatione practica, & ex aliis intellexi, qui morbi cum duritie alicujus partis incipiunt, & qui longo tempore increscunt, antequam ad summum vigorem pervenerint; istos Longos futuros esse, cum ad duritiem solvendam natura diu laborare solet; & longum incrementum quoque secutum fuisse, a longo statu & decremento.

V. Qui

V. Qui morbi ex sua natura Longi habentur, superius recensiti sunt. (III) si vero morbi, qui breviores fuissent, prolongantur, ipsa prolongatio multa mala parit: nam ingesta alimenta minus debito præparantur, cum actio vitæ diuturnitate morbi debilitata & turbata, non valeat nova ingesta in eam bonam indolem mutare, qualis in sanitate requiritur, atque ipsi humores naturales ante morbi invasionem sani, perseverante morbo hanc sensim exuunt bonam indolem, & corruptam non omnino evacuatam generat in corpore cacochymiam. Partes etiam firmæ alienis humoribus irrigatæ enervantur, & laxantur, ipsa caro invenitur laxa & flaccida post morbos diu toleratos. Atque ex ita alienis humoribus parcior spirituum proventus facit debilitatem virium, imo observavimus cum Sydenhamo, stultitiam ex febre protracta natam, solis roborantibus curandam, extincto morbo ita prolongato. Ex protracto morbo ultra modum certum est, vel materiem pertinaciorē esse; vel vires non valere materiem subigere, inde vel materies recrudescit sensim & recidivam facit, vel in aliam sæpe pejorem corruptelam abit, atque producit novum morbum, vel denique longitudine morbi ita deteruntur vires, ut pereat æger, qui non succubuisset ex eodem morbo, si non fuisset ultra modum prolongatus, quare quidam morbi per se non periculosi, prolongati autem hominem interimere valent.

Longus ex
morbi natu-
ra.

VI. Vere & æstate morbi breviores, autumno & hyeme iidem morbi longiores & pertinaciores observantur, ita ut vernali tempore, si oriatur febris tertiana vel quartana, (quod autem raro,) brevitatem promittamus: Sed tertiana vel quartana mensibus autumnalibus invadens, sæpe totam hyemem perseverat, & quamvis antidoto extinguatur, post aliquot septimanas recrudescit, non cedens ante vernale tempus. Cui autem causæ hæc differentia sit adscribenda, non satis constat, an dependeat ex hyemis frigiditate, minuenta insensibilem perspirationem, & materiæ morbi exhalationem; an vero ex pertinaciori causa præcedente æstate solis calore nata, Forfan binæ hæ causæ concurrunt.

Longus
ex Tempo-
ribus anni.

Æsta-

Æstate autem ob majorem solis calorem, uti quoque in regionibus calidis omnia fieri acriora & magis deleteria, constans observatio affirmat; hyeme autem & in regionibus frigidis mitiora manere: quod alienum ergo in æstate confectum est, si infecit corpus, deterius, quam quod hyeme conficitur; inde liquere videtur, æstivos morbos periculosiores esse debere quam hyemales. At tali modo res non est concipienda; nam morbi hyemales non producuntur a noxia materia, quæ hyeme confecta est, neque æstivi ex materia in æstate nata, sed vicissim hyemales morbi fiunt ex materia æstate confecta, & vernaes ex materia in hyeme facta. Nam dum in æstate solis calor humores in terræ ambitu excoxerit, circa finem æstatis admodum sunt exaltati, & corrupti; accedens tunc frigus autumnale non emendat, quod antea corruptum fuit, sed corrupti exhalationem impedit, facitque, ut id quod telluris calore expellitur, alte adscendere nequeat, aëris enim frigiditas vaporis sublationem inhibet, quare nos materiem circa telluris superficiem vagantem inspirantes, nostrum corpus illa virulentia inquinamus, quam non facile excutere vel subigere possumus, minuta perspiratione in autumno, unde autumnales morbi frequentes & pertinaces. Vernali autem tempore, quia corpus mitiorem materiem hyeme confectam inspirat, & sequente calore æstivo eam facilius expellit, aër, elevatis vaporibus in altum, magis depuratus quam autumno, citius liberat a morbo, dum autumnus post infectionem non subsistit novum suppeditare virus, quo aër est imprægnatus.

Brevis &
Longus ex
Paroxysmo.

VII. Paroxysmorum durationem, anticipationem, postponitionem, reditus tempus, prolongationem, abbreviationem, augmentum, decrementum, intervalla temporis, reduplicationem & multa alia promittere morbi longitudinem & brevitatem morbi, expositum inveniet Lector in *Comp: 7. 53. xxii.* quare non opus eadem hic repetere.

Longus ex
epiphæno-
menis.

VIII. Dum morbus in corpore est natus, quædam alia conspiciuntur, sive dependant ex morbi causa vel alia re accedente, quæ in textu dicuntur *mox apparentia*, epiphæ-

nomena: hæc multa admodum morbi longitudinem & brevitatem atque reliqua indicant. Ex his pauca attingam, nam de his omnibus, ubi examinaturi sumus signa epiphænomena, fusius est agendum. Adducit auctor *sputum, urinam, alvi excrementa & sudores.*

IX. Pleuritis & peripneumonia duo præcipui sunt morbi, qui ex sputo judicantur, in his enim quo citius bonum sputum apparet, eo citius quoque homo liberatur a morbo: & contra sputum malum, olens, amurcosum, spumofum, tenax, fero apparens, non solum morbum producit sed & periculum portendit. Non est hujus loci cuncta de sputo, quæ ad hunc titulum collegi, proferre. Hoc solum est adstruendum, sputum cito prodeuns abbreviare morbum, fero apparens morbum protrahere. Quamdiu morbus acutus intenditur, omnia inveniuntur sicca, & humores ulterius compinguntur; sed si morbus subsistit, ea compacta sensim incipiunt solvi, quod solutum tunc aliquam portionem emittere incipit per emunctoria naturalia, inde cutis siccitas commutatur in levem humiditatem, urina nubeculam & aliquid sedimentosi profert: ita etiam in morbis pectoris, trachea arteria & bronchia hucusque siccissima, nunc incipiunt humectari, & quod rudimentum sedimenti in urina aliorum morborum, id est in morbis pectoris sputum coctum, quod expectoratione redditur. Cito itaque apparens sputum indicat, subsistere morbum, & in solutionem tendere; sed si sputum in his non apparet nisi fero, certum est, morbi materiem tam tenacem esse, ut non potuerit nisi longo tempore & iterata actione vitali subigi; itaque cum finem expectare non possumus, nisi præcesserit morbi flatus, ergo quo diutius durat antequam perventum est ad statum, eo quoque longior futurus est morbus.

Brevis &
Longus ex
sputo.

X. Quoniam omnia observata practica morbi brevitatem & longitudinem exhibentia, collecta inveniri possunt in *Comp. T. 36. LVII. 22. & 29.* non erit opus eadem hic recensere (*Conf. Aph. 31 & 34 Lib. 7.*)

Brevis &
Longus ex
urina

XI. Alvi excrementa viridia, porracea potissimum in acutis, spumosa meraca, valde liquida & rursus compacta,

Brevis &
Longus ex
alvi excre-
mentis.

varios colores habentia, cum vehementi strepitu emissâ, copiosa in pectoris morbis, longitudinem præfagiunt: quia viridia & porracea in acutis corruptam bilem indicant, quæ brevi tempore in acutis subigi nequit, & talis quoque evacuatio non est critica, levamen adferens, sed symptomatica: spumosa colliquatæ pinguedinis & putredinis est indicium, & quoniam morbi putridi per longum tempus durant, talia excrementa quoque longitudinem præfagiunt. Reliqua autem indicia ex excrementorum colore, odore, consistentia & quantitate ex *Comp.* T. 90 peti possunt.

Brevitas &
Longitudo
ex sudori-
bus.

XII. Frequentior non est via, qua morbose materia e corpore eliminatur, quam per cutim sub forma sudoris; arteriæ enim & nervi in poros cutaneos desinentes, totius massæ humorum aliena hac via eliminare valent, inde roridi calidi sed copiosi sudores ad febris finem venientes post peractam coctionem (vid *Aph.* 36. L. 4.) corpus liberant a materia morbosa: verum si sudores secum non ferunt morbi materiem, auferendo humorem bonum majorem debilitatem inferunt; tales sunt copiosi & diffuentes alieno tempore, nullumque levamen adferentes: hujusmodi sudores longitudinem portendunt, nam nisi tollatur in acutis morbi materies, non desinit morbus; & quoniam post tales sudores corpus magis fuit debilitatum, eo minus valet materiam morbi subigere: imo si cum sudore copioso non evacuatur morbi materies, signum est, eam pertinacem esse, ad quam tenacitatem subigendam & expellendam longum tempus est infumendum. Interdum quoque sudores prodeunt ex colliquatis humoribus, uti sunt frigidi & copiosi, nam sudor bonus vi vitæ majore, qua simul concitatur calor corporis, est expellendus, quare frigidus sudor certum signum præbet, sudorem vel ex colliquatis humoribus vel relaxatis osculis profluere: utræque hæ causæ longitudinem portendunt, nam putredo seu colliquatio & debilitas virium in acutis brevi tempore curari nequit.

XIII. Restaret in hoc explicandum, quomodo ex his fontibus demonstraretur morbus judicatu facilis, & difficilis,

verum quia hoc ex brevitatem & longitudinem morbi facile intelligi potest, dicta sufficere reor.

LIB. I. APH. XIII.

13. *Senes facillime jejunium ferunt, secundo ætate consistentes. Minime adolescentes. Omnium minime pueri: ex his autem, qui inter ipsos sunt alacriores.*

I.

CORPUS nostrum sensim incrementum accipit, & ad statum perventum in eo conservatur alimentis assumptis, quæ etiam si nobis sint aliena, tamen assumpta, ita actione corporis commutantur, ut veros nostros humores & partes firmas constituent. Quamdiu crescit homo vel animal, ex alimentis assumptis non tantum conficitur, quantum actione istius corporis consumitur, deteritur & expellitur, verum plus conficiendum est, quod cedit in incrementum. Itaque actio conficiens validior est in crescentibus, quam in corporibus non amplius crescentibus. Ita est nostrum corpus creatum, ut motu vitali ex assumptis alimentis præparentur partes nostræ, & eodem quoque motu deteratur & consumatur, quod confectum est. Sed quo propiores sumus origini, eo actio, qua præparatio absolvitur, comparata ad causam deterentem, est major: quo seniores fiunt animalia, eo illa præparans actio comparative est minor. Ex hac creata lege constat, eandem alimentorum quantitatem in crescentibus, ceteris paribus, citius commutari in bonos humores, quam in ætate provectioribus. Inde quo origini animalia sunt propiora, eo citius commutarunt alimenta, quo vero magis ad senectutem accedunt, eo diutius durat, antequam alimenta fuere commutata.

Alimento-
rum defe-
ctus in æta-
tibus.

Puer difficile,
senex facilius
fert
jejunium.

II. Si igitur æqualis quantitas in junioribus & adultioribus alimentorum ingeritur, in junioribus citius consumpta erit, quam in adultis: Potest itaque in junioribus alimenti defectus esse eodem tempore, in quo nulla est in adultioribus ingerendi necessitas: si igitur puer & senex ad id tempus expectant, ad quod senex ferre potest inediam sine detrimento, puer necabitur alimentorum defectu.

III. Quoniam hæc actio cum ætate sensim decrescit, inde, quo successive magis distant ab origine, eo facilius longiorem inediam ferre possunt, ex qua regula generali seu creata in nobis & aliis animalibus lege facile capitur totum mysterium, senes facillime &c: jejunium ferre posse, cum eam actionem immutantem minus validam habent.

Alacriores
difficilius
ferunt jejunium.

IV. Addit Hipp: *qui inter ipsos sunt alacriores.* Sed & hoc etiam ex generali regula deduci potest; corporis enim exercitiis citius cibi subiguntur, nam tunc non solum motus vitalis hoc absolvit opus, verum etiam motus animalis, qui dum operatur, auget quoque circulationem, quare operarii & exercentes plus alimenti assumere coacti sunt, quam quiescentes & otiosi. Pueros autem alacriores, agilioresque, cum corpus suum magis movent, quam segnes & torpentes, eodem modo ut exercentes citius subigere ingesta.

LIB. I. APH. XIV.

14 **Q**Uæ crescunt, plurimum habent calidi innati: plurimo igitur egent alimento: sin minus corpus consumitur. Senibus autem paucus calor: propterea paucis somnitibus indigent, a multis enim extinguitur. Idcirco etiam febres senibus non similiter acutæ, frigidum enim est corpus.

I.

QUod nos in præcedente aphorismo ex creata a Deo actione vitali in nobis aliisque viventibus deduximus, id Hipp: Calido innato adscribit in hoc loco Si quis existimat, Hippocratem magis cognitam reddidisse causam, quia citat Calidum innatum, nos vero legem a Deo creatam, eum existimo rem non satis perspexisse: nam dicere ex Calido innato fieri, sensum magis intricatum facit, si ulterius enim urgemus, unde ille veniat calor nativus seu Emphyton thermon, id creationi, ut nos actionem vitalem, adscribendum est; & tum habet hanc difficultatem, Calidum innatum quoque esse explicandum, quod a Veteribus non peractum est: malo itaque statim in principio ad Creationis opus confugere, quod a nemine explicari potest, ad quod si veniant hodierni Medici & Physici, contenti acquiescunt, quam ut aliquid insuper incogniti interponam. Si qui sunt dicentes, se intelligere, quomodo actio vitæ sit creata, credo mentiri, fateor ego me latere. Invenio tamen, vitæ actionem esse in omnibus viventibus, qua distinguuntur a rebus mortuis.

Incrementum an a calido innato vel actione vitæ.

II. Calidum innatum multa obrinuit nomina, nonnulli Flammam, Auram, Animam vitalem. Archeum eum vocarunt, putarunt esse Humidum primigenitum calore & spiritu

Calidum innatum.

ritu perfusum, quod a parentibus acceptum vocarunt Infitum, sed alimentis conservatum & revocatum dixerunt, Influens, mera verba omni sensu carentia. Num planta, insecta, & pisces vivunt, crescunt, nutriuntur, uti animalia calentia, dum tamen non magis quam alia mortua calent; quare vitæ actioni non semper junctus est calor. Et quoniam animalia frigida viventia eodem modo crescunt & nutriuntur, uti animalia calentia, Calor non est vitæ attributum inseparabile. Quid autem volumus per actionem seu motum vitalem, id in speciali *Exercitatione*. I. Exposuimus; de Calore corporis egimus in *Comp. T.* 49.

Corporis
incrementum
an a
Calido innato?

III. Quod Hipp: observatione Practica detexit, invenimus vera fide nobis reliquisse, quod autem ex placitis Philosophorum sui temporis, quando hæc disciplina defectu experimentorum admodum erat manca & mutila, deduxit, non parum a veritate sæpe recedit. Non constat experimentis, infantes plus calidi innati continere, quam viri: imo ex apparitione videretur, calidum in adultis abundare, nam eorum corpora ad thermometrum calidiora inveniuntur, & a frigore externo non tam facile vincuntur, quam in tenella ætate: si ergo ex mente Hipp: magnitudo incrementi penderet a copia calidi innati, majus incrementum fieret in adultis, quam infantibus. Quod cum experientia contrarium comprobat, hujus asserti absurditas facile patet. Atque frigida animalia etiam crescere non potuissent, si ex innato calido pendeat incrementum. Quare augmentum non adscribimus Calido innato cum Hipp: 1^o quoniam sine eo quoque quædam animalia crescunt: 2^o quia in calidis animalibus incrementum non est proportionatum calori.

Quæ corpora plurimum alimentum egent.

IV. Quatuor genera corporum invenimus multo alimentum egere. 1^o Corpora origini propiora, quoniam observavimus actionem immutantem assumpta in his validiorem esse, quam in adultis, & quia talia quoque corpora pro incremento elaborant: nolo tamen, ut sensus hic accipiatur, ac si vellem, infantem plus cibi capeßere, quam adultum, sed habito respectu molis corporis, si enim decuplo ponderosius sit corpus adulti quam pueri, puer plus quam decima parte

parte alimenti eget, qua fruitur adultus, ut vivere possit sine detrimento ex cibi defectu. 2° Assuetos multum cibi capere, hi enim cum mediocri quantitate dicuntur defectu laborare. 3° Operarii & suum corpus exercentes, quoniam in his non solum motu vitali uti in quiescentibus citius convertuntur assumpta alimenta; verum etiam motu animali, & motu vitali tunc quoque validiore facto, in his subiguntur assumpta. 4° Corpora ex morbis subito reconvalescentia, quemadmodum post quartanam, febrem sanatam; in his autem cavendum est, ne nimium simul ingeratur, famelici quidem sunt & alimento copiosiore egent, sed si appetitui indulgeamus corpus adhucdum debilius, multitudine obruetur, & versabitur in recidivæ vel alterius morbi periculo.

V. Tandem ad senectutem perventa corpora labascunt, motus vitalis a Deo in corporibus viventibus creatus sensim languere incipit & debilitari, unde omnia fiunt in senibus, quæ mala ex infirmiore actione vitali etiam in junioribus conspiciuntur, in quibus tamen recuperatis viribus, nata mala emendantur, in senibus autem, quia vires recuperari nequeunt inevitabili lege deperditæ, sensim in deteriora abeunt: quæ igitur mala ex deficiente actione vitæ nata ut evitentur & aliquomodo præveniantur, adhibemus auxilia, actionem vitæ suscitantia; Hipp: dicit, egere *fomitibus*, id est adhibenda sunt auxilia, quæ majorem calorem sua potentia in corpore excitant, qualia hodie vocamus Calefacientia, qualia sunt spirituosæ & aromatica (*Conf. Comp. T. 84*) Ita enim est nostra vitæ actio comparata, ut a quibusdam assumtis se validius agitet. Talia Calefacientia senibus, minime vero Juvenibus sunt adhibenda, utpote his actio vitæ satis valens non eget stimulo, quem si adhibes, morbus fit ex nimia agitatione, sed senum corpora languentia stimulo exagitanda. Hanc autem adjicit cautionem, a multis fomitibus extinguitur, & ut Galenus: Lampas modico olei nutritur, nimio autem obruitur: nam ut modico spirituofo refocillantur senum vires, usque ad ebrietatem vero assumpto, eadem extinguuntur.

Senes cui
egent cale-
facientibus?

Senibus an
non fiant
febres acu-
tae?

VI. Quoniam senum corpora sunt frigida, dicit Hipp: non corripiuntur febre acuta: experientia autem testatur, non raro senes febre acuta corripiti. Quare hic sensus alio modo est capiendus. Si senes eadem febre calida tentantur, quam juvenis, illa in senibus multo minorem calorem concitabit; atque levior causa qua in juvene febris calida concitatur, in senibus modicum calorem suscitabit, quod ex hac lege generali facile deduci potest. Motus vitalis a nativitate usque ad perfectum incrementum sensim redditur robustior, in eo perstat, dein languere incipit; stimulus idem applicatus eo validiorem motum suscitatur, quo vis vitae est robustior, inde pueri & senes parum, adulti vero maximum calorem experiuntur a stimulo.

LIB. I. APH. XV.

15. **V**Entres hyeme & vere natura sunt calidissimi & somni longissimi. In his igitur temporibus etiam alimenta plura exhibenda. Innatum enim calorem majorem habent. Nutrimento igitur copiosiore indigent. Judicium sunt Aetates & Athletæ.

I.

HUjus aphorismi sensus ut facilius capi & exponi possit, ejus aliquomodo mutabo ordinem: Alimenta plura sunt exhibenda hyeme & vere 1 quia ventres hoc tempore sunt calidissimi; 2 somni longissimi; 3 innatum calorem majorem habent; 4 judicium sunt Aetates & Athletæ. Examinaturi sumus primo, quæ præmittuntur, ut videamus, an exinde per legitimam conclusionem inferre possimus, copiosiora alimenta danda esse.

Hyeme an
ventres cali-
dissimi?

II. *Ventres* multas significationes habent, interdum enim omnem cavitatem; aliter tres notabiles cavitates, caput, pectus

pectus & abdomen; vel ventriculum cum intestinis significat. Ex his in hoc loco Hipp: intelligit ventriculum & intestina, quoniam ab his partibus recipiuntur alimenta & in iis præparantur. Itaque ex sententia Hippocratis ventriculus & intestina hyeme & vere sunt calidissima. Hanc autem sententiam desumpsit ex communi opinione, qua statuitur, hyeme interiora magis calere quam æstate: sed quoniam hæc sententia iteratis experimentis per thermometra captis satis refutata sit, non est opus his amplius insistere, constat enim, æstate contenta ventris magis calere quam hyeme, quare hæc adducta ratio nihil suggerit ad probandum, nos egere pluribus alimentis hyeme quam æstate.

Ventris significatio.

III. Alterum argumentum est, quia somni hyeme & vere longissimi corpora egerent plus alimenti. Ex assumpta hypothese, a somno fieri coctionem, dictum Hipp: firmari potest, sed experientia contrarium probat, non solum enim animalia totam hyemem quasi dormientia non egent alimento, sed etiam quidam homines sopore oppressi per plures vivunt dies sine alimento, vel multo minori copia, quam quæ sufficeret ad sustentandam vitam in vigilantibus: atque experientia confirmat, somnum longiorem vitam conservare cum exiguo alimento. An igitur ratio experientiae contrariatur? imo si falsa sit, quemadmodum hæc est hypothetica, nam a somno fit laudabilis coctio, ut exposuimus (*Persp. Cap. 6. v.*) sed per coctionem, quæ fit in somno, non intelligitur citior assumptorum subactio, nam in vigiliis citius subiguntur alimenta, quam in somno, utpote solo blando motu vitali in somno alimenta sunt subigenda; sed in vigiliis actione vitali validiore & sæpe etiam motu animali promovetur subactio. Hinc satis constat, quam perverse nonnulli statuunt, largiorem cœnam esse sumendam, quoniam optima fit a somno sequente coctio, quoniam alienam de coctione foveant sententiam. Satiùs itaque est in infirmis largiorem evitare cœnam, ne somnus multitudine alimentorum turbetur, & cibus nimis diu quiescens corrumpatur. In robustis autem, qui solo vigente motu vitali omnia subigere valent, non est opus strictam hanc regulam servare.

Somnus longior an egent pluribus alimentis?

Ventres
an hyeme
& vere ma-
jorem calo-
rem innat-
um ha-
bent?

IV. Superius (II) demonstravimus, ventres hyeme & vere non habere majorem calorem, sed hæc est alia quaestio, an vero calidum innatum (*Aph* 14. II) his temporibus sit majus, nam statuunt in pueris, quibus ad thermometrum minor est calor, majus esse calidum innatum, adeoquidem existimant, maximum esse posse calidum innatum, etiamsi ejus calor deregere nequeat thermometro, quemadmodum in aromate, & spiritu vini dicitur inesse calorem, quamvis is ad thermometrum non percipiatur. Si pro Calido Innato, de quo multum litigant veteres, aliam rem cognitam ponamus, nempe eam actionem vitæ in nobis viventibus a Deo creatam, qua corpus nostrum suum accipit calorem sine calore vel igne adventitio, quem fieri demonstravi (*Persp. Cap. VIII*) ex attritu, responsio erit facilis. Nam hyeme & locis frigidioribus hæc actio magis valens est. Nos versamur semper in aëre ambiente frigidior, quam est gradus caloris nostri corporis, certum itaque est, in nobis esse causam hunc majorem calorem producentem, quæ tanta est, ut corpus ab ambientibus refrigeratum tamen suum caloris gradum conservet: si igitur in majore frigore externo æqualis maneat caloris gradus in corpore, vel si tantum non minuitur calor corporis, quantum augeatur externum frigus, evincimur, causam calefacientem in nobis in eo aëre frigidior validiorem esse, quam in aëre calidior. Experimur quoque omnes, ex subito ingruente frigore corpus nostrum ad thermometrum magis refrigerari, quam si idem frigus aliquamdiu persistit: quare in frigore perseverante causa calefaciens in nobis validior fit. Neque hoc est contra rationes, nam demonstratum est, pro validiore attritu augeri calorem, eum autem attritum a frigore in nobis viventibus majorem fieri, consentaneum est, quia partes firmæ nostræ a frigore uti omnia corpora contrahuntur & accurtantur, si ergo motus vitalis idem manet, sed cum aucta applicatione unius partis ad aliam, validior fit attritus, & inde major istius effectus, nempe calor. Hac igitur actione validiore transfluentes humores plus patiuntur, seu quæ sunt aliena, uti alimenta, citius

commutantur in bonos humores, atque ex alimentorum defectu novi assumendi nascitur necessitas. Inde roboratis visceribus hyeme major necessitas capiendi alimenta nascitur. Si igitur per Calidum innatum intelligunt Actionem vitalem, allati veritas fatis constat.

V. Quænam Ætas copiosioribus & paucioribus eget alimentis, superius (Aph. 13. 1) notavimus. *Athleta* autem ex consuetudine & corporis exercitio plurimo alimento eget; nam qui assuescunt sua saginare corpora, paucis alimentis non possunt contenti esse; atque corpora exercitata quia plus deterunt, citius defectu alimenti laborant. Hoc autem an ex calido innato majore proveniat, ex superius dictis facile colligi potest.

Athletæ & Ætates indicant copiosiora alimenta.

VI. Ex allatis rationibus & experientia constat, hyeme largiora assumenda esse alimenta, sed non ex dictis rationibus Hippocratis, quia per se non satis firmæ sunt. Num vere quoque id sit faciendum, admodum dubito, quia, si corpus multitudine fuit onustum, accedens calor enervans actionem vitalem, partesque firmas laxans, facit humores non satis enervatis actionibus agitados, in alienam naturam degenerare.

Conclusio.

LIB. I. A P H. XVI.

16. *V*ictus humidus febricitantibus omnibus confert, maxime vero pueris, & aliis tali victu uti consuetis.

I.

Tribus in casibus Hipp: dicit, victum humidum conducere; 1° in febricitantibus omnibus; 2° maxime pueris; 3° consuetis. Videtur ex textu constare, Auctorem velle febrientes pueros & consuetos humido victu uti.

Victus humidus.

tentes. Ergo sciendum est omnium primum, quid sit humidus victus. Qui nihil solidioris cibi capit, sed cuncta liquida magnaue copia aquæ diluta, victu humido utitur, ergo nihil tunc ingeritur, quin ita sit solutum, ut forma liquida intret, quare ad subactionem non eget corporis actione, & affusione liquidi, quæ requiruntur in cibo solido & sicco, antequam eo usque perveniat, ut lactea vasa intrare possit. Si liquida mediocri copia ingeruntur, non dicitur humido victu uti, sed humida copiosius ingeruntur vel & applicantur. Denique auxilia, quæ dicuntur saponacea aciescentia & fructus horæi, mediocri quantitate ingesta humectant, horum usus etiam dicitur victus humidus. Videntum nunc est, num tria hæc genera victus humidi omnibus febricitantibus pueris & consuetis conferat.

Febricitantibus.

II. Febris omnis sive sit essentialis sive symptomatica nunquam est præsens, nisi concitet maiorem circulationem, calorem, & corporis ægritudinem. Ex febris causa non possumus ratiocinari quia latet, seu res est nobis incognita, quæ se per hæc criteria prodit. *Major* autem *Circulatio* non solum ex morbosa, sed etiam ex mechanica causa seu motu musculari semper inducit sanguinis lentorem, seu sanguis acquirit maiorem concrescendi potentiam, atque quidquid ita compingi non potest, extruditur: massa sanguinis ita compacta multa mala facit, quæ non sunt hujus loci citare (vid. *Comp.* T. 45.) Ut autem hæc evitetur compactura, non solum humida sunt ingerenda copiosiora, verum etiam quæ humectant, qualia hodie dicuntur antiphlogistica; nam iis temperatur motus ille major & prævenitur nimia illa concrescibilis potentia in sanguine. *Calor æstuans* in febribus breve omnia in putrilaginem convertens egregie iisdem temperatur, & quoniam dicta Antiphlogistica non facile per maiorem calorem in putredinem convertuntur, quoniam sunt Acescentia, præ omnibus aliis in febribus sunt laudabilia: miror igitur perversitatem multorum, qui in omnibus febribus non dubitant dare decocta carnis, quoniam in corporibus a febre calentibus cito in putrilaginem convertuntur. Non novi, me unquam sine *ægritudine* seu infirmitate

mitate observasse febrem, quæ ergo causa est, ut nova ingesta imperfectius elaborentur: nostrum itaque est evitare ea, quæ multa subactione egent, ut sunt cibi solidi, sed quæ facile vel minima corporis actione in bonos humores nostros converti possunt, uti sunt liquida, quæque soluta sunt antequam ingerebantur: imo quia in febricitantibus distillatur tenuissimum, ad subigenda ingesta alimenta non confluit satis magna copia liquidi; atque corpus humido privatum, hoc victu humido etiam suppetias accipit. Quare non solum ex sententia Hipp: verum etiam ex ratione & experientia conducit victum humidum præscribere febricitantibus. Practicis graviter obstat, quid sit faciendum in Hydro-pico febricitante, nam victu humido augetur hydrops. At tales multæ in praxi occurrunt difficultates, si signa contra indicantia occurrunt, in quibus Medicus judicium ferre debet, quid ex his contra indicantibus præcipue tollendum sit. V. G. si hydrops magis urget, quam febris, non est victus humidus imperandus, secus vero si æger ex febre magis periclitatur. Non est ex hydropis natura febricitare, sed si accedat, est morbus novus alteri accedens, vel producitur ex corrupto latice. Atque in morbis compositis generalis regula non valet, unde allata difficultas illa non est alicujus momenti, nam si vellem plures alios quoque compositos casus fingere, hæc regula generalis de victu humido febrientium sæpe pateretur exceptiones.

III. Nostrum corpus observatur a nativitate ad perfectum incrementum non solum augeri mole, verum etiam robore, ut quo propius est origini, eo minus sit valens; ante nativitatem enutritur enim solo præparato a matre succo; post nativitatem lacte & pauxillo panis, non fert solidiora alimenta; sensim vero increscens viribus etiam pollet; est ergo ex sua natura puerorum corpus debile, & alimentis liquidis concoctu facilibus sustentandum. Quod si oboritur in tali corpore per febrem major infirmitas, in hoc itaque omnino debemus abstinere a cibo solido & concoctu difficili. Recte igitur Hipp: imperat victum humidum, præprimus in pueris febricitantibus.

Pueris

Consuetis. IV. Corpus nostrum etiam malis rebus assuescere, notavimus (in *Persp: Aph.* 208 & 231.) hæc consuetudo hic est persequenda in victu humido. Qui a longo tempore nihil nisi humida & digestu facilia accepit, ejus ventriculus & reliqua organa ita emolliuntur & relaxantur, ut imparia fiant duriora subigere: hoc experiuntur illi, qui ad evitandam podagram vel phthisin protrahendam utuntur diæta lactea; quod si lac amplius ferre nequeunt, & tunc volunt ad victum communem redire, haud facile priorem victum ferunt: ita operarii si longo tempore fuere otiosi, ad labores accedentes citius fatigati erunt, qui se domi continere sunt consueti, in apricum vel ventum venientes, magis læduntur quam consueti. Igitur maxime confert victus humidus omnibus febricitantibus, ut dictum est, sed præprimis consuetis, nam hi ob duas rationes per alium victum læderentur, 1^o ex natura febris, 2^o ex consuetudine.

LIB. I. APH. XVII.

17. *ET quibus semel aut bis, & plura vel pauciora, & per partes offerri conducat, videndum. Concedendum autem aliquid & consuetudini & tempestati & regioni, & ætati.*

I.

Hic Aph. rigide primo examinat ingerendi tempora, seu quoties in die cibus sit dandus; dein quantitatem determinat. Sed monet deinceps, recedendum interdum esse a rigidissima hac regula ob consuetudinem, tempestatem, regionem & ætatem. Quare primo generaliter inspiciendum, quid magis conducat in sanitate & morbo, semel aut bis, multum vel parum ingerere.

II. Cum

II. Cum quidam homines semel, alii bis, imo ter quaterve de die cibum capientes omnes manent sani, experientia non constat, quid sit eligendum sanitati maxime conveniens in sanitate conservanda; itaque ratione quadam fatagunt hoc examinare, tam in sanis quam ægrotantibus. Quidam solummodo asserunt, bis vel ter de die tutius esse quam semel (*vid. Psp C. 11. XII*) alii vero contrarium statuunt. *Videndum est* habetur in textu, quid itaque videbo, si experientia non comprobat unum vel alterum; & ratio vario modo a Medicis accipitur. Ponderabimus itaque rationes, ut inde aliquid certi petere possimus. 1º Capiuntur alimenta ut restituatur id, quod inevitabili actione corporis deteritur, ex hac itaque ratione omni tempore & parum simul esset ingerendum, ut suppleatur amissum. 2º Ventriculus & reliqua organa chylopoiëtica facilius possunt parvam quantitatem simul subigere, quam magnam semel ingestam; atque saliva, bilis, ventriculi & pancreatis succus assiduo affluens, melius possunt parvam quantitatem simul ingestam superare & solvere quam magnam, quia tanta copia horum liquorum confluit eo tempore dum semel in die comeditur, cum hærent alimenta in ventriculo & intestinis, quam affluit, si eadem quantitas partitis vicibus fuisset ingesta. Constat ergo ex causa, quæ alimenta exigit, & quæ alimenta præparat, conducere, sæpius de die capere cibum saluberrimum esse. Sed *Sanctorius* (*vid Persp: Aph. 306.*) Pestis est inquit, *comedere ante cibi præcedentis concoctionem*. Hoc ergo confirmat bis aut ter de die capere cibum conducere, modo tantum spatium intercurrat temporis, ut præcedens ingestus cibus perfecte coctus sit. Istud ex hac recepta hypothese adstruit, coctionem, quæ ad minimum quinque vel sex horas insumit, novo ingesto turbari, ut alimenta ebullientia in olla ab affusa nova aqua desinunt ebullire. At longe abest, nam in infantibus, qui fere omni hora lac sugunt, experimur, non turbari coctionem ventriculi, & in reconvalescentibus & infirmis, quo sæpius & parva copia simul sumunt alimenta, eo facilius hæc subigere, & eo minus aggravari; atque rationibus

Quoties
capienda a-
limenta,

bus allatis consentaneum est, eo melius esse quo sæpius assumuntur alimenta. Patet itaque ex his, falsam assumptam fuisse hypothesin, qua contendunt, coctionem turbari novo ingesto. Decepti utique sunt existimantes, coctionem turbari novo ingesto, quia hoc desumunt ex comparatione coctionis per ignem substratum, cum in nobis dicitur coctio, si actione vitali organorum, & affluxu humorum saponaceorum subiguntur ingesta, minime vero ab igne substrato, uti illi existimarunt. Videntur autem duæ obstare rationes. Prima est, omnes homines in victu communi nunquam omni hora capere alimenta, si melius esset omni hora sumere, cur non faciunt istud? Hoc autem Dei benignitati est tribuendum, qui nostrum corpus ita creavit, ut quidem omni momento alimento egeat, sed huic molestiæ prospexit, ut quoque valeat semel in die si capiat alimentum, istud coacervare: eodem modo quoque cum excretionibus constitutum est, omni momento secernitur urina & segregantur fæces, sed non sumus coacti excrementa omni momento reddere: hoc argumentum igitur non destruit utilitatem capiendi frequentissime cibum in ægrotantibus & ex ætate debilibus. Alterum est, non concedi tempus sufficiens collectioni bilis in vesica fellea, quia ventriculus semper manens in æquali distensione eodem modo cistam urget, dum vero a ventriculo vacuo cista minus compressa in se bilem colligere valeat, quam evomit, si deinceps ventriculus impletur. Innuitur hoc argumento, requiri bilis collectionem, quasi collecta stagnans redderetur melior & efficacior ad præparanda alimenta, quis hoc probavit? existimo acervaculum bilis nobis a Deo datam esse, ne essemus coacti omni momento cibum capere, sed ut eo tempore, quando ventriculus est vacuus, non efflueret frustra ad præparanda alimenta per duodenum transeuntia, sed tunc eo copiosius, si post jejunium copiosiora alimenta ingererentur, ut simul præsto esset major copia humoris præparantis. Ex his itaque omnibus colligo, sanitati admodum conducere aliquoties de die capere cibum, & maxime debilibus ex ætate vel morbo: sed sanos & firmos in sanitate permanere posse, etiam-

si semel in die cibum sumunt, quia in nobis ita sunt fabricata organa, ut unica vice tantum possimus ingerere, quantum intra viginti quatuor horas requiritur ad nutritionem; quemadmodum hoc quoque in excrementis exonerandis experimur: sed propterea non sequitur eum modum optimum esse ad conservandam & recuperandam sanitatem.

III. Si attendimus ad scopum, cur sumuntur alimenta, facile est definire quantitatem generalem, nam in crescentibus paulo plus est ingerendum quam corpus deterit, quia ab assumptis incrementum debet formari; sed in ætate constante tantum est ingerendum, quantum consumitur, modo non sit causa vetans tantam ingestionem, uti sæpe in morbis. Ut itaque homo in sanitate sciret, quantum sit ingerendum, Deus nobis dedit monitorem, famem scilicet, quæ in sanis satis fideliter declarat, quantum assumendum sit: sed hanc minus quam saporem consulunt, quare gratiora nimia copia sæpe assumunt, minus grata vix ad sustentandam vitam. Qui vero sani viventes corpus nutriunt tanta quantitate alimentorum, quantum fame indicatur, & in potione a siti, non egent aliis regulis sanitatis quantitatem indicantibus, cum non omnes homines, omni ætate, & anni tempore, in otio & quiete, eandem quantitatem requirant: semper tamen in sanis pari passu augetur fames & sitis cum alimentorum necessitate (vid nostram Exercitationem de fame & siti.) In morbis autem longa alia est ratio: sæpe enim vitiata fames & sitis plus vel minus petit quam requiritur; corpus ex ægritudine debile non valet modicam præparare copiam; satius est emaciari parviori cibo, quam assuetam quantitatem ingerere, quæ subigi nequit, & tamen permittit corpus macie consumi, & insuper crudo & corrupto opplet.

Quantum
assumen-
dum.

IV. Tempus sumendi & alimentorum quantitas, tam in sanis quam ægrotantibus, aliquam mutationem patitur ex Consuetudine, quod, etiamsi in præcedentibus ea fuere definita, interveniente tamen Consuetudine, debeamus aliquomodo a receptis regulis recedere. Tantum e-

Ex Consuetudine.

nim valet Consuetudo, ut dicatur altera natura, & qui certis temporibus consuetus est cibum capere, si idem tempus recurrat, appetitu aucto moneatur tempus esse capiendi alimenta: hi si alio tempore comedunt, alimenta difficiliter digeruntur; ita multi ex Consuetudine contenti sunt & sani vivunt semel in die capientes cibum: alii vero quater de die assueti, non nisi difficultur ferunt semel comedere. Idem quoque verum est de quantitate, nonnulli enim gloriosi se multum devorare vel bibere posse artificiosi fiunt heluones & bibones. His autem diu assuetis difficillime restituitur victus, quamvis id in sanitate tentant, sed morbo correpti aliquomodo perseverare debent in consueto vitæ genere; nihil enim in podagricis periculosius, quam dum doloribus langueant potum spirituosum in aquosum commutare; vidi quoque in hydrope post abusum spirituosorum damnosum esse omnino a spiritu fermentato abstinere. *A multo tempore consueta etiam si fuerint deteriora, insuetis minus turbare solent. Lib. 2. Aph. 50.*

Ex Tem-
pestate.

V. Tempestates hic duplici modo capi possunt, vel significant variam aëris constitutionem, calidum, frigidum, humidum, siccum, nebulosum, pluviosum &c. vel respicere possunt ad solita anni tempora, æstatem, hyemem, ver & autumnum, æquinoctium, solstitium. In his præcipit auctor, aliquid concedendum esse, uti hyeme frequentius & copiosius est dandum; æstate autem parcius; sed cuncta quæ præcipienda sunt in victu his temporibus & tempestatibus aliis in locis exponitur: debemus autem si morbus in tali aëris constitutione vel anni tempore occurrit, simul perpendere, num istis temporibus non debeat fieri quædam in victu mutatio, ut quoque ad ea aliquomodo nostram curationem dirigamus.

Ex Regio-
ne.

VI. Regiones calidiores pauca sed diluta & humida magis egent; frigidiores vero solidiora & copiosiora: atque humidiores alimenta sicciora postulant, sed sicciores humidiora. Interdum quibusdam locis unum præ alio genus victus magis conducit: quæ omnia ex locorum inhabitatione sunt observanda, ut si in istis locis incidit mor-

morbus, aliquomodo recedamus a regula generali, nosque magis accommodemus ad victum tali in loco saluberrimum.

VII. Ex iis quæ superius (Aph. 13. 1) notavimus, facile est determinare, in exhibitione, tam quoad copiam quam qualitatem, quando & quomodo debemus recedere a generali regula in ætate varia: in pueris enim & junioribus copiosiora & dilutiora exhibemus; in senioribus autem solidiora & parciora. Ita semper est in medicina ratiocinandum, primo proponendus est casus singularis & absolutus, in quo cuncta præcepta traduntur; itidem in alio singulari casu: sed tunc deinceps hi duo inter se sunt conferendi, ut si differentia occurrat, eligatur temperamentum, ut nempe de singulis aliquid detrahatur & addatur, quo in casu composito non peccemus in nimis stricta regula hujus vel illius.

Ex Ætate.

LIB. I. APH. XVIII.

18. **Æ**state & autumno cibos difficillime ferunt: hyeme facillime, deinde vere.

I.

IN Aphorismo præcedente præceptum generale tradidit, aliquid in alimentis porrigendis concedendum esse Tempestati (Aph. 17. v.) in hoc nunc quatuor anni partes agit, ut cibus parcior sit exhibendus æstate & autumno, sed copiosior hyeme & vere. Ex quibus autem causis hæc regula firmatur, videndum: nam his temporibus quædam naturalis debet fieri mutatio, quæ copiosiora, vel pauciora alimenta exigit vel tolerat.

II. Æstate solis calorem majorem partes firmas non solum nostri corporis, sed & alia relaxari, minus contracti-

Æstas difficile fert cibos.

lia & elastica esse, atque humores omnes citius suscipere corruptelam, omnia experimenta suffragantur, cum calore enim majore chorda, corium, laxantur, in frigore vero contrahuntur, ita ut ipsa metalla flexibilia fiant æstate, dum autem in frigore hyemali rigeant: atque caro, pisces & cuncta corruptibilia brevi tempore in æstate putrilaginem contrahant, quæ hyeme diu sine corruptela potuerunt servari. Est ergo in partibus firmis nostris æstate minor actio quam hyeme; sed ingesta alimenta corporis actione erant subigenda, quæ nunc debilior facta non valet ut antea tam cito ingesta subigere: itaque si eadem servatur ingerendi quantitas, aliquid de ingestis restabit in corpore non subactum. Hoc dein per spontaneam seu insitam actionem commutatur in corruptelam, quæ non esset expectanda, si tantum fuisset detractum de ingestio- nis quantitate, quantum vires fuere diminutæ per super- venientem calorem. Imo non solum enervatur ex calore contractilitas in partibus firmis, verum infirmior e- tiam fit motus animalis & vitalis, corpora enim nostra cum eodem pondere sentiuntur graviora, quia vires moven- tes fuere enervatæ. Quod non subactum est de ingestis, citius quoque in corruptelam convertitur, si itaque per abun- dantiam hyeme peccatum fuerit, quoniam tarde in cor- ruptelam convertitur, sequentibus diebus id abundans sæpe emendatur; sed in æstate protinus abundans in corrupte- lam conversum morbos parit: quare æstas minorem co- piam alimentorum ferre potest quam hyems.

Autum-
nus difficile
ferre alimen-
ta.

III. Ex allatis rationibus, cum aucto calore corporis vires minui, patere videtur, autumno facilius ferri posse alimenta, cum aër tunc frigidior fieri incipiat: sed pari modo non procedit, ab accedente frigore vires augeri, quemadmodum fit virium diminutio cum caloris augmen- to: nam per calorem ut diximus laxantur solida & ex- hauriuntur spiritus; sed per frigus augetur quidem con- tractilitas, verum non adduntur spiritus, qui generandi sunt propria actione nostri corporis. Inde ingruente fri- gore autumnali solida quidem contrahuntur, verum quia

vires

vires simul non augentur, a quibus validis alimenta sunt subigenda, & quia minuitur insensibilis perspiratio, alimenta tam copiosa ferri nequeunt: nam ingesta a viribus infirmioribus minus præparantur, &, quod exhalare debebat, retentum, morbos parit: tum aër a præcedente calore maligna infectione inquinatus pronior est ad producendos morbos. Quare, qui morbos autumnales studet evitare, caveat a nimia ingestione alimentorum hoc tempore; & studeat, ut conservetur corpus in eodem pondere, ut erat pondus æstivum, id est ut fervetur corpus perspirabile.

IV. Tandem vero continuato frigore sensim magis roborantur corpora, nam ex frigore subito veniente non ita augebatur spirituum copia, ut valerent majorem alimentorum copiam ferre, neque statim emendatum fuit corruptum ex antecedenti calore æstivo, verum si hyeme diu continuatum fuit frigus, corpora ferendis oneribus redduntur paria; & tandem liberatur aër ab omni inficiente: Quare hoc tempore alimenta copiosiora non solum facilius feruntur, uti experimur omnes, nos hyeme plus comedere quam æstate, sed etiam in morbis victus humidus & parcior minus conducit, quam æstate. Hipp: autem rationem hujus redderet ex majore calido innato, cum ventres hyeme sint ex ejus sententia calidissimi. (vid Aph. 15. iv.)

Facile ferunt alimenta hyeme.

V. Discrimen ponere videtur Hipp: inter hyemem & ver, nam non dicit hyeme, & vere, sed *hyeme facillime dein vere*, quasi innueret hyeme facillime ferri alimenta, sed vere minus, facilius tamen quam autumnno & æstate. Hoc non est sine ratione, nam hyeme & ob majorem contractilitatem in partibus firmis, & spirituum copiosiores proventus facile fertur major alimentorum copia, magisque deteritur & inde copiosiora alimenta tam in sanis quam ærotantibus desiderantur: sed vere ob accedentem calorem sensim relaxantur partes firmæ, verum quia calor non est nimius, sola valida adhuc actione vitæ subiguntur alimenta, inde vere minus ferri potest, quam hyeme, plus vero, quam æstate & autumnno.

Vere.

LIB. I. APH. XIX.

19 **H**is qui per circuitus exacerbantur, nihil
care oportet, neque cogere, sed auferre de
appositionibus ante judicationes.

I.

IN præcedente Aph. xi. egerat Hipp; de Diætâ generali in paroxyfmis morborum, qui dicuntur Remittentes & Intermittentes: deinceps dixit in morbis judicium desumi ex exacerbatione, natura morbi, anni temporibus, paroxyfmis, & æpiphænomenis: hinc dat regulas diætæ ætate varia, tempestatibus anni, consuetudine; concludit aliquid concedendum esse consuetudini (*Lib. i. Aph. xvii.* majorem dandam quantitatem hyeme & vere, minorem autem æstate & autumnno; hanc nunc arripit occasionem ut dicat, quando nihil dari oportet. Tria enim in victu observari possunt, ut plus vel minus, vel nihil detur, ut itaque hoc ultimum traderet, vel debebat antecedentem Aphorismum xi. repetere vel locum citare, ad clariorem autem doctrinam verba quam locum repetere: Hoc Hippocrati non est infrequens, nam sæpe eadem verba repetita invenies, si ejus opera pervolvuntur: & quando ordo pertractationis nos eo deduxit, ut eadem res antea fuerit explicata, locum præcedentem indicabo. Sensum hujus quia iste ex præcedente peti potest, non est opus hic proponere.

LIB. I. APH. XX.

20 **Q**Uæ judicantur & judicata sunt perfecte, neque movere oportet, neque innovare, sive purgantibus, sive aliis irritamentis, sed sinere.

I.

HUc usque egerat Hipp: de dirigenda diæta in morbis, nunc autem mutat sermonem & agere vult de evacuationibus faciendis in morbis, initium sumens a morbis acutis, nam agit de crisi in morbis, quæ non ita in chronicis observantur: in acutis præceptum dat de irritamentis & purgantibus adhibendis determinato tempore acutorum, nempe dum morbus acutus judicatur vel judicatus fuerit; & hoc perfecte: nam si imperfecte judicatur vel judicatus fuit morbus, hæc regula non valeret, ut infra constabit. Quare in hoc aphorismo primo determinandum venit, quid sit intelligendum per judicantur perfecte, & perfecte judicatum, deinceps quamobrem eo tempore irritamenta & purgantia sunt evitanda.

II. Crisis doctrina ab Hipp: accuratissime observata & descripta a neotericis vario modo agitata, hodie admodum incerta & fallax, imo nullius momenti a quibusdam habitata, facit, ut tiro medicus incertus. num observanda vel repudianda sit hæc doctrina, anceps hæreat. Veteres autem ex observationibus practicis in ægris, dum versabantur in locis calidioribus, atque ex ratione, qua statuebant pugnam vel lætamen fieri inter morbi materiem & vires vitæ, statuebant in morbis fieri crisin seu judicium: Sed neoterici, vel quod minus attenderunt naturales morbo-

Crisis.

rum

rum mutationes; vel easdem præpostera curatione perverterunt; vel in regionibus frigidioribus minus observabiles sint, totam hanc doctrinam, ex assumpta hypothese; naturam non habere mentem, qua observaret tempora, omnino dereliquerunt & repudiarunt. Quid autem sit sentiendum, paucis videbimus.

III. Omnes fere morbi acuti, qui nempe sensibili evacuatione finiuntur vel metastasin faciunt ad aliquam partem, (nam inveniuntur quoque, qui materiem sensibilem non habent, ut pestis; atque alii, qui desinunt per insensibilem perspirationem, ut levis ephamera; vel crisin non subeunt, ut putridi & erysipelatosi atque maligni morbi.) certo tempore morbi ex sua natura, si nulla inducitur mutatio vel per artem vel res non naturales, moluntur evacuationem, qua eliminant morbi materiem. Hoc tantum interest, num ea evacuatio fiat certis diebus morbi, an vero indifferenter omni tempore & die. Neoterici contendunt certum tempus observare non posse naturam animæ carentem, at qui observat accuratissime stadia, quæ servant variolæ, nemo negare potest hodie adhuc morbi materiem servare tempora. Quod autem hodie cricum doctrina sit incerta, ex allatis rationibus facile colligitur, præprimis si quis morbos putridos & erysipelatosos observans, detegit, incertis diebus naturam moliri evacuationem, facile concludet omnia incerta fore: sed aliquid certi esse in diebus criticis, morborum observatio affirmat.

IV. Crisis apud veteres duobus modis accipitur, vel intelligunt symptomata, quæ concitantur, dum morbi materia præparatur & expellitur, vel intelligunt ipsam evacuationem. Dum vis vitæ versatur in elaboranda materia morbi, quando in excretis quædam signa hujus confectionis conspiciuntur, dicebant, crisin instare: si vero dein augentur symptomata & procedit evacuatio materiæ præparatæ, concipiebant fieri Crisin; post hanc evacuationem cum mitescebant symptomata, dicebant crisin factam esse.

Quæ ju-
stantur.

V. Quam primum ergo ac in urina vel aliis excretionibus apparent signa, quæ præcedere solent in morbis acutis

tis

tis, post quæ laudibilis secuta fuit evacuatio cum morbi diminutione, morbus dicitur judicari, atque etiam si natura versatur in expulsiōe, etiam dicunt, morbum judicari.

VI. Ultimum hoc & quando facta seu absoluta est evacuatio, morbus dicitur judicatus, nam dum evacuatio fit, Quæ judicata sunt. quia antecessere signa hanc evacuationem præfagientia, res quidem versatur in judicio, sed respiciens ad præcedentia, dicitur judicata. Si vero evacuatio fuerit peracta, absoluta est judicatio, & morbus dicitur judicatus.

VII. Tria hæc tempora, primo futura evacuatio, Crisis perfecta & imperfecta. secundo evacuatio ipsa, & tertio quando evacuatio fere absoluta est, distinguuntur in perfecta & imperfecta; nempe si in futura evacuatione deteguntur omnia, quæ bonam evacuationem præcedere solent, perfecta dicitur: ita quoque in evacuatione & post evacuationem: sed si quædam notæ deficiunt, vel aliena simul conspiciuntur hoc tempore, crisis dicitur Imperfecta.

VIII. Multi contenti sunt dicere, perfectam crisin bonam Crisis perfecta. esse, imperfectam vero malam, sed junior medicus nesciens, ex quibus signis colligere debet, num in ægro perfecta vel imperfecta fiat crisis, æque incertus est in prædictione & modo agendi, ac si nihil scivisset; quare opere prætium erit istas hic addere notas, quas praxis detexit in morbis perfectam crisin concomitari, ut junior medicus ex istis detectis & observatis dejudicare valeat de perfecta & imperfecta crisi. (1) Omnis perfecta crisis fieri debet per *Evacuationem*, quoniam morbi materia ad aliquam partem deposita omnem quidem materiem deponere potest, sed quia non fertur extra corpus, illa liberatio est imperfecta. (2) *Evacuatio signis* antea debuit esse *indicata*, id est aliquid sedimentoli in urina præcedere debuit, ut constaret, præparationem materiæ morbi inceptam fuisse, cum unico momento materia cruda non convertatur in coctam, sed sensim: si ergo statim magna fit evacuatio, illa critica esse nequit in morbis acutis. (3) *Satis copiosa*, id est respondens magnitudini morbi, quare copiosior in magno, quam parvo

morbo esse debet: si enim parvus morbus magnam molitur evacuationem, hæc partim ex morbi materia, partim etiam ex bonis humoribus provenit, quare non est perfecta crisis, quia ablatione boni alium sæpe inducit morbum. (4) *Per locum conveniens*; ita enim nostra sunt creata emunctoria, ut specialem materiem a communi massa segregare valeant, non vero sine discrimine omnem materiem morbosam, id quoque non fit in fanis, cerebrum enim discernit spiritum, hepar bilem, renes urinam, sed hi humores non segregantur a communi massa sine discrimine per quodcumque organum secretorium vel excretorium; frustra enim laborarem omnem urinam ducere per cutis spiracula, vel perspirabile omne per renes trajicere. Ita quoque sentiendum est, morbi materiam purulentam commodissime per renes segregari a communi massa, minus commode per alvum vel cutis spiracula: interdum tamen pus aliam affectat viam, sed in crisi perfecta reddi debet per renes, vel si in pectore hæret, etiam per sputum. (5) *Debuto tempore*. Multi ut monuimus indiscriminatim omni tempore perfectam crisin fieri contendunt, Hippocrates autem passim inculcat, excretionem perfectam fieri debere diebus Criticis: si verum fateor, quod observavi in morbis acutis, Hippocratis sententiam veram inveni, si morbus perversa curatione vel errore in diæta non turbatur, optima crisis a me observata fuit diebus criticis: & ut non errarem in signis, sedulo perscrutatus sum variolarum stadia, in quibus mutationes magis quam in aliis morbis acutis sunt manifestæ, semper detexi, minime periculosas esse variolas hæc tempora observantes; sed ab iis temporibus recedentes, erant periculosiores: quare minus irridendi sunt veteres, quam a quibusdam fieri assolet. Tamen tempus non ita valet, ut crisis alio tempore sine vitæ discrimine non potuisset fieri. Experimur etiam, malas herbas florendi & semen maturum proferendi tempus accurate quoque observare, non est ergo mirum, semina morbosa sua quoque tempora servare: valeo tamen præmature flores & semina generare conciliato majore calore; & retardare, detracto calore naturali; hoc quoque

que fieri in morbis, experientia practica confirmat: optima tamen fruges debito tempore colliguntur, quare optima quoque est crisis, quæ critico die perficitur. (6) *Tollens omnem morbi materiem*, nam si aliquid relinquitur, id novum morbum faciet, vel recidivam inferet, quod cognoscimus ex virium incremento post eam evacuationem: nam si bonus humor evacuetur, vires inde non recuperantur, neque minuuntur morbi symptomata. Si omnes hæ notiones adsunt, *perfecta* dicitur seu optima; si multa vero, *bona* potest vocari; si quædam, *mala*; & quo pauciora adsunt vel his contraria, eo *pejor* habetur.

IX. In Crisi dictis signis indicata, quæ ad salutem tendit, vetat nunc Hippocrates *Moventia*, hoc expertus est observatione practica, si tunc irritamentum addatur, turbabitur illa crisis laudabilis, quia omnis mutatio inducta unum alterumve bonum signum detrahit. In vitæ actione modus est, a quo si recedit, vel quod motus fiat major, vel minor, in utrisque malum producit, nam motus major invertit laudabilem præparationem & corrumpit bonos humores: ita tepor naturalis avium imprægnatum ovum facit producere pullum, minor impedit, major corrumpit. Inde contra hanc regulam non parum peccant, qui in variolis cum optimis signis erumpentibus exhibent calefacientia, moventia, quibus fictam malignitatem excuterent, dum experiuntur variolas nunc bonas, his auxiliis in corruptelam verti.

In Crisi
perfecta
non mo-
vendam.

X. Motus vitalis æqualis est per totum corpus in sanitate, sed in exonerandis liquoribus suos contentos liquores in vasis magis ad aliquam partem dirigit: atque in morbis observamus, impetum majorem interdum fieri ad caput, pulmones, hepar aliaque organa; in ulceribus etiam si instat hæmorrhagia, præcedit partis pulsatio indicans sanguinis fluxum magis ad eam partem dirigi motu vitali arteriarum: hoc etiam in mensium fluxu instante. Valemus etiam medicamentis ad aliquam partem dirigere fluxum, ut in purgantium, diureticorum, emmenagogorum, sialogogorum exhibitione observatur: cuncta enim hæc ore

Perfecta
Crisis vetat
purgantia.

assumpta, proprias tamen suas exequuntur operationes: hoc etiam tota doctrina derivantium comprobatur, motum vitalem in arteriis sanguinem majore impetu ferri posse ad aliquam partem. Sed insuper observatur, si talis vel ex natura vel medicamentis fiat derivatio, reliquas excretiones minui & sisti, ut in sudoribus, si alvus fluat, in alvi fluxu, si sudor erumpat. Si ergo natura in morbo moliatur crisin bonam vel per sudorem vel urinam, illa directio ex dato purgante pervertitur ad alvum; at vero quia illa morbi materia adaptata est, ut possit per cutis spiracula duci, ad intestina delata exonerari nequit, quia quodcumque emunctorium suum proprium liquorem separat & exonerat. Quare per purgans exhibitum retinetur id, quod in crisi perfecta fuisset evacuatum. Aliquis tamen dubitare potuisset, si crisis fieret per alvum, an tunc illa non esset promovenda purgantibus: neque hoc faciendum in crisi perfecta, nam in ea evacuetur omnis materia, si addas purgans, plus eliminetur, sed quia tantum non est de materia morbi, id quod purgantibus evacuas, est de bonis humoribus, qui cum detrimento ægri evacuantur. Ergo non sine ratione concludit Hipp: *sed finire.* Nihil enim præstari potest medicamentis ad melius.

LIB. I. APH. XXI.

21 **Q**uæ ducere oportet, quo maxime vergant, eo ducenda, per loca convenientia.

I.

IN generali evacuatione facienda Hipp: hæc tria observat. (1) Ut sit materia apta ad evacuandum, & quæ ablatione ejus mitigare vel curare potest morbum (2) Ut observetur naturæ directio, nam reluctante natura difficul-

ficulter procedet evacuatio, vel aliena evacuabuntur. (3) Sed quia interdum per alienam viam, quæ magnum damnum inferret, natura evacuationem molitur, in eo casu ductio derivanda est ad alium locum minus periculofum.

II. Qualia ducere oportet, in fequente Aphorifmo præcipit, nempe *Cotta* non *Cruda*. Tria funt humorum genera, quæ evacuari poffunt. (1) Sola materia morbi evacuationi adaptata, fed talis nifi hæreat in primis viis, eliminari nequit in morbi principio, nifi talis fit naturæ, quæ præparatione non eget, ut materia perfpirabilis re-tenta. (2) *Cocta*, quæ in fequente aphorifmo tradetur. (3) Bonus humor, ut in venæ fectione, qui aufertur ad temperandum nimium motum & minuendam abundantiam humorum, fi peccat: ex his ea ducere oportet, quæ cum emolumento ægri auferri poffunt, & quæ natura evacua-re folet, fi hominem in fanitatem reftituit. Verum talis sæpe fit evacuatio fine ullis auxiliis, tunc illa quo-que medicamentis non eft turbanda, fed fi experimur, natura languere, fuppetias ferre debemus, nam materia erat evacuanda & non fatis evacuatur, quare ejus eva-cuatio medicamentis eft promovenda, hoc denotat *qua ducere oportet*.

III. Sanguis materiâ morbi infectus ex cordis ventriculo finiftro in aortam pulfus, fi fola cordis actione & elate-re arteriarum propellitur, fecundum leges hydraulicas æqua-li quantitate feretur per omnes ramos arteriarum, feu quan-titates per æquales canales fluentes erunt eo majores, quo minor eft refiftentia. In vafis igitur integris & corpore quiefcente, uti in decumbentibus ægris, nulla fieri poteft directio ad hanc vel illam partem major: nam fi cor vali-dius operatur, per omnes arterias æquabiliter augebitur velocitas, ut experimur in fontibus falientibus per varia emiffaria ex eadem fcaturigine provenientia; & viciffim languente cor'is actione, per omnes arterias fit tardior fluxus. Certum itaque eft ex obfervatis hydraulicis, fi in nobis fola actione cordis peragatur circulatio, natu-ram

Quæ du-
cenda funt.

Obfer-
vanda natu-
ræ directio.

ram facere non posse directionem, quæ tamen toties in morbis observatur: veritate itaque victi, cogimur admittere causam aliam, circulationem facientem, quæ potest in quodam ramo majorem & minorem concitare motum. Talis est motus vitalis in fibris arteriarum, nam si in alicujus arteriæ ramo major fit motus vitalis, in eo ramo accipit sanguis majorem impetum, quam in aliis: sed quoties liquor circulans in itinere accipit novum impetum, sanguis a tergo veniens, in eo ramo minorem inveniens resistantiam, ob magis propulsum in eo ramo sanguinem, majori copia eo derivabitur. Ergo natura potest ad aliquam partem facere directionem, si modo concitetur in quodam ramo motus vitalis validior. Hanc directionem possumus quoque præstare topicis medicamentis, nam stimulantia applicata in istius loci arteria, majorem motum concitant: sed an directionem quoque facere possumus exhibitis internis medicamentis, minus liquet: quæ enim stimulant, quia toti massæ mista sunt, non videntur in speciali parte motum concitare posse. Verum aliter ratiocinamur in rebus mortuis & aliter in viventibus, multa fiunt in nobis, quæ longe superant detectas leges motuum in physicis: & interdum fit in viventibus actio a nemine mente consecuta. Quis physiologicorum ex alimentis in machinis mortuis fecit lac? quis potuit ex sanguine solam separare urinam? bilem? semen? spiritus? si deficit organum motu vitali instructum, nihil horum ulla arte assequi potest: nam sanguis per organum tale mortuum trajectus, non conficiet urinam, semen, spiritus, bilem: quare directio vasorum, fabrica organi, transitus liquoris per id organum, non sunt sufficientes causæ ad horum liquorum præparationem & secretionem, adesse insuper debet motus seu actio, quæ in viventibus solis præsens est: imo hanc actionem in viventibus non omni tempore præsentem esse, docet observatio in feminis & lactis confectione, nam si illi humores non conficiuntur, præsens tamen est organum & fluxus humorum per istud in viventibus: verum naturaliter lac solummodo post partum formatur
in

in mammis, & semen in matura ætate. Quare admittere debemus, in organis his requiri præter structuram & generalem motum vitalem, alium specialem motum, quem Deus in distinctis organis locavit. Eum autem motum seu actionem majorem & minorem fieri posse, experientia dicitur; sentiunt enim fœminæ lactantes quodam tempore lac veluti ad mammas pelli, quando etiam facilius & copiosius ab infante attrahitur; sed motus ille non dependet ab arbitrio lactantis, quare non est voluntarius motus, neque motus a generali causa dependens, cum in tali lactis copiosiore ad mammas affluxu nulla observetur in cordis vel arteriarum actione commutatio, sed dependet a sola agitatione organi in mammis. Neque hoc solummodo in mammis, lachrymæ enim, saliva, & aliæ secretiones ex animi pathemate augentur, non quod totius corporis circulatio augeatur, sed in istis solis organis, ut taceam, quid sit in generationis actu. Negari ergo nequit, in organis specialem fieri posse motum, eum non pendere ab arbitrio nostro, neque a generali motu vitali. Hunc motum vocat Hipp: *Naturam*; & vult si *natura vergat ad aliquod organum excretorium, ut eò ducamus*. Constat ex dictis præstare posse confectionem motum illum specialem in quibusdam organis; non ergo est absurdum, eundem quoque motum concedere renibus, intestinis, cuti, aliisque organis excretoriis, cui, si fiat, facilius est medicamentis suppetias ferre, quam eum auxiliis fuscitare. Atque altera subest ratio: morbi materia non sine discrimine per quodvis organum secretorium a communi massa potest segregari, pus enim commodissime per urinæ vias, melancholicus humor per intestina, infectio venerea per glandulas salivales, variolosum per cutim, segregatur. Si ergo ex inchoata evacuatione percipio, motum specialem in quodam organo augeri, materiem aptam esse, ut per istud organum possit eliminari, non solum difficile erit ad aliud organum eum ducere liquorem reluctante natura, verum etiam sæpe frustra hoc contendimus, cum materia evacuanda inepta possit esse, ut per istud organum separari

rari possit: quare inducta perturbatione per nostram præposteram sapientiam, non raro retinetur morbi materia in corpore cum ægri damno.

Evacuatio per locum convenientem.

IV. Quisnam sit locus conveniens evacuationi, non satis constat apud practicos; unus laudat cutim, alter alvum, urinam, vomitum, imo artificialem viam. Ut hoc generale in morbis cum iudicio tractetur, distinguendum est inter humorem generalem & specialem: nam quidam humores per omnia loca patiuntur educi, & tunc eligimus commodissimum: vel humores unico organo segregari possunt & tunc debemus imitari naturam. Hæc autem regula in exemplis clarior sit. V. G. ob majorem motum vel plethoram requiritur sanguinis evacuatio, sanguinis missionem instituo in pede vel brachio, quia locus est conveniens, in quo operatio potest institui: sed si natura conatur se exonerare per hæmoptoen vel mictum aut vomitum cruentum, non sequor naturam, sed conor naturam divertere per aliam viam, quia æque facile per venam brachii vel pedis communis abundantia potest tolli, quam per vias istas periculosas. Aliter autem faciendum in particularis humoris educatione; si enim empyematicus deponat materiem ad alvum, tali evacuatione non liberabitur, cum omnis alvi fluxus malus sit in phthisicis & empyematicis, intestina enim non valent pus segregare a sanguine, renes id commodius peragunt, vel per sputum eliminatur, si ergo in empyematicis natura moliatur evacuationem per alvum, ea cohibenda, & promovenda expectoratio & diuresis. Et quoniam observatur in praxi, materiem tenuem per alvum evacuandam, etiam duci posse per cutim, & vicissim ad alvi fluxum cohibendum exhibentur sudorifera. Constat ergo secundum Hipp: præceptum, nos interdum recedere debere a naturæ conamine, si per alienam viam affectet evacuationem; atque hoc arte fieri posse, ex iis quæ supra disputavimus, satis firmari posse, reor.

L I B. I. A P H. XXII.

22. **C**oncocta purgare & movere oportet, non Cruda, neque in principijs, nisi turgent. Plurima vero non turgent.

I.

Maxime fatigavit Commentatores hic Aphorismus, variam hinc adduxere interpretationem, & inversionem sensus, & ad probandum varia loca Galeni adferunt: sed quia auctoritas nihil valet in medicina, sed experientia, & inde deductis rationibus veritas est adstruenda, videbimus quid Experientia & Ratio dicat. (1) Examinandum, num concocta sint purganda & movenda. (2) Num Cruda, neque purganda neque movenda sint. (3) Num Cruda non sint movenda & purganda in principio, nisi turgent. (4) Plurima non turgere.

II. Cuncta, quæ alimenti nomine ingeruntur, nobis sunt aliena, sed sensim actione vitæ & affluentium humorum ita commutantur, ut maxima ingestorum pars convertatur in liquida & firma nobis propria, qualis elaboratio dicitur Nutritio: altera autem pars assumptorum huic nutritioni inepta, commutata tamen, ut præbeat alvi excrementa, urinam, & perspirabile, si actione corporis etiam fuerit subacta & a materia nutriente separata, vocatur Cocta: nam si illæ excretiones præbent materiem minus elaboratam, vel & partem nutrientem, dicuntur Cruda emitti. Formatur ergo ex assumtis duplex genus materiæ coctæ. (1) Humor sanus perfecte elaboratus nostris assimilatus. (2) Humor alienus nobis inutilis, sed excretioni adaptatus, ex assumtis confectus, si

Concocta
quænam
dicantur.

emittitur, Coctum evacuari dicitur (*vid. Persp. Cap. vi.*). Sed si humor ille bonus evacuatur, vel quod emittendum erat retinetur, dicimus evacuare & retinere Crudum. Nam bonus & utilis humor ratione evacuationis, dicitur Crudus; & bonus ad evacuandum retentus etiam dicitur Crudus.

In mor-
bis.

III. In morbis alio sensu accipitur Coctum. Quædam morbi materia actione vitæ elaboranda est, antequam cum levamine emittitur, alia vero ulla virtute corporis præparari nequit: nam omnis materia morbi non ita mutabilis est, ut actione corporis subigi possit, quemadmodum non omnia, quæ per os assumuntur, in laudabile nutrimentum converti possunt; sed manent immutabilia, ut asfumebantur, vel abeunt in sibi propriam mutationem. Morborum inflammatoriorum materia, quæ præcipuam partem acutorum generat, observatur actione vitæ commutari; vel forsan in nutritivum seu bonum iterum liquorem, si parva fuit facta mutatio, ut in levissima febre, vel lentore nato validiore exercitio corporis; tunc potest ille lentor sine materiæ coctæ evacuatione in bonum succum commutari: sed si materia illa sit copiosior, attenuatur, interdum exit per insensibilem perspirationem, desinit etiam morbus sine crisi sensibili. Sed si major fuerit degeneratio, constans observatio practica docuit, evacuationem & retentionem hujus dici Crudum evacuari & retineri, de quibus infra: sed si materia hæc continuata corporis actione fuerit subacta & evacuationi adaptata, dicitur Coctum, quando per emunctoria evacuatur: sed retentum dicitur Crudum. Ut evitetur ambiguitas, res ipsa in exemplo clarius concipi potest: si quis in morbo acuto reddat urinam cum multo sedimento, albo, lævi, constanter, is dicitur evacuare coctum, & morbi materies ab omnibus practicis statuitur cocta. Verum si in eodem morbo istud sedimentosum dispareat & reddatur urina tenuis sine sedimento, dicunt crudum retineri & talem urinam arguere cruditatem, quam materiem antea vocarunt coctam. Ergo eadem materia morbi, quæ respectu evacuationis est cocta, respectu retentionis est cruda.

IV. In

IV. In Cocti descriptione quasdam species Crudorum delibavimus, omnes vero in hoc loco, quantum ex practi- Cruda quæ
dicantur. cis colligere potui, recensebo. (1) Alimenta ingesta sine commutatione per os, vel alvum, rejecta. (2) Eadem quoque corrupta & dein ejecta vel retenta. (3) Chylus bene elaboratus per emunctoria evacuatus. (4) Chylus corruptus evacuatus vel retentus. (5) Sanguis & reliqui humores boni evacuati: interdum tamen sanguis bonus in plethora vel impetu majore emissus cum levamine non vocatur cruda evacuatio. (6) Materia inutilis facta actione corporis & dein retenta. (7) Morbi materia quævis retenta sive sit inepta sive apta evacuationi. (8) Morbi materia non satis subacta & ita evacuata Cruda vocatur. Sunt ergo multæ species materiæ Crudæ, & id ex vario respectu, vel quia evacuatur id, quod retinendum erat; vel retinetur id quod erat evacuandum; vel quod evacuatur non satis subactum. De his omnibus plura videri possunt in *Comp. T. 39. Persp. Cap. v. & passim in Psp. Aph.*

V. Præcipit Hipp: *Cocta medicanda esse*. Liquet facile, qualem materiem Coctam intelligit, nempe (1.) Materiem ex alimentis confectam evacuationi adaptatam (II, 2.) Nam si talis in morbo retinetur, ulteriori mora & motu perturbato corrumpetur, conducit ergo collectum illum evacuare per emunctoria naturalia; inde licitum est omni morbi tempore, si talia fuere collecta, purgare corpus, id est liberare a materia illa cocta, ne retenta novum morbum pariat, vel præsentem augeat. (2) Materiem morborum acutorum actione vitæ eousque elaboratam, ut evacuationi (III.) sit adaptata: hæc quamvis matura sit non tamen semper subsequitur ejus evacuatio, sed arte est facienda, uti in abscessu diutius clauso istud pus diutius stagnans corrumpetur in ichorem, qui absorptus novum morbum putridum facit. Talis ergo materia morbosa vel per naturalia vel artificialia emunctoria est educenda, si sponte hujus evacuatio non procedit. Cocta
purganda.

VI. Cum duplex sit coctus humor; alter bonus ex ali- Cocta me-
dicanda. mentis in corpore retinendus; alter evacuationi adaptatus,

& evacuandus, videndum, num hi humores sint movendi. Chylus in primis viis optime confectus, si diutius retineatur commutabitur in cacochyliam, necesse igitur est ut moveatur, id est ducatur majore motu ad ea loca, ubi servire debet, quare diætetici admodum extollunt corporis exercitia & stomachica calefacientia eo tempore, quando chylus est coctus. Morbi materia ut est Lentor si conversus sit in pus, aut Inflammatio in abscessum, omnino alia indicatio curativa nascitur, quam ante istud tempus: hucusque enim minuímus motum per antiphlogistica, sanguinis missionem, & refrigerantia; sed nunc, si hæc facta sit mutatio, moventia adhibemus, & evitamus omnia motum minuentia; hinc in stadio variolarum suppuratorio licitum est calefacientibus uti, quæ damnum inferunt, si ante suppurationem propinantur. Utrique igitur peccant, qui semper calefacientia, & qui semper refrigerantia in acutis, inflammatoriis morbis, & variolis adhibent.

Cruda non
evacuanda.

VII. Duplex genus Crudi quia observatur, (1) bonus humor corpori inserviens, (2) alienus ineptus nutritioni & evacuationi, videndum, cur noceat horum evacuatio. Vires vitæ materiem morbi subigere debent & expellere, hæc quoniam generaliter minuuntur evacuatione boni humoris, tali itaque evacuatione minuendo causam præparantem, morbi curatio protrahitur: neque evacuatione boni detrahitur materia morbi, quare hujus evacuatio non valet morbum tollere, qui unicus est scopus medicinæ. Constante etiam observatione experimur in morbis inflammatoriis, evacuationem materiæ ante maturitatem exasperare morbum, qui enim apostema ante maturitatem aperit, morbum protrahet: quare Chirurghi monent, abscessum ante maturitatem non esse aperiendum. Hoc imitantur medici in curatione febris ardentis acutæ, quæ est veluti inflammatio generalis per totum corpus; si conantur lentorem evacuare per emunctoria, morbus exasperabitur.

Cruda
non mo-
venda.

VIII. Nisi adjiciatur, quid sit intelligendum in hoc loco per Crudum, hæc regula, cruda non esse movenda,
non

non procederet. Nam si virium defectu nata fuit Cruditas, uti in multis morbis chronicis, nisi moveamus crudum, id ad Coctionem deducere non possumus: sed Hipp: hic intelligit Lentorem seu materiem morborum acutorum majore motu febrili compactam; si huic addas moventia, magis compingetur & ad maturitatem non perveniet: inde Chirurghi numquam Emplastra vel Cataplasma a calefacientia & moventia adhibent tumori inflammatorio, quamdiu pus non est factum: neque Medici prudentiores in febris inflammatoriæ incremento adhibent calefacientia & stimulantia, ne lentorem ultra modum compingant.

IX. Turgere hic significat copiam humorum majorem impetum facientem, ut exeat. Ita in principio morborum acutorum sæpe turget sanguis, tunc oborta hæmorrhagia sedatur impetus & corpus minus turget: quamvis itaque per sanguinis educationem emittimus sanguinem seu humorem crudum, conducit tamen eam tunc facere evacuationem, non ut tollatur morbi materia, ut multi existimant, sed ut nimius impetus, quo partes vel totum corpus turget, & qui laudabilem coctionem inverteret, temperetur: nam æque ex nimio, quam languidiore motu vitali pervertitur materiæ concoctio. Ita etiam in morbis chronicis, si ventriculus & intestina cacochylia turgent, in principio conducit eliminare contenta.

Evacuare
& movere si
turgent.

X. Ne ergo medicus crederet, in omni principio Acutorum & Chronicorum sanguinem esse mittendum, vel Vomitorium aut Purgans esse dandum, addit *Plurima non turgere*. Hanc raro practici observant regulam, nam invenio, nonnullos statim, vel venam secare, vel vomitorium aut purgans dare, sine ullo discrimine, existimantes hæc auxilia tollere morbimateriem; & in sua praxi confirmantur, quia sæpe levamen ex tali medicatione observarunt; si vero successum morbum non habuit medela, id morbi naturæ adscribunt. Sed monitus hac regula, sedulo observavi semper in morbi Cruditate, num turgeret materia, tunc adhibui evacuationia cum summo successu, aliter vero utiliter a me omissa sunt. Si quis variolas curandas habet, quæstio est, num in princi-

Plurima
non tur-
gent.

pio sanguis sit mittendus, aut alvus ducenda, unus haec, alter illam sententiam tuetur, & acriter litigant. Verum illa statim componi potest admittendo evacuationem, si materia turgeat ut sæpe in juvenibus; & omittenda si non turgeat, ut in infantibus.

LIB. I. APH. XXIII.

23. **Q**uæ prodeunt, non copia sunt æstimanda, sed si prodeant, qualia oportet, & facile ferat. Et ubi ad animi deliquium ducere oportet, hoc etiam faciendum, si æger sufficiat.

I.

Duo diversa complectitur hic Aphor: (1) Ex quibus notionibus petenda sit cognitio bonæ & malæ evacuationis. (2) An non interdum licitum sit evacuare usque ad animi deliquium. In evacuatione præcipit, æstimationem non fieri debere ex *Copia*, sed ex *Qualitate* & *facili tolerantia*: Quæ res sensim examinandæ sunt.

An Evacu-
ationis
copia non
sit æstiman-
da

II. Quæstio hæc bipartita potest concipi. (1) Num nullo modo debeamus ad quantitatem evacuationis respicere. (2) Num vero minus sit ponderanda, quam evacuati qualitas & facilis difficilisve tolerantia. Primum hic velle Hipp: haud credo, quoniam utilissimum est in morbis, si evacuatio respondeat magnitudini morbi: nihil enim parvum est criticum; & nimia evacuatio debilitat: neque in morbo parvo magna debet esse evacuatio, neque in magno morbo parva evacuatio: sed tantum debet evacuari, ut judicare possimus, materiem omnem morbi ablatam esse. Minus enim evacuatum pro magnitudine morbi declarat, portionem mate-
riæ

riæ morbi relictam esse, quæ vel recidivam faciet, vel novum pariet: magis autem evacuari nequit, quin id abundans desumatur ex bonis humoribus, & ita non levat, verum debilitatem inducit.

III. Cum humores boni & mali evacuati copiam egestionis præbeant, sola observatio quantitatis non sufficit ad cognitionem; nam incertus sum, num illa copia ex bonis vel malis sit petita. Necesse ergo est, simul respicere ad qualitatem egestorum. Quidnam vero horum magis sit ponderandum, ita accipi potest: quantitas relinquit dubium, num sit ex bonis vel malis, atque facilis est copię æstimatio: verum qualitatis observatio declarat, num bonus vel morbosus humor educatur & morbo conveniens, & summo iudicio est opus, ut videamus, num sit qualitas conveniens. Igitur magis attendendum ad qualitatem, quam quantitatem; sed non debemus propterea totam quantitatis observationem negligere.

IV. Si omnibus in morbis eadem esset evacuanda materia, facile esset judicare qualia prodire deberent ad morbi solutionem, humores enim evacuati graphice cum omnibus his notionibus describi potuissent: sed qui prodeunt in uno morbo, damnosum sunt in aliis; quare decerni nequit, nisi addatur morbus, imo interdum morbi tempus, num, quæ prodeunt, bona sint vel mala. Nimis longum foret omnes percurrere casus, quare unum alterumve adferam ad hujus rei clariorem intellectum. Bonum est in Pleuritide & Peripneumonia si sputum æquale, album, inodorum prodeat; sed varium, spumofum, flavescens, foetens, malum. In morbis acutis urina est bona modice tincta cum sedimento laevi & albo; sed clara tenuis, vel cum nigro sedimento lethalis. Sanguinis fluxus in acutorum principio bona, circa finem autem lethalis. Sudores boni calidi ex toto corpore erumpentes; sed frigidi oleres, tantum circa collum & pedus, mali. Ex quibus rationibus autem dicta dicuntur bona & mala, aliis locis exponitur.

Qualia oportet evacuari.

V. Ponamus hominem materia morbi obsessum, quæ materia irritat vires vitæ, ut inde quædam nascantur symptomata.

Evacuatio-
nis iudici-
um ex faci-
li tolerantia

mata. Si motu illo concitato superatur & expellitur morbi materia, constat, corporis vires prævalere ad subigendum & expellendum; & si secuta fuit evacuatio, talis æger liberatus est ab ea materia, quæ vires opprimebat: ergo necesse est, ut facta evacuatione æger roboretur. Talis evacuatio dicitur fieri cum facili tolerantia, & propterea bona est, quia recuperantur ægri vires, & aufertur causa morbi. Si vero vires vitæ minus valent, sæpe etiam fit evacuatio, sed tunc victis vitæ viribus quivis humor ad emunctoria veniens transmittitur, non potest tunc fieri mali a bono separatio, sed effluit sine discrimine bonum & malum simul: quia vero bonorum evacuatio debilitat, & crudorum exoneratio recrudescente facit morbum, æger ille nullum levamen ex tali evacuatione percipit, imo qui antea non valebat morbi materiem superare, nunc hac evacuatione magis debilitatur, succumbet.

Quando
oportet ad
animi deli-
quium du-
cere.

VI. Superius (*Aph*, 3, ix) demonstravimus ex Hippocratis sententia immodica evacuatione abundantiam non tollendam esse, hic vero contrarium videtur statui. Quare multi Commentatores refugia quæsierunt, alii vero omnino contradixerunt: sed si res ipsa penitus inspiciatur, a veritate non recedit Hipp: nam ponit casum, in quo facienda esset evacuatio usque ad animi deliquium, ut homo fervetur, quæ si non fieret, periisset homo; satius tunc est tam copiosam facere evacuationem & servare hominem, quam permittere, ut vi morbi opprimatur. Hoc ergo loco perstringit meticulosos, qui in morbo sola magna evacuatione curabili existimant, fatiffecisse, si parvam fecerunt. Sed *ad Extremos morbos, extrema remedia exquisita optima.* (*Aph*. 6) Si aliquis pleuritide, peripneumonia, angina, phrenitide, febre inflammatoria tam valida corripitur, ut timor sit, ne homo fervari possit, dum tantus sit in corpore motus, qui omnia destruet, vel imminet suffocationis periculum, si subito summa non adhibentur auxilia, tali in casu præstans est sanguinem ducere ad animi deliquium ex lata plaga: nam minor evacuatio tam subitaneum levamen adferre nequit, quin prius extinctus sit æger. In his igitur oportet du-

ducere ad animi deliquium, sed tam vehemens non est facienda medicina, si faciliori & leviori auxilio levare possumus: sed si aliter homo servari nequit, ut monet Auctor, id quoque faciendum est, cum ex inducta lipothymia per majorem evacuationem non tantum periculi sit expectandum, quam immineret ex morbi vehementia.

LIB. I. APH. XXIV.

24. **I**N acutis affectionibus raro, & in principiis, purgante utendum, atque hoc diligenti prius adhibita cautione faciendum.

I.

UT intelligatur, an ex usu sit purgans exhibere in principio morbi acuti, sciendum est. (1) Qualia purgantia fuere Veteribus in usu. (2) Quinam morbi dicuntur Acutæ Affectiones. (3) Quodnam tempus habuere pro morbi principiis. Ex his dein inter se comparatis iudicium ferri potest. His perspectis tandem examinandum, quæ Cautio sit adhibenda.

II. Veteribus in frequenti usu fuit Helleborus, medicamentum validissimum, vel Colocynthis, Scammonium, Agaricus, aliaque drastica, quibus hodie, cum mitiora, ut Rhabarbarum, Sennam, Mannam, Cassiam possidemus, vix uti audemus. Veterum itaque purgantia magnam vim exercebant & corpus mirifice turbabant; hodie autem istis lenioribus fatis commode alvum ducere valemus: quare hoc tempore licitum est etiam turbare alvum, quod olim non erat licitum. Quare olim in morbis exhibitum purgans sæpe crisin pervertebat, quod hodie minus verendum est.

Purgantia
Veterum.

III. Acutarum affectionum apud veteres lata est signifi-
L ca-
Acutus
morbus

catio. (1) Omnes morbi breves sunt acuti, sive sint cum vel sine periculo, ita febris Ephemera, Apoplexia, Phrenitis sunt apud ipsos morbi acuti, dum tamen nullum subfit in Ephemera periculum. (2) Acutæ quoque affectiones erant cum vel sine febre, ut ex allegatis morbis constat; modo brevi tempore morbus ex sua natura ad finem perducatur, vocatur Acutus. Acutæ autem affectiones, vel morbi, si absolute ponuntur ab Hipp: intelligit fere semper morbos breves, cito desinentes vel in sanitatem vel mortem, cum adjuncta febre, & non sine periculo. Hi acuti morbi calidi febriles sunt. (1) Inflammatorii. (2) Erysipelatosi. (3) Putridi; (4) Maligni. In quibus cum magna fiat signorum differentia, sæpe Aphorismi Hipp: sibi mutuo contrariari videntur: quare utilissimum foret in praxi medica, si semper adderetur in quam specie morbi acuti hoc vel istud signum bonum, vel malum fuit observatum. In hoc loco intelligit Auctor morbum acutum Inflammatorium, ut infra patebit.

Morbi
principium.

IV. Morbi acuti Principium triplicem habet significationem. (1) Notat ipsam morbi invasionem, id est id tempus, in quo prima signa morbi apparere: nonnulli pro principio accipiunt id tempus, in quo æger lecto affigitur, sed tali modo nunquam accipitur ab Hipp: & hodiernis Medicis, nam si fieri debet numeratio dierum, V: G: in variolis, primus dies statuitur, dum æger corripitur febre variolosa, nam quarto die solent primo apparere pustulæ vel stigmata rubra, & in discretis variolis ne quidem tunc lecto affiguntur ægri. Interdum vero ponitur principium, dum homo à morbi causa inficitur, etiamsi nulla signa morbi appareant, quemadmodum in Hydrophobia, Venerea Lue, Peste, morbo Epidemico & Endemico, dum virus morbosum in corpore latitat. Communi autem significatione intelligunt tempus id, in quo signa morbi apparent. (2) Totum quoque morbi tempus ab invasionem usque ad statum pro principio capitur, adeo ut morbi Incrementum complectantur auctores sub generali titulo principii. (3) Interdum ipsum etiam morbi vigorem intelligunt, modo signa

coctionis non conspiciantur. Tria hæc tempora Hipp: hic velle videtur; quia ἀρχὴ utitur in plurali.

V. Purgantia omnia sive sint validiora sive mitiora, semper tamen contenta intestinorum ejiciunt, & faciunt humorum corrivationem ad intestina, fortiora autem magis, mitiora minus. Si ergo in acutorum principio intestina cacochylia sint oppleta, quam maxime conducit eam eliminare, ne incremente morbo in majorem corruptelam convertatur & morbum augeat: verum his ejectis, non est iterum dandum purgans, nam tam brevi tempore ex ingestis nova fieri nequit accumulatio; quare semel & ad summum bis alvum ducere in morbi principiis sufficit ad hunc scopum satisfaciendum. Si vero exhibeatur purgans ad eliminandam materiem morbi ex reliquo corpore, duæ nascuntur difficultates. (1) Intestina non sunt organa secretoria naturalia ad eliminandas humorum impuritates ex circulatoriis organis; huic muneri destinati sunt renes, & pori cutanei, quare raro in acutis critica evacuatio observatur per alvum (*vid. Comp. Tr: 90, cxii.*) (2) In morbi principiis omnia sunt cruda, sed *cocta purgare, minime cruda oportet* (Aph. 22). Si autem morbus acutus nascatur ex bile corrupta, quæ hac via commode educi potest, conducit præprimis saponaceis acescentibus & salibus saponaceis neutris alvum ducere. Hodie autem multi existimant, parum differre operationem purgantis in morbis inflammatoriis a sanguinis missione; sed quia purgans omne semper aliquam in corpore commotionem facit, atque dirigit humorum fluxum ad alvum, quæ in sanguinis missione non observatur, atque raro crisis fit per alvum, ut monuimus, sed in principiis frequentissime per hæmorrhagias, minus præstans tamen in acutorum principiis, si ultra debitum terminum non apparebat in urina signum coctionis, inducta turbatione per purgans, postero die laudabile sedimentum in urina apparuisse cum ægri levamine: sed tunc non licitum est repetere purgans, nam perturbaretur crisis. Ergo constat, nos raro id est semel debere; & raro, id est non in omni morbi acuti principio purgans exhibere.

Raro in
acutis adhi-
bendum
purgans.

Qualis sit
adhibenda
cautio.

VI. Qualis sit adhibenda cautio, ex exhibitione purgantium in morbis acutis colligi potest ex *Comp: T. 90, c. 11*. His dictis constat, exhibendum esse purgans in principio, si corpus cacochylia sit onustum, si progrediente morbo adest in corpore materia morbi cocta, sed quæ retinetur; si materia morbi impetum ad caput faciat, ut derivetur ad alvum, his absentibus plus mali quam boni per purgans facere solemus. Si ulterius ponderare volumus in morbis acutis aliis morbis junctis, omnes morbi sunt percurrendi, in quibus alvi fluxus & purgans prodesse & nocere possunt, quos citavimus *Comp: T. 90, LXXI ad CXLVIII*.

LIB. I. APH. XXV.

25 *SI qualia purgari oportet, purgentur, confert & facile ferunt: si vero contraria, difficulter.*

I.

EAdem fere verba inveniuntur (*Aph. 2.*) scilicet *In perturbationibus alvi & vomitibus sponte evenientibus*, hic vero agit de generali evacuatione artificiali, si natura non molietur evacuationem, sed medicamentis faciamus evacuationem, illa si reddat talia, qualia oportet, id confert & ægri facile ferunt: si vero ducas, quod non oportet, id quoque non confert & ægri difficile ferunt. Ergo videndum, quales debent esse notiones, quibus constat, nos talia ducere, qualia oportet: dein cur hoc confert & facile fertur, & contra.

Qualia
purgari o-
portet.

II. Ducimus qualia oportet. (1) Si ducuntur cocta (*Aph. 21, IV*). (2) Per emunctorium conveniens (*Aph. 2 XII*) (3) Morbo conveniens (*Aph. 23. IV*). (4) interdum evacuandus

andus bonus humor (Aph. 3. v.) si abundat vel nimium impetum faciat.

III. Talis evacuatio *Confert*, id est, præveniet ea mala, quæ ex retentione materiæ morbi, vel ex boni humoris abundantia aut majore motu erant expectanda. Nam materia morbi ad maturitatem deducta si diutius retinetur, corrumpetur, atque ita vel prolongabitur morbus, vel in alium degenerabit: ut si pus maturum sit in abscessu, confert educere pus, retentum enim diutius, vel inquinabit totum corpus, vel abiet in ichorem. Confert etiam bonum ducere sanguinem in abundantia & majore motu; nam sæpe in morbis cum aucta circulatione generatur gangræna & sphacelus destructis partibus majore motu, qui prævenitur, si in principiis debita quantitas sanguinis detrahatur.

Qualis
vacatio
confert.

IV. Quæ vero evacuatio educit materiam crudam, non conducit, nam tali educatione non prævenietur morbus, imo potius morbus recrudescet, ut tumoris apertura ante maturitatis tempus: & sanguinis missio, dum non abundat & non facit majorem impetum, quemadmodum in fine morborum acutorum & multis morbis chronicis.

Qualis
non
confert.

V. Omnis evacuatio in *sanis* debilitatem infert, nisi sit evacuatio naturalis educens id, quod inevitabili actione nostri corporis fuerit corruptum & detritum, nam plus educi nequit, quin auferatur de bonis humoribus, atque ita destruitur æquilibrium inter liquores & partes firmas. Sed si adsit *abundantia* aut major *Impetus*, destructum æquilibrium restituitur evacuatione, & motus nimius temperatur, atque ita statim ægri percipiunt levamen ex hac evacuatione. Id quoque sentiendum est de evacuatione materiæ morbi, quamdiu enim morbosus humor est in corpore, ægri vires ab eo opprimuntur, & extinguuntur: nam ægrotantes, amittentes vires agentes, non possunt ferre sine molestia solitam humorum quantitatem; & morbi materia humoribus mista laudabilem confectionem & secretionem spirituum invertit: inde qui ante morbi invasionem mediocrem copiam humorum ad causas agentes habebat in corpore, nunc debilitatis viribus in destructum æquilibrium ex superante hu-

Facile
ferunt.

moris copia incidit; nam non fit supputatio æquilibrii inter quantitatem partium firmarum & fluentium, sed inter causas agentes & copiam humoris: potest ergo æquilibrium destrui solis diminutis viribus, ut fit in sanis, si corripiuntur morbo vires debilitante. His igitur si detrahuntur humores, sive sint sani, sive morbofi, restituitur æquilibrium, facta evacuatione spontanea vel artificiali tam humoris sani, quam morbofi, inde toties per sanguinis missionem & alvi ductionem, quæ evacuat etiam humores bonos, vires eriguntur copia majore pressæ. In morbis quoque acutis cum aucto motu invadentibus summo cum levamine statim in principio concitantur evacuationes: nam motu circulatorio aucto, ut alibi demonstratur, arteriæ magis implentur & turgent humoribus, quam in quiete, qua turgescentiâ vasa arteriosa latitudinis modum excedentia molestiam adferunt, non nisi largiore evacuatione tollendam. Quibus igitur morbis statim adest valida circulatio, his conducit, nisi sponte fiat, artificialem facere evacuationem, ut ad mediocrem distentionem redeant arteriosa vasa. Hi homines igitur facile ferunt evacuationem largiorem boni humoris. Quod, si in istis casibus fieri potuisset restitutio æquilibrii, detractio-
ne materiæ morbi, non solum inde, sed & depuratione reliquæ massæ, ut ita perfectius præparentur spiritus, facile ferunt evacuationem largiorem. Cognoscimus itaque ex facili tolerantia, num talia fuere evacuata, qualia oportet.

Difficile
ferunt.

VI. Difficilis autem Tolerantia contrarium fieri indicat; nam quibus larga fit in perfecta sanitate evacuatio, his inducitur debilitas; atque eo magis, si defectu humorum destructum sit æquilibrium: vasa enim modice distenta optime operantur, sed inanita collabuntur & languent. In morbis autem pluribus modis per Evacuationem generatur difficilis tolerantia. (1) Si evacuantur Cruda (2) Boni humores in ægro, neque abundantia, neque majore impetu laborante. (3) Copiosior evacuatio humoris alieni seu morbofi. Horum dabimus exempla.

Evacua-
tionem
Crudi.

VII. Sæpe fiunt in morbis tam Acutis quam Chronicis copiosæ evacuationes pravorum humorum, ex quibus non
sa-

fatis in medicina expertus judicaret, omnem morbi materiam auferri, dum tamen inveniat, ægrum tali evacuatione aggravari, & interdum breve post perire. Ita si morbi hi abierunt in corruptelam seu colliquationem, non raro magnam copiam vitiosorum reddunt per alvum, ex qua evacuatione magnum expectant levamen: sed quia illa est indicium corruptelæ & Evacuatio symptomatrica, ægri deinceps aggravantur. Atque in principio acutorum magnæ evacuationes pravorum humorum, quia denotant morbi materiæ abundantiam, difficile ab ægris feruntur. Phthistici quoque in alvi fluxum incidentes, plerumque periunt. Has omnes Evacuationes difficile ferunt ægri.

VIII. Bonorum humorum, id est eorum, quales sunt humores corpori inservientes, evacuatio, nisi fiat in abundantia & majore impetu, difficile ab ægris toleratur. Qui verbi gratia in principio acutorum incidunt in hæmorrhagiam largam, aut quibus instituitur venæ sectio, ex ægri facili vel difficili tolerantia judicare valemus, num evacuatio ea proderit vel nocuerit. Qui enim post talem sanguinis emissionem minus dolent & calent, quietioresve redduntur, signum est profuisse. Qui vero inde non levantur, sed potius debilitantur, atque inquietiores fiunt, non solum scimus ex difficiliore tolerantia, nocuisse hanc Evacuationem, ut talem proferamus prognosin; sed egregiam curationis quoque regulam præbet, quid faciendum sit: nam talis spontanea tunc evacuatio est cohibenda, atque evitanda est iterata venæ sectio.

Evacu-
tionem Bo-
norum.

IX. Paradoxum videtur, Evacuationem malignorum difficile ferri posse ab ægro, cum auferatur morbi materia, quæ necessario levamen adferre videtur: invenitur tamen in praxi frequentissime, ut in sequentibus constabit. Quibus hydropicis in cruribus fit abscessus magnus fundens ingentem puris copiam, quo major fit evacuatio. eo magis aggravantur. Sedimentum copiosum in urina demonstrans morbi materiæ evacuationem, quo copiosius cernitur in morbis chronicis. eo difficilior fit tolerantia. & nisi minuat sedimenti quantitas cum faciliore tolerantia, æger non

Evacua-
tionem ma-
lignorum.

con-

convalescet. Ulcus cacoëthes quo majorem copiam virulenti ichoris fundit, eo difficilius ferunt morbum. Ita morbi omnes fomitem intus habentes, vel qui ex colloquatione interna nascuntur, quo majorem fundunt copiam virulenti humoris, eo difficilius tolerantur. Quare observatio Tolerantiæ tam in spontanea, quam artificiali Evacuatione admodum necessaria: confert enim per educationem juvare, non lædere, atque hoc quammaxime cognoscimus ex facili vel difficili Tolerantia.



M E D I C I N A H I P P O C R A T I C A ,

E X P O N E N S

A P H O R I S M O R U M

H I P P O C R A T I S

L I B R U M S E C U N D U M .

A P H. I.

26. **I**N quo morbo somnus laborem facit lethale: si vero somnus juvet, non est lethale.

I.



Uid in hoc loco per *Laborem* sit intelligendum, facile ex opposito sequente colligi potest, nam si somnus *juvet* non est lethale, ergo hic per laborem intelligitur molestia, læsio, ærumna, noxa: ita describuntur a practicis febres laboriosæ, in quibus summa est corporis inquietudo & molestia, & morbos difficile ferre. Si ergo æger absoluto somno se sentiat pluribus novis symptomatibus pressus, vel si præcedentia magis fuere aucta, dicitur somnum attulisse Laborem. Tunc autem quam maxime, si in ægris major nascatur molestia & inquietudo, taliaque symptomata, quæ malignitatem potius quam vehementiam declarant, dicitur somnus laborem facere, quia ægri tunc inquieti se jactantes, quasi laborarent, gestiunt. (Conf. *Persp. Aph. 441.*)

Somnus
laborem
faciens.

M

II. Si

Juvans.

II. Si vero æger ex somno prægresso se sentiat agiliorrem, paucioribus vel benignioribus stipatus symptomatibus, nunc facilius quiescere potens, talis somnus dicitur juvans, quoniam declarat morbi magnitudinem per somnum fuisse minutam, sed ægri vires auctas. Cur autem illæ mutationes post somnum apparentes bonum & malum portendant non potest intelligi, nisi præmittantur effectus naturales in nobis, qui ex somno fiunt; qui cum morbo comparati firmabunt doctrinam.

Mutatio-
nes in som-
no.

III. Quæ in *Exerc. secunda* fuisse disputavimus de somno collecta proferam, ut unico aspectu res fiat perspicua. Si comparemus hominem dormientem ad vigilantem, invenimus motum animale omnino nullum, sensus externos & internos sopitos, carnem laxiorem, pulsum æquabiliorem minorem & rariorem, respirationem rariorem minus profundam, sed sæpe stertorosum, membra omnia laxa & flaccida, perspirationem parciorem. Quæ omnia simul sumpta declarant vitæ actionem minorem esse, minusque consumi spiritus, quibus in vigiliis peraguntur sensus interni & externi atque motus animales. Itaque in somno naturali post vigilias resolvuntur humores, præcedente motu majore compactos; fit spirituum materiæ accumulatio; concoquuntur humores, qui motu minore præparandi sunt; colliguntur humores magis in venis & cellulis, ex quibus in præcedente motu fuere depulsi; spatiola inter partes firmas humiditate implentur, quare partes firmæ fiunt humidiores & laxiores; materia ad insensibilem perspirationem præparatur; vires augentur collectis spiritibus; sitis lenitur & alvus humectatur (*Persp. Aph. 328*); Caloris æstivi molestiam tollit.

Somnus
in morbo.

IV. Qui autem aliquo morbo correptus est, non acquirit ea bona, quæ aliter ex somno placido in sanis profluunt: nam ex mutationibus in dormientibus mali causa augeri vel minui potest: quare ut cognoscamus an prosit vel noceat somnus, alicujus morbi causa comparanda est cum somni mutationibus. Morbi generaliter dividuntur in Acutos & Chronicos, seu in morbos cum aucta & minuta circulatione.

Quia

Quia in somno circulatio sit minor, facile liquet generaliter somnum magis conducere Acutis quam Chronicis: tamen si isti morbi seorsim examinentur, facile patebit, somnum in utrisque prodesse & nocere posse.

V. Concitatur somnus in acutis, primo si homo ob præcedentem motum majorem impeditus fuit dormire, nunc cessante illo motu aucto & perturbato in somnum labitur, qui si sit placidus, egregium ægrotantibus præbet auxilium: nam æger per majorem illum motum spiritibus privatus, laborans lentore seu sanguine compacto, atque solidorum siccitate, a somno ejus corpus temperato calore fruetur, viribus erit auctum, leutor erit dispositus ad crism facien-
dam. Talis igitur somnus non solum *non lethale*, ut dicit Hipp: sed admodum salubre est. Huncque bonum statum cognoscimus ex viribus auctis, diminutione symptomatum, temperatiore calore & motu, subsequente critica evacuatione, urina minus tincta, multo sedimento albicante saturata, pulsu minus duro & minus citato, respiratione liberiori & faciliore, madoris suffusione per totum corpus, faciliore morbi tolerantia. (2) Si autem in acutis ob majorem sanguinis impetum ad caput opprimatur cerebrum, ut æger in soporem incidat, talis somnus ut signum malum est accipiendus: nam quod æger dormiat, morbi causa non augetur, imo potius minuitur, quia in majore impetu conducit temperare motum ut sit in somno, sed quia talis somnus concitatur ex mala causa, declarat ægri somnum non esse naturalem, sed symptomaticum, & inde id boni, quod ex somno provenire solebat, non producit. (3) Somnus inductus medicamentis hypnoticis, neque salutem, neque mortem declarat, nam omni tempore talis potest concitari: experientia docuit in principio acutorum somnum hypnoticis inductum raro profuisse, quoniam tempus non est in quo lentor mutari potest in materiem criticam; at suppurationis tempore conducit hypnoticis conciliare somnum, ut diu fuit observatum in variolis, quæ multo felicius curantur, si suppurationis tempore nimius motus compescatur hypnoticis

somnus
in acutis.

diluentibus. Hinc Papaverina miscent pectoralibus in fine peripneumoniæ & pleuritidis.

Somnus
in Chroni-
cis.

VI. In morbis autem Chronicis, ut signum & causa malum inferre potest: morbi enim hi fere omnes languidiorum habent circulationem, minoremque actionem vitalem, si tunc ex viscerum copia opprimatur cerebrum, ut inde homo fiat somnolentus, & obdormiat, talis somnolentia indicans pituitæ in encephalo collectionem, malum est signum; atque ipse somnus non solvit pituitam, sed debilitata actione vitæ in somno major fit pituitæ collectio: quare in his neque somnus longior, neque hypnotica conveniunt. Interdum vero in Chronicis ex humore tenui & acri natis, aut quibus est motus perturbatus, ut in mobilitate & passionibus hysteris, somnus & somnifera conveniunt; omnium optime humores tenues somno & somnifero crassescunt, quod dicitur coctio in his humoribus; & nisi quies inducatur motui perturbato, non solet cessare paroxysmus. Ita a priori determinare valemus, num proderit somnus, vel damnum sit allaturus: in nostra autem opinione firmiores sumus, si peracto somno æger sentiat levamen vel laborem.

VII. Ex dictis facile liquet, in quo sensu capi debeat *Lethale* & *non Lethale*: nam experientia docet, sæpe somnum attulisse laborem sine morte subsequente, ut hæc vox indicare videtur: quare pro *lethale* mallet ponere *malum*, & pro *non Lethale*, *bonum*, quia post somnum, si æger percipiat levamen, inter præstantissima signa salutis instantis observatur.

LIB. II. APH. II.

27. **U**bi somnus delirium sedat, bonum.

I.

Hic Aph: est veluti exemplum prioris, nam posuit in quovis morbo somni indicia, hic vero duntaxat in Delirio, quoniam morbus hic exemplar præbere potest, tam in Acutis, quam in Chronicis. Omnis enim mentis abalienatio Paraphrosyne seu Delirium dicitur, sive fiat cum vel sine febre, tam a causa externa & cognita, quam interna latente. Quam maxime laborant Commentatores Delirii species perscrutaturi, ut sit vel continuum, vel interpolatum, cum studio, tristitia, mœrore, furore, stultitia & aliis notionibus, ac si multum faceret ad prognosin & curationem: hinc multa quoque finxerunt nomina, quæ magis retardant, quam promovent Medicam scientiam. In omnibus autem morbis nomen mutuantibus ex phænomeno, quale est Delirium, perscrutandæ sunt causæ variæ eum morbum producentes; præcipuas earum delibabimus, nam omnes recitare nimis longum foret.

In Delirio
somnia.

II. Qui ex morbosa causa aliena percipit, cogitat, & agit, quam idem homo sanus antea vel cogitare vel agere solebat, a Medicis talis censetur Delirare: nam aliena facere ex voluntate, malevolentia, vel quavis alia actione voluntatis, a Medicis non dicitur Delirare, quoniam mentis aberratio ex morbosa causa sola ad forum medicum pertinet.

Delirii
definitio.

III. Si perscrutemur morbos eorumque causas Delirium inferentes invenimus istas in Externas & Internas satis commode dividi posse. Quæ omnes, (1) turbant æquabilem per cerebrum circulationem; (2) Defectum spirituum pariunt; (3) Spirituum naturam mutant. Neque hæc generalis di-

Delirii
causæ.

visio ad cognitionem, num somnus proderit nec ne, sufficit, ad hujus enim divisionis simplices species est descendendum, antequam certum potest comparari iudicium.

Causæ
Externæ.

IV. Causæ externæ *Turbantes* spirituum æquabilem motum sunt omnes cerebri læsiones a vulnere, contusione, fractura cranii &c: in his, nisi tollatur Delirii sensibilis causa, somnus obrepens nihil boni præstare potest, talis tunc somnus ex Cerebri oppressione generari solet, & tunc est mortis indicium: sed ablata causa, ut in fractura cranii sublato fragmento ossis, vel educto humore ex encephalo, si obrepit somnus, valde bonum, quia significat mali causam turbantem, ablatam esse. *Detrahentes* autem causæ sunt omnes evacuationes copiosiores, studia severiora profundiora, vigiliæ protractæ: in his si somnus juvat valde bonum, quoniam declarat, per somnum illum restitutos fuisse spiritus: sed si non sedat somnus, delirium tale malum est, quia inde scimus, non ex solo defectu spirituum, sed ex eorum etiam mutata indole Delirare hominem. *Mutantes* naturam spirituum multæ sunt externæ causæ: ita omnis spiritus fermentatus, stramonium, cicuta aquatica, aliaque philtrea, atque morsus canis rabidi, & in fervidis regionibus Opium. In his omnibus si somnus sedat Delirium, servantur, sed si non levat, admodum periculosum est.

Causæ In-
ternæ tur-
bantes.

V. A multis causis internis *Turbatur* æquabilis spirituum fluxus, ut generetur Delirium. Ita Inflammatio, Erysipelas Meningum; sanguinis impetus major ad cerebrum; commotio febrilis præprimis in capite, serum, lympa, acris quivis humor in encephalo collectus; morbus ad caput metastasin faciens; consensus præprimis affecto pulmone, hepate, diaphragmate. In quibus omnibus optimum est, si somnus delirium sedat, nam, nisi minuantur vel evacuantur illæ morbosæ causæ, non cessabit Delirium: ut si quis obdormiat auctis istis causis, sopore premitur, non vero fruatur placido somno. Hypnotica in his omnibus non æque bona sunt; nam in Inflammatione & Erysipelate non tollunt causam, sed inducunt soporem, nihil levaminis afferentem, neque evacuant humorem acrem in encephalo collectum: sed in

majo-

maiore impetu, si simul adhibentur derivantia, sanguinis missio, & refrigerantia, cum levamine conciliant somnum; atque ex consensu delirantibus egregium præbent hypnotica auxilium.

VI. Non raro post lochiorum profluvium in puerperis, vigilias diuturniores ex morbo diu toleratas, febres intermittentes & longas invaletudines, exhaustis spiritibus, generatur Delirium, solis recuperatis viribus abigendum, quale etiam fit in summa senectute: vel spiritus extincti commutatis humoribus in sphacelum, ut in moribundis ex acutis; vel spiritus inviscati lentore morborum acutorum, aut viscoso chronicorum generant Delirium, in quo somni observatio multum valet. Nam qui ex debilitate virium delirant, si a somno levantur, magna spes est, tandem vires recuperari posse iterato somno. Delirium ex Lentore egregie levatur somno, quia somno placido Lentor commutatur in materiam, quæ critice evacuari solet: Sed in viscoso, quoniam augetur quiete & somno, somnus Delirium aut stultitiam augere solet.

Detrahentes spiritus.

VII. Ut quædam externa (iv) valent ita commutare naturam spirituum, ut mens omnino sit alienata, ita etiam in nobis generantur Morbosi humores crasin spirituum invertentes, qualis est bilis corrupta, materia melancholica, pus corruptum, deliquata materia chronicorum, urina retenta ad cerebrum delata. In his omnibus, quia per somnum non fit commutatio in melius, siue somnus fiat ex naturali causa, siue ex cerebri oppressione, nihil boni ex somno in hujusmodi Delirio est expectandum; neque propinanda sunt hypnotica: sed tale Delirium educatione & emendatione illarum causarum est curandum.

Mutantes spiritus.

LIB. II. APH. III.

28. **S**omnus, vigilia, utraque modum excedentia, malum.

I.

OMnes fere Commentatores hunc Aph: absolute ponunt, tam in sanitate, quam morbo, & inde in sequentibus, *somnus vigilia utraque modum excedentia, morbus*, eodem modo exponunt; sed ex nexu hujus cum duobus præcedentibus facile liquet, in hoc loco somnum & vigiliam ut signa epiphænomena capienda esse: nam in primo hujus libri exponit somnum in quovis morbo; in altero autem qualis esse debeat in Delirio; nunc vero dicit somnum & vigiliam longiorem quam exigit natura morbi, malum facere. Duplici modo somnus & vigilia excedentia, ut signum nempe & causa, malum indicant.

Somnus
modum ex-
cedens.

II. In sanis hominibus quamdiu somno sit indulgendum, exposuimus (*Exc: 2, LVI.*) Sed & ex istis constat hominem ex necessitate interdum longius, interdum vero brevius tempus, quam octo horarum, concedere debere somno, atque in omni ætate idem tempus non servandum esse: in his longius & brevius tempus non dicitur modum excedens, quia sanitati conducit. Sed si homo, cui comperit somnus brevior, utitur longiore, & vicissim: aut qui longo eget somno, adhuc magis somno indulget, quam exigit sanitatis conservatio: in his omnibus somnus modum excedit. Ita etiam in morbis hic sensus capiendus; nam qui post diuturnas vigiliis longe fruitur somno, is non dicitur excedere modum, sed est conveniens, quia supplet defectum præcedentis temporis.

In acutis.

III. Multi in ea sunt sententia, quo plus & diutius dormiunt

miunt ægri in *Acutis*, eo melius esse, quasi non potuisset somnus in acutis modum excedere, contrarium vero inculcat noster Auctor: nam in acutis oppresso cerebro ex mala causa, diutissime dormiunt, ut in *Caro*, in quo somno, quo diutius detinentur, eo pejus signum, quo enim cerebrum magis est oppressum, eo profundior & diuturnior *Caros*. Sed somnus longior ut causa in acutis modum non excedit; nam relaxatis partibus firmis, temperatiore motu Lentor morborum acutorum optime disponitur ad criticam evacuationem.

IV. In morbis autem *Chronicis* somnus modum excedens, ut signum & ut causa malum portendit. Omnibus fere In Chronicis. morbis chronicis est tardior vitæ actio, quo humores abeunt in spontaneam corruptelam, & minus commutantur ingesta deficientibus viribus in bonum succum, quare talia corpora frequentissime laborant Corruptela spontanea & Cruditate, quæ causæ morbosæ ex minori actione in somno (Conf. Exc: 2, XLII. XL, XIV, XXXV, &c.) augentur: sed majore agitatione sunt concoquendæ & expellendæ; quare in Chronicis raro per somnum longiorem curantur morbi, vid. (Aph. 26, VI.) Qui somnus ex morbosa causa modum excedit, quale exemplum habetur in *Lethargo*, nunquam bonum præfagium præbet: cerebrum enim Pituita oppressum non facile liberatur.

V. Frequentius in acutis vigiliæ modum excedunt, & malam præbent prognosin: nam vigiliis protractis, constat cerebrum continuo in morbo turbari, ut non concedatur quies pro somno capiendo; quare in perpetuo vigilantibus, quoniam Lentor in acutis formatus, continuato illo motu raro ad criticam evacuationem deducitur: interim vigiliis & motu aucto in acutis quam maxime exhauriuntur spiritus, unde summa debilitas generatur. Vigilia modum excedens in Acutis.

VI. Minor & quietior motus in Chronicis disponit quidem corpus ad longiorem somnum capeffendum, sed si In Chronicis. æger nimis vigilat, inde scimus, aliquid acre latitare, quod hunc languidiorem motum turbat: atque vigiliis protractis exhauriuntur quoque spiritus, quorum privatione

corpus sensim magis debilitatur. Et quoniam viribus auctis superandus est morbus Chronicus, corpus vigiliis debilitatum, morbum quoque auget. Inde in Chronicis hypnotica corpus ad naturalem somnum redigentia, vera videntur esse Cardiaca.

LIB. II. APH. IV.

29. **N**on satietas, non fames, neque aliud quicquam bonum est, quod naturæ modum excedat.

I.

Sensus
Aphorismi.

Generalem de omni excessu, & specialem de fame & satietate complectitur sententiam. Omne nimium naturæ inimicum non est opus adstruere, utpote omnibus fatis cognitum: quid autem hic per Satietatem & Famem sit intelligendum, non constat inter Auctores: maxima pars sensum hujus ad parciorem & copiosorem ingestionem alimentorum refert; de his autem in morbis superius egit Hipp: in Lib. I. Neque hic regulam tradere vult de quantitate alimentorum assumenda in sanis; nam statim in primo Aph: hujus libri inceptit *quo in morbo*, & in eo examinavit somnum; conducit ergo, ut nunc regulas præbeat de sensu famis, quia versatur in corporis actionibus observandis, quid boni aut mali portendunt in quovis morbo.

Satietas.

II. Per satietatem intelligo hoc loco, si corpus præcedentia ingesta alimenta omnia subegit, ita ut si fuisset sanum, nunc debuisset esurire, sed quamvis nihil alimentosi sit in corpore, tamen talem sensum percipit ac is qui saturus est, id est, cibum non appetit, aut si parum ingerit, statim saturus est.

III. Quid

III. Quid sit Fames, fatis exposuimus (*Exc: 3.*) In hoc loco intelligitur sensus famis præter modum urgens, ut fames non placetur modica ingestione alimenti, citiusque redeat quam in sanis hominibus redire solebat post assumpta alimenta, imo urgeat ventriculo pleno. Utrumque hoc dicit Hipp: in morbis est malum, quod paulo altius ex suis causis est eruendum.

IV. Ad famem naturalem concitandam (1) requiri Chyli defectum in sanguine; (2) ventriculum vacuum alimentis; (3) bilis bonæ confluxum in ventriculum vacuum, quæ nuda ventriculi latera tangens sensum famis excitat, olfactus ab odoriferis & gustus a sapidis applicatis in *Exc: 3.* demonstravimus; si vero ventriculi latera muco nimis obducta, vel bilis sit iners, cum alimenti defectu in ventriculo & chyli in sanguine, homo non solum saturus videtur, & minima ingesta alimenti quantitate oppletus, verum etiam multo difficilius quoque ingestum cibum in bonum chylum convertit.

V. Constante observatione practica experimur, in fine morborum acutorum hominem non securum esse, quamdiu fames naturalis non redit; ut enim vires præcedente morbo amissæ restaurentur, bonus chylus est suppeditandus; qui in tali inappetentia imperfecte conficitur, ut notavimus *Exc: 3, XL.* Et vigente morbo acuto semper minor est fames, quam in sanis, si æger vero nihil appetit, sed semper saturus videtur, multo pejus est, quam si alimenta petit.

VI. Frequentissime in Chronicis observatur, famem deletam esse, vel quod ventriculus pituita scateat, vel bilis sit iners: in his quia inappetentia malam latentem declarat causam famem exstinguentem; & quia tunc imperfecte concoquuntur ingesta alimenta, quæ morborum Chronicorum causam foveant, satietas illa in Chronicis mala est censenda.

VII. Ut olfactus & gustus interdum a morbosa causa concitantur, & tunc pro natura materiæ istos sensus excitante bonum & malum signum præbent hi sensus, ut odor foetidus sine foetente applicato naribus; sapor falsus, dulcis,

cis, putridus sine applicatione earum rerum, ita etiam fames ex non naturali causa excitatur in *Bulimo* (*Exc: 3, XLIII,)* & *Cynorexia*, (*Exc: 3, XLIV.)* denotat morbosam esse causam, hanc alienam famem excitantem.

In acutis.

VIII. Naturale est in acutis parum comedere, si vero tantam Famem sentit, vigente morbo, ac sentitur in sanis, talis tamen fames dicitur modum excedere : sed finito morbo acuto, aut in morbis acutis, qui per paroxysmos exacerbantur, bonum est sentire naturalem famem : quia significat, causas famem excitantes naturales intactas esse, sed in tali casu cavendum est a nimia ingestione alimentorum, corpus enim debilius non valet, ut sanum, mediocrem quantitatem concoquere, sed permittit, portionem manere crudam, vel abire in spontaneam corruptelam.

In Chroni-
cicis.

IX. In Chronicis autem morbis melius est, si fames modum excedat, quam si sit deleta; interim non est bonum nimia fame laborare, nam talis non fit ex sanitatis causa; & quoniam nimium quoque solet ingeri, quam id corpus ex ægritudine debile potest superare, corpus morbo & multitudine alimentorum onustum in graviorum solet incidere morbum. Paulo itaque minus, quam in sanis requiritur, est ingerendum, licet fames plura exigit, & interim nimiae famis causa est curanda.

LIB. II. APH. V.

30. *Spontaneæ lassitudines morbos denunciant.*

I.

Lassitudo
laboriosa.

Qui post Labores vel exercitia multa sentit in membris ad movendum ineptitudinem, ita ut, si membra movere conatur, debeat plus virium adhibere, quam

quam antea solebat, atque in ipso motu aliquam molestiam percipiens, dicitur lassus vel defatigatus; illa autem lassitudo sequente quiete & somno iterum evanescit. Talis conveniens laboris magnitudini non recensetur inter morbos, & vocatur *Lassitudo laboriosa*. Qui vero ex minori labore fit lassus, talis dicitur debilis. Lassitudo hæc laboriosa erat præmittenda, ut constaret, quid esset sentiendum de causis Lassitudinem spontaneam inducentibus. Motum membrorum fieri copiosiore spirituum influxu, eoque motu spiritus consumi, colligi potest ex iis, quæ in *Comp: T. 18.* exposuimus. Hac spirituum consumptione nascitur major movendi difficultas, & frequentiore musculi agitatione relinquitur dolor seu molestia in ea parte; quæ utraque somno & quiete satis longa emendantur, regenerantur enim spiritus, & rediguntur humores atque partes firmæ musculorum æquali motu vitali in pristinam sanitatem, nullisque eget medicamentis.

II. Qui vero in suis membris similem difficultatem & ineptitudinem sine laboribus prægressis sentit, is *Lassitudine spontanea* laborare dicitur: est ergo in corpore causa morbofa, ita minuens vel immutans spiritus, ut ad hunc motum peragendum sit defectus vel ineptitudo. Spontanea igitur est, non quia sponte sine causa nascitur, sed quia generatur sine laboribus præcedentibus, qui Lassitudinem in sanis inferunt. Hanc autem spontaneam lassitudinem veteres non sine ratione diviserunt in *Squalentem, Laboriosam, Ulcerosam, Tensivam, Phlegmonosam*, ex adjunctis symptomatibus causas Lassitudinis indicantibus.

III. Qui in membris citra labores prægressos observat Lassitudinem cum cutis colore squalido, hæc signa juncta satis denotant, ex Cacochymia vel Cachexia hanc generari lassitudinem: atque ita formatur Curatoria indicatio, nos debere anticachecticis hanc discutere Lassitudinem, corpus esse movendum & fricandum. Talis lassitudo mane surgenti solet sentiri major, atque moderato labore levatur, quia id crudum aucto motu solvitur & expellitur, sed somno & quiete magis accumulatur.

Laboriosa. IV. Lassitudine autem pressus si ne quidem per momentum in eodem situ manere potest, sed continuo præ anxietate membra hinc inde jactat, uti fit in febre laboriosa, talis Lassitudo periculosissima est, nam lassitudine constat virium defectus, & ex inquietudine, organa vitalia affici, hominemque anxietate urgeri.

Ulcerosa. V. Molesta vero sensatio in membris, quemadmodum in membris ulceribus obsessis, cum lassitudine tunc observatur, quando ex materia purulenta, per corpus dispersa generatur lassitudo; sæpe etiam in scorbuto & cacochymia in acrimoniam conversa. Talis ergo lassitudo si sit ex pure, quietem exigit & medicamenta, quæ puris corruptelam inhibent: In chronicis autem Antiscorbutica & Diaphoretica præcipua sunt.

Tensiva. VI. Ex humoris abundantia æque, quam ex diminutis viribus nascitur lassitudo, sed quia copia major non solum inducit lassitudinem, verum etiam impletionem, inde plethorici Lassitudine tensiva laborant, quæ facta naturali vel artificiali evacuatione evanescit: ita unica instituta venæ sectione vel superveniente alvi fluxu tollitur sæpe vernali tempore lassitudo.

Phlegmonosa. VII. In febribus acutis, ardentibus, Inflammatoriis frequentissime observatur Phlegmonosa Lassitudo, quia aucta circulatione & compacto lentore diminuti sunt spiritus, sed irritamento concitatus motus vitalis non desinit urentem calorem in corpore producere: admodum periculosa hæc est Lassitudo, antiphlogisticis curanda.

Spontanea morbos denunciat. VIII. Omnes species spontaneæ Lassitudinis ex morbosa oriri causa, jam satis constat; ergo non est ambigendum, quid denotat *morbos denunciat*, nempe Lassitudo illa semper oritur ex latente Morbosa causa. Hæc autem phrasis sæpe in futuro sumitur, id est morbum præfagit. Lassitudo enim a quibusdam non accipitur ut morbus, sed ut signum indicans morbum instare; hoc declarant multi, si sine labore corpus sentiunt lassum, ajunt, morbum exspecto, nam plus solito sum defatigatus. Hoc non est sine ratione, nam Lassitudo semper indicat minorem agendi potentiam, qua in-

ingesta alimenta nova non satis subiguntur, & quæ sunt evacuanda, retinentur, ipsique boni humores ex laudabili statu recedunt: ita ex his corruptelis inductis per motum infirmiore varii nascuntur morbi. Ut igitur præveniantur morbi, spontanea lassitudo est curanda.

L I B. I I. A P H. VI.

31. **Q** Vicumque aliqua corporis parte dolentes, dolorem ferè non sentiunt, his mens agrotat.

I.

QUam maxime laborant Commentatores in hoc Aph: explicare, quomodo Dolor, qui sensus est molestus tamen possit dici non sentiri, quia sentire & non sentire simul constare nequeunt. Sed si verum capimus sensum, facile hæc dictio admitti potest, & non erit contradictoria, nam si pars quædam dolet, & manente causa dolorem ante inferente, pars illa non amplius a nobis percipitur dolere, vero sensu dicimus, nos non sentire istius partis dolorem.

Sensus
hujus.

II. Ita creavit Deus nostrum corpus vivens, eique junxit animam, ut si in organis sensui dicatis, (nam non omnia organa communicant suas mutationes animæ) quædam a rebus externis vel internis inducitur mutatio, anima alicujus mutationis in istis organis redditur conscia: & quamdiu durat mirabilis ille nexus inter animam & corpus, atque organum manet integrum, semper omnis mutatio in tali organo facta a mente percipitur: experimenta autem probant, animam agere in nervorum principia, & eorum prin-

Sentire
quid sit.

ci-

cipiorum mutationes, quæ in encephalo fiunt, immediate percipere; & quia sensuum mutationes a rebus externis fiunt in nervorum extremitatibus, igitur ipsa inducta finibus nervorum mutatio per nervum vel ejus spiritus, est propaganda ad nervorum principia, seu aliquid aliud per nervum vel spiritus propagatur a finibus ad principia, quod productum menti communicatur, ut mens percipiat aliquid fieri in nervorum extremitatibus. Hanc propagationem a finibus nervorum ope spirituum fieri, qui continentur & fluunt in canaliculis nervorum, alibi (*Comp. T. 16.*) demonstravimus, & quidem hoc modo, fluunt spiritus ex encephalo æquabili & continuo fluxu per canaliculos nervos sensui famulantes; quoties ille liber fluxus retardatur, mutatur, aut turbatur in finibus eorum canaliculorum nervosorum, statim quoque influxus in principia eorum mutatur, quæ mutatio a mente percepta dicitur sentire. A causa autem interna non raro circa medium hujus canaliculi in transfluxu inducitur mutatio, qua in principio hujus canaliculi quoque turbatur spirituum influxus, quia tunc mens eandem mutationem percipit, quam antea percipiebat ex affectione extremitatis, mens errare dicitur, quamvis error non sit in mente, sed in organo, quod afficitur alieno loco.

Dolor
quid sit.

Omnis causa sensum excitans in organo quovis sentiente validius agens nobis ideam doloris præbet, quamvis multi dolores ad solum organum Tactus referant: nam dolent oculi ex nimia luce; aures ex acutiore sono; lingua a nimis sapidis; & nares ab acrioribus odoriferis. Causam excitantem dolorem existimant consistere in tanta fibrarum tensione, qua ruptioni imminent: verum si omnes perscrutemur dolorem inferentes causas, detegimus, eas sistere liberum fluxum spirituum per canaliculos nervos sensui dicatos, sive fibra nervosa tendatur, ut ita fiat angustior, sive prematur, sive ipsa contrahatur, ut in nimia exsiccatione & levi combustione, omne impedimentum hujus fluxus æquabilis spirituum per sensuum nervos, dolorem infert: leve autem impedimentum facit sensum, majus Dolorem, & quo impedi-

men-

mentum est majus, eo acrior fit Dolor, donec tandem totus subsistat fluxus, quando etiam subsistit Doloris perceptio: inde in sensim incremente causa doloris tandem subito omnis exstinguitur dolor, tunc nempe, quando impedimentum hujus fluxus eo usque fuit auctum, ut fluxus omnino subsistat. Mens ergo nostra percipiens in principiis nervorum impeditum influxum, in nervis sensuum Doloris ideam præbet. Hinc, quo partes pluribus nervis ad sensum sunt ditatæ, eo vividior in istis Dolor; quo vero pauciores, eo Dolor obscurior, verbi gratia in ossibus; his autem nervis destitutæ licet afficiuntur ab iisdem causis, quæ in aliis partibus Dolorem intulissent, nullus tamen sentitur Dolor, ut sæpe in pulmonibus & hepate: sed loco Doloris sæpe generatur *Anxietas*, quemadmodum observatur in Doloris metastasi ad interiora viscera minus sentientia.

IV. In Sensibus & Doloribus duo loca simul occupantibus observamus, si unus præ alio sit major, majorem non solum minuere, sed interdum omnino exstinguere perceptionem mitioris, imo profundiore cogitatione sensus hebescent. (2) Si nervus sentiens in organo destructus sit, ut in parte quadam sphacelata: ita pars contusione destructa, vel combustione valida exusta non infert Dolorem: & pars antea vehementer Dolens per supervenientem sphacelum exstincta, statim desinit dolere. (3) Quia alio in loco hæret Doloris causa, quam ubi mens Dolorem percipit, inde intercepta via communicationis, causa aliter Dolorem inferens nunc nullum Dolorem inducit; ita ligato, abscisso, compresso, vel destructo nervo, tendente ad partem Dolore correptam, statim facit omnis Doloris extinctionem. Tandem (4) quando principia nervorum, quibus mens consentit, ita immutantur, ut ad mentem debita non feratur mutatio, hoc in casu dicitur, mentem aberrare. Potest ergo mens esse incorrupta, & tamen non sentire Dolorem. Ex his igitur constat, nos non ita certos esse, semper mentem ægrotare, si non percipitur Dolor alicujus partis.

V. Si vero constat ex signis, necessario in quadam parte Dolorem adesse, vel ex ratione sciamus, Dolorem non

Dolorem
fere non
sentire.

Mens æ-
grotat.

potuisse cessare, atque pateat, partem ipsam non esse destructam, aut nervum intermedium compressum vel destructum, his tamen non obstantibus, æger non conquerens de Dolore, demonstrat, vel principia nervorum non communicare menti, vel mentem ipsam ita ægrotare, ut mutationes principii nervorum inductas non animadvertat. In utroque casu a medicis dicitur, mentem ægrotare, nam si vitiatas spiritibus aut perturbatis principii nervorum, quibus consentit anima, aliena percipiuntur, mens tamen, etiam si esset integra, diceretur ægrotare. An vero semper vitio corporeo, an vero mutatione mentis, an utrisque vitiatas æger non sentiat Dolorem, non est hujus loci amplius perscrutari.

LIB. II. APH. VII.]

32. **Q**uæ longo tempore extenuantur corpora, lente reficere oportet: quæ vero brevi, celeriter.

I.

Nexus

Multi Commentatorum existimant, hunc Aph: absolute poni, minime cohærere præcedentibus; contrarium vero statuo, quia nullus est magis conveniens præcedentibus, quam hic: in primo hujus libri Aph: inchoat descriptionem in quovis morbo, nempe Acuto & Chronico; examinavit in his somnum, vigiliam, satietatem, famem, spontaneam lassitudinem, atque dolorem fere non sentire: nunc vero regulam tradere vult de Refectione in maciatis post morbos tam Acutos, quam Chronicos. Nam post morbos Chronicos extenuata corpora præcipit lente re-

reficienda esse: post Acutos autem brevi. Perscrutemur hujus asserti rationes, ut in refectione macilentorum post morbos certas comparemus regulas.

II. Refectio duplici significatione recipitur a medicis; (1) ^{Refectio quid sit.} Corporis vires præcedente morbo debilitatas restaurare, ne corpus ex Debilitate relicta morbum recidivare faciat, vel alium novum morbum producat. Talis Refectio tunc post morbum acutum statim facienda, quare Hipp: Alteram Refectionem hic intelligit, quæ fit ingestione alimentorum, ut deperdita quantitas in extenuatis post morbum restituitur. Præmonendum est de alimentis ingestis, ea quidem augere humorum quantitatem, sed ut suppleant amissum bonum, illa alimenta actione nostri corporis ita sunt mutanda, ut amissis bonis fiant similia: quare ingesta alimenta in corpore debiliore non subeunt hanc bonam hujus actionis mutationem, sed vel manent cruda, ut ingerebantur, vel per corruptelam alimentis propriam, in alienam indolem convertuntur. *Conf. Aph. 3, x.*

III. Constat corpus nostrum partibus firmis & liquidis; ^{Maciei species & causas.} firmæ partes in morbis parum consumuntur, sed liquores evacuantur sæpe copiose, unde corpus humiditate ea privatum dicitur Aridum; Si vero Pinguedo naturaliter multis partibus firmis interstrata auferatur, talis corporis extenuatio dicitur *Macies*. In qua varias species notant Medici, ut si quis ex inedia vel improbo labore multum de hac Pinguetudine amittat, proprie vocatur *Macies* aut *Corporis Extenuatio*. Qui vero toto corpore extenuantur sine his prægredientibus causis, & sine aliquo visibili morbo, nisi quod ingesta alimenta defectu actionis corporis non convertantur in bonam pinguetudinem, tales dicuntur *Atrophia* laborare. Similis extenuatio ex quodam membro, vel quod nutrienda actio deficiat, vel influxus sanguinis arteriosi in id membrum remoretur, pars illa *Aridura* dicitur correpta. Verum consumptio totius, corruptione totius massæ inducta, sive fiat ex Deliquatione, sive ex pure toti massæ misto, eam vocant *Phthisin* seu *Tabem*, eam autem distinguunt in *Tabem nervosam*, si fiat ex colliquatione, uti fit in multis

Chronicis; & in *Purulentam*, si adsit abscessus vel ulcus internum: si vero ulcus hæreat in Pulmonibus, *Phthisin veram* vocant. Summam vero Extenuationem, ut corpus sit instar sceleti pelle tecti, vocant *Marasmm*. Ex his nunc speciebus videndum, quamnam intelligit Hipp: Ex nexu cum præcedentibus constat, Hipp: eam intelligere Maciem, quæ vel ex morbo Acuto vel Chronico fuit nata, remanens post morbi curationem, ut nulla alia sit in eo corpore labes morbofa, nisi quod humores & præprimis pinguedo consumpta sint, quæ sunt restituenda nutrimentis ingestis. In hac refectioe præcipit, Maciem relictam a morbo Acuto brevi supplendam esse; sed post morbum Chronicum corpus lente reficiendum esse. In reliquis autem speciebus hæc regula non procedit, nam manente causa Maciem inducente, frustra tentamus refectioem; imo observamus, quo largius nutriuntur talia corpora, eo sæpe magis extenuantur.

Refectio
post Acutos.

IV. Qui morbi *Acuti* salubri critica evacuatione finiuntur, relinquunt corpus Lassum seu Defatigatum prægresso motu aucto, & Extenuatum expulsis humoribus, ceteroquin id corpus ponitur sanum: nam aliquod vitium morbosum si relictum fuit, abiit morbus Acutus in Chronicum, quando refectiois regula ex natura morbi relictæ est petenda, & præceptum hoc ab Hipp: allegatum locum non habet. Tale corpus lassum brevi tempore recuperat pristinas vires, ut omnis Lassitudo inducta, si ejus sit ablata causa, ita ergo valet nova ingesta alimenta brevi convertere in bonum succum, quo suppletur defectus humorum prægresso morbo Acuto inductus. Statim autem finito morbo, non sunt multa ingerenda alimenta, sed sensim eorum est augenda copia, cum incremento virium.

Post Chro-
nicos.

V. Alia autem est in *Chronicis* ratio, hi enim morbi Defectu virium nati, quamvis evacuatione materiæ morbi cessat, non solum relinquitur in partibus firmis lassitudo, sed Debilitas quædam, quæ longo tempore eget, antequam superatur: itaque multo lentius suppeditanda sunt alimenta reficientia, nam si paulo plus ingeris, superentur vires, & in-

ingesta commutentur in corruptelam. Regula Refectionis erat in Acutis cum augmento virium augere copiam nutri-
menti; eadem etiam in Chronicis est observanda; sed quia post morbos Chronicos lentius recuperantur vires, quam post Acutos, lentius quoque erit procedendum in Refe-
ctione: imo in his conducit stomachicis & roborantibus adjuvare restaurationem virium; & promovere ingestorum concoctionem.

LIB. II. APH. VIII.

33. *SI a morbo cibum quis capiens non roboretur, indicat corpus uberiore alimento uti Si vero cibum non capienti hoc eveniat, evacuatione opus habere, nosse oportet.*

I.

Convalescens ex morbo, ut monuimus, laborat tamen virium aliquo defectu & æquilibrio inter partes firmas & fluentes destructo, ablata nimia quantitate liquo-
ris; ut igitur vires restaurentur & æquilibrium restituatur, nova erant ingerenda alimenta tanta copia, quæ viribus incrementibus respondebat. Hæc autem comparatio diffi-
cillime fieri potest: fames enim major & minor hanc quan-
tatem præprimis definire debet, quæ sæpe sanato morbo non est naturalis, interdum plus exigens, quam corpus su-
bigere valet: imo interdum cessantibus omnibus morborum signis morbifica materia deposita hæret in ventriculo & in-
testinis, ubi stagnans nova ingesta alimenta corrumpit. Igitur necesse est ad restaurandas vires & restituendum æ-
quilibrium, ut habeamus signa, quibus cognoscimus, num corpus istud nimio utitur alimento, num vero hæreat in
O 3 primis

primis viis cacochylia expellenda: Ita enim valet medicus moderari Diætam, vel exantlare alienum, ut pristina fanitas recuperetur. Totum hoc statuit Hipp: consistere in observatione virium multum vel parum comedentium.

Post mor-
bum mul-
tum come-
dens si non
roboretur.

II. Post morbum quemcumque perfecte curatum, relicta debilitate & destructo æquilibrio ex humoris defectu, necesse est ut fames fiat major: quippe ipse nutrimenti defectus est famis causa, & tunc semper etiam in sanis hominibus sentitur. Debilitas non est causa sensum famis impediens, nisi per debilitatem mali fuere nati humores, qui in perfecta sanatione supponuntur non adesse. Ita igitur constitutus homo si tantum ingerit, quantum fames exigit, ingestum omne subigere nequit: fames quidem indicat corpus alimento egere, sed corporis vires non valent tantam ingestam copiam alimentorum commutare in bonum nutrimentum. Quare corpus ex morbo convalescens, etiam si fames urget, non debet tantum ingerere, quantum ingerit corpus sanum, adeoque magis peccat, si plus ingerit, ut satisfaciat fami auctæ: nam id superfluum non solum corrumpitur, verum id simul corrumpet quoque, quod minori copia ingestum fuisset subactum & in nutrimentum conversum. Cui ergo fames reconvalescenti redit, huic parum edenti, seu tantum, quantum viribus debilitatis vinci potest, corpus roborabitur, plus vero comedens debilitabitur. Nam alimenta subacta roborant, eadem autem corrupta debilitant. Ex observatione reconvalescentis bene comedentis non solum cognosco, id corpus a præcedente morbo omnino fuisse depuratum, & non roborari nimia ingestione alimentorum verum etiam quid sit agendum, quod auctor non præcipit, nam exquisitiore victu comparabitur robur, & si cacochylia interim in primis viis sit collecta, ea expellenda semel leni purgante.

Non ro-
borari in ci-
bum non
capiente.

III. Cui vero ex morbo convalescenti non redit fames, quæ necessario adesse debebat, ut superius demonstravimus, signam est alienum remansisse humorem in corpore, naturalem sensum famis extinguentem: quod hoc modo sæpe fit. Si morbi materia toti massæ circulanti mista mor-
bnm

bum faciens, separata fuit in intestina & ventriculum, ut exoneretur, liberatur quidem corpus a præcedente morbo, sed materia in his locis collecta, non solum exstinguit appetitum alimentorum, verum etiam nova ingesta alimenta huic materiæ mista, in alienam nutritioni ineptam convertuntur. Cui ergo fames a morbo convalescenti non redit, signum est in primis viis morbosam collectam hæere materiem. Pro *Cibum capiente* intelligo famem, pro *Cibum non capiente* inappetentiam: nam id manifestissime patet ex sensu hujus aphorismi; nemo enim ex morbo reconvalescens sine cibo sumto roborari potest, hoc quoque scivit Hipp: Quare si loco dictorum intelligatur fames & inappetentia, verus est hujus aphorismi sensus.

IV. Præcipit Hipp: in cibo non capiente post morbum, si non roboretur corpus, Evacuationem esse faciendam, sed qualem vult evacuationem, non determinat. Existimo autem facile determinari posse ex superius allatis rationibus: nam in his non redit fames, quia in primis viis collecta hæret Cacochymia; igitur talis est facienda evacuatio, quæ hanc cacochymiam evacuat, ut est purgans vel vomitorium. Eligerem purgans, quoniam tunc via ab ore usque ad anum expurgatur, & quia hujus operatio mitior magis conveniens est corpori debilitato, & quia naturalis est via pro excrementis ejiciendis. Vomitorium est vehementius, inversam faciens evacuationem, neque totam hanc viam evacuans. Nullam hic de Sudoriferis aut Diureticis facio mentionem, quæ aliena ex tota massa circulatoria eliminant, nam quamdiu his humoribus mista est morbi materia, morbus non est finitus.

In inappetentia relicta indicatur evacuatio,

LIB. II. APH. IX.

34. **C**orpora ubi quis purgare voluerit, facile fluentia reddere oportet.

I.

Divisio.

Duplici sensu hic Aph: accipi potest; vel ut respiciat ad præcedentem aph: si corpus non roboretur in eo qui cibum non capit, cum facienda sit evacuatio; vel ut sit generalis regula in quovis morbo, si sit evacuandum. Utrumque examinaturi sumus, quando constat, quid sit intelligendum per *fluentia reddere oportet*.

Præparatio.

II. In Liquoribus vasis coarctis nullus est motus ad evacuandum urgens, si excipias motum intestinum & gravitatem liquoribus proprium; sed ut contentus liquor expellatur, a partibus firmis est protrudendus: verum tenacitas in liquoribus partibus & cum partibus firmis, quibus adhærent, impedimentum est expulsionis: atque liquores ducendi per canaliculos minimos, ut sit in excretionibus corporis nostri, exigunt aliquam convenientiam (*Aph. 2, XII.*) ut non quilibet humor per quodlibet Emunctorium possit duci. Fluentia tunc ergo redduntur evacuanda, si destruiatur illa major tenacitas, & adaptetur alienus humor ad hanc vel illam Evacuationem, qualis mutatio medicamenti vel aliis auxiliis inducta hodie dicitur *Præparatio*.

Præparatio in convalescentibus.

III. Qui ex morbi materia toti massæ mista ægrotat, tunc demum convalescit, si materia ea sit subacta; sed si simul evacuatur, perfecta sequitur curatio; verum retenta, vel alicubi deposita, videtur convalescere æger, sed vel recidivam patitur, vel in alium morbum, corrupta stagnante materia, relabitur. Imperfectam hanc curationem cognoscimus, si corpus cum inappetentia manet debile, ut in

in

in præcedente Aph: notavit Hipp. Sed in tali casu, quia materia evacuationi est apta, verum retenta, magis conducit statim moliri evacuationem, quam præmittere præparantia, nam vitium non est in concoctione, sed expulsionem. Sin vero post longiorem moram concreverit humor, fieri potest ut humor evacuandus præparandus sit. Hanc itaque regulam ad generalem curationem mallet, quam ad specialem convalescentium referre, quia sæpe sine prævia præparatione difficile sequitur evacuatio.

IV. Materia autem Morborum acutorum, ut est Lentor, evacuationi est inepta; aut si extruditur, morbum exasperat: ita per moventia in acutorum principio si materia quædam expellitur, ipsa evacuatio morbum auget binis rationibus; nam lentor eo majore motu magis compingitur & ex bonis humoribus novus generatur; ipsa etiam educatio recrudescere facit morbum, uti experiuntur, qui apostema ante maturitatem aperiunt, quia forsitan inchoata coctio in reliqua massa cruda præparationem promovet, ut fermentum integram massam panis in fermentationem citiorem conducit, & adjecto putrefacto reliquorum putredo acceleratur. Obstare autem videtur venæ sectio educens materiem in morbi principio, quæ promovet morbi acuti solutionem: at longe abest, venæ sectionem materiem inflammatoriam evacuare, bonum enim educit sanguinem, qualis tunc est in toto corpore majore motu acutorum compactus, ut evacuatione hac nimius ille motus pervertens lentoris præparationem, temperetur. Hinc sanguinis missiones & hæmorrhagiæ præcipua sunt præparantia in acutis, cum frequentius motu aucto quam minuto impediatur lentoris concoctio. Itaque præparantia in acutis sunt præprimis illa auxilia, inter quæ quoque sanguinis missio & refrigerans alvi ductio est numeranda, quæ motum circulatorium temperant, ut Lentor commutetur vel in materiam criticam vel purulentam. Hæc auxilia tamdiu sunt adhibenda, donec Lentor hanc mutationem induerit, antequam ipsius materiæ est tentanda evacuatio. Interdum ob majus imminens malum ante maturitatem evacuatio est facienda,

In Acutis

ut si tumor inflammatorius ad interiora minetur ruptionem: fatius est protrahere hac evacuatione morbum, quam permittere, ut ruptione ad interiora æger pereat.

In Chroni-
cicis.

V. Eandem hanc regulam Præparationis in morbis Chronicis fere omnes practici strictissime servant, ut non audeant cortice peruviano vel alio antidoto abigere febrem intermittentem, nisi præcesserit præparans; semperque antequam moliantur aliquam evacuationem, præmittunt aliquod præparans. Sed morborum Chronicorum longe alia est ratio quam Acutorum, quia varia sunt Chronicorum genera, quæ non omnia præparationem exigunt, ut sunt omnes morbi ab humore tenui provenientes; sed qui visciditatem adjunctam habent, ejus solutio loco præparationis præcedere debet, ut eo commodior fiat istius humoris evacuatio. Omnes etiam morbi firmarum partium, uti laxitas, rigiditas humiditas, siccitas, sine prægresso præparante statim curandi sunt. Quare præparationis regulam magis generalem in Acutis statuo quam Chronicis.

Præpara-
tio ad alvi
ductionem.

VI. Purgare late significat omnem depurationem, qua aliena separantur a bonis & auferuntur, quare in medicina denotat sæpe omnem evacuationem alienorum humorum e corpore: ut plurimum autem proprie denotat evacuationem per alvum, in quo sensu hic ab Hipp: videtur accipi. Videndum igitur, qualis præparatio tam in Acutis quam Chronicis præcedere debet, antequam exhibetur purgans. In morbo Acuto correptis omnes medici statim sine ullo præparante præmissio exhibent purgans; in Chronicis etiam a purgante dato initium curationis multi inchoant: videntur ergo contra hanc regulam Hippocratis peccare, in qua præcipit, *ubi quis purgare voluerit, facile fluentia reddere oportet*. Verum qui inde intelligunt semper præmittenda esse solventia, non intelligunt sensum: quippe si contenta intestinorum satis fluentia sint, non est opus solventia præmittere; si vero in intestinis hærent crassa & tenacia, quæ difficulter educi possunt, necesse est tenacia hæc primo solvere & dein educere. Hoc etiam hodie in praxi verum est. Quare hoc modo hic Aph: intelligi potest. Si alvus du-

cenda

cenda sit, est attendendum, num contenta sint crassa & tenacia, num vero facile mobilia, quod si tenacia sint, præmitti debet solvens, ut commodior non solum sed & perfectior fiat contentorum evacuatio.

LIB. II. A P H. X.

35. **I**mpura corpora, quo magis nutritiveris, eo magis lædes.

I.

Sensus hujus absolute in omnibus potest accipi morbis, quando tradit regulam victus in omni corpore impuro, ut debeamus minorem alimentorum copiam dare impuritatibus laborantibus. Vel restringitur ad præcedentem (33.) in Convalescentibus ex morbis, si cibum capiens non roboretur, nos tunc non debere copiosiore ingestione alimentorum onerare corpus. Utrumque examinaturi.

II. Antequam aliquid certi statuere possumus de nutritione in Corporibus Impuris, constare debet inter Medicos quid sit intelligendum per Impuritatem, de qua hic agit Auctor, nam multæ sunt impuritates quæ neque indicant, neque vetant nutritionem, ut sunt externæ corporis vel ulceris sorditates, tam ex morbis quam neglectu depurationis. (1) Quæ corpora valetudinaria solitum ingestum cibum convertere nequeunt in bonos humores, qui cibus dein longiore mora corruptus & non evacuatus, vel in primis viis hæret, vel circulantibus est permixtus, ea corpora tali succo onusta, dicuntur impura. (2) Quæ corpora sana nimiam copiam alimentorum onusta non valent cuncta subigere & expellere, tandem multitudine corruptorum oppressa & infecta etiam dicuntur Impura. (3) Si

Impuritas
quid sit.

morbi materia ex præcedente morbo facta non expellatur, sed intricata manet aliis bonis liquoribus, vel alicubi detineatur, ita ut antecedens morbus videatur omnino curatus, sed homo tamen ad perfectam sanitatem non redeat ob alienam retentam materiem; talia corpora etiam dicuntur impura. (4) Denique humores actione nostri corporis inutiles facti, partesque firmæ detritæ, quæ per emunctoria naturalia debebant evacuari, in corpore retenta, ut sæpe fit impedita perspiratione, ea faciunt quoque corpus Impurum.

Nutrire
quid deno-
tet.

III. Videndum nunc est, an talia corpora sint nutrienda. Hipp: dicit, *quo magis talia corpora nutriveris, eo magis lades*. Nutrire proprie significat per ingesta alimenta id restituere, quod inevitabili vitæ actione fuit deperditum: si hoc sensu hic reciperetur nutritio, absurdum foret interdiceret nutritionem, cum vitæ actione semper quædam periant, quæ sunt restauranda. Sed per nutrire, uti in hoc loco, solam sæpe intelligunt alimentorum paulo copiosiorum ingestionem. Hunc nutritum non sine ratione interdicit Hipp: nam ut ingesta alimenta nutriant, corporis actione in nutrimentum sunt convertenda, quod difficilius fit in corporibus impuris, ut statim videbimus.

Impura
corpora non
nutrienda.

IV. Vis vitæ valens, omnem morbi materiem subigit & expellit; ea vero retinetur in corpore vel deficientibus viribus, vel obstinata resistantia materiæ, ne tamen homo defectu nutrimenti pereat, aliquid est porrigendum, de qua exhibitione superius multis locis, sed hoc tempore cavendum esse præcipit, ne alimentorum multitudine ægri collapsas vires conemur refocillare, corpusque emaciatum ex præcedente morbo faginare, non sortiemur bonum effectum, cum ingesta illa copiosiora alimenta non convertentur in bonum nutrimentum corporis nostri, quo fiet refectio virium & corporis splendor, sed in corruptelam, qua corpus magis debilitabitur & potius emacietur. Corpus enim impurum manens ex virium defectu, vix valens modicam cibi quantitatem in bonum convertere succum, multitudine obrutum succumbet, permittetque, ut non solum suppressis viribus
boni

boni humores etiam corrumpantur; sed etiam ingesta, per insitam spontaneam mutationem in loco calido, convertantur in succum nobis alienum; ita ut ea, quæ nutritioni erant destinata, præbeant novam morbi materiem. Quod vero corpus manet impurum per obstinatam materiæ morbi resistantiam, eadem hæc materia ingestis mista tanquam fermentum malignum, alimenta in alienam indolem nutritui ineptam convertit. Quare corpora ea modicâ copiâ cibi sunt sustentanda, minime vero majore quantitate opprimenda.

LIB. II. AP H. XI.

36. **F**acilius est replere potu quam cibo.

I.

Aphorismus hic potest vel absolute poni, adstruens corpus tam in sanitate quam morbo facilius impleri posse potu quam cibo; vel restringi ad Refectionem corporis ex præcedente morbo debilitati. De curatione enim eorum jam ante (Aph: 32) inceperat agere, quæ ex morbo erant relicta, in qua præceperat *Refectionem* (Aph: 32) *Evacuationem* (Aph. 33) *Præparationem* istius evacuationis, atque in præcedente (Aph: 35) *nutritionem*, in hoc nunc apposite agere potest, num nutrire debeat medicus Potu vel Cibo. Potest ergo hic Aphorismus duplici modo exponi, vel ut regula generalis vel specialis. Quonam in sensu hic ab Hipp: sumitur, non curo, quia scopus non est sensum auctoris interpretari, sed propositas sententias explicare, ut Aphorismi nobis duntaxat agendi normam præbeant.

Nutrimen-
tum quot
modis inge-
ritur.

II. Veteres existimarunt tres distinctas partes esse nutriendas, firmas nempe, liquidas, & spiritus, inde cibus solidus, potio, & vapor has tres diversas nutrent: verum non cogitarunt non admodum magnam inter corpora firma & fluentia interesse deferentiam, cum Caro in gelatinam vel jus coctione conversa, & lac coagulando concretum cibi nomine veniens, propterea non nutrent differentes partes, sed fluentes & firmas partes eodem cibo sive fluido sive firmo nutriri: imo vapor ab his non differt, quia est humidum solutum aëri mistum. Præter dictos modos tres addi potest applicatio in forma epithematis; atque injectio ope clysmatis. De duobus his posterioribus quam maxime litigant multi existimantes nihil corpori communicari posse quod non intrat per vasa lactea, & quia ex cute & intestinis crassioribus statuunt nulla oriri vasa lactea, contendunt his viis alimentum communicari non posse. Verum ex his partibus per vasa absorbentia, deferentia receptum liquorem tandem in venas cruentas, recipitur, quod alio loco fusius est exponendum.

Facilius re-
pletur potu
quam cibo
corpus sa-
num.

III. Facilior repletio in sanis, his modis accipi potest. (1) Facilius fit impletio, quia potio sine prævia manducatione deglutiri potest. (2) Facilius quoque quoniam minimo tempore impleri potest ventriculus potione, sed longius tempus exigit, antequam impleatur cibo solido. (3) Quoniam alimenta in forma liquidi regulariter minore egent actione corporis, ut convertantur in nostros humores nutrientes.

Ægrotans.

IV. Si Repletio respiciat ad præcedentes aphorismos, idem significat quam *Refectio*. Qui igitur ex præcedente morbo sunt emaciati & debiles, hi facilius ingesto potu quam cibo refocillantur. (1) Nulla alimenta nutriunt nisi in fluorem sint redacta, aliter enim non possunt ingredi lactea vasa, quæ igitur ingeruntur liquida, non egent organorum chylopoieticorum actione, ea in fluorem redigente, sed statim prompta sunt; adeoque facilius tradi possunt corpori toti. (2) Ex morbo convalescentes plerumque oris siccitate & inappetentia laborant, quibus cibi solidi deglutitio red-

redditur molesta, & interdum impossibilis, dum tamen admittunt potionis ingestionem: si vero accedit sitis, quod sæpe fit, avidissime potum ingerunt. (3) Solet quoque ad cibum subigendum major requiri corporis actio, quæ in convalescentibus parva est, quam ad commutandum potum; inde conducit in his refectionem facere alimento liquido & tenui, donec corpus recuperatis viribus magis sit firmatum, cibum solidum subigere valens. Inde etiam infantes solis potionibus quoque sustentantur, denique sensim ad cibum solidiorem veniunt.

LIB. II. A P H. XII.

37. **Q**uæ in morbis post crisin relinquuntur, Recidivas facere solent.

I.

Duo in hoc Aph: sunt examinanda, (1) quid sit Recidiva; (2) quomodo ea generari possit ab iis, quæ in morbis post Crisim relinquuntur.

II. Non omnis reditus in morbis a Medicis vocatur *Recidiva*, quare a ceteris congeneribus rite discernenda. (1) Requiritur ut redeat morbus priori similis, nam si post morbum sanatum alius nascitur, vocatur morbi Mutatio seu Transitus in alium morbum, ita morbi acui sæpe transeunt in chronicos: talis Transitus si morbo est naturalis & frequens, etiam dicitur morbi Exitus; ita abit inflammatio in abscessum, sphacelum. & scirrhum; Transitus in sanitatem & mortem dicitur etiam morbi Exitus. (2) Ut totus morbus vel integre vel fere desinat, antequam sequens novus priori similis incipit, nam citius inchoans sævire, Recrudescencia aut morbi Exacerbatio vocatur. (3) Ut reditus

Recidiva.

non

non sit ex morbi natura, inveniuntur enim morbi, qui ex propria sua natura per Exacerbationes id est Paroxyfmostotam periodum absolvunt, talis autem reditus nunquam vocatur Recidiva, sed Paroxyfsmus: si vero ille morbus, qui vocatur intermittens, non amplius suis temporibus paroxyfsmum concitat, sed deinceps post aliquot tumpus, talis reditus vocatur Recidiva; ut si quartana intermittens v: g. per quatuordecim dies nullum paroxyfsmum faciat, dein vero redeuns dicitur quartanam Recidivare. (*Conf. Comp. T.* 53, XVII.)

Recidiva
duplex.

III Duplici modo fieri potest recidiva. (1) Si morbi materia ita fuit subacta, ut morbus lateat, verum si materia non omnino sit extincta vel expulsa, quæ dein adolescens morbum priori similem profert, ut in nephritide & ictero a Calculo, venerea lue, febre quartana, totus morbus plane evanescere videtur, sed ex latente causa deinceps re-
crudescit. (2) Si morbi materia omnino sit expulsa vel subacta, verum relinquatur ea causa quæ priorem morbum regenerare potest; quemadmodum in Hydropis curatione si relinquatur debilitas, sensim novum hydropem generans; ita Cacochymia per intemperantiam nata si curata fuit, homo in eadem intemperantia pergens Cacochymiam recidivare facit. Prius genus hic vult Hipp: nam dicit Recidivas fieri ab iis, quæ post crisim a morbis relinquuntur, ergo a materia præcedentis morbi non satis subacta vel expulsa.

Quæ post
Crisim re-
linquuntur.

IV. Per Crisim intelligi morbi commotionem aut ipsam evacuationem, superius, (*Aph.* 20, IV) notavimus: utroque sensu hic accipi potest; nam si perturbatio Critica præcesserit sine subsequente evacuatione, relicta morbi materia Recidivam facere potest: atque ipsa facta evacuatio, modo sit imperfecta, relinquens aliquam portionem de materia præcedentis morbi, etiam Recidivam producere valet: uterque hic modus a medicis vocatur Crisis imperfecta. Non sine ratione dicit Auctor *Recidivas facere solent*; nam ea materia relicta non solum Recidivas facit, sed & materia commutata non raro degenerat in alium morbum,
imo

imo interdum interimit; vel ad quædam loca depulsa parit metastasin. Quare ex iis, quæ post crisin relinquuntur prædicimus Recidivam, verum etiam Transitum in alium morbum, mortem & metastasin.

V. Ut itaque ex arte prædicatur Recidiva ex iis, quæ post Crisim relinquuntur sciendum est. (1) Nobis proponi morbum, qui crisi finitur, cum non omnes morbi per Crisim terminantur. (2) Illa Crisis debuit esse Imperfecta, quia post Crisim perfectam (Aph. 20, VIII.) nunquam fit Recidiva. (3) Remanere signa, quæ declarant, materiem retentam potius resuscitare Recidivam quam metastasin, vel aliam mutationem morbi (Conf. Comp: T. 53, xx). Signa hæc graphice depinxit Hipp: a, 444. („ Recidiva fi-
 „ unt in his, quibus febribus desinentibus vigilia fortes accedunt,
 „ aut somni turbulenti, aut corporis robur, aut dolore uniuscujus-
 „ que membri: & quibus febres sedantur, neque signis solutoriis
 „ contingentibus, neque in judicatoriis diebus: & si deficiente
 „ febre, & sudore accedente, urinam fulvam minxerint, albam
 „ subsidentiam habentem, his febris recidivam eadem die expecta.
 „ Ha vero recidiva quinto die judicantur extra periculum. Et
 „ si ex judicatione facta urinam rubicundam, rubram subsidentiam
 „ habentem minxerint, etiam his recidiva febris fit eadem die, &
 „ pauci ex hac servantur. Quum recidit febris ardens, plerumque
 „ etiam exudat. Et si revertens tot diebus detineat quot prius,
 „ etiam tertio recidivat, si non impari die dimiserit reversa.
 „ Plerumque si cruda sint urina, & alia signa non secundum ra-
 „ tionem eveniant, morbus in die indicatoria recidivat. Quando-
 „ que etiam revertitur in die judicatoria, his talibus relictis.)
 Quibus si addantur signa Recidivam præfagientia ex urina
 (Comp: T. 36, LVI, 29) admodum certa habetur Recidi-
 væ prædictio ex iis, quæ in morbis post Crisim relin-
 quuntur

Recidivæ
 prædictio
 post imper-
 fectam cri-
 sim.

LIB. II. APH. XIII.

38. **Q**uibus Crisis fit, his nox ante exacerbationem gravis est. Subsequene vero levior plerumque.

I.

Num quædam in morbis post Crisim relinquuntur, quæ Recidivas facere solent, hic aphorismus definiet, perfecta enim Crisis (Aph: 20, VIII) nihil relinquit, sed imperfecta semper aliquid, vel omnem materiem: utrisque antecedit nox gravis: sed post perfectam Crisim nox sequens levior; post imperfectam vero nox gravior. Hoc loco Hippocratem per Crisim intelligere ipsam evacuationem, minime vero perturbationem criticam, facile colligitur, quia per noctem ante paroxysmum gravem perturbatio critica intelligitur, quod augmentum morbi indicat instare Crisim, quæ si bona fiat & perfecta, faciet subsequentem noctem quietiorem; si vero imperfecta fuerit, sequens nox etiam erit gravis, quoniam corpus a materia morbi non fuit liberatum.

* Nox gravis ante crisim.

II. Istud tempus in morbis dicitur grave seu molestum, in quo symptomata morbi fiunt vehementiora & plura, quam antea: instante Crisi necesse est symptomata augeri & interdum alia accedere, nam in morbi statu solo fit Crisis. Quippe vis vitæ instigata a morbi acuti materia sensim majorem facit motum, quod verum est in omni irritatione, donec tandem vel hoc motu subigatur & expellatur causa irritans, vel motus se ipsum destruat, parsque destruat & motus vitalis extinguatur: si alienum irritans subigatur vel expellatur, brevi post sedatior fit motus: sed si vis vi-

tæ

tæ extinguatur parsque sphacelescat post validum motum, cessant quoque symptomata ex majore motu nata, sed nascuntur alia, quæ dicuntur maligna, etiamsi videantur mitiora: sed si neque materies morbi vincatur aut expellatur, neque vis vitæ destruat, post pugnam aliena relinquuntur symptomata. Post hunc conflictum ergo si nulla fiat evacuatio aut metastasis, nox sequens manet gravis, quia morbi materia irritans fuit relicta: si vero sequitur evacuatio, hæc si educit morbi materiem, nox sequens levior; si autem alius evacuatur humor faciens symptomaticam evacuationem, sequens nox iterum gravis est, quoniam corpus a morbi materia non est liberatum. Qualia vero symptomata hac nocte conspiciuntur, quæ noctem graviores faciunt, determinari nequit, etiamsi illa a practicis annumerantur: nam prout varia instat Crisis (*Comp. T. 53, XLV*) vel morbus terminatur in Abscessum, vel in aliquam Metastasin (*Comp. T. 48, XVI.*) symptomata differunt. Hæc quia quoque turbant somnum, qui nocte fieri debet, non sine ratione dicit Hipp: nox ante exacerbationem gravis est, atque regulariter nocte solent graviora observari symptomata, quam de die.

LIB. II. AP H. XIV.

39. **I**N alvi profluviiis mutationes excrementorum juvant, nisi in prava mutantur.

I.

QUoniam post criseum descriptionem statim hunc Aph: de Alvi profluviiis ponit, potest itaque hoc alvi profluvium tanquam critica evacuatio capi. Sed si hic Aphor: non cohæreat præcedentibus, absolute sententia est

exponenda de mutatione excrementorum in alvi profluviis: Utrumque sumus examinaturi.

Excre-
mentorum
mutatio in
alvi proflu-
vio critico.

II. Critica tam bona quam mala alvi dejectio observatur a practicis in morbo acuto (*Comp. T. 90, cxiii*) & febre (*Comp. T. 90, cxxix*). Atraro Morbus acutus vel febris legitima per alvum deponit morbi materiem, cum intestina non sunt creata ad impuritates totius corporis eliminandas, in statu enim sano inutilia facta in ventriculo & intestinis, atque recrementa assumptorum hac via eliminantur: reliquæ autem impuritates in circulantibus natæ, vel per renes, vel per cutim a communi massa segregantur & eliminantur; quare non est via regia ad eliminanda aliena toti massæ mista alvus. Si vero inde confluunt humores morbosus, colliquationis signum est, quod humores soluti labe morbosa, non vero cocti & organis excretoriis adaptati, in intestina confluant, & ita exonerentur. Hinc tam pauca a Practicis recensentur signa criticum alvi fluxum præfagientia (*Comp. T. 53, XLV.*) Quibus vero febris vel morbus acutus concitatur ex caco-chymia hærente in intestinis, mesenterio & hepate, aut in quibus morbis acutis hæc simul adest materia, his critica alvi perturbatio potest fieri, auferens alienum illum humorem: nam non solum ex intestinorum cavo evacuari potest humor alienus ibidem collectus; sed & alienus in vena portarum coacervatus, ad Hepar delatus, per ductum choledochum in duodenum exonerari potest: quare morbi acuti a bile corrupta vel materia melancholica alvi profluvio non raro tolluntur. In hujusmodi critica alvi evacuatione *Excrementorum mutationes* sunt observandæ. Nam dum corruptus talis humor deponitur, Alvi Excrementa admodum varia sunt; verum tandem naturalia & magis compacta prodire debent, quibus designatur, omnem eam materiam ablatam esse: si vero continuatur talis evacuatio malorum, malum est signum, quia denotat fontem esse perpetuum, ut fit, si istis in locis per putredinem continuo supeditetur novus morbosus & alienus humor: adhuc pejus est, si Excrementa sensim deteriora evacuantur, nam in augmento putredinis aut corruptelæ sensim magis a sanis distantia

stantia excrementa ejiciuntur. Non parum ergo allucinantur multi, expectantes solutionem ex pravorum continuata vel aucta dejectione, cum tandem reliqui boni humores hac corruptela commutati eliminantur.

III. Si alvi copiosior egestio, ut in Diarrhœa (*Comp. T. 90, LXXXIII.*) Lienteria (*Comp. T. 90, XXVIII.*) Dysenteria (*Comp. T. 90, CXXIV.*) Cholera (*Comp. T. 90, XLIX.*) Fluxu hepatico (*Comp. T. 90, c.*) Excrementa diu similia ejiciuntur, malum est signum. Quippe ab assumptis alimentis non potest tanta suppeditari copia excrementorum, ut semper similia maneant, quin ipsa alimenta, quæ lactea intrare debebant, egerantur ut in *Lienteria*: conducit vero in hoc morbo excrementa mutari in naturalia, ut constet, chylum intrare lactea vasa; si vero loco chyli emittantur humores corrupti, id est si in prava commutentur, id malum signum præbet, nam talis dejectio non emittit, quod retinendum erat, sed insuper designat chylum corrumpi: melius autem est, ut bonus evacuetur humor, qui potest inducere debilitatem & defectum humorum, quam ut bonus ille humor primo corrumpatur & dein educatur, quia talis evacuatio non solum dicta quoque infert mala, sed insuper designat corruptionem, & facit corruptus ille humor, ut ceteri liquores, qui boni mansissent, hac corruptela inquinantur, et ad vitam sustentandam inepti fiant. Nec minus valet in ceteris morbosis alvi dejectionibus observare Excrementorum mutationes. Sensim debent ad consistentiam, colorem, & odorem naturalem redire, ut promittatur sanitas, ita enim constat, minui in corpore morbi materiem. Si vero morbosa continuantur emitti, certum est, fomitem esse intus continuo suppeditantem, vel bonos humores ad intestina delatos corrumpi & egeri, qualis evacuatio nunquam est critica. In prava vero mutari, eo pejus est, quia quo morbus fit major, quo corruptelaque magis intenditur, eo praviora generantur & emittuntur. Qui vero ex pravis dejectis bonam proferunt prognosin, non parum decipiunt ægros, quoniam signum est augeri corruptelam, bonosque humores etiam corrumpi.

In alvi
profluvio
morbofo,

LIB. II. APH. XV.

40. **U**bi fauces ægrotant, aut tubercula in corpore exoriuntur, excretiones inspicere oportet: si enim biliosæ fuerint, corpus una ægrotat: si vero similes sanis fiant, tutum est corpus nutrire.

I.

DE Excretionum inspectione in faucium morbis & tuberculis per corpus obortis hic agit Auctor, ut sciamus num illi morbi sint particulares ex vitio istius partis, num vero totum corpus una ægrotet, ut sciamus, tutum an sit corpus nutrire, vel medicamenta sint adhibenda. Faucium autem morbi & Tubercula corporis duplici modo accipi possunt, vel ut morbi ipsi particulares, vel ut metastases. Excretiones hic accipi possunt, vel pro sola alvi egestionem, quia de ea in præcedente Aphorismo egit, vel simul hic intelligi potest urinæ inspectio.

In faucium morbis biliosa alvi excrementa.

II. Faucium morbi difficilem deglutitionem aut respirationem facientes speciali nomine Anginæ vocantur, sed si illa symptomata non adsunt vel non admodum difficilis habetur deglutitio cum libera respiratione, uti in parotidibus, atque tonsillarum, vel palati mobilis, vel uvulæ tumore, generali nomine hi morbi dicuntur ab Hipp: si fauces ægrotant. *Pharynx* est in textu, quo nomine intelligit totam partem posteriorem oris, quæ oculis conspici potest hiantem ore & radice linguæ depressa; hodie vero solum caput oesophagi vocatur *Pharynx*, & per fauces, plures adjacentes partes intelligunt. Hæ fauces si vitio organico corripiantur, uti reliqui morbi particulares, sana relinquunt excrementa, & urina

urina quoque inde non mutatur; nutrire ergo licet, si deglutitio fieri possit, quia intus omnia sana bene subigent alimenta. Sed si bilis corrupta hæret in ventriculo, illa eruētans fauces comburit, tunc vero ex bile simul exeunte excrementa fiunt biliosa: in hoc casu magis a cibo abstinendum, quia bilis corrupta nova ingesta corrumpet, quare ab alimentis assumptis non generabitur corpori nostro nutritivus humor, sed morbosus, qui morbum augebit vel novum insuper pariet. (Conf. *Comp. T. 90, XLIX.*)

III. Morbi autem faucium ex generali causa duplici modo generantur. (1) Si morbus generalis vehementissima sua symptomata in faucibus exercent, quemadmodum Inflammatio, Erysipelas, Hydrops: tunc tota massa simili morbo infecta reddit urinam morbo convenientem. Ex his eligit urinam biliosam, id est quæ intensiorem flavum colorem habet, (*Comp. T. 36, XIII ad XVIII.*) nam in tali urina etiam si non adessent morbi faucium, non esset licitum nutrire, cum morbi Inflammatorii, Erysipelatosi, Prutridi & Icterus, plura alimenta vetant. (2) Morbi faucium ex Metastasi, ut sunt Parotides (*Comp. T. 48, XVI.*) indicant corpus ab omni morbi materia non esse liberatum; si tunc redditur urina biliosa, summam cruditatem arguit, in qua non est licitum nutrire.

Biliosa
urina.

IV. Alvi Excrementa biliosa indicantia, bilem corruptam esse in primis viis, largiorem nutritionem vetant sive Phymata adsint vel non adsint: eo magis quia verisimile tunc est Phymata, sive pustulæ sint parvæ, sive tubercula majora, uti furunculi, ex bile acri per corpus dispersa generari.

In corporis
tuberculis, alvi
Excrementa
biliosa.

V. Talia autem Tubercula nata ex bile corrupta per totum corpus dispersa, vel ex alia materia flavescente, ut est pinguedo colliquata, vel pus in ichorem conversa, ex quibus redditur urina quoque biliosa, omnino non convenit nutrire corpus. Nam excretionem illam morbosam designant, totam massam circulantem materia corrupta infectam esse, cum tales evacuationes ex communi massa depromantur.

Urina biliosa.

VI. Quando tale corpus nutritur, malum est, quia assumpta alimenta priusquam in sanguinem veniunt, a cacochymia in intesti-

Vetant
nutrire.

testi-

testinis, cui admiscentur ingesta alimenta, ita invertuntur, ut omnino laudabilem naturam suam exuant, vel per alienos admistos humores impediuntur in bonum chylum converti. Ita igitur cruda vel & corrupta cum chylo in sanguinem delata multorum etiam aliorum morborum causæ sunt. Ergo non conducit, his signis in alvi excrementis apparentibus, nutrire corpus. Neque prodesse potest, si bilis corruptæ signa in urina apparent; licet bonus chylus tradatur sanguini, corrupta bile infecto, ad ulteriorem perfectionem perducere nequit, quia a bile corrupta laudabilis coctio invertitur.

Quando
nutrire li-
cet.

VII. Si vero tam ex alvi excrementis, quam ex urina constat, primas vias non scatere corruptis humoribus, atque ex urina sana massam sanguinis puram esse, etiam si tubercula adsint, vel fauces ægrotent, nulla est manifesta causa, quæ nutritionem vetaret: nam morbi illi non sunt nati ex vitio generali, cui alimenta admiscentur, sed quia pars illa morbum in se fecit, reliquum autem corpus purum nutriri debet, ut vires valeant, quæ requiruntur ad morbi particularis subactionem. Præterea morbi particulares diuturniores esse solent, quam ut posset tam diu ferre inediam æger, donec morbus ille curatus sit.

VIII. Regula hæc specialis, magis generalis potest accipi, quia signa in excrementis, ex quibus deduximus, num tutum vel non tutum esset nutrire, non deducta sunt ex faucium ægritudine vel tuberculis, sed quoniam morbus aliqujus partis, si designat totam massam infectam, vetat nutritionem, sed aliter permittat. Hinc inferri potest eadem regula de omnibus morbis particularibus ad dirigendam diætam. Ex eadem quoque doctrina patet, frustra sæpe examinari ad eruendas morborum particularium causas excrementa; quia sæpe sana prodeunt, etiam si corpus laboret particulari morbo.

LIB. II. APH. XVI.

41. **U** *Bi fames, non oportet laborare.*

I.

UT hujus constet veritas, examinandum (1) quid faciat Labor, (2) Qualis fames hic sit intelligenda. (3) Denique quam ob rem non sit laborandum, ubi fames.

II. Utut corporis Exercitium moderatum saluberrimum habeatur ab omnibus, invenitur tamen tempus, in quo hoc saluberrimum ceteroquin damnum inferre potest. Constat omnibus, Exercitium peragi motu musculorum, qui voluntati obtemperant; ad quem peragendum requiritur spirituum influxus, qui hac actione consumuntur: si ergo eodem hoc motu in nobis non fieret humorum restauratio & coctio, corpus necessario magis debilitaretur consumptione spirituum per moderatum etiam motum muscularem, quam si quiesceret. Sed si in nobis habentur humores crudi majore motu ad perfectionem deducendi, quia Exercitio fit motus major, major proventus spirituum ex crudo succo habetur, quam dispendium spirituum per hunc moderatum motum, & inde sæpe corpora moderato motu reficiuntur & robustiora fiunt. Itidem alimenta assumpta in chylum conversa, circulantibus mista, solo motu vitali minus debito assimulantur, verum accedente motu animali ad perfectiorem concoctionem rediguntur: Quare præstantissimum est, ut assimuletur chylus, exercere corpus; major enim bonorum humorum habetur proventus ex eo motu muscolari, quam ex eodem habetur dispendium bonorum & spirituum: atque corpus perfectius liberatur ab inutili humore per largiorem insensibilem perspirationem. (*Conf. Psp: 18, XI.*)

Labor
quid faciat.

R

III. Quid

Fames
quotuplex.

III. Quid sit fames, ex *Exercitatione Tertia* satis constat, quare in hoc loco solummodo videndum, quotuplici sensu fames a Practicis accipiatur, & quali sensu hic sit capienda. Fames ex sanitatis & morbi causa concitatur. In sanitate & victu moderato tunc in nobis concitatur fames, si Alimenta ex ventriculo & intestinis tenuibus sunt depulsa, atque Chylus sanguini traditus commutatus fuit in alios humores, his peractis Deus voluit, ut in nobis concitetur sensus hunc defectum declarans, quem famem vocamus. In sanitate permanens quoque observatur fames in iis, qui ex voluntate inedia se macerant, & ut olim fiebat in rigidissima diæta. At vero in morbis per varias causas (vid. *Exerc: 3, XLII.*) fames concitatur, quarum quædam subigerentur motu musculari, ut est acrimonia acida nimiam famem excitans. Quia vero Hipp: vetat laborem, satis constat, eum in hoc loco velle famem naturalem in sanitate, vel in rigidissima diæta, quia fames morbosa interdum labores exigit.

Ubi fames,
non laborandum.

IV. Corporis motu musculari consumi spiritus, concoctosque humores degenerare in excrementitios, atque chylum & crudum humorem in nostros bonos commutari humores, alibi demonstravimus. Igitur quamdiu ex Crudis & Chylo major fit bonorum humorum proventus, quam consumptio bonorum per exercitia corporis, ipsa exercitia saluberrima sunt. Verum si in sanis excitatur fames, signum est, omnem chylum esse consumptum, aliter enim in nobis sanis non fit fames, itaque motus muscularis facit degeneracionem bonorum in excrementitios humores, & fit spirituum consumptio; verum quia in tali corpore nulla est materia, quæ eodem motu in bonos potest commutari humores, necesse est, defectum fieri bonorum, qui mutati, vel colliguntur in corpore, & ita pariunt cruditatem ex alienis re-tentis; vel expelluntur, facientes majorem humorum bonorum defectum.

An cor-
pus moven-
dum ante
cibum?

V. Quidam contendunt, ante coenam & prandium corpus movendum esse ambulatione; alii vero contrarium statuunt: quia vero ad sanitatem conservandam hoc scire maxi-
me

me interest, hanc quæstionem, quia ex præcedentibus facile determinari potest, hoc loco agitare volui. Qui perfecte sanus est, quique ex evacuato ventriculo & intestinis, atque defectu chyli in sanguine fit esuriens, non conducit huic ex superius allegatis rationibus suum corpus ante cibum exercere: Qui vero antequam fames nova alimenta exigit, quique ventriculum & intestina alimentis semiplena habet, multumque chyli in sanguine, volens tamen, quia tempus est cœnæ vel prandii, cibum capere, huic conducit prius suum corpus exercere, ut chyli viæ exonerentur, & chylum in sanguine abundantem consumere, antequam nova ingerit. Quia vero mores sæpius suadent nondum fame monitis ingerere alimenta his temporibus, ut plurimum salubrius est, ante prandium & cœnam movere corpus. Illa autem regula damnosa est concionatoribus publicis, non audentibus cibum sumere in prandio, cum sequens oratorius labor, si fiat cum alimenti defectu in corpore, maximam debilitatem inferat. Propterea non suadeo, ut corpus suum multis alimentis hoc tempore onerent, corpus enim cibo onustum multo minus est agile, quemadmodum hoc in sequente aph: explanabitur.

LIB. II. AP H. XVII.

42. **U**bi cibus præter naturam copiosior ingressus fuerit, id morbum facit. Ostendit autem sanatio.

I.

IN hoc observanda veniunt (1) Quinam sit Cibus copiosior præter naturam ingressus; (2) Cur morbum pariat & qualem; (3) Num, ostendit sanatio, ut signum, vel curatio capiendum.

Cibus copiosior in sanis.

II. De Pleniore Diæta superius (*Aph.* 5, IV) verba fecimus: in hoc autem loco examinaturi Cibus copiosorem in Sanis, Morbo laborantibus, & Convalescentibus. Sani homines tantam exigunt Cibi quantitatem, quæ sufficit ad restaurandum id, quod inevitabili actione corporis fuit consumptum. Qui vero plus ingerit, id ingestum, vel iterum redditur vomitu, aut alvi copiosiore evacuatione; vel corpori traditum plethoram aut obesitatem generat, modo tamen actione corporis id ingestum in laudabilem succum converti possit; si vero etiam a nobis subigi nequit, varia genera morborum parit, ut infra exponetur.

In morbis.

III. Morbo autem aliquo afflicto, qui corpore est debilis, ipsam salubrem cæteroquin mediocritatem non fert: nam actiones corporis enervatæ, quæ debebant ingesta alimenta in bonum convertere succum, nunc permittunt ingesta permanere tali indole, ut erant ingesta; vel permittunt corrumpi, ex quibus igitur non solum alienus generatur humor, sed copia majore ingestorum vires pressæ succumbunt: Quare ægris ne quidem mediocris sanorum quantitas est porrigenda, multo minus major copia. Hinc patet, quam perverse multi agunt ægrorum corpora ultra farcientes, ut languentibus addant vires, cum cibo corpora onusta magis debilitentur.

Convalescentibus.

IV. Convalescens ex morbo corpus obtinet sanum, omni morbi materia liberatum, sed tamen debilitatum ex morbo præcedente: in hoc itaque corpore consumptus est chylus ex massa sanguinis, ablatae sunt causæ in ventriculo famem extinguentes, hinc fiunt famelici, quemadmodum observatur post febrem quartanam antidoto curatam; hoc corpus itaque debile & famelicum si tantum ingerit, quantum expostulat fames, nimium assumet: nam fames illa magnum chyli defectum indicat, sed vires debiliores non valent tam magnam subigere ingestorum quantitatem; quare si in Convalescentibus famem consulentibus nimium ingerimus, quod abundans opprimens vires, & degenerans in alienam indolem, vel novum parit morbum, vel priorem recidivare facit. Utile est igitur in Convalescentibus, non indulgere fami, neque vulgi opinioni, qua statuitur, virium restaurationem

tionem ingestorum quantitati proportionatam, sed paulo minus ingerere, quam fames & communis victus ratio expostulat.

V. Cibus præter naturam copiosior in sanis. (1) Sua ^{Morbum} multitudi- ^{parit.} ne opprimit vires. (2) Actione corporis & humorum commutari nequit in bonum succum, nam si hæc absint, non dicitur Cibus præter naturam copiosior. Expositis his sequentia fiunt. (1) Corpus onere pressum se sæpe liberare conatur per Vomitus, vel Alvi secessum: aut Cibus toti corpori traditus sudorem vel urinam copiosiore parit. (2) Pars ingestorum abundans propriam suam servans indolem, tam in primis viis, quam in circulantibus, mole sua superat agendi æquilibrium, unde præcordiorum gravitas, oppletio, corporis languor, lassitudo, pigritia, somnolentia, quæ omnia sensim evanescunt per subsequenter inediam, & corporis exercitia, quia novo non addito, corporis continuata actione, id quod antea erat abundans, tandem facta evacuatione inutilium, ad mediocritatem redigitur, atque ita solâ abstinentiâ & corporis motu tollitur abundantia, & prævenitur instans morbus. (3) Non semper autem copiosior ingestus cibus tam diu suam bonam & commutabilem servat indolem, sæpe citius in corruptelam convertitur per motum intestinum cibo proprium, priusquam iterata corporis actione id, quod abundat subigi potuit, præprimis si continetur in copiosiore ciborum ingestione. Si Cibus ita fuerit corruptus in primis viis, præbet Cacochyliam, in reliquo corpore Cacochymiam, imò Cachexiam: illi autem morbi non semper subsequente abstinentia & corporis motu superantur, cum actio corporis non valeat quamcumque corruptelam inductam emendare & expellere. Ex hac igitur corruptela multi & varii fiunt morbi, quorum vix potest exhiberi enumeratio, ipsa enim assumptorum varietas diversos morbos parit, & corporis partes variæ phænomena distincta præbent. Quales præterea morbi fiunt in Morbo decumbentibus & Convalescentibus ex copiosiore Cibo, nimis longum foret enumerare.

Ostendit
autem sana-
tio.

VI. Ultimum est demonstrare, num verba *Ostendit autem sanatio* ut signum vel curatio sint capienda? si quis præter naturam copiosiore ingesserit cibum, & dein sequente usu alicujus medicaminis non corripitur morbo, ipsa curatio ostendit nimium fuisse ingestum: sic sæpe ex juvantibus & lædentibus, id est ex modo curationis expiscamur causas. Qui vero nimis ingesserit, & perpendit deinceps, corpus suum non valere tantam copiam in laudabilem humorem convertere, vel si sentiat corpus inde onustum, vel oppletum, format hanc indicationem curativam, corpus liberandum esse ab eo onere, ne deinceps in graviores morbum incidat: ergo in hoc etiam sensu ostendit sanationem. Uterque modus ut Signum & Curatio admitti potest. Mihi autem magis arridet amplecti posteriorem sententiam, quia non est opus, tam anxie per ablationem sequentem examinare, num nimis fuerit ingestum, ipse æger hoc facile indicabit: sed quid agendum, si Cibus ultra naturam ingressus fuerit, id medici est perpendere. Sanare debemus illam abundantiam, ne supra recensita mala fiant, ergo suggerit indicationem Curatoriam. Quali autem modo curari debeat, alibi tradetur.

LIB. II. APH. XVIII.

43. **E**orum, quæ confertim, & celeriter nutriunt, celeres etiam fiunt egestionem.

I.

TRia in hoc Aph: exponenda veniunt. (1) Quæ confertim & celeriter nutrientia dicantur. (2) Cur ea celeres quoque faciant egestionem. (3) qualem inde medici in dirigenda diæta usum habeant.

II. Vo-

II. Vocabulum ἀθρόως, quod hîc *Confertim* exponitur, a ^{Confero} Commentatoribus & affatim & universim exponitur, redu- ^{tim nutri} citurque vel ad quantitatem, vel qualitatem ingestorum. Sed quoniam scopus est res ipsas, quæ in Aphorismis pro- ^{entia} ponuntur, ad majorem usum medicum redigere, minime autem ad eruendum verum Auctoris sensum, Commentato- ribus de vero sensu hujus vocabuli relinquimus suas senten- tias. Hoc loco conabimur adstruere, alimenta facilis co- ãtionis, id est quæ celeriter nutriunt, magna copia, brevi temporis spatio, assumpta, Celeres quoque facere Egestio- nes.

III. Quæ alimenta celeriter nutriunt, eorum partes tam ^{Celeres} laxæ inter se cohærent, ut brevi actione separari possint, ^{egestionem} & adaptari ad ingressum vasorum lacteorum; quæ vero tar- ^{faciunt,} de nutriunt, earum partium firmior est cohærentia, & diu- tius in ventriculo & intestinis morantur, antequam in la- ctea intrare possunt: quæ itaque celeriter soluta sunt, brevi tempore massæ circulanti traduntur, & quæ tarde solvun- tur, longius tempus insumunt, priusquam circulantibus permiscantur. Sed Circulantibus tradita alimenta non ta- men statim evacuationibus sunt adaptata, in hoc quoque organo ulterius sunt elaboranda; non est sine ratione ad- struere, quæ in prima officina facile potuere actione cor- poris subigi, eadem quoque in sanguificationis organo ce- leriter adaptari posse, quare facilis digestionis alimenta non solum citam nutritionem præbent, sed actione corporis quo- que celeriter ad egestionem faciendas adaptantur: hæc me- diocri copia assumpta largam non faciunt egestionem per urinam, vel insensibilem perspirationem, aut sudorem, sed confertim ingesta, id est, magnâ copiâ simul brevi tempo- re copiosas evacuationes faciunt; cum hoc tempore mul- tum suppeditetur materiæ. Sed difficilis digestionis alimen- ta mediocri quantitate assumpta, non possunt augere Ege- stiones, & majori copia ingesta vires opprimunt, ut cor- pus non valeat se liberare ab opprimente onere, neque talia patiuntur tam brevi temporis spatio excretionibus adaptari.

IV. Quibus itaque debilibus post confertim ingesta cele- ^{Ufus hu-} ^{jus observa-} ^{tionis,} riter

riter nutrientia oboritur urina vel sudor copiosior, talis evacuatio, neque est colliquationis signum in Chronicis, neque crisis in Acutis, sed ab assumtis inducta: sed eadem evacuatio sine tali assumptione alimentorum, præcedentia indicare potuisset. Si morbi acuti materia evacuationi adaptata propter corporis siccitatem non exit, optimum est, præprimis si vires simul defectu alimenti sunt debiles, exhibere confertim alimenta celeriter nutrientia, suppeditato enim humido, tanquam vehiculo, facilius eliminatur illa concocta materia, & corpus defectu alimenti languens refocillatur. Quibus ob susceptum externum frigus prohibita fuit insensibilis perspiratio, cum ex materia illa retenta acri febricitant, summum quoque auxilium experiuntur, si confertim celeriter nutrientia cubitum ituri assumant, subsequens in aurora largior perspiratio, vel sudor, id acre retentum simul per cutim vel renes eliminans, specificum febris antidotum prædicatur.

LIB. II. APH. XIX.

44. **A**cutorum morborum non omnino certæ sunt prædictiones, neque mortis, neque sanitatis.

I.

Prædicere posse in morbis aliquid Divinum esse, veteres existimarunt, & quam maxime in hac parte laborarunt, ut ita non solum apud ægros, sed & adstantes & amicos honorem, fidem & auctoritatem aucuparentur. Equidem eximia est pars in medica scientia, in qua nemo plus præstitit, quam Auctor noster, totum enim ejus opus Prædictionibus est plenum, sed in hoc Aph: statim monet, etiamsi

etiam si in sequentibus absolute dicat, hæc vel illa secutura, ita esse accipienda, ut interdum fallant; nempe omnes prædictiones non sunt tam absolute certæ, ut nunquam aliter evenire potuissent. Ut igitur constet, unde petatur in morbis Prædictio certa, fontes Prædictionis rimandi.

II. Quidam morbi, inter quos excellunt Acuti, certum sequuntur ordinem, quem omnes fideles Practici graphice depingunt: V: G: experiētiâ constat, quarto die ab invasionē morbi variolosi incipere stigmata rubra; septimo omnia stigmata in pustulas mutata esse, quarum quædam incipiunt suppurari; undecimo omnes pustulas suppuratas esse & quasdam exarescere; decimo quarto omnes esse in crustulas mutatas & jam incipere decidere. Sed insuper observant, victu & medicatione refrigerante hæc stadia longius infumere tempus; sed victu & curatione calefaciente stadia illa citius absolvi; addunt præterea phænomena, quæ in his stadiis fuere observata, tam in iis, qui convaluere, quam qui moriebantur. Hucusque medicus solam fidelem historiam exaravit, ex qua deinceps formabit Prædictiones: nam si in morbi cursu detexit constantiam, intrepide audebit in morbo jam præsentē præsagire eadem, quæ antea constanti observatione didicit, in antecedentibus semper fieri. Quod enim in antecedente morbo erat Observatio, in sequente commutatur in Prædictionem. Ex hac doctrina facile liquet, quinam prædicere possunt & qui non valent: nam solus is novit præsagire, cui historia certa istius morbi est cognita, indoctus vero si hanc artem excerceat, mirum est, si res prædictioni respondeat. Vidi tamen & doleo, hanc artem æque ab indoctis quam expertis ad magnum vituperium scientiæ exerceri, & quia ægri nesciunt, num prædictio ex constante observatione vel figmento cerebri sit petita, docto & indocto æqualem præbent fidem, donec tandem suo detrimento experiantur, quisnam horum ex Arte Prædictionem formaverit.

Prædictio-
nis fons.

III. Si omnes morbi semper simili modo decurrerent, ut nunquam a tramite eo secederent, Prædictiones tandem æve certæ potuissent formari per longam seriem observationum,

Non om-
nino certa.

tionum, ut quævis alia in rerum natura res certa; sed idem morbus uno tempore aliquo alio ordine absolvitur, aliaque profert phænomena, & exitum habet, quam alio tempore aut in alio homine: hoc mutabile per artem immutabile fieri nequit, & magnam in Prædictione præbet difficultatem. Hinc recte statuit Hipp: Prædictiones non omnino sunt certæ, sed propterea non sunt semper fallaces & incertæ, ut omnem Prædictionem debeamus repudiare. Mathematicum certum in his rebus nullus quærere debet, sed quod fere semper ita observatur in morbis, pro certo admittere tenetur. V: G: Si quis assumsit medicamentum purgantis, & ejus non laxatur alvus, de hoc medicamento non dicet, incertum est purgans, quamvis semel, aut bis in speciali casu fallit, habetur tamen inter certissima purgantia, modo fere semper talem præstet operationem: simili quoque modo deducimus præfagium certum ex apparentibus ægrorum phænomenis.

In Acutis.

IV. Morborum generalis divisio est in Acutos & Chronicos. Cur autem Hipp: selegit Acutos, quam maxime se torquent Commentatores, quasi Auctor hic vellet innuere, Chronicorum Prædictiones certiores esse. Verum Hipp: longe plures Prædictiones habet in suis operibus de morbis Acutis, quam Chronicis, quæ certum exitum ad salutem vel mortem complectuntur, ne igitur in his quæ præcipua sunt & videntur certissima, aliquis judicaret, has Prædictiones nunquam fallere, hoc aphorismo indicare voluit, ne deinceps semper hæc verba repetere deberet. Forfan ad solos morbos Acutos attendere voluit, non indicans Prædictiones Chronicorum certiores esse, nam hic quoque Aphorismus esset verus, si dixerat Acutorum & Chronicorum morborum Prædictiones sunt non omnino certæ, cum veritatem praxim exercentes passim experiantur, Chronicos non minus quam Acutos interdum recedere a consueto ordine

V. Opportunus hic mihi videtur locus, referare difficultates, quæ in Acutis præbent Prognosin incertam. Morbus Acutus non est unicum morbi genus, nam Inflammatorius,

torius, Erysipelatosus, Putridus, & malignus, uno nomine Acutorum morborum recipiuntur. Quum vero inter hos magnum sit discrimen, non est mirum, si quædam phænomena conspiciuntur morbi putridi, & inde formatur Prædictio, ac si orirentur ex morbo Inflammatorio, quod talis Prædictio non respondeat exitui. V. G. salubre est in acutis, si oboriatur hæmorrhagia larga, quia compefcit impetum, temperat calorem, minuit capitis dolorem & pulsationem: At eadem larga hæmorrhagia in morbo putrido mortem præfagit, designans tantam corruptelam in humoribus, quæ vasa perrodit, tantamque fluiditatem, ut undique effluant. Id quoque verum est de sudore & alvi egestione copiosiore, quare medicus etiam peritus sæpe anceps hæret, an bonum vel malum ex sensibili evacuatione sit præfagiendum, non satis attendens ad discrimen, quod est inter dictos morbos, qui tamen, omnes dicuntur Acuti. Ex hoc facile tanquam fundamento multa loca Hippocratis, quæ sibi invicem obstare videntur, nos facile & cum scientiæ incremento conciliare posse autumo. Hipp: enim noster se ubique fidelem gessit observatorem, non ex ingenio depromsit sententias, sed hausit istas ex observationibus coram ægris. Non est ergo mirandum, si plures morbi naturâ distincti eodem nomine proferantur, quod post eadem phænomena bonus & malus exitus fuerit secutus.

LIB. II. APH. XX.

45. **Q**uibus, dum sunt juvenes, alvi sunt humida, iis senescentibus siccantur. Quibus vero, dum sunt juvenes, alvi sunt sicca, his senescentibus humectantur.

I.

SI duo sunt Juvenes eodem victu utentes, quorum unus alvum magis constrictam & siccam habet, alter vero alvum humidam, magisque lubricam, hi si senescunt, fere semper hanc mutationem subeunt, ut alvus sicca mutetur in Lubricam seu humidam, & quæ erat humida, mutetur in Siccam: si vero talis fiat mutatio ex mutato victu, non debet referri ad hanc observationem, ut recte monet Galenus; qui etiam dicit, hanc observationem sufficere, licet nulla adjiciatur ratio. Commentatores tamen varias inquisiverunt hujus mutationis rationes, quas non sumus examinaturi, ne refutando consumatur tempus, nostram solam proferemus rationem, quæ num sit valens, aliis dejudicandum relinquo.

Alvificcio-
ris naturalis
causa.

II. Quoties per alvum egeruntur fæces compactæ, duræ, paucæ, Alvus dicitur sicca a medicis; talis fit, vel quia ab ingestis alimentis & deglutitis & confluentibus in intestina humoribus nimis cito absorbeatur omne humidum, ut nihil nisi crassum, quod lactea intrare nequit, in cavo intestinorum relinquatur: vel ita fit, quia minor humoris copia in intestina confluit, nam si tale fiat ex parciore ingestione, vel victu exsiccante, talia sicciora excrementa ad hanc observationem non pertinent. Ergo in tali juvene vel est promptior humidi absorptio, vel parciior ad intestina confluxus.

III. In

III. In cujus autem intestinorum cavitatem plus humorum confluit, vel in quibus parcius fit absorptio, huic fiunt alvi fæces humidæ, liquidæ & copiosiores, quales quoque fieri possunt per victum humectantem, sed tunc ad hunc titulum non referuntur.

Alvi Humidioris naturalis causa.

IV. Causæ mutantes alvum siccam in humidam, humidam in siccam, sunt eædem, nempe sola mutatio juvenis in senio rem, quoniam eadem causa in eodem subjecto eundem effectum edit, sed in diversis subjectis sæpe contrarium effectum, ita igne liquefit cera, sed argilla in lapidem commutatur, per se igitur patet, nos hujus diversi effectus causam quærere debere in corporibus juvenum, quod nempe causa alvi siccæ per senectutem fere semper convertatur in causam alvum humectantem; & vicissim causa alvi humidæ naturaliter commutetur cum ætate in causam exsiccantem.

Causæ mutantes.

V. Quibus juvenibus est corporis robur, quo humores quam maxime compinguntur, & qui compingi nequeunt, per insensibilem perspirationem diffillantur, his caro durior, compactior, corpus gracilius, sed tamen viribus pollens; quoniam talis juvenis confluentes in intestina humores promte absorbet, & derivatio ad cutim pro insensibili perspiratione largiore est major, quæ in intestinis restitant, sicca esse debent & compacta. Talis autem juvenis robustus senior factus, naturali lege naturæ istius corpus sensim fit minus potens; minus igitur compinguntur humores, absorptio ex intestinis languidior, perspiratio minor, ergo ab eodem victu nunc, & in intestinis, & in reliquo corpore, plus humidi colligitur, inde sæpe ob abundantiorum humiditatem alvus sensim incipit magis humectari, & corpus pinguescit.

Alvum siccam in humidam.

VI. Quorum vero juvenum corpora sunt humida, succulenta, mollia, & tamen valentia, facile hæmorrhagiam ferentia, qualia corpora fæminarum solent multum sanguinis menstrui fundere, & copiosum post partum generare lac. Talia autem corpora juvenum cum ætate debiliora facta, minorem humorum confectionem faciunt, quemad-

Alvum humidam in siccam.

modum quoque tales foeminae sensim parciores menses habent, & minorem lactis copiam generant. His igitur, quia parciior succi pancreatici, hepatici, ventriculi copia in cavum intestinorum ferri incipit, contenta intestinorum minus diluta, sicciora & magis compacta debent reddi, atque hoc solummodo ex naturali mutatione, quae omnibus hominibus accidit: nam si ex morbosa causa hae mutationes inducantur, observatio haec non deberet restringi ad sanam mutationem, ut fecit Hipp: sed ad morbosam.

LIB. II. APH. XXI.

46. **F** Amem vini potio solvit.

I.

F Ames duplici modo accipi potest: naturalis nempe in sanitate, vel praeternaturalis in morbis, quia vero hic absolute ponitur, videndum, quomodo fames tam naturalis, quam morbosa solvatur vini potione.

Fames naturalis an solvatur vini potione.

II. famem naturalem in nobis concitari, si ventriculus sit vacuus, Chylus fere omnis in reliquo corpore consumtus, quando vel a proprio succo, vel succo pancreatico reflunte, vel bile, excitetur quidam in ventriculo sensus, quem alimentis solemus placare, demonstravimus (*Exerc. III.*) si vini potio potest tollere istas causas famem concitantes, Hipp: veritatem dixit. Verum si quis vinum bibat, quod confectum est ex succo uvarum, fermentatione mutatum, aliquid ingerit nutrititii, itaque post vini potionem ventriculus non amplius est vacuus, atque vini dilutione temperatur naturalis acredo in confluentibus & jam collectis humoribus in ventriculo, quare sensus hujus affectionis redditur minor: sed quia eo major est fames, quo major fit affectio

fectio, inde necesse est in perfecta sanitate, ut vini potio minuat famem.

III. Huic sententiæ quam maxime obstare videtur, multos homines ante prandium & cœnam potare vinum, ut desidem appetitum ergant: si enim vini potio solvit famem, hi homines perverse agerent, cum tamen experiantur, a vini potione augeri appetitum. Qui ita simpliciter hæc dicta perpendit, existimaret, hæc sibi invicem omnino obstare, verum qui animadvertit, nos posuisse perfectam sanitatem, & in eo casu agitur de quadam inappetentia, si ergo quædam sit inappetentiæ causa, quæ vini potione tolli potest, certe in hoc homine vini potione ad prandium vel cœnam intentetur fames. V. G. Qui laborat ventriculi laxitate & visciditate, ita ut ventriculus affici non possit muco obfessus a refluyente bile in ventriculum; huic, si ingerat vinum, vel & spirituosum, quæ solvunt mucum & ventriculum vi calefaciente & constringente exagitant, fiet fames major, cum post assumptionem vinosi, vel a vinoso aut spirituosum ipso, vel validiore applicatione laterum ventriculi ad contenta, aliquis in ventriculo concitatur sensus, quem famem vocamus.

Cur quidam potant vinum ad famem excitandum.

IV. De fame morbosa non tam certum potest ferri iudicium, illa enim ex multis causis potest generari, quarum quædam minuuntur, quædam vero non per vini potationem. Eligamus ex multis unicam causam excitantem famem non naturalem, ut in bulimo, quod ventriculi contenta acriora inter plicas ventriculi hærentia præternaturalem famem excitent: quæcunque id acre applicatum diluunt & remonent a ventriculi lateribus, quibus applicata suâ vellicatione sensum famis excitabant, equidem in tali casu per ipsam dilutionem temperaretur sensus famis.

Fames morbosa an solvatur vini potione.

LIB. II. APH. XXII.

47. **A** Repletionem quicumque fiunt morbi, evacuatio sanat. Et quicumque ab evacuatione, repletio: Et aliorum contrarietas sanat.

I.

Duas profert Hipp: curationis regulas in hoc Aph: unam in Repletionem per Evacuationem: alteram in Inanitionem per Repletionem. Ex quibus denique generalem Conclusionem format, *Contraria contrariis medentur*. Quare primo examinaturi sumus, an in Repletionis & Inanitionis morbis hæc curationis regulæ sint universales & semper observandæ, deinceps, num conclusio illa generalis ad omnes morborum curationes possit applicari.

Quinam
sint Reple-
tionis mor-
bi.

II. Repletio tunc est, quando major humorum est copia in corpore, quam ad sanitatem conservandam requiritur: Quoniam triplex est in nobis humor. (1) Chylosus ex alimentis assumptis confectus, quo nomine quoque completor ipsa alimenta assumpta, nondum in chylum conversa: hujus repletio *Satietas* vocari potest, quam quoque significationem admittit *πλησμονή*. (2) Bonorum humorum tanta copia, ut inde æquilibrium inter humores & causas agentes destruat, qualis Repletio plerumque vocatur *πληθώρα*. (3) Humor excrementitiorum & morbosorum in corpore redundantia, quæ *κκοχυρία* vocatur. Hæc tria genera humorum suos morbos per solam abundantiam inferre possunt: qualia tunc conspiciuntur symptomata, illa dicuntur morbi Repletionis. Vel dicti humores diutius in corpore manentes, inductâ corruptelâ nova symptomata inferunt, seu fiunt alii morbi Repletionis. Hos autem morbos,

bos, quamvis producantur ex aliena qualitate, ad morbos repletionis referri, constat ex annumeratione morborum, qui formantur ex mensibus retentis vel hæmorrhagia consueta suppressa, quamvis non sint symptomata repletionis sed corruptelæ supervenientis.

III. Satietatem & plethoram evacuatione sanari, nullum est dubium, nam per ablationem abundantiae restituitur æquilibrium: an vero hoc quoque procedat in Cacochymia, & quando reliqua abundantia per corruptelam mutata, non tam liquide constat. Nam quibus ex suppressis evacuationibus, vel per degenerationem humorum fuit, nata Cacochymia, solis evacuantibus a morbo liberari nequeunt, quoniam materia illa, antea evacuationi apta, per corruptelam inversa, non tam promte eliminari possit; & etiamsi educatur, morbosa labes partibus firmis illata, post omnem evacuationem restaret. Omnis enim materia morbosa non est educenda, nisi sit præparata (vid. Aph, 22, v & vii.) Igitur distinctione opus est, qui hanc regulam generalem ad praxin vult applicare, ne cujusvis humoris repletionem hoc loco intelligat.

An quoscumque Repletionis morbos vacuatio sanat?

IV. Ut ex humorum abundantia destruitur æquilibrium, ita etiam ex humorum Defectu, per auctam evacuationem inducto, ab altera parte destruitur æquilibrium. Si per copiosiores Evacuationes Defectus sit natus, remanens humor non est opus ut alienam possideat qualitatem; sed non diu durat, quin ex hoc destructo æquilibrio multi quoque generentur morbi. Quare etiam duplex genus morborum ab evacuatione: vel merus defectus & symptomata inde nata, atque morbi ex superveniente corruptione.

Evacuationis & defectus humorum morbi quoniam?

V. Quoniam in defectu humorum nihil alieni est in corpore, facilius videtur ille morbus curari posse, quam qui fit abundantia, quoniam sæpe adjunctam habet alienam qualitatem: sed si penitius inspiciantur auxilia, multo facilius erit morborum ex abundantia curatio, quam ex Defectu per Evacuationem. (1) Evacuatio ipsa si morbum fecit per Defectum, non subsistit protinus, sed valemus imperatâ abstinentiâ abundantiae suppetias subtrahere, quibus detractis, corpus ipsum sine medicamenti auxilio, minuit abundan-

An hi morbi Repletionis curandi?

tiam; Evacuationum autem sæpe multi laboris est compescere, vel moderari. (2) Purus defectus difficilior suppleri potest, quam pura abundantia minui. Copiosiore addito nutrimento non suppletur Defectus; quippe alimentis non satis actione corporis subactis & in bonos humores conversis, refarcire defectum frustra molimur (vid. *Aph. 3, v* ;) his enim impletum corpus scateret crudis. Et quia semper in humorum Defectu est virium imbecillitas, non erit facile per Additionem refarcire, quod deficit. Verum abundantiam solam promte valemus vomitoriis, purgantibus, sanguinis missione, & abstinentiâ ita minuere, ut non amplius abundet. (3) Quod si per Defectum alii fuere induti morbi, illa materia corrupta si educatur, major inducitur Defectus; tale corpus Replere, addit cruda; inde summa in curatione difficultas, ut superius (*Aph. 32, iv & v*) demonstravimus.

Contraria
contrariis
medentur.

VI. Tandem examinare restat, num ex præcedentibus regula generalis curationis elici possit *Contraria contrariis mederi*. Ex iis, quæ disputavimus satis constat, non omnem Repletionem curari ablatione, neque omnem Defectum tolli Repletionem, non valemus itaque inde generalem formare conclusionem, sed duntaxat sæpe Contraria contrariis curari. Quoniam hanc regulam multi universalem faciunt, operæ pretium erit, quasdam proponere exceptiones, ut satis constet, quam circumspecte nos debeamus ad omnem casum hanc applicare regulam. Qui laborant hæmorrhagiâ ex abundantia & impetu majore, curantur sanguinis missione. Febris cacochymica febre curatur. Pars gelu contracta solvitur nive applicatâ. Quæcumque perfrigerata sunt, excalefacere oportet, præterquam a quibus sanguis erumpit, aut erupturus. Alvi fluxus sæpe per purgans, & vomitus per vomitorium tollitur. Inflammatio mitescit tepidis applicatis, recrudescit ab actu frigidis. Pars combusta non fert actu frigida. Ex istis & multis aliis exemplis, quæ adduci potuissent, abunde constat, hanc regulam non esse generalem, sed sæpe locum habere.

II. A P H. XXIII.

48. **A**cuti morbi in quatuordecim diebus judi-
cantur.

I.

Quid sit morbus Acutus, & quinam varii morbi hoc nomine intelligantur, superius (Aph. 24, III.) definivimus; hos morbos nunc dicit judicari (vid. Aph. 20.) quatuordecim diebus, id est: intra istud temporis spatium, sive septimo, undecimo die ab invasione, sive ipso die decimo quarto notabilem facit mutationem, vel ad mortem, vel ad salutem; vel ad melius, vel deterius. Cum vero morbi Chronici sæpe longum tempus insumant sine notabili mutatione.

II. Qui omnium apparitionum reddere conantur rationem, sæpe ipsa ratio observatione constante est obscurior, & in multos non raro incidunt errores: Quod morbi acuti veri intra quatuordecim dies notabilem mutationem faciant, tam constans est observatio, ut si non fieret in aliquo morbo, is non reciperetur in Acutorum morborum classe. Qui ulterius urget, exigens hujus temporis termini rationem, existimans se tale ex veritatis amore petere, meo arbitrio eum a vera ratione aberrare, puto, ut facile liquebit, si terminus temporis ad alias res applicetur. Ut si quis quærat, cur non omnes plantæ eodem tempore florent, fructusque maturos proferunt? Cur non omnia animalia idem tempus gestationis habent? Cur una planta quotannis, alia perennis? & centena talia. Equidem tandem invitus cogeretur fateri, Deum in creatione omnibus his terminum temporis præscripsisse, nos nescire, ex qua lege

Cur Acuti intra quatuordecim dies judicantur?

alia cuncta hæc eundem semper fervent. A nobis tamen plus exigunt sciscitantes materiæ morbi mutationes, num ex quadam lege alia hunc temporis terminum fervent. Cum vero rerum naturalium perscrutatores sint contenti, perpetua observatione constantem temporis terminum in aliqua re invenire, nos quoque non nimis curiosi contenti esse debemus, morborum acutorum materiem intra hoc tempus semper notabilem subire mutationem, hocque constare intes medicos a vetustissimis, ad hoc usque tempus per continuam observationum seriem. Hunc autem terminum non tam fixum esse, quin possit prolongari & minui, nihil derogat, idem quoque in reliquis rebus naturalibus observatur; calor enim major applicatus præcoces profert fructus, & frigus maturitatem retardare valet. Quare tempus hoc solum nititur constanti practica observatione, quæ si non fuisset indagata, fateor, nos nunquam potuisse ex fabrica corporis, vel examine humorum hoc tempus in morbis rimari. Ita multa sunt in morbis, quæ latuissent physiologicos, cum talia per solas observationes in praxi sunt eruenda. Hinc quisque facile perspicit, subtilitates physiologicas in scientia medica utiles esse, nondum tamen valere cuncta, quæ in morbis accidunt, perscrutari. Morbus enim est res aliqua diversa, non semper servans leges in sanitate detectas: quare utile est praxin exercenti, ut non minus se in observationibus practicis exerceat, quam ut solis subtilitatibus theoreticis totum tempus terat.

LIB. II. APH. XXIV.

49. **S**eptimorum quartus est index. Alterius septimanæ octavus est initium. Notandus vero undecimus: is enim quartus est alterius septimanæ. Notandus rursus decimus septimus: hic enim est quartus quidem a decimo quarto, septimus vero ab undecimo.

I.

Postquam posuerat Hipp: Acutos morbos in quatuordecim diebus judicari, hoc loco voluit istos intermedios dies accuratius definire. Dividit igitur XIV. dies in duas septimanas; prioris initium est ipse dies invasionis; alterius est dies octavus ab initio, adeoque utrique septimanæ tribuit septem dies integros, nam finis prioris septimanæ est dies VII. & finis posterioris, dies XIV. Isti dies Critici dicuntur, sed dies IV. & dies XI. sunt Dies judices, quibus diebus conspicerentur in morbis Acutis mutationes, indicantes, vel VII. vel XIV. die futuram esse crisin. Si ergo ponatur dies octavus pro initio secundæ septimanæ, utræque septimanæ pari divisione dierum distinguuntur. In morbis autem intermittentibus quivis paroxysmus pro uno die numeratur, dies vero apyrexiae vel induciarum non numerantur, adeo ut paroxysmus quartus, septimus, undecimus & decimus quartus habeantur pro tot diebus, etiamsi multi dies interim præterlapsi fuerint, in quibus nullus fuit morbi paroxysmus. Quomodo vero fit reliquorum dierum annumeratio & denominatio, aliis locis tradetur.

Dierum
criticorum
annumeratio.

Num dies
Critici sint
observandi?

II. Inter Practicos longo tempore fuit dissidium, num Dies Critici, quemadmodum traduntur ab Hippocrate & Galeno, in ægris observentur, num aliquem habeant in arte medica usum. Nonnulli tanquam pro aris & focis contendunt, in morbis observari, non quod ipsi istos observaverunt in Praxi, sed quia ab Hippocrate & Galeno rotundis verbis, quemadmodum in hoc Aphorismo & multis aliis locis, descripti inveniuntur, quasi quæ ab his sunt dicta, quamvis non observentur in praxi, satis essent firma. Alii vero hanc sententiam oppugnant, non solum rationibus ex non respondente lunæ cursu, sed experientiâ in multis ægris, in quibus incertis diebus evacuationem criticam observaverunt Acutorum; verum etiam loca multa ex Hippocrate adducunt, ex quibus constat, his diebus Crisin non fuisse factam, sed omnino alio die. Et ut tamen rationem reddant, cur Hipp: hos dies ita descripserit, existimant morem sectari medicorum sui temporis, atque veteres, qui arcana in dierum numero quæsierunt. Res ergo de diebus Criticis, de quibus tot libri sunt conscripti, relinquitur in incerto. Id autem certum est, si Dies Critici in Acutis magni momenti sunt æstimandi, male ageret medicus, si hos non observaret: si vero nullum certum habent, frustra laboramus tam accurate istos sectari.

Impedi-
menta ob-
servationis.

(1) Acuto-
rum varie-
tas.

III. Hanc sententiam tam misere agitatam fuisse, ansam dedit. (1) Morborum diversitas, qui uno nomine Acutorum proferuntur: si enim acutorum morborum unica & simplex esset causa, forsan aliquid certi in terminis dierum quisque medicus observasset; sed si varias causas, varias species morborum uno nomine complectimur, quorum una causa suggerit constantibus temporibus suas mutationes, altera vero omnino sine ullo ordine incedit, non est mirandum, a quibusdam in diebus Criticis aliquod certum inveniri; ab alio vero medico cuncta incerta; imo non erit quoque mirum, si Hippocratis scripta, qui ex fide passim, quemadmodum in ægris detexit, observationes vel inde deducta dogmata scripsit, rimamur, sæpe inveniri, aliis quoque temporibus bonam fuisse factam crisin, vel omnino nullam diebus cri-

cri-

criticis. Medicos autem per morbum acutum intellexisse Inflammatorios, Erysipelatosos & Putridos, atque interdum Malignos, modo haberent adjunctam febrem, imo quosdam ex morbis cum minore motu vitali, uti Apoplexiam & multos alios, ex iis, quæ superius disputata sunt (Aph. 24, III) abunde colligi potest. Quia vero dicti morbi in mutationibus producendis toto cælo sæpe distant, non est mirum, cum tamen omnes isti morbi uno nomine proferuntur, quod in compositis hujusmodi morbis sæpe contraria observentur.

IV. Alterum impedimentum, quod non minorem difficultatem parit, est *Dieta* varia & Regimen; quidam versantur in calidis & calefacientibus, alii laudant Regimen frigidum; alii venam secant, alvumque ducunt, & nil nisi antiphlogistica in acutis crepant; dum alii in eodem morbo per Alexipharmaca malignitatem satagunt ex cutis poris eliminare: ætas quoque varia & habitationis loca citiori vel tardiori maturationi favent. In tanta quæso rerum diversitate si agitetur morbus, qui ex sua natura certum habet temporis terminum, nonne unus bis potuisset absolvere totam periodum, dum alter vix pervenisset ad acmen. Imo vero hodie norunt media hyeme calore artificiali conciliato æstivos producere fructus. Atque media æstate in locis subterraneis creare glaciem. Sed si quis inferret, omnino incertum esse rerum ordinem, nemo huic haberet fidem; & tamen fidem præbent medicis, qui perversa curatione sua totum invertunt rerum ordinem, in morborum criticis diebus nihil certi inveniri.

(2) Varia
Dieta, medicatio,
Clima, Ætas.

V. Ex iis, quæ disputavimus, Criticorum dierum ofores nullam gloriam asportare possunt, nisi quod in omnibus morbis sic dictis Acutis non observetur certus temporis terminus; sed propterea non sequitur, omnes morbos acutos diebus criticis carere. Quia vero maxima pars Acutorum ex Morbis Inflammatoriis constat, qui vel resolvuntur, vel abeunt in suppurationem, aut sphacelum, atque interdum in putrilaginem, in his, inquam, si naturæ ordo non turbetur, accuratissime tempora Critica observantur, nisi mor-

Criticos
dies in A-
cutis In-
flammo ato-
riis obser-
vari.

bus transeat in Putrilaginem. Fidem habeo ex manifestissimo morbo inflammatorio, variolis nempe benignis; nullus medicorum est, quin novit, quarto die erumpere exanthemata, septimo die suppurari, undecimo incipere exarescentiam, decimo quarto decidere arefactas variolas. Tantum in hoc valet naturalis & constans morbi mutatio, ut inde probati medici hunc morbum in quatuor stadia distinguant; eandem quoque constantiam in febre inflammatoria observamus. Qui vero variolas regimine calido tractat, citius facit, non tamen minori periculo absolvi hæc stadia: qui vero variolas aggreditur refrigerantibus, stadia sæpe ad longius tempus protrahit; nondum tamen constat, Criticos dies inde ex sua natura incertos esse. Si vero variolæ abeunt in putrilaginem, quemadmodum in confluentibus non raro observatur, post eruptionem stadia omnino incerta sunt, adeo ut variolæ ultra viginti dies persistant. Ex hac ratione statuo, Criticos dies esse observandos in morbis Acutis, sed ne fallamur ex adjunctis signis, morbus Acutus in suas species est distinguendus, atque solummodo in Inflammatoriis hæc rimandæ mutationes, quæ a veteribus ad Criticos dies referuntur.

Causa criticorum dierum.

VI. Hac non contenti observatione practica, in morbis inflammatoriis causas hujus temporis conati sunt investigare, eamque plerique quæsierunt in lunæ cursu, alii in stellis; sed quia Criticorum dierum osiores facile perspiciebant, omni tempore, & etiam contrariâ Lunæ phasi fieri Criticorum dierum annumerationem, eamque non referri ad Lunæ cursum, sed incipi numerari ab invasione morbi, quæ omni die fieri potest, hanc totam doctrinam non immerito repudiarunt. Quare theoria Criticorum dierum huic doctrinæ semper obfuit. Verum quia, ut supra monui (*Aph.* 48, II.) constantes mutationes sunt petendæ ex materiæ morbi natura, quæ eodem modo, ut plantarum semina, certo tempore ad maturitatem veniunt, florent & ferunt fructum, solummodo restat sedulo perscrutari, an non possimus ex observationibus practicis Criticos dies magis firmare, & ab erroribus, qui ex præpostera theoria irrepserunt, depurare.

VII. An.

VII. Antequam Criticam evacuationem molitur natura, quæstio est, an non prius concitet in corpore mutationes, quæ sensibilia proferunt phænomena, eaque finito tempore prægrediantur; an vero crisis fiat sine præviis phænomenis. Si vero natura talia moliatur, quæ instantem Crisim præfagiunt, & in iis servat ordinem, non erit sine ratione æque admittere Dies Indices, quam Criticos. Nullam hîc inveniri impossibilitatem, ex iis, quæ superius disputata sunt, plane constat: Quippe non eodem tempore planta floret & fert semina matura, sed flores sunt frugum prodromi, & ex florendi tempore dejudicamus quoque, quo tempore matura sunt expectanda semina, neque pustulæ erumpentes in variolis statim sunt pure plenæ, sed ex tempore eruptionis determinatur maturitatis tempus. Illi igitur sunt Dies Indices, in quibus oboriuntur phænomena, instantem evacuationem præfagientia.

Dies Indices.

VIII. Hippocrates passim alique Practici notant, si quarto die quædam apparent phænomena, septimo die futuram esse Crisim, si vero undecimo conspiciuntur, nos decimo quarto die expectaturos evacuationem Criticam: adeoque inter florendi & maturitatis tempus præterlabitur tempus trium dierum; num vero hoc sit possibile, vel impossibile, non disputo, quia sola observatione practica veritas hæc firmatur, quæ me multosque alios practicos docuit, regulariter ea fieri, quæ Hippocrates notavit. Nonne unusquisque liberrime fatebitur, si videat septimo die ab invasione variolarum inchoare hinc inde pustularum suppurationem, regulariter omnes pustulas undecimo die maturas fore & decimo quarto decidere. Quod si itaque quarto vel undecimo die in urina conspicio rudimenta seu inchoatam coctionem, nulla est ratio dissuadens, ex his signis apparentibus, hoc tempus vocare Diem Indicem. Dierum itaque Criticorum & Indicum doctrina firmo nititur talo, sed ex oscitantia, perversa medela, permissione multorum morborum a non satis in praxi attendentibus ad veterum nugæ, hæc temporum observatio damnata fuit.

Quantum
distant a
Criticis.

LIB. II. APH. XXV.

50. **Q**uartanæ æstivæ plerumque fiunt breves :
autumnales vero longæ , & maxime , quæ
prope hyemem incidunt.

I.

Critico-
rum die-
rum obser-
vatio firma-
tur Quarta-
nâ.

ANtequam redditur ratio, cur Autumnales febres quar-
tanæ vernalibus plerumque sint longiores, non erit
inutile, ex hoc Aphorismo adstruere veritatem Die-
rum Criticorum. Superius notavimus, solos dies paroxysmi
numerari, ad intermedios apyrexia non attendi. Regulari-
ter autumno incipientes Quartanæ evanescunt vere; adeo-
que æger per 180. dies circiter premitur a febre, in quo tem-
pore fiunt 60 paroxysmi. Hippocrates observavit in morbis
longioribus quam dies 40, annumerationem fieri debere per
vicenarium numerum. Inde 60, 80, 100 sunt ipsi dies
Critici. Itaque febris quartana legitima, nulla perversa
curatione aut errore victus turbata, satis respondet huic ter-
mino. Sydenham (Cap. v. *de Febris Intermittentibus. An-
norum* 1661, 62, 63, 64) sedulus morborum perscrutator,
nulli addictus hypothese, ex meris observationibus, ut fe-
cit noster senex, firmare & excolere studens medicam
scientiam, in eadem quoque est sententia, in Quartana
scilicet febre Criticorum temporum habendam esse rationem,
victus constante observatione, hic sola naturæ vestigia pre-
mens, hæc profert verba, quod *Continua conceptam semel ef-
fervescentiam convexis, unoque tenore persciant; Intermittentes au-
tem partitis vicibus, ac diversis temporibus, eadem defungantur.*
*Interim in utrisque fermentatio naturæ ductu peragitur spatio hora-
rum 336. aut circiter.* Hic igitur vir in practica observatio-
ne

ne fidelis, victus observatione constante, voluit per numerationem horarum, ad tempus quatuordecim dierum restringere seu ad spatium 336 horarum, posuit pro singulo paroxysmo quinque horas cum dimidia. At vero inter nostrum & Sydenhami calculum nulla est differentia essentialis, volumus enim utrique quartanam febrem diebus criticis finire, illè ad hoc faciendum facit additionem horarum, quibus premitur æger a paroxysmis, ego autem pro singulo paroxysmo posui integrum diem, sed sive quis meum vel Sydenhami sequitur calculum, constat tamen, febrem Quartanam sequi Dies Criticos: dum Sydenham Quartanam perstringere voluit ad morbos acutos, ego vero ad morbos longiores, seu qui ultra XIV. dies excurrunt.

II. Antequam de febris Quartanæ longitudine & brevitate agitur, constare debet, qualem febrem medici intelligant per Quartanam. Omnes febres Essentiales dividunt in Continuas, Intermittentes & Remittentes. Ex Intermittentibus, quæ per paroxysmos invadunt, & intermedias inducias faciunt, una est, quæ relinquit duos inter paroxysmos dies sine ulla febrili exacerbatione, hanc vocant Quartanam legitimam, quam quoque Hipp: hoc loco intelligit. Hæc vero si duplicatur, duobus diebus successivis paroxysmum facit, unum diem pro apyrexia relinquens, hæc dicitur duplex quartana, denique si omni die exacerbatur, eam vocant quartanam triplicem. Interdum aucto morbo & corporis viribus debilitatis, ita protrahuntur duplicati paroxysmi, ut mentiantur febrem Remittentem vel Continuam. Ex his solis, hoc loco intelligit puram, legitimam febrem Intermittentem Quartanam, quæ nullam commotionem febrilem duobus intermediis diebus facit, nullumque alium habet adjunctum morbum, in corpore ceteroquin sano & robusto.

Quartana
febris.

III. Inutile foret tempus vernale describere, & adstruere, hyemem semper prægredi; at inde deducere, cur vernaes Quartanæ propterea fiant breviores, quam quæ adoriuntur autumnò, altioris est indaginis. Ut ordine proceda-

Vernalis
cur brevior

damus, investiganda sunt, quæ nobis naturaliter fiunt hyeme, & qualem mutationem vere subeant. Hyeme aëris frigiditas facit, nos sine incommodo ferre posse majus pondus humorum (vid. *Persp.* 193.) Eodem quoque tempore vix ulla fit in humoribus putredo: superveniens vero calor copiosiore difflationem facit (*Conf. Aph.* 12, VI.) Qui morbi igitur ex deficiente motu, parciore difflatione in corpore fuere nati, ab accedente calore facilius solvuntur & per insensibilem perspirationem diffiantur; quare regulariter non solum febris quartana, sed & alii morbi vernaes observantur breviores.

Autumnalis cur longior?

IV. Ut Hyems Ver, ita Æstas prægreditur Autumnum; sed in æstate solis calore corpora magis ad putredinem disponuntur, quod attenuatum invisibiliter exhalat, verum accedente Autumno minuitur insensibilis perspiratio, colligitur corruptum in corpore, nam corpora Autumno solito sunt ponderosiora. Atque corruptibilia in ambitu telluris hærentia corrupta, virus emittunt, quod tam diu elevatur, ac aëris calor valet discutere vapores; sed vero accedente frigore, non desinunt tamen corrupta exhalare virulentiam, verum hæc in aëre, quem inspiramus, hærens, nostrum corpus coïnquinat; unde toties nascuntur morbi Autumnales præprimis post æstatem æstuantem. Adeoque hoc tempore frequentior est causa corpus inficiens autumno, quam vere: atque nos, ob parciorem difflationem, receptam infectionem retinemus frequentius: imo quod inficit, pertinacius est, utpote corruptum, quod non patitur actione nostri corporis emendari, dum cruda vere accepta iteratâ tandem corporis actione assimilantur. Si igitur ex tali recensita causa formetur in Autumno febris quartana, non est mirandum, eam diutius persistere, quam si materia vernalis, quæ emendari & expelli facilius potest, quartanam concitaverit. Hæc omnia vera inveniuntur, si actione vitæ quartanæ materia sit subigenda & expellenda; sed si detectum habeatur antidotum, exstinguens illam virulentiam, ut acidum & alcali se mutuo exstinguunt, non erit opus

opus tam diu tolerare quartanam. Sed quia Hipp: hîc agit de quartana, si actione vitæ curetur, curatio per antidotum hîc non debet examinari.

V. Observavit præterea, quo propius hyemem, id est, mense octobri, vel novembri, adoritur quartana, eo longior rem esse. Ego vero in praxi febris quartanæ observare non potui; sed an verum vel falsum sit, non disputo: hoc autem inveni, non in omnibus epidemicis constitutionibus febris quartanæ, eas æque pertinaces esse.

Quo propius hyemem ingruunt, eo longiores.

LIB. II. APH. xxvi.

51. **F**ebrem convulsioni supervenire melius est, quam convulsionem feбри.

I.

Corpus morbo tentatum, non immune propterea est aliorum morborum, sed interdum alio insuper corripitur: novus accedens morbus vel potest ex eadem oriri causa, ut prior, vel sua causa propria. Regulariter quo una causa plura profert mala symptomata, quæ seorsim considerata tot dicuntur morbi, eo majorem causam declarat: interdum vero quædam symptomata ex eadem causa concitantur, quæ futuram solutionem potendunt, sit sudor copiosus in febre, si absolute consideretur sudor copiosus, vocaretur morbus, sed nunc in febre oboriens, signum est solutionis. Si vero novus morbus accedat ex alia causa, illa potest corpus quoque aggravare, quia pejus est duobus morbis affligi, quam uno; interdum tamen accedens causa valet priorem extinguere, aut concitato motu, vel evacuatione priorem curare. Ergo non potest ex generalibus constare, quid sit melius aut pejus, sed debemus hoc perpendere in singularibus casibus, quemadmodum hîc

Morbus morbum sæpe supervenit.

facit Hipp: faciens comparisonem , inter febrem & convulsionem, quinam horum morborum primus veniat, melius vel pejus indicium præbeat.

II. In proposito aphorismo duo citantur morbi, Febris nempe & Convulsio, qui se mutuo sequi possunt, non tamen perinde est, quisnam horum primus veniat. Aliis in locis dicit Auctor, febrem supervenientem solvere Convulsionem, & a convulsione superveniente perire, qui correptus est febre: hoc autem loco comparisonem facit melioris & deterioris. Observavit quidem noster Senex hanc in praxi veritatem, qualis vero subsit causa differentiam ponens, Commentatores maxime laborant investigare. Inde provenire debet, quod febris possit minuere, vel expellere Convulsionis causam, verum Convulsio non valeat febris causam tollere, verum eam potius augeat, vel denotet, novam morbi causam aggravantem accessisse. Igitur opus est, generales Febrium & Convulsionum causas & effectus rimari, ex quibus hæc veritas est elucidanda.

Convul-
sionis defi-
nitio.

III. In nostro corpore vivente duo diversi præprimis motus observantur, unus qui vocatur vitalis, in quem nullum exercemus imperium; alter vero animalis, qui a nostro arbitrio dependet. In motu vitali, qui consistit in alternatione constrictione & relaxatione, quam diu sumus sani, hanc invenimus legem, ab omni irritatione vel stimulo facere vel vibrationes suas frequentiores & potentiores, vel producere continuam constrictionem, quem motum Tonicum vocant, sed ab Hippocrate Tetanus. Quod si motus alter-
nus fiat potentior & regularis, adjacentes humores quam maxime propellit, & corpus aucto attritu incallescere facit; sed inordinate si fiat & simul valide, tunc in organo vitali vocatur Convulsio; si vero successive fiat per aliquod organum & adjacentes partes, vocatur Convulsio flatulenta. Talis motus alterne constringens violens in musculis motus animalis, etiam vocatur Convulsio, quæ si validior cum sensuum extinctione, Epilepsiam vocant. Constante observatione practica experimur, ex multo minore causa generari

Con-

Convulsionem in organo vitali, quam animali, frequentior enim fit convulsifica intestinorum & ventriculi agitatio, quam Convulsio in membris externis.

IV. Febrem autem definire haud facile est, quia tria stadia diversa observantur, quæ tamen omnia vocantur febris: ita in initio dum frigus urget cum motu vitali minore; in vigore dum Calor est ingens cum motu vitali aucto; in remissione dum sudor erumpit, redeunte motu vitali ad solitum tenorem, cuncta hæc ita distincta tamen vocantur uno nomine febris. Si hæc ab aliqua interna causa inferuntur, plerumque noxium hoc incipiens agere, sistit motum vitalem, sed dein pergens, quammaxime motum vitalem instigat, quo transfluentes humores commutantur fere omnes (nam putrefactum & compactum, hoc motu non assimilatur) ex sua natura in indolem nostram primo, sed Dein pergente motu aucto vel compinguntur in Lentorem vel deteruntur in Excrementitium. Hoc absoluto stadio, dum languere incipit ille motus, quod in excrementitium fuit conversum, per emunctoria cutanea sub forma sudoris eliminatur, atque sanguis hoc majore motu compactus sensim iterum incipit liquefcere.

Febris definitio.

V. Si nunc causæ & effectus convulsionis & febris inter se conferantur, facile erit definire, cur in convulsionibus quibusdam, si febris veniat, fiat solutio. Frequens enim causa convulsionis est acrimonia cruda, quæ ex spontanea mutatione est nata, quæque motu circulatorio aucto subigi potest & expelli, hæc ergo irritans nervos, faciens convulsionem, per motum vitalem auctum in secundo stadio febris subigitur sæpe, atque demum una cum sudore febrili in tertio stadio febris expellitur. Quare quoque hujusmodi Convulsiones per calefacientia aromatica curantur: non quod illa medicamenta specifica virtute extinguant acre, Convulsionem faciens, sed instigando & roborando motum vitalem hæc materies vel assimilatur, vel expellitur. Utique omnis naturalis concoctio in nobis viventibus hoc motu absolvitur, si moderatus sit, vel & paulo major:

Febrem convulsioni supervenire melius est.

jor: verum si multum augetur, multa quoque destruit, & optimam præparationem invertit. Est enim in nobis Coctio talis materiæ morbi commutatio, quâ amplius non valet symptomata morbosâ producere, vel qua ita invertitur, ut, quæ antea non potuit evacuari, nunc possit per organum secretorium a reliqua massa segregari. Quæ commutatio producitur motu circulatorio moderato, aut paulo majore, quam qui fit in sanitate. Nam languidior circulatio permittit spontaneam corruptelam, & validior nimis compingit.

Convul-
sionem fe-
bris supervenire
pejus
est.

VI. Si autem quis febre correptus convulsione tentatur, sive illa oritur ex eadem febris causa, sive ab alia accedente, nihil boni inde possumus expectare: nam ex eadem causa veniens, declarat accedens convulsio in motu vitali causam fuisse auctam, quia ex multo minore causa commotio febrilis potest concitari, quam Convulsio: illa si præterea fiat in musculis motus animalis, adhuc majorem causam significat, quia leviori causa motus vitalis inordinate convellitur, quam motus animalis. Neque juvat, ex nova accedente causa generari Convulsionem, quia non cognita est causa Convulsionem faciens, quæ causam febrilem exstingueret, ergo homo duabus causis morboris laborans, quæ se invicem non destruunt, in majore discrimine versatur, quam antea. Neque quidquam boni ex effectibus Convulsionis expectamus, ipse enim motus convulsivus major non subigit, neque assimulat, neque expellit febrilem causam, ille motus non est talis, qualem in motu febrili notavimus, qui humores concoquit aut præparat, sed semper mala parit. Historiæ quidem testantur, motu febrili multos morbos curari, sed non novi, ab aliquo observatum fuisse, per motum Convulsivum unicum morbum fuisse sublatum. Ergo recte statuit Noster Senex in hoc brevi, sed & utilissimo Aphorismo, melius esse, ut febris superveniat, quam Convulsio.

LIB. II. AP H. XXVII.

52. **H**is, quæ non secundum rationem levant,
 credere non oportet, neque timere valde,
 quæ præter rationem fiunt prava, multa enim ho-
 rum sunt inconstantia, nec admodum permanere,
 neque durare solent.

I.

Totum mysterium hujus Aphorismi in cognitione rei, quam Rationem vocat Hipp: consitum est, quæ enim ex Ratione fiunt, sunt Constantia & permanentia, quare si bona phænomena fiant ex Ratione, certa salus instat; si vero mala fiant, valde timendum. Quæ vero bona fiunt sine ratione, his fidere non debemus; & mala non admodum debemus vereri. Ut igitur omnibus constet quid sit Ratio in Morbis, in memoriam revocandum est, omnem materiem morbosam rem esse distinctam in corpore vivente, quæ non erat in sanitate præsens, si-
 ve lateat sine ullis phænomenis, ut sæpe materies Luis veneræ, & multorum aliorum morborum, antequam indicia præbet, si-
 ve manifesta signa exhibeat. Hæc res sui juris est, sed agitur actione vitæ, quare ut semina malæ herbæ tandem adolescit, & in morbum perfectum erumpit. Ille autem morbus cognoscitur suis signis propriis, distinguiturque iisdem a ceteris, ita ut multa signa aliis quoque morborum causis sint communia, sed tamen quædam profert diversa, quæ in nullo alio morbo conspiciuntur, vel quædam phænomena unà profert, qualia unita in nullo alio morbo inveniuntur; aut facit consequentiam singularem causarum antecedentium & signorum præsentium, quæ
 X simili

Ratio in
 morbis quid
 sit.

simili ordine in aliis morbis non occurrunt. Ex his tribus valet peritus Medicus unam morbi causam ab altera distinguere. Si tali modo rimatus est causam, non amplius versatur in perscrutandis signis, sed mentem applicat ad detectam causam, consulit dein vel fideles Auctores practicos, vel propriam experientiam de natura & naturali mutatione causæ detectæ; ex his invenit quales mutationes huic causæ sunt naturales, quæ mutationes fiebant, & qualia signa apparebant, dum causa hæc viribus vitæ superabatur, atque ita exstinguebatur; quales fiebant, si causa hæc commutabatur in aliam naturam; & denique quales apparebant, si causa hæc mala superavit vires vitæ. Istas mutationes tam parum ex proprio ingenio potest deducere, ac potuisset Botanicus ex conspecta radice vel semine ignoto, terræ commisso divinare, qualia folia, flores, & fructus, sint expectanda. Sed si simul viderit ista omnia producta, tunc deinceps novit Botanicus quales mutationes futuræ sint, quoties suum cognitum semen vel radicem terræ committit. Ita quoque nos non a priori valemus ex detecta causa divinare mutationes futuras, sed si ipsi observavimus omnia producta istius causæ, vel legendo ex aliis observatoribus horum notitiam nobis comparavimus, valemus ex causa detecta, secundum ordinem mutationem huic causæ naturalem, quædam prædicere certa, quæ ab indocto prædici non possunt. Has mutationes naturales detectæ causæ in ægro apparentes, dicimus fieri ex Ratione, seu secundum Rationem, quia morbi causa sequitur naturalem ordinem: si vero quædam alia phænomena in illo ægro apparent, non provenientia ex naturali ordine causæ, hæc dicuntur præter Rationem fieri, sive signa sint bona vel mala, quoniam vel ex aliquo incidente, vel nova accedente causa producuntur.

Quæ sunt
præter Rati-
onem in-
constantia
sunt.

II. Cuncta igitur phænomena, sive ad salutem, sive ad mortem tendunt, quæ naturalem mutationis ordinem sequuntur, Constantia esse debere, nullus erit qui dubitet; nam, nisi ponatur, verbi gratia, in progerminando aliquod infortunium, planta suis temporibus fert folia, flores, semina;

mina, ita etiam in progressu morbi, materia inferet suo tempore Constantia symptomata: quam primum vero ob aliquod infortunium aliquomodo ab ordine deflectitur, propterea non inferitur totius materiæ mutatio, sed cessante illâ levi causa, quæ aliquam in ordine induxit mutationem, materia morbi viribus vitæ ulterius agitata ad priorem ordinem redigitur.

III. Quia ordinem turbans plerumque levis est causa, hæc viribus vitæ facile vincitur; quare morbi prioris causa, dein sola in corpore relicta, pergit suo suscepto ordine absolvere totum cursum, qui per levem illam causam interruptus fuit. Si vero accedens causa quoque sit valida, ordo morbi fit permixtus ex binis morbosis causis simul agentibus. Sed quia accedens causa levis esse solet inferens ordinem turbatum, inde Noster Auctor recte statuit, symptomata illa non diu solere permanere & durare; si vero illa causa semper esset levis, dixisset absolute illa anomala non diu durabunt.

Nec admodum permanere solent.

IV. In morbis periculosis, ex quorum causæ natura nobis per constantes in morbis observationes constat interitum esse expectandum, si aliquod bonum fiat phænomenon uti videtur, huic monet non esse fidendum, quia tale quid provenit, vel quod morbi materia pro tempore quasi latitet, vel quod vis vitæ superata, vehementia non inferat symptomata, sed mitia, & maligna symptomata ægro blandiantur. Ita febris ardens cum diris & vehementibus symptomatibus subito si lenimen doloris infert, tunc monet noster Senex huic Levamini non est fidendum, ut multi faciunt, existimantes ægrum nunc esse incolumen, quum liberetur a sævissimo illo dolore: sed istud levamen erat sine Ratione, quia in eo morbo ex naturali ordine causæ tam subito sine manifesta humoris morborum evacuatione non potuit fieri solamen. Ita in Pleuritide in suppurationem abeunte, si æger subito sine multa sputi vel urinæ sedimentosæ evacuatione libere spirare incipit, hoc est sine Ratione; nam pus factum sine sensibili evacuatione non potuit evanescere; ergo id levamen est infidele: forsan abscessus

Neque oportet hoc timere, aut fidere.

fuit ruptus, effudit pus in cavum pectoris, sed non liberavit hominem. Quare semper in memoria tenendum dictum Auctoris, non debemus fidere iis, quæ præter Rationem fiunt, neque valde timere oportet præter Rationem si valida oriantur symptomata, sæpe enim vis vitæ instante Crisi validissima infert symptomata, quæ tamen non veremur, cum nox ante crisin soleat esse gravis (Aph. 38, II.)

LIB. II. APH. XXVIII.

53. **F**ebriticantium non omnino leviter, permanere, & nihil remittere corpus, aut etiam magis quàm pro ratione colliquefieri, malum est. Illud enim morbi longitudinem indicat, hoc vero infirmitatem.

I.

Non oportere iis, quæ præter rationem fiunt, fidere, neque ea admodum vereri in præcedente exposuimus, hujus rei in hoc Aph: tradit non solum exemplum, sed id insuper ita exhibet, ut quoque ad prognosin applicari possit. Ex ratione enim est, ut corpus extenuetur proportionatè cum magnitudine morbi. Si vero extenuatio corporis non respondeat magnitudini morbi, aliquid anomalum adest, vel quod impedit extenuationem vel nimiam extenuationem facit. In hoc Aph: igitur videndum. (1) Ex qua ratione febres naturali ordine corpus debeant extenuare. (2) Ex qua causa talis in febre interdum non fiat Extenuatio. (3) Quæ causa præter modum corpus in febre emaciet. (3) Cur causa impediens emaciationem possit morbi Longitudinem præfigere. (5) Denique cur causa nimiam Extenuationem faciens Infirmitatem declare.

II. Nul-

II. Nulla cognita est febris totam periodum absolvens, quin faciat majorem circulationem, & calorem, & finitur sudore copiosiore, si legitima sit: atque febris tempore pauciora ingeruntur alimenta, aut si æqualis ingeratur quantitas, ingesta tam probe non assimulantur, quam in sanis, quare secundum rationem est, facta largiore excretionem, cum parciore restauratione, corpus Extenuari, præprimis cum calore concitato majore etiam pinguedo liquefscens simul pro parte exeat. Quo igitur febris est major, eo etiam major Extenuatio fieri debet; quæ nisi sit notabilis vix oculis animadverti potest, inde in febre levi non observatur, sed in febre validiore, ut monet Auctor.

Febris cur
extenuat.

III. Sive post febrem seu in fine febris fiat copiosior evacuatio, sive non, sive ægri plus sub forma sæpe potationis assumant quam evacuantur humores, tamen nimio motu febrili fuere degenerati a sua indole. Hic humor evacuatus, ut monuimus, Extenuationem inducit; sed si non egeritur plus quam ingeritur, nulla fit Extenuatio: hoc si fiat, quia colliquefactum non expellitur, remanebit morbosus humor in corpore: si vero plus ingeritur corpus erit crudo onustum.

Quando
febris vali-
da non ex-
tenuat.

IV. Secundum rationem esse, tantam fieri Extenuationem, quæ proportionata est febre, ex dictis colligi potest: interdum tamen hæc Extenuatio modum excedit, & propterea non dependet a sola febris agitatione, sed ab alia accedente causa. Hæc plerumque est Putredo vel Colliquatio, qua humores attenuati nimia copia excluduntur, ita ut pro magnitudine febris nimis Extenuetur, uti sæpe observatur in febre Hæstita & Colliquativa dicta, in qua cum exigua incandescencia febrili sæpe summa observatur Extenuatio corporis.

Cur febris
nimiam ex-
tenuatio-
nem indi-
cat.

V. Morbus solvitur actione vitali, si morbi materia subacta evacuationi adaptata, tandem viribus vitæ e corpore eliminatur: si vero illa materies non expellitur, uti in minori Extenuatione demonstravimus, vel quando interim oneratur multo crudo, finis morbi secundum rationem non potest desinere, quare vel protrahitur idem morbus, vel

Morbi lon-
gitudine ex
minori ex-
tenuatione.

recidivat, vel in novum alium morbum degenerat, prout nempe natura est materiæ retentæ, nunquam vero totus desinit. Quare ex hac observatione practica non solum præfagirem longitudinem, sed unum ex his tribus.

Cur nimia
Extenuatio
Infirmita-
tem præsa-
git.

VI. Nulla observatur causa citius extinguens vires corporis quam Colliquatio humorum, quando naturalis potentia inter partes nostros liquores constituentes ita aufertur, ut vix cohæreant: igitur si per motum febrilem majorem exhauriantur vires, ut fit ab omni febre, atque insuper per Colliquationem nova accedat debilitatis causa, nullus dubitare potest, quin major debeat generari Infirmitas. Has autem utrasque operari causas in nimia Extenuatione post febrem superius comprobavimus.

LIB. II. A P H. XXIX.

54. **I**ncipientibus morbis, si quid movendum videatur, move: vigentibus vero, quiescere melius est.

I.

Movendum
quali sensu
accipiatur.

OMnes fere Commentatores per *movendum* intelligunt Evacuare per vomitum, secessum, & sanguinis missionem; verum frequenter verbum κινέω significat omne id, quod existimas faciendum esse quovis auxilio; interdum quoque concitare motum indicat. Vix videtur verisimile Hipp: hoc loco voluisse *Evacuare*, nam de hac significatione superius egit (Aph. 22,) & de alvi ductio- ne in Principiis (Aph. 24.) Quare in hoc loco exami- naturi sumus. (1) An movendum sit, id est majorem motum faciendum, (2) An reliqua auxilia, inter quæ numerari possunt antidota, in principiis morborum sint adhi- benda.

II. Non

An major
motus faci-
endus in
principiis.

II. Non omnium morborum principia eodem modo tractanda, quum quævis causa suam propriam naturam fervet, quare in hoc loco solummodo agere constituimus de Incipientibus febribus, quia Hipp: versatur in curationis & signorum regulis in febribus tradendis. Junio rem Medicum ancipitem hærere, num in febrium principiis debeat antiphlogisticis refrigerantibus temperare motum, num vero Alexipharmacis & Calefacientibus debeat intendere motum, nullus dubito; nam si inspicio praxin hodiernam, tota fere in principiis febrium constat, nitrosis, diluentibus, succis fructuum horæorum, acidis & acescentibus, junior medicus his imbutus si consulit Veteres, inveniens Veteres sæpe hoc tempore præscribere Alexipharmaca calida, sudorifera, ita incertus tamen praxin exercet; interdum ex doctrina comparata in ægro, qui alexipharmacis curandus erat, adhibet Refrigerantia, vel Veterum vestigia premens, præpostere propnat interdum Alexipharmaca. Quod si nostri Auctoris monitum fuisset secutus, non ita versatus esset in ancipiti. Hic enim dicit *si quid movendum videatur move*. Vult itaque ut attendat medicus, num motus major sit faciendus in morbi principio nec ne; Si vero judicas movendum esse, move non cunctanter, sed in principio. Ergo hoc loco præprimis examinandum venit, an non interdum in principio febris debeamus motum majorem facere. Nullus est, neque ex Hodiernis, neque Veteribus, quin credat, si morbi materia viribus vitæ sit subigenda, tantum concitandum esse motum, qui valet eam materiam morbi subigere & expellere; hinc veteres alexipharmacis hunc motum augere conati sunt, ut eo citius subigatur morbosa materies; quare adhuc multi in principiis variolarum alexipharmacis satagunt extrudere materiem variolosam, non attendentes nimio motu omnem laudabilem coctionem inverti, materiemque cum ægri damno ante maturitatis tempus extrudi. Ea mala observantes neotrici, sæpe ex nimio motu & calore ante legitimum tempus materiem extrudi, omni ope conati sunt refrenare hunc motum refrigerantibus antephlogisticis, præprimis cum

obser-

observent usu horum ægros multo quietiores esse. Verum hac methodo sæpe ita frenatur motus, ut ægri vires multitudine materiæ obrutæ exstinguantur. Quid ergo sentiendum de his ita oppositis curationibus, num olim & nunc non sunt naturæ febrium eædem? an mutabitur rerum ordo, secundum Methodi medendi mutationes? Minime. Constans & perpetua est naturæ lex in morbis, sed variatis opinionibus misere agitatur. Interdum enim sedatior motus, quam ad subtractionem & expulsionem materiæ morbi requiritur, est concitandus; interdum effrenus motus, quia omnia perverteret & destrueret, est sedandus. In hoc igitur casu dicit Hipp: si observas motum non sufficere, quod ex pulsu, calore corporis, & tinctura urinæ cognoscimus, *move* in principio, ne vires a materiæ morbi opprimantur, & nimis diu protrahatur primum morbi stadium, aut relinquatur in visceribus impacta morbi materia, quæ ad ambitum corporis erat pellenda. Si autem observas motum satis valere non egebit stimulo. Quare sedulo attendendum in morbis, qui actione vitæ sunt curandi; ut tantus concilietur motus, qui valet superare, & temperetur, qui destrueret, ut ita moderato, id est paulo majore, quam qui fit in sanitate, motu subigatur morbi causa.

Cur in vigore quiescere melius est.

III. Si vero primum stadium percurrit febris, & ad vigorem venit, non tam tutum est movere secundum nostrum Auctorem, nam dicit *Melius est quiescere*, quare non absolute præcipit, nunquam in vigore morbi movendum esse, sed existimat melius esse statim in principio. Si a principio morbi ita valuerunt vires, ut morbus ad Vigorem pervenire potuerit, fere semper hoc tempore, plus mali expectandum ex nimio motu quam languente, Calor tunc & pulsus durus frequens, cum corporis siccitate urgere solent, tunc oleum non est addendum camino, quare satius est sedare tunc illum nimium motum, ne omnia invertat & destruat. Post hoc autem stadium, si vires languere incipit, corpusque refrigerari, iterum erat tempus movendi, sed de hoc tempore, alio loco dicetur.

IV. Si

IV. Si vero occurrit febris, quæ virtute medicamenti abigi potest, non quod medicamentum majorem aut minorem motum faciat, & ita curet, quia talis methodica curatio habetur pro curatione ipsius naturæ, sed per auxilia, quæ vel eliminare valent e corpore morbi materiem, vel ita extinguere, ut priorem naturam exuant, ut fit ex permistione acidi cum alcali. Secundum nostri Auctoris sententiam hæc essent facienda in principiis. Hoc imitati sunt multi & in Arte Medica Clarissimi viri, exhibentes vomitorium, vel purgans, vel sudoriferum, eo tempore, ut eorum maxima fieret operatio in incipientibus paroxysmis, hæc pro arcanis sæpe sunt vendita vel celata, quasi specifica virtute infringerent materiem febrilem, dum tamen tota virtus in evacuatione erat locata. An vero in exhibitione Antidoti febris hoc quoque debeamus sequi, non consentiunt; in aliis autem Antidotis apud omnes valet, quo citius adhibentur, eo præstantius, ne, ut ajunt, malum nimis altas egerit radices: febrifugum autem excipitur a multis, ex quo autem fundamento, non satis exponunt. Generalis observatio est, quo citius applicetur Antidotum, eo melius: debet esse igitur aliquid singulare in materia febrili, quod facit recedere ab hac regula generali. Si perscrutemur venena & alias causas, quæ antidotis tolli possunt, fere omnes non patiuntur viribus vitæ subigi, ita venerea lues, hydrophobia, ergo quia in his nihil boni expectari potest cunctando, protinus ad antidota se conferunt Medici, sed febrilis materia sæpe sine auxiliis a viribus vitæ subigitur, quare expectando absolvetur pars curationis: verum Acrimonia acida quoque viribus vitæ subigitur, non tamen dubitamus protinus propinare acidi Antidotum. Quare non satis firma stat sententia, num omnino esset illicitum protinus Antidoto abigere febrem, si pura sit, nullusque alius præterea in corpore morbus, qui motu febrili posset minui. Experientia dictum firmat, sæpe enim fugata fuit febris Antidoto, sine ulla remanente labe morbosa, in principiis propinato; sed si febris corpus fecit ex ægritudine debile, sæpe fugata

An in principiis antidota danda?

febre remansit Cachexia vel Hydrops, qui morbi tunc per-
verso ufui corticis peruviani adscribuntur. Si vero re-
cessisset usu salis Ammoniacy, Gentianæ, Centaurii minoris,
Absinthii, Cardui benedicti, Chamæmeli, vel antiquartii
Riverii, aut cujufvis novi inventi Antidoti, omnino care-
ret periculo, solo autem Cortice subacta febris periculum
inferret, quis credere posset?

LIB. II. APH. xxx.

55. **C**irca principia & fines omnia sunt debilio-
ra. Circa vigores vero vehementiora.

I.

Hippocratem in præcedente magis respexisse ad mo-
tum faciendum, vel alia auxilia adhibenda, quam
ad evacuandum, hic Aph: declarat, qui veluti ætio-
logia est præcedentis: quasi diceret Auctor, si scire vis,
quando movendum est, id ex temporibus morbi potest pe-
ti, nam movendum est, si debilis est motus, sed motus
sedandus est, quando nimis viget, quia motus debili-
or est circa principia & fines; his igitur temporibus movendum
est, sed nimius motus temperandus est in vigore. Tria
tempora citantur, in quibus statuit regulas, nempe Prin-
cipium, vigorem, & finem: paucis videbimus, quid sit
fentiendum de moventibus & motum sedantibus in his
temporibus.

Cur circa
Principia
omnia de-
bilia?

II. Quid per morbi Principium sit intelligendum, supe-
rius (*Aph.* 24, iv) exposuimus: in hoc loco accipitur
pro toto illo tempore, quod est ab inchoatione fere us-
que ad summum vigorem, vel notabile incrementum symp-
tomatum. Cur autem hoc tempore omnia sint debilia,
non potest ex quantitate vel qualitate materiæ morbi de-
duci,

duci, sed ab instigatis viribus vitæ. Concipiamus noxium hæ-
rere, quod irritando febrem excitat, hoc noxium hæ-
rens in corpore non augetur quantitate, sed viribus vitæ,
si mutabilis sit, subigitur aliquomodo, quare dici non po-
test in morbis, qui sanantur, circa vigorem deteriore
accepisse indolem, quum aliquomodo id noxium sit sub-
actum seu coctum, id est præparatum ad excretionem.
Verum vis vitæ instigata a noxio, non statim vehemen-
tissimum motum concitat, imo in invasione febris utpluri-
mum sistitur, ut patet ex frigore, quo fere omnes febres
incipiunt. Sed pergente irritatione sensim magis magisque
concitatur motus vitalis, ita ut in vigore sit validissimus,
tunc sæpius corpus plus patitur ex eo motu aucto, quam
ex ipsa morbi materia. Quod igitur circa principia om-
nia sint Debiliora, non ita debet intelligi, ac si vellet Hipp:
vires corporis circa principia sunt Debiliores, sed motus
vitalis tantum non est instigatus ac in Vigore. Si ergo
videas pro ratione morbi motum vitalem non satis incref-
cere, stimulus debet addi, ut legitimo tempore per mo-
tum vitalem majorem subigatur febris materia.

III. Lex est perpetua in motu vitali circulatorio, ut
si pars quædam stimuletur, non protinus concitet magnum
motum, sed si continuetur stimulandi causa, sensim magis
magisque ille motus intendatur: tandem eousque intendi-
tur, ut si stimulandi causa non aufereretur vel exstingue-
retur, pars ea destrueretur vehementissimo illo motu, &
fieret sphacelus. Dum ad illum vigorem proritatus fuerit
motus vitalis, morbi materia hac agitatione subigitur, at-
que ita vel tollitur vel mitigatur causa, si morbus ten-
dat in salutem: nam nisi hoc fiat, pars ita agitata peri-
ret. Igitur circa tempus mutationis materiæ vehemen-
tissimus est motus vitalis: inde phænomena, quæ per hunc
motum concitantur, hoc tempore, nempe in Vigore
morbi, sunt vehementissima, non quod morbi causa
tunc maxima sit, est enim tunc aliquomodo subacta,
sed quia per tam tamdiu motus vitalis fuerit instiga-
tus.

Cur circa
Vigorem
vehemen-
tiora?

Cur circa
fines debi-
liora?

IV. Post vigorem si homo convalescet, superata est morbi causa, verum omnis materia non ita est subacta & expulsa, ut nullo modo natura stimulari possit, quare ex residuo sed mitiore motus quoque vitalis cessare incipit. (2) Etiam si omnis materia esset ablata, statim non haberetur quies. Ut si spina sit infixæ carni, concitatur dolor & calor in tali parte ex irritato motu vitali, sed si tollatur spina, ita ut nulla remaneat stimulandi causa, quemadmodum in ablata palea in oculo illapsa, quæ concitavit oculi inflammationem, per aliquot tempus, tamen continuatur nimius concitatus motus, sed sensim mitescet. (3) In morborum acutorum & febrium materia stimulantē, quando totius corporis vires vitæ fuere instigatæ, post tam longum motum validiorem, incipiunt quoque deficere spiritus, quare ex defectu virium debet motus minui, seu symptomata minus valentia esse. Si vero ex hac sola causa, defectu nempe spirituum, languescere incipit motus, symptomata videntur mitescere & debiliora fieri, sed fiunt maligna, id est periculosa, sed non vehementia. Si vero mitescant defectu virium, unā cum stimuli subactione, sæpe materia ita subacta, quæ viribus valentibus fuisset expulsa, in corpore retinetur, vel recidivam, vel novum morbum, vel mortem creat: opus est ergo hoc tempore instigare vires vitæ, ut subacta illa materies expellatur. Hinc est, quod in fine morborum acutorum, & circa finem, sæpe debeamus dare calefacientia, vinosa, spirituosā, aromatica, ut moveamus, quæ in morbi vigore prohibentur, quia tunc magis veremur mala ex nimio concitato motu, quam ex multitudine vel malignitate materiæ morbi. Propterea aurea hæc est regula, quam præcipit in hoc Aph: Auctor, si conferatur ad præcedentem Aph: ut sciamus, quiescendum esse in Vigore, sed sæpe movendum esse in principiis & finibus morborum.

LIB. II. APH. XXXI.

56. **A** Morbo belle comedenti, nihil proficere corpus, malum est.

I.

Hic Aph: maxime convenit præcedenti (33, II) ubi exponitur, si quis post morbum multum comedens non roboretur, verum ibidem ut signum proponitur hæc sententia, nam denotat, corpus uberiore alimento uti. In hoc autem loco non solum refertur ad robur virium, sed ad quantitatem quoque humorum, quare hic videndum, cur sit malum signum, si corpus non proficit, id est recuperat quantitatem, & sanum colorem humorum, postquam a morbo præcedente fuit liberatum, & satis comedit.

II. Quando morbus præsens vel sponte vel arte sublatus fuit, propterea non statim perfecta recuperata est sanitas, quia nostrum corpus per morbum fatigatum, etiamsi omnis istius morbi materia fuerit ablata, statim non superavit eam debilitatem ex morbo natam, & emendavit mutationem humoribus inductam, sed exigit aliquod temporis spatium, ut dicta emendet. Hoc non solum in morbis, sed etiam in exercitiis sanorum observatur, qui enim a laboribus desistit, aliquamdiu tamen manet lassus & fatigatus. Ut igitur reficiantur ea mala, quæ a morbo relicta sunt, duo præprimis requiruntur. (1) Continuo sunt toti corpori suppeditanda alimenta in primis viis præparata, quæ reficere possunt amissum. (2) Illa bona humoribus circulantibus tradita, ulteriori actione humorum & virium vitæ sunt assimilanda, ut resarciant id amissum. Non habemus certius criterium, ex quo constat, num alimenta recte in

Convalescentes belle comedentes quid significat?

primis viis præparentur, quam quod æger belle comedat, id est habeat famem satis valentem, & nullam molestiam sentiat ex assumtis. Igitur belle comedere designat, primam coctionem laudabilem esse.

Nihil proficere cur malum?

III. Qui ita comedit, semperque bene elaboratum chylum adfert sanguini, ex ratione videtur, tale corpus non solum sensim recuperaturum vires, sed etiam restauraturum amissam quantitatem humorum & pinguedinis, ita ut sanitatis splendor, quem per morbum præcedentem amiserrat, brevi recuperetur. Si vero ea bona non sequantur, sed manet corpus macilentum & exhaustum aliquo lurido colore infectum, certissimum est eum laudabilem chylum, sanguini traditum, non commutari in bonos humores: quare indicium est aliquid a morbo fuisse relictum, quod hanc laudabilem refectiorem intercipit & invertit. Malum utique est videre signa indicantia in corpore latitare morbosum, quod bonum chylum corrumpit. Est etiam malum præfagium, nam quamdiu corpus non proficit, timor est, ne aliquis morbus ex latente causa sit nasciturus. Operæ præteritum est hic examinare causam, quæ facit, ut corpus nihil proficiat. Talis homo Convalescens satis magnam copiam alimentorum ingerit, & quia corpus non augetur mole, necesse est, ut quoque habeat magnam evacuationem. Duæ frequentissimæ hujus rei causæ inveniuntur in convalescentibus. Prima est tanta inducta imbecillitas virium in organis hæmatopoïeticis, ut non valeant bonum chylum traditum in sanguinem aliosque nostros sanos humores convertere, sed reddunt chylosum & utile vel per urinam, quæ tunc plerumque est alba crassa & copiosa, vel per alvum, quando dejectiones sæpe observantur chylosæ & solito copiosiores. Vidi ex hac causa miram faciem morborum esse natam, nam si ita diu manent valetudinarii, hoc crudum in acrimoniam sensim conversum plerumque aggreditur nervosum stamen, quod debilitatum & hoc acre irritatum versatiles sæpe præbet dolores vel miras convulsiones sæpe in partibus motui vitali destinatis. Altera est relictæ in humoribus putredo, quæ recipiens bonum chylum, eum

in similem convertit corruptelam, hinc urina copiosa & colorata, atque sæpe spumosa, interdum tenuis si omne chylosum liquefactum fuit; interdum vero crudo sedimento varii coloris saturata; imo sæpe tota massa manet turbida, quando materia non satis fuit liquata. Qualis est urina, talis est lympa per vasa lymphatica cutis & oculorum trajecta, nempe sanorum lympa erat candida, & sanguinis globuli rubri miscelam rosei & splendidi coloris in cute producebant, nunc vero ex chylo & humoribus bonis, si adsunt, per corruptelam generatur flavescent corruptus liquor, atque pauci sanguinis globuli rubri, unde nascitur color ex pallido flavescent, ut est color cachecticorum, cum corporis extenuatione, qualis morbus vocatur a Medicis *phthisis nervosa*, qui, nisi succurramus, hominem post longam infirmitatem tandem interimit. Non sine ratione ergo pronunciavit noster Auctor, malum esse non proficere corpus, tanquam signum latentis mali, & tanquam præsagium mali instantis, sæpe enim noster Auctor tales suo tempore observavit inde natos morbos, quales hodie in praxi quoque occurrunt.

LIB. II. AP H. XXXII.

57. **U**T plurimum omnes, qui male habent, circa principia quidem bene comedentes, & nihil proficientes, ad finem rursus cibum non appetunt. Qui vero circa initia quidem cibum omnino non appetunt, postea autem bene appetunt, melius liberantur.

I.

Non consentiunt Commentatores, quodnam morbi tempus hic ab Hipp: intelligitur, nempe Morbi initium, an vero initium Convalescentiæ, quod est tempus

Quodnam morbi tempus intelligendum?

pus (*Comp.* T. 53, xv) post finem morbi. Si autem respiciamus ad præcedentem Aph: voluit Hipp: initium Convalescentiæ: in qua quoque sum sententia. Versatur enim Hipp: in discriptione appetentiæ Convalescentium, & affirmat, belle appetentes malum producere, si Convalescens inde nihil proficit. Nunc vult amplius illa mala exponere, nempe observavit in Convalescentibus valetudinariis, id est in omnibus, qui hoc tempore male habent, ad finem cibum non appetere, & inde morbum recidivasse, vel novum fuisse natum morbum. E contra observavit in initio Convalescentiæ, ægros vix cibum appetere, postea vero bene appetentes melius liberari. Quare hoc *Initium* non est morbi Convalescentiæ. Hanc mutationem appetentiæ, quæ maximi momenti est in utroque tempore, nostris Commentariis explanare conabimur.

An Appetentia vel Inappetentia præstantior?

II. Ut homo percipiat, num Alimenti defectus sit in corpore, nobis innata est sensatio, quam famem vocamus, qua monemur corpus egere alimento, hæc igitur sensatio est naturalis, si defectu alimentorum excitatur: sed si eodem tempore, dum corpus privatum est alimento, homo non percipit hanc sensationem, morbosa est causa naturalem perceptionem, ad vitam sustentandam tam necessariam, intercipientis, vel extinguens. Ergo Inappetentia semper agnoscit morbosam causam (vid: *Exercit:* III) nemo enim medicorum diceret, hominem alimentis saturum laborare Inappetentia. Verum appetentia potest esse naturalis & morbosa; si enim Defectus alimentorum famem excitat, naturalis est & semper laudabilis, quæ autem ex causis morbosis (*Aph.* 29, II) concitatur, mala est. Quia vero Inappetentia semper ex morbo, fames vero ex utrisque generari potest, generaliter debemus pronunciare, Appetentiam præstantiorem esse Inappetentiâ, sed quæ ex morbosa fit causa, interdum pejorem esse posse.

In Convalescentibus.

III. Qui Convalescentes bene appetunt, indicare causam appetitum extinguentem esse ablatam, organa chylopoietica præparare ingesta, superius (*Aph.* 56, II) exposuimus. Ergo fames in Convalescentibus ab hac causa est præstantissima.

tissima. Potest autem fames in Convalescentibus duobus modis mala esse, nam quæ a morbo redit, quoniam acris quidam humor in ventriculum confluens alienam appetentiam excitat, malum potest esse signum, atque præbens occasionem plura alimenta ingerendi in corpore ex morbo debili, potest novos producere morbos, atque vires vitæ multitudine ingestorum obruere. Quare Medicorum est in redeunte appetentia, num ex alimentorum defectu naturali redeat, perscrutari, ne fami indulgeat, sed tollat morbosam causam non naturalem famem excitantem; & cavere in fame naturali, ne nimium ingerat (*Aph.* 33, II). Bonum igitur est regulariter in Convalescentibus & fine morborum redire Appetentiam; sed malum potest esse signum, si redeat ex morbosa causa (vid *Exercit.* 3, XLVIII.).

IV. Appetentiam in morbis tam malum esse signum, In morbis, eamque remorari curationem, non solum apud vulgum, sed, quod miror, multos medicos invaluit opinio, ut verear, vincere num valeam, rationibus hanc præposteram opinionem superare. Qui enim, contendunt, laborat quartana febre, si habeat appetentiam, raro sanabitur, hoc firmanant multis experimentis. Existimo tamen præstantius esse in quartana & aliis morbis frui Appetentia, quam laborare inappetentia. Quippe superius demonstravimus, famem naturalem notare organa chylopoïetica valere, inappetentiam vero semper ex morbosa causa provenire: hoc si applicetur ad regulam judicandi generalem in morbis, qua constat, quo plures functiones recedunt a naturali ordine, eo majores vel plures esse morbosas causas, atque judicium ferendum esse ex magnitudine & multitudine causarum ad sanationem & interitum vel periculum: quo enim causa morbi est major, & quo plures adsunt, eo periculosior morbus, modo singulæ sint æque valentes. Quia vero Inappetentia semper est signum causæ morbi, nunquam bonum præsagium præbere potest, sed appetitus redeuns vel manens ex bona causa oriri potest, ergo tunc bonum est indicium. Potest tamen per accidens Inappetentia præstantior esse in morbis. Verbi gratia, homo corripiatur morbo, manente

te appetentia, hinc plus ingerit alimentorum, quam hoc corpus ægrotans subigere posset: alius vero Inappetentia simul laborans, parum ingerit, potest homo famelicus ille ob maiorem ingestionem in difficiliorem morbum incidere, quam ille qui Inappetentia laborat. Verum hic casus non destruit regulam, quod enim fit per accidens, non derogat regulam generalem; ita optimum sanitatis statum per accidens valemus in deteriore commutare. Ut si quis perfecte sanus in aquam prolabens moritur, præstantius fuisset ægrotare, quia in lecto decumbens spem habet sanationis. Altera difficultas videtur majoris momenti: potest Appetitus ex maiore causa morbosa generari, quam Inappetentia & inde periculosior esse. Hoc fateor, sed potest etiam ex minore causa morbosa generari; quare judicandum est in morbosa Fame & Inappetentia, quænam harum causarum sit major, & inde, non vero ex sola fame vel Inappetentia, ferendum est iudicium.

Cur appetentes ut plurimum ad finem non appetunt?

V. Antequam hanc mirabilem observationem aggredimur, appetentes in principio Convalescentiæ ut plurimum ad finem Inappetentia afficiuntur, status quæstionis ad mentem Hippocratis bene capi debet. Hippocrates proponit morbi præcedentis finem, atque ita initium Convalescentiæ, quo tempore æger se *male habet*, id est, liberatus quidem est a symptomatibus præcedentis morbi, sed manet adhucdum admodum debilis, neque rediit naturalis corporis color, adeoque non ita ut antea est morbo pressus, sed tamen est valetudinarius, multum adhuc distans a perfecta sanitate. In tali homine dicit, si appetitus vigeat & bene comedit, verum dein non reficitur corpus, plerumque, ergo non semper, ad finem rursus non appetunt. Hanc veram esse sententiam, experimentis & rationibus firmari potest. Talis Convalescens luctatur corpore debili & effoetis humoribus, si tamen viget chylicationis organum, bonum quidem præparat chylum, sed is circulantibus effoetis & corruptis mistus tandem quoque in similem putrilaginem convertitur, aut plus ingerit fame monitus, quam sanguificationis organum subigere valet, quod abundans in corrupte-

telam convertitur; denique vigens appetitus ex aliena causa in Convalescentibus, tam in primis quam reliquis viis corruptelam parit ex assumpto nutrimento; in tribus his casibus putrefactum tandem ad ventriculum quoque delatum omnem appetitum exstinguit. Verum si ex bona causa Convalescens appetit, non nimis ingerit, & sanguificationis organum non nimis debile, appetentia manebit, & talis æger brevi tempore recuperabit vires, naturalem corporis colorem & incrementum. Hinc plerumque ad finem veniens cibum non appetunt, sed non semper, ut ex allegatis mutationibus constat.

VI. Alimenta in duabus præprimis officinis sunt elaboranda, antequam in bonos nostros humores convertuntur, nempe in organo Chylopoietico & Hæmatopoietico. Si nullum sit vitium in Convalescentibus relictum, quod impediret chyli commutationem in bonum sanguinem, potest tamen talis homo sanitatem recuperare, etiamsi in primis viis minus perfecta absolvitur chyli confectio: nam sæpe homines ceteroquin sani vivunt, qui tamen longo tempore defectu coctionis ventriculi & Inappetentia laborarunt, quoniam vitium in primis viis productum, deinceps in circulante organo emendatur. At minore temporis intervallo restauratæ fuissent vires, si quoque organum chylicationis valuisset, quare multi medici stomachum habent pro scaturigine multorum morborum. Si vero ex signis constat, circulatorium organum valere, sed Chylicationis debile esse, verum sensim ejus actionem roborari, certum est omne malum tandem superatum iri. Hoc constat ex recensitis ab Auctore signis, nam valens est organum circulatorium, si æger laborans inappetentia post morbum, sensim ad naturalem appetitum redeat. Si vero una cum Inappetentia non valeret Circulationis organum, appetitus sensim non rediret, quia mali & corrupti humores continuo ad ventriculum delati omnem appetentiam exstinguerent.

VII. Ex his quæ disputavimus non potest concludi, melius esse, ut æger Convalescens inappetentia laboret, quam ut vigeat appetitus, ut quidam ex dictis Hippocratis colligere

Qui postea
bene appe-
tunt melius
liberantur.

Conclusio

gere voluere, quia dicit melius liberantur, qui circa initia cibum omnino non appetunt, postea autem bene appetunt. Sed propterea melius liberantur, quia in iis, qui sensim appetitum amittunt, designatur, materiem morbi augeri, & vires vitæ debilitari. Verum quibus sensim redit appetitus signum est, morbum minui & vires augeri. Ergo ipsa appetentia est bonum semper signum, nam nisi rediret in eo, qui circa initia inappetentiâ laboravit, non facile liberaretur a morbo. Quare non ita in hoc Aph: attendendum ad Appetentiam vel Inappetentiam, sed ad commutationem horum, tanquam signa indicantia augmentum vel decrementum malorum; melius enim est ut in initiis Convaiescentiæ mala adsint signa, quæ sensim in meliora commutantur ut est appetitus post in appetentiam, quam quod post bona signa sequantur mala, ut post naturalem famem si fiat inappetentia.

LIB. II. A P H. xxxiii.

58. **I**N omni morbo mente valere, & bene se habere ad ea, quæ offeruntur, bonum est: contrarium vero, malum.

I.

Mens præbet signa in morbis.

EX omnibus partibus & actionibus in morbis non solum debet medicus petere indicia boni & mali, verum etiam ex mentis operationibus & affectionibus, adeo ut nihil relinquatur in toto homine, quin aliquid tribuat ad cognitionem & prædictionem formandam. Noster itaque Auctor ex Mentis observatione generalem suggerit in morbis regulam. (1) Bonum esse in quovis morbo mente valere, contrarium vero malum. (2) Bonum, mentem se bene habere ad ea, quæ offeruntur, sed contrarium, malum.

II. Ex.

II. Experimur omnes etiam sani Mentem omni tempore non æque valere, uno tempore conceptus formatur facilius quam alio tempore, atque sæpe cum corporis debilitate mentis actiones debilitantur. Non tamen cum omni virium imbecillitate minuitur mentis actio in ratiocinando, reminiscendo, & percipiendo, quia non omnia corporis vitia æquali modo menti consentiunt. Mens tunc dicitur in nobis valere, si sit prompta in sensibus internis exercendis; non facile turbatur per sensus externos; neque aliena imaginetur in sensibus internis, neque alio modo percipit per organa sentientia, quam naturalis fit per res externas perceptio. Igitur si in morbis ita valet mens, indicium est, stamen nervosum, & Cerebrum non agitari a vigente morbo, atque sufficientem esse in corpore spirituum copiam atque æquabilem fluxum. Ergo pars sane princeps est illibata in nostro corpore, quia his partibus affectis mens non manet valida, aut debilitatur, aut aberrat, vel non percipit, ut si æger non sentiat Dolorem (Aph. 31, v). Quæ omnia mala præbent indicia, quoniam numero majore functionum depravatarum deducimus morbi magnitudinem & periculum, atque ex paucis mutatis salutem.

Mentem valere in morbis, bonum

III. Quid sit intelligendum per *Mentem se bene habere ad ea, quæ offeruntur*, non tam liquide constat, & nisi planius exponatur, nullam in observationibus morborum præbebit utilitatem, res enim non verba sunt in ægrotantibus observanda, quod si nullus intelligat rem his verbis designatam, ipsa verba nihil valebunt. Offeruntur autem ægro alimenta & medicamenta, mens debet se bene habere ad ea. At se bene habet, si in alimentis eundem saporem, & odorem percipit, ut antea dum erat sanus, si eadem quoque expetit, seu habet appetentiam: verum si alienum odorem, vel saporem in iis percipit, aut si ad adspectum corripitur fastidio, mens se bene non habet ad alimenta, quæ offeruntur, & hoc erit malum signum. Nam alienati in nobis humores, alienum odorem & saporem, dum capimus cibum, præbent, quando non accusant ægri humores corruptos, sed oblata alimenta, quia nesciunt istos odores

Mentem se bene habere ad ea quæ offeruntur bonum.

& sapores alienos ex causa in nobis latente generari. Igitur bonum est, mentem se bene habere ad ea, quæ offeruntur, quia designatur alienis humoribus non affici organa sentientia; sed malum est indicium si mens se bene non habet, quoniam corruptorum vel alienatorum humorum præsentiam declarat. In medicamentis quoque hoc observari potest, si enim æger ab omnibus medicamentis abhorret, vix valet medicus quidquam præstare: si vero præter consuetudinem abhorret, idem est de medicamentis sentiendum, quod de alimentis monuimus.

LIB. II. APH. XXXIV.

59. **I**N morbis minus periclitantur, quorum naturæ, & ætati, & habitui, & tempori magis similis fuerit morbus, quam in quibus horum nulli fuerit similis.

I.

Sensus.

SI duo sunt homines simili morbo laborantes, & iisdem atque æque gravibus symptomatibus pressi, de his præcipit, cui naturæ, aut ætati, aut habitui, aut tempori non respondet talis morbus, propterea ille versatur in majore periculo, nondum tamen vult difficilius curari posse & diutius durare, quare in hoc loco solummodo attendit ad periculum. Fundamentum omnium ponitur in magnitudine causæ, quia ad similem morbum producendum in contrariis his major debet esse morbi causa, quam in alio homine, cujus naturæ &c: Morbus est similis. Hanc comparisonem persequemur in singulis.

Periculum
ex dissimi-
litudine na-
turæ,

II. Per naturam hoc loco intelligit Hipp: Temperiem humidam, siccam, calidam, frigidam, biliosam &c: Sensus igitur

igitur est morbus frigidus in frigida temperie est minus periculosus quam in temperie calida, quoniam ex minima causa frigiditatem inferente generari potest talis morbus; verum magna requireretur causa, quæ potuisset in calido temperamento producere morbum frigidum. Ut si homo temperamenti frigidi & humidi corripitur febre ardente æquali calore vexante, ac in homine temperamenti calidi, certe prior in majore versaretur periculo. Si enim hydropicus febre calida corripitur plerumque moritur.

III. Certis ætatis temporibus quidam fiunt morbi, qui in reliqua ætate rarius observantur, ut Variolæ & Convulsiones pueris frequentiora; juvenibus Hæmorrhagiæ; senibus morbi Cattarrhosi & Pituitosi: hi morbi si conspiciuntur in alia ætate propterea censentur periculosiores. Si enim æqualis numerus adultorum vel senum laboraret variolis, quam est numerus puerorum, pauciores pueri e variolis perirent, quare adulti semper ita timent si variolis corripiantur, dum vero idem morbus censeatur levis seu non admodum periculosus in pueris: atque Epilepsia puerorum sæpe fit & rarius interimit; in adultis autem raro, sed periculosior Convulsio. In Juvenibus frequens fit hæmorrhagia sed non periculosa; in senibus autem semper periculosior observatur, quia senes non facile valent amissum sanguinem restaurare, & non nisi ex valida causa in hæmorrhagiam incidunt. Obstare tamen videtur Hæmoptoën Juvenibus periculosiorem esse, quam adultioribus; hoc autem fit per accidens, quia juvenis in hæmorrhagiam pronus, iterata hæmoptoë tandem pulmonis ulcus contrahit, sed in reliquis speciebus non est majus periculum. morbus Catharrosus & Pituitosus sæpe corripit senem & diu durare solet, verum ille morbus æque gravis in Juvene majoris esset periculi. Quare generaliter hæc observatio potest admitti, interdum tamen contrarium experimur in quibusdam.

Ex dissimilitudine ætatis.

IV. Ad Habitum corporis referre possumus Gracile, Obesum, Robustum & Debile corpus. Si corpus Gracile

Ex dissimilitudine Habitus.

verbi

verbi gratia corripitur hydrope vel œdemate, ille morbus periculofior erit, quam si in corpore obeso pedes tument; si vero obesus admodum extenuatur per phthifin nervofam, illa extenuatio majoris erit periculi, quam fimilis extenuatio in homine gracili. Ita virium Debilitas in fœminis & qui ex natura funt debiles, fed si homo robustus ita debilitatur, ut non plus valeat quam fœmina imbecilla, certe majus periculum erit in Viro, quam fœmina.

Ex Diffimi-
litudine
Temporis.

V. Hoc etiam in anni Temporibus observatur, si quis hyeme corripitur febre ardente, aut æstate affligitur tanto tumore hydropico ac inverfis istis temporibus, majus periculum subesset. Qui autem autumnno corripitur febre quartana, illa erit periculofior & obstinatius resistens, quam si aggreditur vernali tempore. Quare hæc regula non tam universalis est admittenda, ut nullam patiatur exceptionem; interim tamen ad generalem prognosin statuendam multum valet, ut ex allatis exemplis constat.

LIB. II. A P H. xxxv.

60. **I**N omnibus morbis, quæ partes ad umbilicum & immum ventrem sunt, crassitudinem habere, melius est. Valdè autem tenues & eliquatas ipsas habere, malum. Periculofum vero illud est, etiam ad infernas purgationes.

I.

Nulla est in nostro corpore pars externa, quin possit sua præbere indicia in morbis, fed quia similia phænomena in partibus variis non suppeditant eadem

eadem indicia, cum subjacentia viscera in suo usu maxime differant, inde si quadam in parte observantur phænomena, ex Anatomicis sciendum est, quænam viscera tali sub parte externe detecta jaceant: atque inde in quadam parte latissima subdivisio est facienda, ut finitis nominibus semper aliquam portionem istius partis latissimæ indicemus, & nunquam aliam.

II. Duas assignat partes Auctor nempe ad Umbilicum & Imum ventrem. Cicatrix funiculi umbilicalis fœtus, quæ numquam cum ætate eluitur, sed semper visibilem foveam circa centrum abdominis relinquens ita omnibus nota est, ut non indigeat loci indicatione, verum medici ambitum circularem ad tres vel quatuor pollices ab umbilico illo vocant Regionem Umbilicalem. Pars supra regionem umbilicalem usque ad pectus, media inter hypochondria vocatur Præcordia, quia subtus hæret os ventriculi superius, quod Cardian vocant. Partes autem ab utroque latere regionis umbilicalis dicuntur mollitudo laterum. Sed pars inferior a regione umbilicali ad pubem Hipp: ἡτρον vocat, Latinis Sumen & Aqualiculus audit. Omnes autem hæ partes simul uno nomine dicuntur Abdomen.

Umbilicalis regio.

Sumen

III. Quia scopus est per signa externa statum viscerum latentium rimari, non esset opus morbos externos in integumentis communibus vel musculis abdominis exagitare, aut qui ad peritonæum pertinent. Sub Regione umbilicali hærent Tenuia intestina atque Omentum, possumus igitur ex indiciis circa regionem umbilicalem dignoscere, num partes magis minusve tumeant. In Sumine hærent etiam Intestina tenuia, & interdum Omentum; vesica autem urinaria ultra modum extensa hoc quoque in loco hæere potest, sed tunc illa signa potius ad pudenda referuntur. At Uterus in gravidis multa quoque signa in his locis præbere potest. Hipp: autem cum dicat in omnibus morbis, gravidarum observationes in his locis non vult proferre. Quare quæ signa hic traduntur, solummodo adducuntur ad cognitionem Omenti & Intestinorum tenuium.

Regionis umbilicalis & suminis contenta.

Craſſitudi-
nem habe-
re, melius
eſt.

IV. Nihil melius eſt in morbis, quam ut partes natura-
lem magnitudinem ſervent, niſi quod pro ratione morbi
corpus ſimul aliquomodo extenuetur (vid. *Aph.* 53) quod
etiam de his partibus intelligendum eſt, quare hic Apho-
riſmus præcedenti obſtare videtur: verum in hoc loco ad-
ſtruit, utrumque malum eſſe ultra modum Craſſitudinem
& Extenuationem in his partibus obſervare, at melius eſſe
ex his ſi adſit Craſſitudo quam Eliquatio. Craſſitudinem
in Regione umbilicali & Sumine ex iis, quæ diſputavimus,
conſtat, provenire a mole aucta Omenti, Inteſtinorum
tenuium, Meſenterii, vel impletione quadam in cavo ven-
tris: talis fit impletio ex Pituita, vel Lympha, aut Cru-
dis collectis in inteſtinis. Omnes autem illi morbi non
ſunt curatu admodum difficiles, quoniam reſolventibus &
evacuantibus facile minuitur talis tumor.

Tenuia &
eliquata,
pejus.

V. Si vero pinguedo fuerit conſumta Omenti, Meſen-
terii & Inteſtinorum, quando anterior pars admodum gra-
cileſcit, ſignum igitur eſt morbum abire in putredinem,
qua liqueſcit omnis illa pinguedo; ille autem morbus
eſt curatu admodum difficilis. Hæc comparatio reduci
poſteſt ad duplicem morbi exitum, vel in hydropem vel pu-
tredinem circa hanc partem, ſed quia collectio pituitæ fa-
cilis evacuari poſteſt, & recuperatis viribus non facile re-
dit; verum putredo difficile emendari poſteſt, hæc obſer-
vatio magni non ſolum momenti eſt ad prædicendum, ſed
etiam ad formandam indicationem curativam, num debeat
uti evacuantibus & dein roborantibus, num vero an-
tiſepticis ſit aggredienda curatio.

Vocant pur-
gare.

VI. Senſus ex Hippocratis textu dubius eſt, num pur-
gationes ad infernas partes periculofæ ſint in Craſſitudine
vel Extenuatione. Qui vero præcedentia a nobis propo-
ſita perſpexit, huic nullum dubium remanere poſteſt, quin
ſenſus hic reſpiciat ad Tenues & Eliquatas partes, quia
in laticis vel crudorum collectione conducit contenta ea
evacuare; ſed ſi putrefacta purgantibus adgredimur, nimis,
quam æger ferre poſteſt, evacuabitur.

LIB. II. APH. XXXVI.

61. **Q**ui sana habent corpora, pharmacis purgati cito exsolvantur, ut & qui pravo nutuntur cibo.

I.

Vires in corpore sano debilitantur, si boni humores, qui spiritibus materiem debebant suppeditare, auferantur e corpore; vel si suppeditetur humor spiritibus producendis ineptus: quia, ut corpus maneat robustum, requiritur sufficiens bonorum spirituum influxus. Duas propterea causas adducit Auctor, nempe Purgans auferens bonum, & Cibus pravam aliena suppeditantem. Quia vero Purgans est in frequenti usu ad præcavendos morbos in sanis, & in Convalescentibus ut corpora ad perfectam sanitatem reducantur, atque præveniatur recidiva, operæ pretium erit hanc sententiam penitus perscrutari.

II. Purgantia præprimis Veterum validissima, magnam quantitatem liquorum per anum evacuare, omnibus constat: si ponamus hominem perfecte sanum, is pauca continet in cavo intestinorum, quæ quotidie nomine dejectionis vel fæcum ejiciuntur; si tali in homine suscitetur tam copiosa evacuatio per purgans, prima vice plerumque intestinorum contenta emittuntur, deinceps vero reliqui humores, qui in intestina confluere possunt: illi possunt esse boni & mali, verum quia supponitur corpus sanum, ergo nullum habens in corpore vitiosum humorem, id, quod deinceps evacuat ex bonis humoribus, qui corporis actionibus inservire debent, detrahatur: quare corpus bono & utili humore privatum debilitatur.

Purgans cito exsolvit.

An Purgans
depurat?

III. Existimant autem multi, corpora sana multas tamen quiquilias & impuros in corpore habere humores, qui per purgans sunt despumandi & depurandi; hinc præcipiunt aliquoties alvum ducere conducere ad sanitatem conservandam, quare, nisi quis vernali tempore utatur potione majali purgante, æstate non potuisset vivere sanus. Nimis audax autem videbitur hanc abrogare laudabilem consuetudinem, & tamen, si sequimur nostrum Auctorem, purgans in sanis corporibus esset abrogandum, nam præcipit, corpora sana purgante cito exsolvi, id est debilitari, aut in animi deliquium incidere, qualia mala producere non licet medico. Instare possunt, theoriam hodiernorum meliora docere, tunc temporis arcanum despumationis & depurationis non satis cognitum fuisse, veteres enim latuisse doctrinam chylicationis. At vero istud arcanum adhucdum latet, nulla fit in intestinis despumatio aut depuratio, qualem statuunt; Intestina enim constituunt organum præparatorium, & qui humores in intestina confluunt, non sunt inutiles excrementitii, sed boni & agentes eò confluunt, saliva, succus pancreaticus, & bilis, ut absolvatur alimentorum coctio & præparatio: quæ autem actione hac non possunt assimilari, tanquam inutilia postea rejiciuntur una cum humoribus istis, qui agendo inutiles fuere facti. Ergo intestina non sunt organa, malos humores ex bonis separantia, quando aliquod vitium hæret in massa circulante, organa enim liquorem ducentia, quæ annumerata sunt, fecerunt bonos & utiles humores. Nemo igitur statuet, credo, ex dato purgante ita immutari naturam hepatis & pancreatis, ut nunc tantum non fecernerent inutiles humores, & alias utiles: quare pro certo admitti potest in sanis corporibus per purgantia educi bonos humores, qui debuissent in corpore manere; & propterea & experientia & effato Auctoris non est tutum corpora sana valida purgante debilitare. Non tamen statuo nunquam purgandum esse, imo vero sæpe conducit, sed hic solummodo cum Auctore nostro corpora sana a purgantibus debilitari, & hoc non conducere.

IV. Qui

IV. Qui comedit Cibum nutritioni ineptum, vel qui solutus actione nostri corporis alienum suppeditat humorem, corpus duobus modis debilitatur, primo quia non suppeditatur materia, ex qua boni spiritus possunt formari, & dein alienus humor circulantibus mistus naturam spirituum atque aliorum quoque humorum invertit, quare tale corpus defectu bonorum laborat, sed scatet crudis & alienis.

Cibus prae-
vus Exsol-
vit.

LIB. II. APH. XXXVII.

62. **Q**ui bene valent corpore, purgati sunt difficiles.

I.

Non omnes Interpretes verba *καρμὰν ἐδεσθαι ἐργῶδες*, eodem modo exponunt, quidam enim interpretantur *Difficulter ferunt medicationes*, qui sensus magis conveniens est, ut infra constabit, quam ille, quem secutus sum in Editione ab *Almeloveen*. Egerat enim Hipp: in præcedente de malis ex purgatione per alvum & pravo cibo in corpore sano provenientibus: hanc nunc observationem applicare vult ad reliquas medicationes quascumque in sanis corporibus, adstruens *Corpora sana Medicationes agere & moleste ferre*. Præcipuas itaque Medicationes in sanis corporibus delibabimus, ut pateat, num multi bene agant in sanitate conservanda medicationibus uti, ut est Sanguinis missio, Alvi ductio, Diureticum, Sudoriferum, Diæta rigidissima.

II. Quid sit sanitas alio loco (Aph. 3, 11.) Exponitur, solummodo respectiva sanitas ad Medicationes sequentes est proponenda. Respectu sanguinis missionis id corpus est sanum, in quo æquilibrium est inter sanguinis quantitatem &

Sanis an
conveniat
sanguinis
missio?

actiones moventes; quoties enim supponitur sanguinis major abundantia, quæ tolli potest venæ sectione, non ponitur casus in corpore sano, nam qui laborat æquilibrio destructo, non est sanus. Quam primum vero detrahitur sanguis, ipsa Medicatione destruitur æquilibrium, atqui æquilibrium destruere non conducit, ergo sanguinis missio erat omittenda, ut servetur æquilibrium. Multi tamen contendunt, saluberrimum esse auxilium vere mittere sanguinem; hoc etiam ex Hippocratis *Aph.* 3. constat, ubi præcipit *Horum igitur causa bonum habitum solvere confert haud eundanter.* Ad eum autem locum observavimus, nisi Hipp: intelligat nimiam humorum abundantiam, sanguinis evacuationem non conducere. Sed quia in hoc loco vetat omnem Medicationem in *Corpore sano*, sed *Aph.* 3. citat *Bonum habitum*, existimo his verbis non esse eunden sensum adscribendum, sed *Bonum habitum* referendum esse ad plethoram, quando hic aphorismus non est oppositus alteri. Vere autem salubriter venam secari ad conservandam sanitatem constans est observatio, & tamen non obstat huic sententiæ; præcipit enim Auctor sanis corporibus non conducere, ceteris in eodem statu manentibus; si quis contendit vere ad sanitatem conservandam egregium esse auxilium, quia calor æstivus sequens tantam humoris copiam nequit ferre, veram habuit observationem, in qua aliquid mutatur ob quam mutationem, quam exspecto, instituebatur sanguinis diminutio. Si sit licitum addere aliquam mutationem, ut inde probetur sanguinis missionis abusus, eligerem Autumnum, quando exspecto frigus, tunc frigus superveniens post venæ sectionem multa mala induceret. Quare nulla tam salubris aut vix ulla damnosa regula potest proferri, quin valeam per accidens facere exceptionem. V: G. Vulnus semper malum potest bonum esse, si fiat in homine plethorico, ut ita tollatur illa abundantia, quæ multa mala induxit, si homo per vulnus non evacuaverat illam abundantiam. Aut si vulnus aperuit abscessum latentem casu. Verum tales exceptiones non derogant regulam generalem.

gans exsolvere corpus sanum, ad sanitatem conservandam conducere nequit. Ratio erat, quia bonos humores educebat; forsan ipsi spiritus quoque eliminantur, quia invenimus in majore confluxu humorum ad ventriculum & intestina facilius fieri animi deliquium, quam ut possimus judicare, eam Debilitatem, Vertiginem, Scotomiam & Synopen fieri posse ex diminuta quantitate totius massæ. Anatomici docent, ad intestina multo majorem copiam nervorum ferri, quam ad sensum & motum Intestinorum videtur requiri, alia enim pars corporis magis movenda & acutiori sensu prædita paucioribus gaudet Nervis; quare mihi verimile videtur, in statu sano spiritus per hos nervos allatos reduci vasis lymphaticis mesenterii, & effusos in cavum intestinorum, resorberi vasis lacteis, & ita tradi circulantibus, ut præbeant materiem novis spiritibus producendis. Verum si concitetur alvi fluxus per validum purgans, ut Veteres facere solebant, credibile est, istos effusos spiritus e corpore eliminari, reliquos in intestina exonerari, ut ita hujus materiæ defectus generetur: atque quia versus omnem partem stimulatam major copia spirituum derivatur, non erit sine ratione credere, ad intestina purgante agitata, tantam copiam spirituum ferri, ut reliquæ partes istis privatae langueant, unde dicta symptomata facile fieri possunt, quæ spirituum defectum arguunt. An tamen sanis corporibus nunquam dandum purgans, cum multi medici ad præservandos morbos ita extollant purgantia, & fere omnem curationem a Purgante inchoant? Imo vero Purgantia eodem modo ut Sanguinis missio prodesse possunt, aut quando intestina impuritatis scatent. Verum prior casus non facit exceptionem ut monuimus, & alter casus est morbus, quare non derogat hanc regulam.

IV. Quæ adductæ sunt rationes in Sanguinis missione, Diureticum bonum humorem evacuari in Alvi ductione, intestina non esse organa depuratoria massam circulantem, & non possunt Renibus applicari, sunt enim organa inutiles humores a tota massa secernentia & eliminantia e corpore, itaque quo perfectior fit separatio, & ut loquuntur, desputatio,

matio, eo perfectior sanitas: imo addi potest, nostrum corpus sanum sua actione semper generare inutiles humores; quare perfecta depuratio, quæ fit per Diuretica, nunquam damnum inferre potest, inde tutum videtur Diureticis uti ad Conservandam sanitatem. Qui ita libere cum indoctis ratiocinatur, nihil videretur opponi posse ad firmandam nostri Auctoris sententiam, qui Diuretica quoque interdicat. Videamus igitur, quid assumitur in hac sententia. Adstruunt, Diureticis perfectam fieri depurationem, qualis non fit in sanis, sed si corpus sanum non fecernit omne inutile, ut egeat adiutore, non est sanum, ergo qui per Diuretica conservant sanitatem, non ratiocinantur de corpore sano sed ægrotante & debilitato, quod non valet omne inutile separare & eliminare, ergo inde non constat sanis conducere. Diuretica duplicia sunt, quæ quantitate ingesta copiosiores urinam suppeditant, vel quæ sua specificæ virtute urinæ secretionem promovent. Aquæ tepidæ potum augere urinæ secretionem, nemo nescit; verum corpus sanum emittebat omne inutile per urinam, ergo post potionem plus evacuare nequit, nisi potio plura inutilia faciat, sed hoc non conducit: neque statui potest, nimia potatione aquæ corpus perfectiorem sanitatem acquirere, cum perfecta erat, antequam ingerebatur aqua, verum contrarium est verendum, illa enim nimia potatio, ut omne nimium, morbum producat. Quæ specificæ virtute urinam fundunt, quia plus inutile non est in corpore, quam evacuatur in sanis, ergo ipsum Diureticum plus educere nequit, sed quod evacuatur, est ex utilibus humoribus. Huic tamen obstare videtur, Renes solos humores inutiles segregare, utiles relinquere, ergo majore evacuatione solos inutiles evacuari. Veritatem profert hæc objectio, modo maneat sanitas, Renes inutiles duntaxat fecernere liquores, at renes instigati validioribus Diureticis, tam bonos, quam malos transmittunt liquores: forsan, ut monuimus de Intestinis ex magna copia nervorum, qui tribuuntur Renibus, multi quoque spiritus eliminantur, si fiat per Diuretica ad Renes major determinatio;

natio ; unde facile intelligimus, quamobrem ex Diureticorum abusu nascitur vertigo, temulentia, animi deliquium, & alii morbi defectum spirituum arguentes.

V. Quæ de Diureticis dicta sunt, ad sudorifera quoque applicari possunt. Accedit, quod Sudor semper sit ex causa violenta (vid. *Persp.* 180) & sanis non necessarius, (vid. *Persp.* Cap. 15, 11.) Atque corpus sanum satis largam Perspirationem habet, quam si augeas Diaphoreticis, expectamus morbos ex Aucta Perspiratione (vid. *Persp.* Cap. 13. xiv. & *Persp.* Cap. 3, vi.)

Sudoriferum & Diaphoreticum.

VI. Quid sentiendum sit de Diæta rigidissima & jejuniis in sanis hominibus, quia supra (*Aph.* 4, v & *Aph.* 5, v.) egimus, non erit opus repetere.

Diæta rigidissima.

LIB. II. AP H. XXXVIII.

63. **P**aulo deterior, & potus, & cibus, jucundior autem, eligendus potius, quam meliores quidem, sed ingratiore.

I.

Duo genera alimentorum hic proponit Auctor, quæ sanis & ægris dari possunt, nempe grata & salubria, quænam vero ex his sunt præferenda; an grata & minus salubria, (nam quæ omnino mala sunt, & non sunt esui, hic non accipiuntur); vel ingrata & salubriora, hic etiam nolit talia, quæ propter ingratum saponem vel odorem sunt abominabilia. Concludit Iucundiora eligenda esse, etiamsi sint paulo deteriora. Ergo antequam hæc conclusio vel probari vel refutari potest, examinandum venit, quo sensu Deteriora & Meliora, atque jucundiora & Ingratiora sunt capienda.

Deteriora
& meliora
alimenta.

II. Cibus & potus melior & deterior dicitur vel per experientiam vel ex ratione aut potius opinione Si sit aliquod genus alimenti, quod omnibus fere hominibus sanis male cedit, ut aggravet ventriculum, febriculam, anxietatem, cardialgiam & similia producit. Alterum genus est quod nullam molestiam hominibus sanis infert, sed quod medici tamen existimant pravi nutrimenti esse, ut sunt quædam genera avium, piscium, quadrupedum, quæ deteriora a multis censentur. Idem quoque in Ægrotis, quædam alimenta, ut pingua, sale & fumo condita, quæ dum comeduntur, morbum aggravant; alia vero facile subiguntur ut tenuia, macra, ptisana. Sed ex medicorum sententia interdum fructus horæi, farinosa, flatulenta inter deteriora numerantur; unus laudat multam potationem, vel aquæ, vel vini, vel cerevisiæ vel decocti alicujus; alter vero imperat abstinentiam. Quare communi consensu inter Medicos non constat, quænam semper sint Meliora aut Deteriora; atque quod in uno morbo est optimum, in altero est pessimum, ut medicus habita ratione morbi judicare deinceps debeat, quid sit melius & deterius.

Jucunda &
Ingrata.

III. Quod alimenta sint grata vel Ingrata, id a perceptione assumentium dependet, quæ his sunt suavia, aliis sunt abominabilia, imo in eodem homine ætate diversa observatur diversitas, Dulcia enim pueris, amara adultis magis placent; & gravidæ sæpe quædam summo desiderio appetunt, quæ postea fastidiunt. Ægri etiam sæpe fiunt siticulosi, qui antea moderata copia potionis erant contenti. Si observamus animalia, hæc norunt varia genera alimentorum eligere, & reliqua repudiare, instinctu naturali instigata: nos autem ratione magis ducti vix obtemperamus instinctui naturali, sed ducimur ratione, ut comedamus quæ ex ratione censentur grata, quasi in nobis nullus esset naturalis instinctus. Experimur tamen nos ea perceptione non omnino privatos esse, sed minus vigere quam in animalibus. Qui enim assumit, quæ ipsi sunt grata, ea facilius ferunt quam ingrata, quamvis in ceteris hominibus constat, illa huic homini ingrata facilius esse concoctionis;

potest ergo gratum & ingratum aliquid facere ad faciliorem & difficiliorem digestionem.

IV. Si nunc comparamus jucunda cum melioribus alimentis, facile erit dejudicare, quænam generaliter sunt præferenda. Jucunda habent instinctum naturalem, seu aliquod desiderium in assumente, quam ob rem sunt grata, hoc desiderium valet, etiamsi alimentum sit concoctum difficile, ut tamen in tali homine bene cedat. Meliora autem talia non sunt omni tempore & in quovis morbo, vinum conducit seni, non vero juveni, aquæ potus egregium auxilium in ardentibus, & hydropem auget; cibus durior conducit robustis, sed mollior debilibus. Ergo ex ratione nostra debemus judicare, quænam sint meliora. Verum nostrum ratiocinium quia non valet omnia minutissima perpendere & semper meliora eligere, itaque tutius erit cedere desiderio assumentis, & non tam obstinate ægris resistere, si hoc vel istud genus vel potionis appetant avidissime. Sed quemadmodum fit in nimium esurientibus & sitientibus, qui ex nimia ingestione læduntur, modus est servandus.

An Jucunda
melioribus
præstantio-
ra?

V. Quæ disputavimus de jucundis & melioribus, sine multa mutatione ad hanc quæstionem solvendam facile applicari possunt, quare ulteriore sermone hanc quæstionem non persequar. Hipp: igitur in hoc Aph: non parum perstringit istos, qui semper ex ratione, sive sit vera sive falsa, certum genus cibi & potionis ægris imperant, nolentes nunquam vel minimam licentiam in victu decumbentibus concedere, quare sæpe audiunt medicè vivere pessime vivere. Etiamsi experiantur, ægros contra opinionem medicorum assumisse cibum vel potum, in quem summo desiderio flagrabant, sanitatem recuperasse iisdem, tamen non desistunt obnixe in aliis ægris semel susceptam opinionem tueri. Qui vero Hippocratica medicina instructus est, didicit temperatius cum ægris agere, sæpe concedere ægris grata, etiamsi ex ratione minus salubria videantur.

An Ingrata
deteriobus
magis no-
xia?

LIB. II. APH. XXXIX.

64. *Senes ut plurimum quidem juvenibus minus ægrotant. Quicumque vero ipsis morbi sunt diuturni, plerumque commoriuntur.*

I.

Senum &
juvenum æ-
tas.

Non semper idem tempus ætatis vocabulo Senectutis & juventutis apud medicos intelligitur, terminos ætatis, ut hic fit per senectutem & juventutem expriment, non intelligunt finitum ætatis tempus, quod senectuti adscribitur, sed a 40 anno ætatis, donec corpus ex decrepita senectute languescere incipit, inde in sequente Aph: assignat valde senes. Per Juvenes omne spatium vitæ a perfecto incremento corporis ad dictum tempus ætatis intelligit; ergo quæstio ita potest poni, an homines intra 20 & 40 ætatis annum frequentius ægrotant, quam inter 40 & 60 annum ætatis.

II. Num Hipp: in hoc loco intelligat omnes morbos, an vero solos acutos, quia postea assignat in senibus Morbos Diuturnos, non consentiunt Commentatores. Videtur autem mihi, Hipp: omnes intelligere morbos tam Chronicos quam Acutos, quia passim, si vult intelligendos acutos morbos, scribit in Acutis. Voluit autem in hoc loco comparisonem omnium morborum facere ex ætate, sed insuper adjungere, quod si seniores morbo Diuturno corripiantur, plerumque istas perdurare usque ad mortem. Quæ sententia seorsim est exponenda.

An juvenes
frequentius
quam senes
ægrotent?

III. Qui existimat experientia probari posse plures juvenes ægrotare quam senes, facile fallitur, si calculum faciat ex numero ægrotantium vel in propria praxi vel in observatoribus, qui ætatis tempus, ut fere semper fit, adjecerunt.

Com.

Communi illo calculo multo plures ægrotabunt inter 20 & 40 ætatis annum, quam inter 40 & 60. Sed inde non constat, juvenes ut plurimum frequentius ægrotare, nam numerus hominum viventium inter 20 & 40 annum ætatis est multo major quam inter 40 & 60. Nullus enim potest attingere 60 annum, quin antea fuerit juvenis, sed non omnes juvenes fiunt senes, quare senum numerus semper minor. Si igitur multos juvenes comparo ad pauciores senes, equidem in majore illo numero frequentiores observari possunt morbi, quare legitimus non deducitur calculus. An vero Hipp: dicto modo per observationes generales hanc comparisonem deduxerit, asserere non possum. Sed si comparatio esset facienda, idem numerus juvenum & senum esset ponendus, quod haud facile fieri potest, nisi quis utriusque ætatis certum numerum personarum seligeret, in quibus post decursum viginti annorum observaret, in quo numero plures fuere observati morbi: atque tunc ex unica hac observatione non potuisset generalis deduci regula. Aliam propterea Auctores ingressi sunt viam, refugerunt nempe ad continentiam senum, & intemperantiam juvenum, vel alias abstrusiores causas, sanguinem scilicet in senibus esse crassum & frigidum, non facile corruptioni obnoxium; in juvenibus vero sanguinem esse acriorem, volatiliorem, facile fermentantem & putrescentem esse, & inde frequentiores generari morbos. Sed qui ex hypothese futili, ut sunt adductæ rationes, ratiocinatur, stabilem regulam formare nequit. Si hujus regulæ tradenda sit ratio, assignata causa debet vera esse et constans. A 20 ad 40 annum adest summus corporis vigor majorque copia humorum generatur, quam requiritur ad solam corporis nutritionem, quod in fæminis clare patet, & in viris hæmorrhagiis obnoxiiis, qui sanguinis evacuationem cum euphoria tolerant, post istud autem tempus ætatis sensim magis debilitantur, venere aliisque debilitantibus evacuationibus, ut in fæminis lactatio, minus delassantur, quam post 40 annum per easdem evacuationes, quia corpus valens in juvenibus hanc evacuationem supplere potest. In senibus au-

tem ante 60 annum vis vitæ non ita est debilitata, quin possit tantum suppetitare, quantum ad corporis sustentationem requiritur, & tamen non est verendum ex abundantia vel nimio motu tantum, quantum in juvenibus. Ex ratione est, corpora quæ sovent causas, facile producentes morbum, multo frequentius in morbos incidere, quam alia, quæ a sola causa accedente affici possunt. Senes autem ratione virium agentium & quantitatis humorum non sovent morbosam causam, in dicta enim ætate corpus adhuc satis valet suos præparare humores, partes firmæ satis cohærentes sunt, ut non facile a paulo majore motu dissolvantur, Decrepita autem senectus, quæ hic non intelligitur, defectu actionis, & callositate firmarum partium laborare incipit. Juvenes autem, quibus est maximus vigor movens, solidæ partes ad majorem impetum ferendum ineptæ, sanguinis nimia abundantia: his igitur vel ex abundantia facile destruitur æquilibrium, ex minimo stimulo ingens & morbosus motus, ex paulo majore impetu facilius vasorum ruptio, quæ in senibus non observantur, neque inveniuntur in dicta ætate causæ aliæ internæ ad morbum disponentes. Ergo juvenes morbis magis obnoxii, quam senes. Si his addatur intemperantia juvenum frequens, & continentia senum, non erit mirandum, senes ut plurimum minus ægrotare.

Senum diurni morbi cur ad mortem durare solent?

IV. Omnes morbi diu durantes vel habent causam insuperabilem viribus vitæ, vel si causa fuisset superabilis, tantam induxerunt debilitatem, ut senum corpus non valeat, nisi adferantur suppetiæ, eam causam superare. Quod si talis causa cum debilitatis viribus fuisset in juvenibus, spes esset, ut incrementibus viribus tandem potuisset superari, verum quia in senibus raro tantum deinceps incrementum vires, morbus ille ad mortem durare solet: nisi optima adhibita medicatione, vel minuatur morbi causa, vel augeantur vires, quod interdum quoque fieri potest, quare Hipp. adjecit *plerumque*.

LIB. II. APH. XL.

65. **R** Auces & gravedines in valde senibus non coquuntur.

I.

Quoniam per senectutem non intelligunt medici idem ^{Senectutis divisio.} ætatis tempus, ut monuimus (Aph. 64, 1) & in hoc loco dicit Auctor *Valde senes*, ergo necesse est secundum communem opinionem medicorum senectutem dividere, ut intelligamus, qualem ætatem Auctor hic intelligit. Dividunt senectutem in Crudam usque ad annum LX, ut indicavimus, mediam statuunt inter LX, & LXX. Decrepitam a LXX ad finem vitæ. Hic terminus vitæ in hoc loco indicatur per *valde senes*.

II. Aer pulmonibus receptus compressione pectoris ductus per contractam rimulam glottidis, sonum format, qui eo est clarior, quo superficies hujus rimæ est æqualior & membrana cartilaginea rimæ glottidis formantes, tegens est magis tensa. Si vero illa membrana nimis sit laxata, tumens, multa humiditate obfusa, vel inæqualis, vel mucos obducta, transactus aer obscurum & interdum nullum sonum edit. Hoc vitium in formando sono vel voce vocatur *Rau-*
citas, quæ igitur ex multis causis generari solet. ^{Raucedo quid sit?}

III. Si membrana vestiens interna narium, sinus frontales, maxillares, fauces, imo interna membrana laryngis multum muci secernit & colligit, ut inde impediatur libera respiratio præprimis per nares, cum sensu gravitatis & sæpe frigiditytis circa has partes, talis affectio pituitosa medicis dicitur *Gravedo*, quæ ex multis quoque causis generari potest, quod non est hujus loci exaptare. ^{Gravedo quid sit?}

IV. In-

Cur senibus
gravedo &
Raucedo
frequens?

IV. Inter frequentes causas Raucedinem & Gravedinem inducentes est materiæ pituitosæ accumulatio in membrana pituitaria & quæ vestit laryngem interne, quæ collectio fit major, si in dicta membrana motus vitalis ita langueat, ut ibidem delati humores soluti manere nequeant, sed quiescentes, debiliori motu vitali fibrarum in hac membrana non propulsi, sponte inviscantur: naturale igitur est senibus, in quibus vis vitæ languere incipit, ut fiant morbi ex deficiente motu vitali, qualis est morbus omnis pituitosus. Observamus enim, morbos pituitosos multo propterea frequentiores esse in senibus, quam in constante ætate. Non tamen necesse est, ut gravedo & Raucedo sit in omni sene, sed quando motus vitalis in hac præprimis membrana languet, generantur hi morbi. Et quia facilius in senibus quam alia ætate, maxime in iis, qui ad decrepitam senectutem pervenerunt, quædam pars nimis debilitatur & relaxatur, hi morbi quoque frequentius valde senes aggrediuntur.

Cur in senibus non
concoquuntur?

V. Per coctionem phlegmatis in Gravedine & Raucedine intelligebant veteres eam subactionem & mutationem, qua materia hæc assimilatur sanis humoribus, nam valde senes satis copiosa phlegmata rejiciunt & tamen non sanantur, quare voluerunt commutationem in humoribus talem, quæ non eget evacuatione. Verum in valde senibus vix possumus expectare tantum virium augmentum, ut præveniatur phlegmatis generatio, quare hi morbi plerumque concomitantur, nisi auxilio roborante aliquantulum roborentur illa corpora senilia. Hinc Hyssopo, vino malvatico, hydromele vinoso, zingibere aliisque calefacientibus in senibus curantur illa phlegmata, quæ in alia ætate minus valent.

LIB. II. A.P.H. XLI.

66. **Q**ui sæpe & vehementer, absque manifesta causa, animo linquuntur, ex improvise moriuntur.

I.

AUctores practici quatuor species Animi deliquii describunt, quæ omnes solo gradu differunt, & singulis præbent suum proprium nomen, quod non parum remoratur scientiam medicam, præprimis facile inducit medicum juniorem, ut credat, has quatuor species distinctos esse morbos. Hoc si fieret in omni morbo, infinitus haberetur morborum numerus. Ut autem B. L. intelligat in posterum omnes has species, quas omnes vocabo animi Deliquium, sciat, subitanæ & non diu durantem motus animalis aliquem defectum, cum minore sensuum perceptione ab auctoribus vocari *Eclipsin*. Si vero motus animalis magis langueat, ut vix ullus sit, sensus fere omnis extinctus, pulsus admodum debilis, cum respiratione sana vel minore, quæ omnia subito invadunt & non diu durant, quod in omnibus his speciebus semper est observandum, *Leipothymiam* & *Leipopsychiam* vocant. Hic morbus gravior, ut æger omni sensu & motu animali privetur, & pulsus tam exilis fiat, ut vix percipi possit, corporis extrema frigeant, sudorque frigidus exprimatur, cum respiratione admodum minuta, & interdum per tempus subsistente, dicitur *Syncope*. Tandem gravissimus gradus statuitur, si homo instar cadaveris jaceat omni motu animali & vitali, atque sensibus privatus, sed tamen postea ad se redit: in his quia Anima videtur extincta, vocant *Apsychiam*; sed ex abolito pulsu *Asphyxiam*. Quoniam Hippocrates dicit, qui

Quid sit animi deliquium?

Vehementer animo linquuntur, non potest primam speciem intelligere, sed ultimam vel penultimam.

Cur ex im-
proviso mor-
tiuntur?

II. Animi deliquium nomen habet ex citatis phænomenis, quare morbus ipse non præbet futura indicia mortis, sed illa petenda sunt vel ex detecta causa hoc phænomenon producente, vel collectis signis, quæ causam absconditam indicant; vel ex futuris effectibus, qui ex tali phænomeno provenire solent. Tria addit Hipp: criteria; (1) ut sit vehemens; (2) sæpe recurrens; (3) sine manifesta causa. Igitur nemo potest ex natura causæ prædictionem formare, si enim fieret syncope ex sanguinis profluvio, Catarrho, passione hysterica vel alio cognito morbo, potuissimus judicium desumere ex natura morbi, sed causa latet. Id tamen maximi momenti est, morbum in suo genere esse vehementem, & propterea periculum auget. Sæpe redit, habet ergo causam constantem, licet incognitam, quæ tandem vincere potest, hoc auget periculum. Et quia latet causa, difficultas curationis nascitur, nisi enim possimus morbi causam eruere, incerta est curatio. Sufficeret in theoria dogmatica ex tribus his signis collectis cum Hipp:, pronunciare, tales homines tandem ex improvise perituros, quia constante observatione practica hoc confirmatum est. Sed & alia est via prædictionis ex phænomenis, si perpendamus, quænam causa interna latens esse possit, quæ potest mortem ex improvise inferre, & quæ habet tria hæc criteria. Si perpendo Phænomena, causa debet esse in organo motus vitalis vel animalis, primo aspectu videtur organum motus animalis & sensuum magis affectum, quia subito exsolvuntur vires motus animalis, & sensus extinguuntur; sed tunc persisteret pulsus & respiratio, uti in Apoplexia; Sed homo Syncope correptus fere privatur pulsu & respiratione, quæ phænomena non fiunt ex affecto organo animali, quin semper sequatur mors, ut experimur in apoplecticis. Sed si alterum examinemus organum, vitale scilicet, cuncta liquebunt. Ut motus animalis & sensus exerceantur, perpetuus æquabilis spirituum fluxus requiritur per nervos his actionibus destinatos: sed illi ut fluant continuo, etiam

etiam ex allato sanguine sunt secernendi: quoties sanguinis affluxus igitur cessat, subsistit etiam spirituum secretio & fluxus; si minor copia sanguinis adducitur, tardius & minori copia fluunt spiritus, in priori casu omnium sensuum privatio & virium exolutio, ut in Syncope; sed in posteriore casu generatur levis Eclysis. Causa igitur quærenda est in organo pellente sanguinem ad Encephalon vel in sanguine ipso. In hoc organo vel sanguine quærenda est causa dicta tria criteria suggerens & quæ valet ex improvviso mortem inferre. Si nunc perscrutemur cadavera eorum, qui post vehementem syncopem fuere extincti, invenimus vel cor fuisse corrosum, putredine saniosa corruptum, aut ulceribus scatens; pericardium pure plenum vel consumtum, vel undequaque cordis accretum; polyposam concretionem in cordis ventriculis, auriculis, & ejus magnis vasis. An vero omnes hæ causæ exhibeant casum ab auctore nostro propositum, paucis videbimus. Examina prægressa signa in istis & detexi, omnes sine prophasi post frequentem Leipothymiam vel syncopen periisse, præter istos, quibus inventus fuit polypus: & inter hos quidem sine aliis cum alternata palpitatione periere. Quare credo non perinde esse, num in arteriis vel venis majoribus cordis polypus hæreat. Si sit polypus in Aorta vel pulmonali arteria, cor sanguine turgens vehementer simul palpitare debet, quare talis æger non perit sine manifesta causa, quoniam palpitatione etiam si sit phænomenon, inter causas a multis medicis censetur. Quibus autem polypus hæret in vena cava vel pulmonali impediens sanguinis fluxum in cava cordis, sola deficiente circulatione sine palpitatione generare potest syncopen. Imo vero mihi verisimilius videtur, si a præcedentibus causis morboris frequens generetur animi deliquium, quod inde formetur polypus, qui tandem implens magna illa vasa vel cava cordis, mortem ex improvviso inducit. In tam vehemente enim Eclysi perfecta habetur sanguinis stagnatio in cordis cavis & vasis majoribus, & quia est ex sanguinis natura, stagnantem in quadam cavitate, tam in, quam extra nostrum corpus, concrefcere in

thrombum, credibile, inquam, mihi videtur, quod quamdiu homo patitur syncopen & sanguis manet fluidus, reviviscat, contractilitate remanente in vasis, ducta sufficiente sanguinis quantitate ad encephalon: sed si stagnans ita concrevit, ut contractilitate remanente post extinctum motum vitalem, sanguis ad encephalon urgeri nequeat, æger syncope correptus ad se redire nequit. Etiam si mihi nunc constaret, cordis consumptione, pure in pericardio hærente, pericardii defectu aut coalescentiâ, allegatam speciem animi deliqui esse natam, fateor, me tamen non posse ullis auxiliis prævenire mortem ex improvviso, quia nullum novi medicamen, quod his morbis mederi valet. Quare ex perspecta causa coacti sumus solam hanc prognosin proponere cum Hippocrate. Removet autem omne dubium, quod semper restat in re incognita, an non interdum invenietur auxilium.

LIB. II. A P H. XLII.

67. *S*olvere apoplexiam, vehementem quidem, impossibile: debilem vero non facile.

I.

Definitio.

A Præcedente morbo non multum distat Apoplexia, sed pauciores functiones abolentur, quam in syncope: Apoplexia enim hodie vocatur a medicis ille morbus, qui subito invadit hominem, cum sensuum omnium internorum & externorum extinctione, atque laxa immobilitate omnium muscutorum motus animalis. Sed Respiratio vitalis & pulsus non est opus, ut aliquomodo mutentur: si vero pulsus simul debilitetur, Respiratio fiat stertorosa & inæqualis cum spuma circa os, vehemens est Apoplexia, qualis hic ab Hipp: depingitur: sed Debilis Apoplexia

plexia, quæ non multum mutat respirationem & pulsum.

II. Observavit Hipp: & Praxi quotidiana firmatur, omnes fere ex Apoplexia perire, sed homines sæpe syncope corripiri & convalescere: quare Medici hac observatione instructi non multum timent animi deliquium, sed admodum verentur Apoplexiam. Si autem consulamus symptomata in utrisque, syncope gravior est morbus, quam apoplexia, hæc enim relinquit respirationem & pulsum, illa autem utrasque has quoque actiones vitales pro tempore exstinguit. Corruit igitur regula practica, nos periculum deducere ex multitudine functionum læsarum vel abolitarum. Revera si solummodo attendimus ad actiones læsas, regula illa pateretur exceptionem in Apoplexia ad animi deliquium: sed tunc intelligimus, si fiat ab eadem causa aucta, vel pluribus causis accedentibus. Examinanda igitur in utrisque est causa læsas functiones inferens. In Apoplexia læsa est functio animalis, ex cujus læsione non est opus, ut mutetur functio vitalis. In animi deliquio læsa est functio vitalis impediens sanguinis fluxum ad organum animale, quam ob rem etiam actiones Animales propter deficientem spirituum animalium fluxum subsistere debent. Cardo igitur rei versatur in perscrutatione naturæ harum functionum, si motus animales & sensus a morbosa causa, intacta functione vitali exstingui & mutari possunt, ut actio vitalis, equidem apoplexia minus periculosa esset, quam animi deliquium: sed si actio vitalis ex minima causa potest sisti, ut ita simul sistatur actio animalis, & actio animalis semper exigit causam vehementem, necesse erit apoplexiam periculosiorem censere. Perscrutemur igitur magnitudinem harum causarum. Tantam invenimus in Respiratione vitali & animali differentiam, ut quisque valeat sanus per respirationem animalemi omni modo mutare respirationem vitalem, hoc inflando, forbendo, loquendo, cantando, quæ omnes actiones respiratione animali peraguntur, ita experimur, ut aliquis existimaret, respirationem vitalem nullo modo obluetari his actionibus animalibus: quare causa faciens respirationem animalemi validior, quam quæ vitalem facit. Hanc

Cur peti-
culosior
syncope?

quoque differentiam observamus inter motum animale musculorum & vitalem cordis & arteriarum. Quæ enim corpori applicantur vel ingeruntur, ut & morbosæ causæ circulationem mutantes sæpe parvæ sunt & vix perscrutandæ: sed ut oblucente voluntate in motu animali fiat motus convulsivus vel movendi impotentia, semper fatemur, majorem esse causam, quam ut motus vitalis a minimo stimulo applicato ab ordine suo recedat. Sed illi motus animales, qui motu vitali agitato auxiliantur, per consensum hunc facile quoque & a levi causa mutari possunt, ut in tussi, sternutamento, vomitu; non quod ipsi motus animales primo afficiantur, sed organum vitali motu donatum a levi causa movetur, & inde illa organa animalis motus contra voluntatem contrahuntur aut moventur, ut in dictis involuntariis actionibus detegitur. Quid levius quam pluma irritare nares? illa tamen causa valet tot musculos & tanta vi movere, ut experimur in sternutatione; cujus motus causa non quærenda in motu animali, sed vitali, qui motum animale in consensum trahit.

Cut motus
vitalis faci-
lius quam
animalis
turbari po-
test?

III. Ex iis, quæ hucusque disputavimus, constat, quendam motum vitalem nullum consensum exercere cum motu animali, ut est pulsus cordis & arteriarum, nisi sit nimius; quendam vero motum vitalem in consensum trahere motum animale, ut in allegatis & pluribus aliis. Sed inquirere nunc est, an non subsit quædam naturalis ratio ex actione vitali & animali deducenda, qua facile patet hæc differentia. In *Exerc. 1. de motu vitali & Comp. T. 18.* demonstravimus, æquabili fluxu spirituum per nervos ad motum vitalem ex organi fabrica fieri motum alternum; sed in nervis ad motum animale requiri mentis voluntatem, ut in sanis hic vel ille musculus moveatur. Quoties igitur in nervo vitali paulo major aut minor fiat spirituum fluxus, toties quoque ille motus, dependens ab hoc influxu, vel augetur vel minuitur; inde irritatio parva faciens per illum nervum paulo majorem fluxum, facit, ut motus vitalis organi, quod ab influxu horum spirituum movetur, perturbetur. Alio autem modo constitutum est cum motu animali,

mali, nisi enim accedit voluntas, musculus non movetur. Ergo ut ex morbosa causa motus animalis fiat vel impediatur, multo major causa requiritur, quam ad motum vitalem turbandum.

IV. Duobus itaque modis fieri potest motus animalis a morbosa causa subito. (1) Si motus vitalis tantum minuitur, ut non sufficiens sanguinis quantitas feratur ad organum, quod spiritus animales fecernit: sed quia demonstratum est, eam mutationem in motu vitali fieri posse ex levi causa, inde morbus hic, qui vocatur animi deliquium, facilius abigitur. (2) Si motus animalis & sensus exstinguitur, ut in apoplexia, magna requiritur causa impediens spirituum animalium fluxum. Igitur ex magnitudine causæ pronunciamus quoque periculum & difficultatem curationis. Obstare tamen videtur, Apoplexiam natam vehementem vocari, si simul motus vitalis affici incipit, quia diximus motus & sensus animales minus periculosa esse, si dependeat causa a motu vitali impedito. Verum hæc nulla est difficultas, nam in allegato exemplo vehementis Apoplexiæ non fiebat sensus, & motus exstinctio affecto motu vitali; sed quia causa illa magna agens in organum animale nunc tantum increscit, ut quoque motum vitalem sistat. Inde qui homo superstes potuisset manere in apoplexia per aliquot dies, donec motu vitali vel aliis auxiliis erat apoplexiæ causa sublata vel exstincta, nunc mortuus est. Potest enim sine sensu & motu animali per aliquot dies vivere, modo motus vitalis permaneat; sed sine motu vitali nequidem per unicam horam potest nostrum corpus esse, quin nunquam redibit motus vitalis. Quæ adferuntur exempla, homines mortuos & habitos sepultos ad vitam rediisse, vix credibile est, toto illo tempore omnino nullum adfuisse motum vitalem, sed tam exiguum, ut ab adstantibus non potuerit animadverti. Ergo constat ex magnitudine causæ nos judicare de periculo & difficultate curationis in Apoplexia. Quia vero apoplexia morbus est ex variis causis nata, non omnis æque periculosa est, sed quia non est hujus loci omnes has diver-

Apoplexia
cur impossibilis
vel difficilis
curatione?

diversas causas rimari, sufficiet solam causarum magnitudinem assignare.

LIB. II. A P H. XLIII.

68. **E**X iis, qui strangulantur & resolvuntur, nondum autem sunt mortui, non se colligunt, quibus spuma circa os fuerit.

I.

Strangulatio & resolutio quales morbi?

ANtequam iudicium fiat de spuma circa os collecta, constare debet, qualis morbus in hoc loco ab Hipp: intelligatur. Quibus aëris ingressus & exitus per laryngem intercipitur, vel ab externa causa, ut in aqua submersis, suspensis laqueo, aut compressione quacumque ad laryngem; vel a causa interna, ut polypo, alienis laryngi illapsis, angina, aliove tumore premente, vel spasmo has partes constringente, dicuntur strangulari vel suffocari, si tales homines simul actione animali conantur frustra animam ducere. Talis autem homo laborans frustraneo conatu, si resolvitur, id est, desinat amplius motu animali hunc edere conatum, simulque privatur sensibus, talis enim status hic per resolutionem intelligitur, is si colligit circa os spumam, morietur, velut Galenus interpretatur, fere semper morietur. Quia vero in his locis Hipp: agit de morbis, qui subito corripiunt, ut animi deliquium & apoplexia, ex nexu cum prioribus in hoc loco intelligitur strangulatio subito inducta ab aliqua morbosa causa impediante aëris transitum per laryngem vel tracheam: & quoniam addit Resolvuntur, καταλυομένων, talem statum, ut est in iis, qui moriuntur, patet eam resolutionem sequi strangulationem.

II. Per-

Strangulationis & resolutionis causa.

II. Perscrutanda nunc est causa, subito inducens strangulationem, quam brevi sequitur resolutio. Strangulantur seu suffocantur homines, si muscoli claudentes laryngem corripiantur spasmis, ut sæpe fit in hystericeis & hypochondriacis; vel quando fibræ tracheæ & bronchiorum spasmis afficiuntur, uti in Asthmate convulsivo. Spasmus in musculis laryngis cadit igitur in motu animali, quia illi muscoli in voce formanda serviunt. Hic spasmus aliis in musculis vix ullum periculum infert, sæpe enim in musculis membrorum perpetuam morbosam constrictionem spasmodicam toleramus longo tempore sine periculo vitæ: sed si idem morbus hos aggreditur musculos, quorum constrictione impeditur respiratio, homo, quia tam diu sine respiratione vivere nequit, nisi brevi tempore hic dimittit spasmus, suffocata respiratione exstinguitur. Alter casus in fibris bronchiorum & tracheæ, quæ quidem habent motum, sed neque animale, neque vitalem, ut in corde & arteriis, sed specialem præparationi sanguinis in pulmonibus dicatum, qui motus requiritur, ut libere transeat sanguis per pulmones, quod asthmatici sæpe experiuntur, qui summo conamine per motum animale, convulsis his fibris, luctantur animam ducere. Hæ inquam fibræ spasmodicæ nimis diu restrictæ circulationem intercipientes valent suffocare, & quia harum spasmis simul intercipitur respiratio atque circulatio, valet etiam hominem interficere. Spasmodicæ hæ constrictiones in musculis laryngis & fibris tracheæ & bronchiorum si non diu durant, anxietatem ob suffocatam respirationem & impeditam circulationem per pulmones inducunt; sed dimissa constrictione, homo ab ea anxietate liberatur, restituta libera circulatione per pulmones; atque in ipso paroxysmo utcumque valent motu animali continuare aliquomodo respirationem & circulationem. Si vero, ut hic monet Auctor, æger Resolvitur, id est, privatur omni vitali & animali actione, ut in moribundis, signum est, eam spasmodicam constrictionem tam validam esse, ut motu animali respiratio non possit peragi, sed ex defectu circulationis per pulmones, quia cor nihil accipit, non potest

sanguis duci ad encephalon, unde ex hac causa nunc generatur syncope periculosissima, quoniam causa non hæret in motu vitali circulatorio, qui levi causa potest turbari, ut demonstravimus (Aph. 67, III.) Sed in motu animali, vel in motu speciali in pulmonis fibris, qui diutius potest continuare hanc constrictionem, quam homo sine respiratione potest vivere.

Strangulati
& Resoluti
non sunt
mortui.

III. Quibus ex spasmō, quem Tetanum vocant, tam valide & diu constringuntur fauces, ut instar mortuorum decumbant, hos dicit non esse mortuos; vult enim significare, in tali homine non esse extinctam omnem potentiam, qua vivere potest, & abolitæ vitæ actiones suscitari. Experientia quoque firmatur, multos homines pro mortuis habitos ex hac causa, ad se rediisse & diu postea vixisse. Mirum est observare in his penitus cessare omnem actionem animalem & vitalem, & tamen ad se redire: nihil ergo in his restare videtur, cujus actione talis vita amissa rediret. Sed si perscrutamur hunc morbum, & comparamus huic actiones in corporibus viventibus, fieri potest, ut talis vita amissa recuperetur. Spasmus dependet ab inordinato valido & morboſo influxu spirituum per nervos in dictos musculos, si superveniat Resolutio, non amplius hi spiritus feruntur per dictos nervos ad hos musculos, omnis enim spirituum animalium fluxus cessat, inde defectu influentium spirituum musculi laryngis quoque resolvuntur, qua resolutione tollitur respirandi obstaculum. Si hoc nunc tempore in tali corpore restat causa propellens spiritus, facile redibunt actiones vitales, quia in hoc articulo temporis actiones vitæ non peraguntur, deficiente spirituum vitalium influxu. Si in hoc casu Experimenta examino, invenio motum specialem vitalem in intestinis verbi gratia, & fibris pulmonum diu a morte adhucdum continuari in partibus his a corpore vivente separatis; atque invenio in viventibus quasdam fibras esse tensas, quæ sua contractilitate adhucdum pergunt in corpore detruncato continuare motum, quare venæ in mortuis animalibus pleniores & arteriæ evacuatae inveniuntur, atque videmus ductum thoracicum

in

in necato animali adhucdum sub ligatura intumescere. Binis his causis, remanente motu in quibusdam partibus & contractilitate in fibris per actionem vitæ extensis, existimo, stagnantem sanguinem in arteriis versus encephalum pelli sine actione cordis, atque spiritus stagnantes in canaliculis nervosis motus vitalis, eadem contractilitate vaginæ nervi & restante in eadem motu vitali, duci sensim ad cor & reliqua organa vitalia, quæ hoc renovato fluxu se iterum movere incipiunt, & quia sublata est causa constringens laryngem, parvus ille renovatus motus valebit renovare amissam respirationem, atque ita successive omnes actiones vitæ redeunt.

IV. De spumæ generatione circa os nescio quasnam fingunt malas causas, ut adstruerent hujus mali signi rationem: mihi autem videtur admodum simplex causa, quæ in proposito casu est assignanda. Experimentis constat, salivam & mukum trachæ arteriæ tenacia esse, & conquassata admodum spumescere, ergo in trachea arteria & larynge solummodo est assignandus motus agitans hunc mukum, ut misceatur aeri in hoc loco hærenti, statim enim habetur spuma. Quando fauces spasmo constrictæ sunt, motus specialis in membrana interna laryngis & trachæ & forsan bronchiorum, ut continuet respirationem, mukum adhærentem exprimit, eumque miscet aëri in aperta trachea & bronchiis hærenti, ita formatur intus spuma hoc motu violento, quæ spuma majus spatium occupans, quam mucus non conquassatus, atque spasmodica constrictione angustatis bronchiis atque trachea, spuma truditur per rimam laryngis, ut impleat os & emineat. Spumæ apparitio igitur denotat motum specialem pulmonum superare non potuisse spasmus constringentem, sed ulterius fecisse majorem bronchiorum & trachæ constrictionem, ita ut nunc tota illa via plena sit muco spumoso. Hinc constat, validam adesse suffocantem causam, quæ si tollatur per supervenientem Resolutionem, non valebit redeuns actio vitæ, admodum adhuc debilis, tantum dilatare pectus in inspiratione ut ingrediens aer posset superare omnem spumam ad restaurandam

Se non recolligunt, quibus spuma circa os.

dam respirationem, quare demum quoque cessante speciali motu pulmonum & actione ex contractilitate, nulla restat causa, qua cessantes actiones revocari potuissent. Atque ita ex tali paroxýsmo interficitur æger, qui in vitam potuisset revocari, modo spuma non implevisset vasa aerea pulmonis.

LIB. II. APH. XLIV.

69. **Q**ui naturâ sunt valdè crassi, magis subito moriuntur, quam graciles.

I.

Qui dicuntur
naturâ
valde crassi?

Quibus hominibus major est mollium partium moles secundum corporis latitudinem, quam in hominibus sanis reliquis observari naturaliter solet ejusdem staturæ, hi dicuntur Crassi & Obesi: istis igitur est partium mollium succulentarum major proportio ad ossa, quam in ceteris hominibus esse solet: hinc valde Crassi tales sunt, in quibus hæc differentia tanta est, ut non solum omnibus intuentibus facile pateat, sed ut ille homo, etiam si omnes functiones exercere valeat, non multum distet a morbo. Hæc enim plenitudo seu obesitas non provenit augmento firmarum partium, sed collectione humorum in earum receptaculis & vasis, ita ut æquilibrium inter causas agentes firmarum partium & molem humorum fere sit destructum: nam si copia humorum paulo major fiat, vires agentes multitudine obruerentur; dum vero in mediocri corporis mole homo nihil damni patiatur, si aliquomodo humorum moles fiat major. Corpus ergo valde Crassum non est morbus, sed talis status sanus, qui non potest ferre aliquod augmentum humorum vel diminutionem virium, quia incidat in morbum ex destructo æquilibrio. Talis

lis status duobus modis acquiritur vel natura vel arte: qui enim corporis quiete & otio, atque opiparo victu valde crassi fiunt, hanc obesitatem dicuntur acquisivisse ex arte vel auxilio adhibito: qui autem sine his in victu mediocri imo parciori fiunt admodum crassi, ex natura dicuntur tales esse. Etiam si ab utrisque causis eadem sit facta moles, periculosius erit ex natura talem habere habitum, quam per diætam, quia quod arte vel diætâ fuit natum, contrario artificio multo facilius potest tolli, quam quod ex natura sine causis artificialibus fuit inductum; valet enim medicus imperata parciori diætâ artificialem plenitudinem minuere sine damno, sed ex natura crassus huic vix obtemperat, & si duriori victu minuatur moles, plerumque simul in aliquem morbum incidit.

II. Quia in hoc loco Corpus Gracile opponitur Crasso, ^{Qui graciles?} non debemus intelligere omnem corporis Extenuationem; nam qui ex morbo fiunt graciles, uti in Aridura, Atrophia, Phthisi, in periculosiore versantur statu, quam corpora crassa: neque hic intelligenda corpora labore vel inedia emaciata, sed quæ in mediocri victus genere minorem molem partium mollium circumferunt; quæ corpora etiam si otio torpeant, & victu opiparo fruuntur, æque macilenta manent. Talis macies, quæ nihil morbosum continet, in qua homines æque sani degunt, ac illi qui mediocri habitu præditi sunt, multum detrahit de corporis splendore & elegantia, sed tamen est status minus periculosus, quam obesitas: nam dum additur in obesitas, simul non crescunt vires, quare multitudine facile opprimuntur: gracilibus autem si major fit detractio, simul detrahuntur vires, & inde nullus timor, ut ex tali destructo æquilibrio, superantibus viribus agentibus quantitatem humorum, nisi sit nimis acervata detractio, quæ etiam obesitas obesset, aliquid mali sit expectandum. Id est Corpus gracile tantum non periclitatur ablatione quadam, quam obesitas additione.

III. Non solum observatione Hippocratis constat, verum hodierna etiam experientia firmatum est, Obesos sine causa sensibili subito sæpe mori, raro autem id contingit ^{Cur crassi magis subito moriuntur quam graciles?} gra-

Gracilibus: debet ergo esse in corpore crasso quædam causa subitaneam mortem inferens, quæ non invenitur in gracilibus. Subito perit æger, si intercipiatur actio cordis, cerebelli, aut pulmonum: hæ autem actiones extinguere possunt in obesibus, si sanguis majore quantitate feratur ad encephalum, ut multitudine humorum opprimatur cerebrum, ut in apoplecticis, vel & cerebellum, ut in syncope, asphyxia, & catarrho suffocativo: hanc multitudinem obruentem vereri possumus in iis, in quibus tanta est humorum abundantia, ut fere inde destruat æquilibrium, qualis est in obesibus: sed in gracilibus, qui sine detrimento facile ferre possunt augmentum quantitatis, non est verendum mortem sæpe fieri posse ex abundantia.

LIB. II. APH. XLV.

70. **E**pilepticis pueris, mutationes, maxime ætatis, & regionum, & vitarum, liberationem faciunt.

I.

Proponit Auctor in hoc Aph: morbum, qui raro curatur, sed plerumque ad mortem ægrotantis solet perdurare, in quo tamen quosdam ponit casus, qui si obveniunt, hominem a morbo illo terribili & pertinaci liberant. Duæ adesse debent conditiones, prima ut sit in Pueris: reliqui autem exponunt in juvenibus, sed quia noster Auctor Aph. 7. sect. 5. dicit, quibus epilepsia ante pubertatem contingunt, mutationem habent, Pueri potius quam Juvenis nomen retinere volui, quia illa ætas pueris competit. Secunda, ut aliquid fiat in tali epileptico puero, quod observa-

tum

tum fuit attulisse sanationem, nempe. (1) Ætatis mutatio circa pubertatem; (2) mutatio regionis; (3) Vitarum seu victus mutatio. Ergo hæc tria si accidant, spem sanationis in puero epileptico præbebunt, sed non in adultis.

II. Quoniam Epilepsia morbus est, qui nomen obtinuit ex iis, quæ in ægro conspiciuntur, phænomenis, ille itaque ex phænomenis citatis a quovis alio morbo est distinguendus, ut inter omnes medicos constet, quum tales in ægro conspiciuntur apparitiones, eum Epilepsia laborare. (1) Adeste debet invita & reciproca violens musculorum motus voluntarii constrictio, ut illi muscoli, qui in sanis solo imperio mentis constringebantur & dimittebantur, nunc ex causa morbosa non mediocri, sed violenta constrictione alterne contrahantur, quæ contractionis potentia sæpe superat potentiam eorundem musculorum, quam exercere idem posset homo ex sua voluntate. (2) Multi vel omnes muscoli actionis voluntariæ ita debent agitari, quia si in quibusdam tantum obtineat, vocetur ille morbus motus convulsivus, & refertur ad species Convulsionis. (3) Cum hac invita constrictione debent simul extincti esse omnes sensus externi & interni, atque actiones ex voluntate, ita ut homo epilepsia correptus, nec audiat, nec videat, nec sentiat violentissimos dolores, nec recordetur, quæ acta sunt, dum tentabatur epilepsia: nam si sensus aut motus voluntarii in tali paroxysmo exerceri possunt, imperfecta species est Epilepsiæ, atque ad Convulsiones refertur. (4) Illa alterna invita constrictio vel per paroxysmos periodicos aut vagos recurrere debet, ita ut tempore intermedio æger fruatur perfecta sanitate, nisi quod ex præcedente paroxysmo aliquomodo sit delassatus: si vero interim aliquo morbo sit correptus, ut ille non sit hujus convulsionis causa: qui enim tali modo ex febre corripiuntur convulsione, ea agitatio vocatur Convulsio febrilis: & si perpetuo durat, etiamsi reliqua omnia epilepsiæ adsint, a medicis non dicitur epilepsia, sed Convulsio, quare reditus per paroxysmos pertinet ad essentiam Epilepsiæ.

Epilepsiæ
definitio.

III. Qui

Cur epilep-
sia facilior
pueris
quam adul-
tis?

III. Qui sedulo rimatur observata physiologicorum de generatione animalium, inveniet, quo animal propius est origini, eo nervorum imperium in reliquum corpus plus valere; oritur enim animal ex vermiculo capitato seu animalculo exiguo, capitulo mole reliqui corporis majore prædito, atque carina seu cauda, quæ incremente animali convertuntur in contenta encephali & spinæ: sensim vero reliquum corpus proportionate magis incrementum, quam id medullosum, quod in animali perfecto principium nervorum constituit: hoc inæquale incrementum durat, donec totus homo ad incrementi perfectionem venerit: & quo origini est propius animal, eo major est proportio hujus medullofi seu potius nervosi ad reliquum corpus: adeo ut si minima causa hoc nervosum afficiat, tenera membra statim consentiant, & in motum perturbatum quatiantur: magis autem firmata membra non tam facile ex levi causa a solitis muneribus detruduntur: ita Infans ex dentitione, torminibus ventris, vel & quavis leviori causa in totius corporis convulsionem incidit: adultus autem non nisi ex validiore causa convellitur. Ex dictis igitur constat, adultos non nisi magnâ causâ incidere posse in Epilepsiam, sed infantes etiam ex causa levissima; quare sæpe accidit, ut convulsionem epilepticæ sine multo periculo tolerantur, ut in vario- larum invasione. Igitur in pueris fieri possunt Epilepsie curabiles & incurabiles, sed in adultis raro curantur. Inde solent quoque practici Epilepsiam puerorum, ac si alius esset morbus, distincto titulo proponere.

Quæ species
Epilepsie
liberatur
mutatione
ætatis, regi-
onum, vi-
tarum?

IV. Ex iis, quæ hucusque disputavimus, satis constat, puerorum Epilepsiam interdum oriri ex levissima causa, quæ talis esse debet, ut tolli possit mutatione facta in ætate, regione, vel vita seu diætâ: nam illa phænomena recensita, ob quorum apparitionem hic morbus vocatur Epilepsia, non tolluntur, nisi tollatur causa hæc phænomena produciens: sed illa causa multiplex esse potest, ut clare constat ex *Compendio nostro* Tr. 30. Quæ omnes hac inducta mutatione, etiam si epilepsiam in puero inducant, auferri non possunt. Quædam igitur in pueris sunt citandæ, quæ
huc

huic mutationi auscultant. Frequentissima Epilepsiæ puerorum causa, ut quoque olim demonstravit Harris ut & multi alii, est Acrimonia *Acida*, in primis viis congesta, ibidem irritando totum corpus in consensum trahens; hoc autem Acidum continuo circulantibus traditum, totam massam simili acredine inficit, ut tandem quoque nervorum succus aciditate infectus, forsan frequentiores epilepticos insultus faciat, quam acidum in primis viis. Hoc autem praxi constat, medicamenta acidum curantia longo tempore adhibita in epilepsia puerorum esse arcana, ut longus ille usus tandem omnem aciditatem humorum extinguat. Qui pueri ab hac causa fiunt Epileptici, dum per Ætatem robustiores sunt facti, sponte id acidum curant: quia acidi productio nunquam in nobis formatur, nisi ex assumptis alimentis acescentibus, quæ defectu virium permittuntur in acidum assumptis proprium commutari; sed acidum natum si non accipit suppetias, quoniam corpus viribus sensim magis pollet, sensim evanescere incipit; imo viribus valentibus extinguitur, ut experiuntur robusti acidum assumentes, nihil acidi nisi ex sua natura in aliam indolem conversa, evacuant. Quoniam vero admodum constans est virium incrementum circa pubertatem, & incrementum virium semper extinguit acrimoniam acidam, spontanea mutatione inductam, recte adjunxit Auctor *maxime*, quia reliquæ mutationes minus certe hoc acre emendant. Interim Regionum & victus mutatio generationi aciditatis contraria, ut & medicamenta acidum emendantia hanc puerorum Epilepsiam curare valent.

Acidum
frequens est
causa

LIB. II. APH. XLVI.

71. **D** Vobis doloribus simul abortis, non in eodem loco, vehementior obscurat alterum.

I.

E Tiamsi hæc medica observatio Doloris unicuique nota sit, multos tamen naturæ perscrutatores in admirationem rapuit, sciscitantes modum & causam hujus phænomeni: Ergo veritas hujus non est multis experimentis confirmanda, sed invenienda est lex generalis, ad quam hoc phænomenon referri potest, nam leges naturales nobis innatæ experimentis detectæ ampliore explicatione ulterius exponi nequeunt, nisi quod a summo Opifice ita sint conditæ.

Quid sit
Dolor.

II. Omnium primo inter medicos constare debet, quid sit Dolor, de quo superius (Aph. 31, III.) quoque verba fecimus, sed in hoc loco ita est definiendus, ut intelligatur cur Vehementior obscuret alterum. Qui rogaret indoctum quid sit Dolere, risum equidem moveret, quum nullus sit, quin interdum Dolorem perceperit, aut vel levi experimento in proprio suo corpore potuisset experiri. Illa tamen res notissima describere verbis, multis magnam præbuit difficultatem, quia voluerunt ex causa dolorem inferente definire Dolorem: quidam enim dicunt esse impeditum spirituum fluxum, alii nervorum vellicationem, alii tensionem fibræ nerveæ ruptioni imminentis, alii iterum alia adferunt. Sed qui quærit, quid sit Dolor, ponit Dolorem esse rem incognitam, quam vult habere cognitam per aliquam descriptionem rerum cognitarum, sed non quærit Doloris causam. Igitur suppeditanda est alia res quærenti cognita, cui

cui Dolor est comparandus, vel multæ res cognitæ sunt conjungendæ, ut eæ conjunctæ uno nomine Doloris exprimantur. Suppono itaque, quærenti cognitum esse, quid sit sentire aut percipere sensum; intelligere quoque, quid sit ingratum, quid molestum, quid adversum, quod evitare conatur, si possit. Qui igitur in suo corpore percipit sensum sed solito vehementiorem, junctum cum ingratitudine, tristitia, aversatione, molestia, talis perceptio vocatur Dolor. Hæc descriptio Doloris propterea non data est, ut rem incognitam exponerem, quasi nulli esset notum, quid sit Dolor, sed ut ex separatis rebus in Dolore concurrentibus invenirem, quæ sint præcipue in Dolore observanda. Ita enim invenio esse sensus speciem, atque organis sensuum exerceri, quare Doloris naturam possum ex sensuum doctrina exponere: atque scio causas sensum inferentes, etiam Dolores inferre posse, sed quia Dolor est sensus vehementior, scio, sensus causas majores & validiores in Dolore esse. Denique ex ingrata perceptione colligo, meum corpus inde aliquod damnum pati posse, aut in parte dolente aliquid interitum minari.

III. Unus Dolor, inquit, obscurat alterum, quod denotat Dolorem mitiorem non curari vel tolli, sed minus sentiri, si levior Dolor aliam partem infestat, ne decipiamur in judicio, ac si ob vehementiam Doloris causa alterius mitioris doloris minueretur, sed quia vivida Doloris perceptio solummodo obscuratur. Hi duo Dolores possunt esse in eodem membro vel parte, sed tunc potuisset compressione nervi per Dolorem vehementiorem minui sensus Doloris mitioris; sed observavit, obscurari quoque Dolorem in quacumque alia corporis parte per Dolorem vehementiorem, ubi nulla potest esse suspicio obscurationis ex nervo compresso. Hinc per Dolorem vehementiorem debet aliquid fieri in corpore, quod vividam perceptionem in quacumque alia corporis parte obscurat. Hæc observatio generalis est ex sensuum exercitatione deducenda, in qua experimur, unum sensum obturare non solum alterum, sed inter omnes actiones voluntarias hoc observatur vinculum & necessitudo,

Cur dolor
vehementi-
or obscurat
alterum?

do, ita profunde cogitans imperfectius exercere potest sensus externos & motum voluntarium: sensum externum cum studio exercens minus valet sensum internum & motum voluntarium exercere. Qui vero motum voluntarium exercet, minus attente operatur sensibus externis & internis. Omnia hæc exemplis vel experimentis illustrare, nimis longum foret: unusquisque hoc in semetipso experiri potest, nisi arte vel consuetudine didicit, duas tresve actiones voluntarias exercere simul, experietur, non omnes perfecte fieri. Itaque Dolor quia est species sensus, has quoque leges generales sequitur, nihilque arcani hæc observatio complectitur. Hoc autem boni suggerit, quod liberet nos a perverso iudicio de Doloris ablatione, dum propter Dorem vehementiorem in quavis alia parte videatur evanescere. Quare semper in Doloris mitigatione attendendum, num mitigetur obscuratio, vel diminutione causæ.

LIB. II. APH. XLVII.

72. **C**irca puris generationes, dolores, & febres magis accidunt, quam ipso facto.

I.

Puris Generatio quid sit.

IN corpore sano nunquam Pus reperitur, est ergo semper morbosus humor, sive maneat in corpore, sive exeat; estque productum actionis vitalis, quia in cadavere nunquam formatur, aut ulla arte chemica generari potest: nullus enim chemicorum ullo artificio ex quovis humore nostri corporis Pus facere potuit. Et in nobis observatur solummodo formari in loco quodam clauso: nam si ulcus aëri aperto exponitur, in superficie format crustam, sub qua pus confectum colligitur, aut si ulcus emplastro vel alio operculo tegitur, sine crusta locus ille pure repletur. Ipsa autem medicamenta non conficiunt Pus, quoniam sine medi-

camentis tamen in nobis formatur: sed si quædam sunt in nobis impedimenta, iis impedimentis sublati promovetur Suppuratio. Operæ pretium erit rimari actionem vitæ pus facientem, & materiem, ex qua formatur pus. In viventibus duæ actiones inveniuntur; una vitalis, qua ex assumptis alimentis conficitur sanguis; atque ex eo reliqui boni & servientes liquores, partesque firmæ, qua etiam inutile factum vel quod subigi nequit adaptatur evacuationi, & actu expellitur; altera est automatica, ut corruptio, fermentatio, putredo, effervescencia, quorum effectus Chemicus norit artificio suo imitari. Sed neque actione vitali, neque automatica conficitur pus: quod in nobis producitur actione automatica, est corruptum aliquid, minime autem Pus. Invenimus quoque, hoc interesse inter Pus & Corruptum liquorem; Pus habere majorem quam aqua pura specificam gravitatem, in aqua enim dimissum fundum petit, ut nostri humores boni circulatorii; sed Corruptus humor supernatat, uti nostri humores excrementitii. Propterea non inepte dixit Galenus in hoc Aph: Pus esse humorem semi corruptum, quia notas non habet boni & corrupti humoris, sed de utrisque participat, neque productum esse motu automatico corruptente, neque motu vitali moderato: atque puris generationem inter bonas mutationes censeret, non tamen esse commutationem in humorem nutrientem; sed humoris degenerationem per corruptionem semper esse malum.

II. Constat perpetua observatione solis in viventibus formari Pus: sed actio illa in sanis hoc nunquam facit, ergo hoc fieri debet, si actio vitæ aliquomodo ab ordine solito recesserit. Experimenta in viventibus & morbi docent, post majorem circulationem vel in toto corpore, vel in quadam speciali parte pus prodire: nam post febres ardentes & morbos acutos sæpe magna copia puris emittitur, aut alicubi in parte speciali deponitur sine prægressa inflammatione istius partis: vel post inflammationem particularem pars antea inflammata abscessum purulentum format: imo pars sana vulnerata, vel læsa, ut inde inflammationem concipiat, pus in loco læso post aliquod tempus colligit. His omni-

Quæ actio
vitæ gene-
rat pus?

bus constat, circulationem seu motum vitalem per totum corpus vel in speciali parte formare Pus. Sed hoc quoque experimur, cum motum nimis validum non formare Pus sed abire in corruptionem, quam sphacelum vel gangrænam vocant. Hinc actio vitæ moderata dicitur Coctio faciens humores nutrientes; actio validior autem Coctio materiæ morbi in purulentiam; actio validissima tendit in destructionem seu corruptelam per nimium motum vitalem: sed actio minor quam in sanis, permittit corruptionem automaticam. Hinc intelligitur, quantum debet augeri vel minui motus vitalis in acutis, quum optima mutatio fiat in Pus, instigandus est motus vitalis si torpeat, sed sedandus si nimis intensus sit, ut paulo maiore circulatione humor mute-
tur in Pus.

Ex qua
materia for-
matur pus?

III. In corpore sano nullum alienum morbosum humorem continente infligatur vulnus, eo in loco formatur pus, ergo materia illa ex qua formatur, est humor nutritivus ex assumptis, vel excrementivus, vel bonus, qui corpori est utilis. Ex tribus his per colorem album decepti existimant nonnulli, Chylum commutari in pus, sed in chylo deficit illa naturalis major gravitas, quæ in pure observatur, atque post longam inediam tamen formatur, etiamsi nihil chylosi restet in corpore: neque excrementivus humor hanc mutationem subire valet, cum corporis actione ad eam specificam levitatem ductus, non patitur tantum compingi, ut hanc acquirat puris gravitatem: Quare verisimile mihi videtur, materiam gelatinosam humorum & concrescibilem motu maiore vitali commutari in pus.

Cur circa
puris gene-
rationes
Dolores &
febres ma-
gis acci-
dunt, quam
ipso facto?

IV. In morbis inflammatoriis internis & inflammationibus externis particularibus, egregia est observatio medica practica; sensim intendi in his dolores & febres, donec pus sit natum, sed eo facto sensim leniri dolorem & mitescere febrem, quia inde nobis constat, minui posse inflammationis symptomata, etiamsi non sit curatus morbus, sed transiit in suppurationem. Atque inde cognoscimus, num morbus adhuc dum versetur in inflammatione, vel commutatus fuerit in morbum suppuratorium: ut ita valeat quoque medicus suam
simul

simul mutare medendi methodum. Hujus mutationis hæc mihi videtur causa. Dum pars quædam corporis vel a causa mechanica vel stimulo inflammatorio instigatur, sensim motus ex stimulo magis magisque intenditur, ut experimur in parte quacumque irritata, si maneat stimulans causa, partes ita sensim magis agitatæ, sensim quoque magis calere & dolere incipiunt: hoc si fiat per universum corpus, vocatur febris calida vel ardens, & in parte speciali Inflammatio localis. Ablato autem stimulo sensim quoque incipit ille motus ex stimulo major compesci, atque Dolor ex eo motu & stimulo natus mitigari. Ita Pus ex hoc aucto motu natum, collectum inter causam stimulantem & partem vitalem, facit, ut stimulans causa non amplius eam partem tangat, quare obvoluto stimulo per pus natum, quietem concedit his partibus stimulo agitatæ: quare hoc tempore sensim majore copia puris interposita, & quia sensim quoque instigatus motus compescitur, Dolor & febris ex hoc instigato motu nata minui incipiunt, & ita loco Inflammationis habetur morbus purulentus. Quando ob stimulum minorem minor Calor, Dolor, & Febris observantur.

LIB. II. A P H. XLVIII.

73. **I**N omni corporis motu, quando dolere cœperit, interquiescere statim lassitudinem curat.

I.

EX physiologicis demonstratum assumo, nam nimis longum foret hic proponere, motum voluntarium fieri alterno & copiosiore spirituum influxu per nervos in istos musculos, qui voluntatis actione exercentur; atque hoc alterne

Corporis
motus do-
lorem &
lassitudi-
nem facit.

alterno motu, præprimis si vel nimis diu duret, vel nimis fortis sit, fibras musculares agitatae simili fere modo affectas esse, uti a levi contusione, vel frictione unius partis ad aliam, cum muscoli alterne non possint constringi, quin simul una fibra musculi terat aliquomodo alteram, ob quem attritum nimium evitandum Deus posuit inter fibras musculares pinguetudinem, quæ motu continuato sensim consumitur, ut tandem circa finem una fibra alteram magis terat. Cum vero ille motus voluntarius diutius continuatus fuerit, spiritus sensim deficere incipiunt inserviando: ex hac denique penuria spirituum formatur ad motum ineptitudo seu impotentia, quæ ex motu musculari nata vocatur *Lassitudo*. Et quoniam continuato illo attritu fibrarum inducitur levis inflammatio, quæ conjunctum Dolorem habet, inde pars illa præ ceteris agitata quoque dolet: ut omnes homines experiuntur, qui sua corpora diutius & validius exercent. Hoc quia omnibus constat hominibus, existimarunt Interpretes nonnulli, hanc sententiam Hippocrati indignam esse, quasi nil nisi arcana debuisset noster Auctor proferre. Ego autem existimo, eum, qui fundamenta artis studet condere, oportere notissimas res quoque proferre, ut istis demonstratis possit uti ad obscuriora explicanda, quemadmodum in sequentibus constabit.

Quies curat lassitudinem & dolorem ex labore.

II. Qui post tamdiu toleratos labores suum corpus ad quietem componit, huic non amplius tanta copia spirituum fertur ad musculos, neque fibræ musculares amplius fricantur: sentit tunc quidem ex spiritibus consumptis ineptitudinem ad motum, & molestum sensum in contritis fibris levi inflammatione affectis, sed quia cessat causa duo illa producens, inde corporis actio vitalis ex reliquis humoribus præparat materiem spiritibus suppeditandis aptam, præprimis si superdormiat; quare post aliquod tempus restaurata materia spirituum, corpus iterum fit agile, ut antea. Levis quoque inducta inflammatio sensim iterum evanescit, ut si pars ex fricatione rubet, cessante fricatione ad naturalem colorem redit sensim, ita quoque in his musculis agitatae inducta lenis inflammatio evanescit: atque consumpta

sumta pinguetudo per continuatum motum, nunc per quietem restauratur, ut ita ea pars similis fiat, ut erat ante exercitationem. Hæc autem ipso momento quietis non restaurantur, ut nonnulli ex hoc Aph: colligere conantur, hoc nimis obesset quotidianæ experientiæ, quam ut hoc nescivisset Hipp: Quare ut sensus constet, hoc modo legendus est hic Aph: *In omni corporis motu quando dolere cæperit, interquiescere statim, lassitudinem curat.* Monet igitur Hipp: nos non debere continuare illum corporis motum, si Dolorem aut Lassitudinem induxerit, ut multi conantur, ut per motum continuatum superent eum Dolorem & Lassitudinem; sed vult, ut talis homo statim quiescat, quoniam quies multo melius curabit Lassitudinem & Dolorem, quam motus continuatus.

LIB. II. A P H. XLIX.

74. **C**onsueti solitos labores ferre, etiamsi fuerint debiles aut senes, insuetis, robustis licet & juvenibus, facilius ferunt.

I.

Multum valere Consuetudinem in capiendis alimentis, superius (Aph. 16, iv. Aph. 17, iv) notavimus, in hoc autem loco sermo habendus, quid valeat consuetudo in corporis exercitiis, de quibus prædicat Auctor tantum valere, ut sæpe superet innatam potentiam: sine Consuetudine enim juvenes & robusti facilius tolerant labores, quam senes & debiles, dum tamen contendit, contrarium fieri posse ex Consuetudine. Duæ itaque res in hoc loco examinandæ veniunt: (1) an illa veritas experientis sit firmata: (2) quali modo nostrum corpus Consuetu-

fuetudine laboris firmatur, ut facilius toleret labores. Monuerat in præcedente, quamdiu labores erant tolerandi, ut conservetur fanitas generaliter in omnibus hominibus tam assuetis quam insuetis. Hoc autem loco indicare vult, quod si aliquis multos & graviores velit ferre labores, eum non oportere se statim accingere, sed comparare sibi aliquam consuetudinem.

Consueti
facilius to-
lerant labo-
res

II. Qui manuum pedumque opera totam vitam assueti fuere victum quærere, vel qui gladio, saltu, quovisque corporis exercitatione suum corpus fatigarunt, a duriori illo labore vix fatigantur: nos vero otiosam vitam ducere consueti literisque dare operam, interdum levi ambulatione non solum corpus statim sentimus lassum & ad ulteriorem motum ineptum, atque dolens; sed si obnixe contendimus cum assueto licet viribus minus valente, continuare labores, nostrum corpus veluti comminutum sentitur, ita ut longo tempore egeat, antequam restauratur. Illi vero e contra severiore studio brevi hebescent, imo ad ætatis constantiam pervenientes ad studia excolenda se sentiunt inidoneos, dum vero literis assueti etiam in senectute ulterius discere valeant. Tantum valet Consuetudo in nobis, ut non solum corporis actiones obfirmentur, sed & nostra mens immortalis ingenii exercitatione firmetur. An vero certo generi laboris assuetus minus defatigetur in diverso genere laboris, quam qui omnino otiose vixit, hoc generali observatione in hominibus est assequendum. Experimur ab insolitis laboribus magis defatigari quam a solitis, sed tamen corpus laboribus assuetum ferre facilius potest quosvis alios labores, quam corpus continuo otio torpens: ita qui exercuit ingenium, quavis quoque alia in scientia valebit magis, quam ille, qui nunquam literas excoluit.

Laboris
consuetudo
quid in no-
bis faciat.

III. Aliam legem in nostro vivente corpore invenio, quam in ullis rebus mortuis: omnia enim corpora mortua usu deteruntur, nostrum autem corpus ab exercitiis, frictionibus & attritu occallescit, durius fit & tenacius cohærens, quod non solum in cute externa manuum & pedum operariorum, verum etiam in partibus interioribus verum invenimus,

nimus: hinc in iis aorta callosa imo ossea fuit inventa, & callus obtegens capitulum ossis luxati non repositi: modo statim non applicetur vehementior attritus, quam cohæsione fibrarum potuisset sine solutione sustentari. Ex lege generali ergo constat, fibras musculares toties exercitatas tenaciores fieri, & propterea non tam facile dirumpi posse & inflammari, quam fibræ motui inassuetæ. Ex laboribus non ita vehementibus inassuetis generabitur in manibus rubedo, vesiculæ aquosæ & excoriatio, aut diutius ambulanti inflammabuntur pedes; quorum autem manus & pedes callo obducta sunt, ab iisdem laboribus ne minimam læsionem percipient. Ita igitur ex innata generali lege, quia fibræ musculares callosæ sunt factæ, laboribus assuetus in istis musculis minus dolebit. Ex his autem non patet, quam ob rem minus fatigantur defectu spirituum. Sed experimur quoque omnes, corpora evacuationi assueta minus lædi quam non assueta, quoniam corpus longa consuetudine quasi firmatum ad generationem majoris copię spirituum, tandem quoque majorem aptitudinem acquirit. Ulterior hujus rei inquisitio neque utilis est neque prodesse potest medico, debemus tandem fateri, hanc legem nostris corporibus viventibus a Deo innatam esse, quæ in rebus mortuis non invenitur: eamque observare medico sufficit, licet primas causas non attingat.

LIB. II. APH. L.

75. *A Multo tempore consueta, etiamsi fuerint deteriora, insuetis minus turbare solent. Oportet igitur etiam ad insolita mutare.*

I.

DUm nascitur homo, nullis rebus assuetus est, at ex innata natura exigit alimenta facilis digestionis sæpe de die, atque corpus sensim increscens naturalem habitum & figuram acquirit sine ullo artificio. Satim vero

Consuetudinis differentia.

accedit ars curatricum, cingunt ligantque membra, quaedamque corporis partes, ut pulchriorem formam, ut putant, acquirant. Ita *Hipp.* a, 348. narrat de quadam gente, in qua infantum capita ita cingebantur, ut prohiberetur rotunditas, sed acquireretur figura oblonga, hos macrocephalos vocat; tandem longa illa consuetudo non amplius egebat artificio, quasi natura cum consuetudine conspiraret. Hodie autem strictissime cingunt præcordia ut graciles fiant puellæ. In aliis regionibus stringunt pedes, ut maneat parvi, tandem formantur corpora in quamcumque formam, quam decus istius gentis vel morum exigit. Hoc etiam in victu *Aph.* 17, iv. Laboribus tolerandis *Aph.* 74, & omnibus aliis in rebus verum observatur. Sed ut Consuetudo convertatur in naturam, primum est, ut instituatur statim a nativitate, nam in adultioribus non facile fit: alterum est, ut longo tempore fiat, brevi enim tempore si aliquid fiat, consuetudo in habitum seu naturam non commutatur.

Cur consuetudo deteriora insuetis minus turbare solent.

II. Quænam hic intelligantur per Meliora & Deteriora, exponendum est, quia si aliquis rebus quibusdam assuetus sit, omnes mutationes ipsi videbuntur deteriores. Itaque accipiendi sunt homines nullis rebus assueti, quæ tunc in his observantur conservare sanitatem, nullamque molestiam afferre, dicuntur meliora; quæ autem difficilius tolerantur ab homine non consueto, dicuntur deteriora. De his nunc Deterioribus dicit Auctor, ea minus turbare vel molestare consuetos a longo tempore, quam insuetos. Ut si quis longo tempore degit in regione calida vel frigida, usus fuerit victu duro vel levi, copioso vel parco, corpus multum vel parum exercuit longo tempore, talis homo non fert mutationem, quin inde turbetur vel molestiam percipiat, quia longa illa Consuetudo quasi in naturam sit commutata, ut superius de corporis varia artificiali forma monuimus. Hoc non solum in rebus, quæ æque bonæ censentur, sed & in deterioribus, quæ corporibus nullis rebus assuetis intulissent molestiam & damnum. Qui potione spiritiosa a longo tempore deperierunt, ut unum adferam exemplum,

emplum, infinita vero incurrunt, hi podagra correpti, vel hydrope, vel debilitate affecti ex spirituosorum abusu, si omitterent spirituosorum potionem, admodum periclitantur, etiam si genius morbi abstinentionem exigeret: sæpe enim observavi spirituosos addictos, si propter doloris vehementiam, vel monitu adstantium aut amicorum vel medicorum, omiserunt hanc potionem, deficiente stimulo consueto spirituofo, periisse. Tantum ægris valet Consuetudo, ut deterioribus debeamus indulgere.

III. Inter medicos non constat, an certum & fixum vitæ genus sit eligendum ad sanitatis conservationem & longævitatē acquirendam, num vero varium & mutabile debeat vitæ genus institui. Si absolute ratiocinemur, ea sola sunt eligenda, quæ nobis non assuetudini addictis nullam adferre possunt molestiam, id est temperate vivere maxime salubre, quia omnia deteriora, etiam si propter Consuetudinem non amplius inferant molestiam, tamen sanitati & longævitati obsunt, quum intemperate viventes raro decrepitam ætatem attingant. Quia vero omnes homines inopinatis rerum fortibus subjiciuntur, ne incidamus repente in nobis insueta, satius est, inquit Galenus, omnia tentare. Atque Celsus monet, sanum hominem, beneque valentem, nullis obligare se legibus debere.

An euidam
generi vitæ
assuescen-
dum.

Et noster Auctor, *oportet etiam ad insolita mutare*. Sed quæ est causa hujus mutationis, regulariter magis conducit solis melioribus uti, sed quoniam multi in his totam vitam transigere nequeunt, coguntur multa tentare, ne ex consuetudine a deterioribus nimis lædantur. Ergo deterioribus uti non est conservare vitam & sanitatem; sed quia non semper valemus in communi vita evitare deteriora, hinc illis, qui non obstricti sunt interdum deterioribus uti, non est opus ad vitæ & sanitatis conservationem singulis mensibus vomere vel bibere ad ebrietatem, ut monet Celsus; nemo enim cogitur ex natura abuti spirituosos, aut edere vel bibere nimium.

LIB. II. APH. LI.

76. **M**ultum, & derepentè, aut evacuare, aut replere, aut calefacere, aut frigesacere, aut aliter quocumque modo corpus movere, periculosum est. Nam etiam omne multum, naturæ est inimicum. Quod vero paulatim fit, tutum est: tum alias, tum si quis ex altero ad alterum transeat.

I.

Consuetudo
non subito
mutanda.

Dixerat in præcedente, nos consuetudine acquirere habitum, ut facilius toleremus deteriora, si ergo recedere volumus ab hac mala consuetudine, nunc regulam generalem suggerit, eam mutationem paulatim fieri debere, cum omnis subita mutatio non careat periculo: imo addit damnosum esse, siue recedamus a peioribus ad meliora, vel a melioribus ad peiora, quam sententiam his verbis complectitur *tum alias, tum si quis ex altero ad alterum transeat*. Egerat enim in superiore de consuetudine Deteriorum, & meliorum, quam rem hoc loco ulterius vult persequi, ut demonstret, quali modo consueta sunt mutanda. Quæ igitur hoc loco proponuntur, ad Diætam sunt perstringenda, sed minime ad omnes curationes morborum extendenda, interdum enim in periculosis morbis subitanæ mutationes sunt inducendæ ad majus malum evitandum. Hujus regulæ generalis quædam exhibet specimina.

Periculo-
um est
multum &
derepente
evacuare.

II. Quoniam versamur in homine vel perfecte sano vel leviter ægrotante, sententia de multa & repentina evacuatione ad talem casum est perstringenda, & quidem in homine hujusmodi evacuationi non assueto, quod si vel per venæ sectionem multum sanguinis detrahas, vel purgantè vel vomitio-

mitorio multum evacuas & subito, talis æger facile incidet in syncopen, & forsan non reviviscet: quod si talis evacuatio instituta fuit ob nimiam humorum abundantiam, ne quidem tunc conducit, ut monuimus *Aph.* 3, ix. Si vero sine abundantia *Aph.* 2, v. fiat, eo peior est, quia tunc cum ablatione boni destruitur æquilibrium. In Consuetis autem minus malum, quoniam hi largiorem ferunt evacuationem sine multo detrimento: ita fæminæ copiose menstruantes facilius ferunt largiorem sanguinis evacuationem, quam viri robusti sine metu leipothymix, quod multi mirantur: in his autem si modum excedat, uti in mensium profluvio, non raro fiunt hydropicæ; quare ne quidem repenta & multa evacuatio assuetis conducit. In morbis quoque multis non est licitum talem facere morbose humoris evacuationem, uti in hydrope & empyemate: cavent enim omnes prudentiores Medici & Chirurghi, ne nimis cito omnem humorem evacuent. Sed in phrenitide, pleuritide aliisque morbis, quibus subito instat summum periculum, imperamus largam evacuationem, ut præveniatur majus malum.

III. Quæ corpora magnam simul copiam alimentorum ^{Replere} sumere sunt consueta, etiamsi minus lædantur reliquis, ad sanitatis autem conservationem non conducit, corpus nostrum toties onere pressum, tandem succumbit: magis autem id experietur corpus insuetum; est enim in nobis nata definita actio subigens, quæ valet mediocre ingestum in bonum succum assimilare: sed si nimis ingeritur, id abundans non solum opprimit vires, ut corrumpatur, sed etiam reliquum, aliter in mediocri quantitate sumtum subigendum, impedit præparari, quare omne ingestum manet crudum & dein corruptum non carens periculo. Vide quæ disputavimus *Aph.* 5, iii. & *Aph.* 42. ii, iii, iv. his satis constabit asserti Auctoris veritas.

IV. Duobus modis corpora nostra calefiunt, unum ge- ^{Calefacere.} nus dicitur fieri Actu, alterum Potentia. Nos enim, ut omnia corpora etiam mortua a calido applicato, incalescimus, sive sit aer calidior, sive ignis accensus, sive collectus in aliquo corpore; de hujus Caloris communicatione nemo

nemo ambigit: sed alterum genus in viventibus solis observatur, si excipiamus incalescentiam putredinis, fermentationis & effervescentiæ, qui calor dependens ab actione vitæ, augetur omnibus stimulantibus, majorem motum vitalem facientibus, & inde calefacientibus dictis. Ita experimur, aromaticis, vel spirituosissimis assumptis aut applicatis, etiamsi illa ad thermometer nullum indicium præbeant caloris, in nobis tamen calorem verum & sensibilem concitare. De utrisque nunc monet Auctor, periculum esse, si multum & repente excitetur Calor. Qui enim consuetus est in aere frigidiori versari, deferatur in aerem admodum calidum, aut si tempestates subito mutantur, non solum homines magnam molestiam experiuntur, sed etiam hanc mutationem non sine periculo experiuntur. Qui partem gelu constrictam majore calore tentat degelare, partem destructam inveniet. Qui calido vapore, vel accenso alcohole conatur resolvere concretos humores, caveat, ne nimis cito nimium calorem concitet, perierunt enim nonnulli ferre non potentes tam repentam mutationem, qui calor sensim auctus in majori gradu sine damno potuisset tolerari. Hoc quoque consuetum est observare in Calefacientium exhibitione, si a majore dosi inchoamus, magnam molestiam adferunt, sed a minima dosi data, sensim vero adscendens ad majorem dosin, felicem dedit in Chronicis curationem.

Frige facere.

V. Quod monuimus de Calefacientibus, id quoque statuentum est de Frige facientibus: sunt enim corpora actu frigida, quæ alteri corpori calidiori demunt calorem; sunt etiam quæ potentiâ refrigerant, ut nitrum & omnia nitrosa. Non minus in his, quam in præcedentibus datur peccandi locus. Corpora enim excalefacta exponere aëri frigido nihil periculosius, quæ experimenta omnibus ita sunt obvia, ut non egeamus exemplis. Sed de Refrigerantibus videtur hodie nullum periculum existare, quasi nemo in his, quæ antiphlogistica vocant, in excessu potuisset peccare, sed secundum nostrum Auctorem & experientiam constat, antiphlogistica omnis periculi non esse expertia, etiamsi toties non in his, quam in actu frigidis experimur damnum.

VI. Qui

VI. Qui equos aliaque animalia exercere norunt, nunquam permittunt, ut equus a stabulo veniens statim valido agitetur cursu; neque ut a cursu veniens statim in stabulo quiescat: experientia enim didicerunt, si hac cautela non fuere usi, hæc animalia sæpe damnum passa fuere. Ita etiam in hominibus observamus, qui a longo tempore dixerunt suum exercere corpus, si dein se totum tradant otio, plerumque aliquo corripuntur morbo; neque tam facile est vitam otiosam in validiora exercitia commutare. Lente semper omnis illa mutatio est inducenda. Quare regula generalis constat, omnis subitanea mutatio non vacat periculo.

Motus &
quies cor-
poris.

VII. Hucusque cum nostro Auctore probavimus Replere, Calefacere, Frigefacere, & Movere non conducere, si subito fiant, quoniam corpus consuetum alicui rei non facile patitur subito ad contrarium statum duci. Restat autem videre, multum Replere, &c: quoque periculosum esse, si corpus assuetum sit, si non. Qui enim multum evacuat, si sit bonus siue malus humor, semper destruit æquilibrium, detrahitque naturale sustentaculum: vasa enim & fibræ nostri corporis mediocri vel majore etiam copia humorum distenta, se nequeunt tam subito accurtare, ut satis firmiter amplectantur relictos humores tantâ copiâ privatos; unde vasa non satis humoribus distenta collabuntur, & semi impleta istos minus propellunt, imo stagnare patiuntur. Si talis subito Evacuatio fiat ex cavis corporis, nisi artificiale accedat sustentaculum, vasa antea humoribus incumbens sustentata, nunc sustentaculo orbata, ultra modum tument, omnesque fere reliquos e corpore humores in se recipiunt, imo interdum disrumpuntur, ut observamus in subitanea puris ex abscessu, vel cavo pectoris educatione, & in paracenthesi hydropicorum. Quare siue corpus sit assuetum siue non, siue bonus educatur humor siue morbosus, omnis evacuatio nimia non caret periculo. Neque Repletio modum excedens in hominibus quidem consuetis sanitati conducit. Multi autem existimant, pari passu corpus nutrirî cum copia ingestorum, judicantes inde multum lædi non posse. Sed si perpenderent, ingesta ali-

Omne mul-
tum naturæ
inimicum.

menta naturâ diversa esse ab eo, quod in nobis nutriri debet, illa actione nostri corporis primo esse commutanda, quæ actio multitudine obruta nil boni conficit, facile intelligerent, multum ingestum potius inducere cruditatem vel corruptelam, quam bonos nutrientes humores generare. Hoc etiam sentiendum est de Calore & Frigore: nimius enim Calor etiam in corporibus assuetis non conducit sanitati, quoniam nimius Calor enervat nimis, disponit ad putredinem, & ultra modum dissolvit humores, fervor autem coagulat humores & partes firmas crispare facit; sed frigus nimis inspissat humores, atque tantum minuit motum vitalem, ut in nimio frigore omnino subsistat; dum vero tepor moderatus saluberrimus sit corpori: quare non parum peccant medici, qui excessu refrigerandi vel calefaciendi conantur morbis mederi. Etiam si in multis morbis Chronicis corporis Exercitatio summum statuatur auxilium, longe verò abest corpus multum exercere conducere sanitati; mediocris quidem membrorum agitatio humores concoquit, sed nimius motus bonos humores nimis vel deterit, vel convertit in lentorem: neque multum quiescere debet homo ad sanitatem conservandam, quoniam omnis præparatio solo motu vitali est absolvenda, & multi humores in remotissimis vasculis & cellulis stagnantes, quia ultra debitum tempus ibidem relinquuntur, dum exeunt, corrupti inveniuntur. Ex His constat, omne multum & derepente factum tam in Consuetis quam in Inconsuetis periculosum esse, etiam si Consuetos minus afficiat.

LIB. II. APH. LII.

77. **O**mnia secundum rationem facienti, & non secundum rationem evenientibus, non transiendum ad aliud, manente eo, quod visum ab initio.

I.

SI omnes curandi modos perscrutemur, experimur his tribus modis tentari Curationem. (1) *Empirica* est, quæ solis vagis nititur experimentis: ut si aliquid profuerit in dolore, inappetentia, debilitate, delirio, vertigine reliquisque morbis, qui ex unico præcipuo phænomeno obtinuerunt nomen, protinus audito vel viso phænomeno in promptu habet appropriatum medicamentum, vel didicit medendi methodum, aut adhibet regimen in diæta, quibus ille morbus antea fuit curatus, si fideliter agit Empiricus. Nihil est, quod majus damnum intulit Medicinæ, quam hujusmodi arcana, quoniam idem phænomenon in sensus incurrens, ad quod solummodo attendit Empiricus, & existimat se ex arte agere, variis & sæpe oppositis nascitur causis, quæ suam appropriatam exigunt curationem. Hos morbos variis nasci causis, variamque postulare curationem, passim indicavimus in Compendio nostro. Quare non mirandum, Empiricos suis probatis medicamentis frustra toties tentasse curationem: & nostram scientiam ad hoc usque tempus in Curatione non majorem fecisse progressum. Sperandum itaque esset in posterum, si quis detegit vel medicamentum vel methodum medendi, vel quodvis aliud auxilium in curatione morbi, qui ex prævalente phænomeno nomen obtinuit, ut addat simul causam hoc phænomenon producentem, quæ ex multis simul phænomenis

Curatio secundum rationem
quænam?

Empirica
Curatio.

Conjectu-
ralis curatio

collectis vel causis procataceticis prægressis colligitur: hæc tunc probata medicamenta & auxilia erunt constantia, eorumque usus in posterum non erit inutilis vel contrarius, ut sæpe in empiricis auxiliis evenit. Altera est *Conjecturalis*. Qui medicus curandum habet morbum multis phænomenis stipatum, incertam indicantibus latentem causam, ut sæpe fit, quia causa ita abscondite latet, ut ne peritissimo in Arte medica possit erui, talis tunc medicus ex quadam verisimilitudine conjicit de causa latente, ut aptam adhibeat medendi methodum, hos vituperant Empirici, sed ipse Empiricus nihil plus præstare potest, ille enim sibi solum maxime conspicuum proponeret phænomenon, hoc etiam valeret facere medicus, qui ex conjectura tentaret curationem; sed quia novit phænomenon hoc incertam indicare causam tollendam, reliqua quoque rimatur, an non possibile sit omnium apparitionum eruere causam, cum vero facilius sit in medicina ex multis inter se collatis latentem invenire causam, quam ex unica apparitione, itaque Conjecturalis illa curatio præstantior est censenda: si vero occurrit morbus nomen ex causa habens, ut Inflammatio, vulnus, combustio, fractura, in his non utitur conjectura, sed ut Empiricus probatam adhibet curationem. Denique est *Rationalis*. Qui in Physicis, Chemicis, Anatomicis, aliisque adminiculis, quibus eruuntur absconditæ causæ, est instructus, in phænomenis morborum versatus, statim sedulo examinat omnia, quæ suis sensibus possunt detegi, quæque ab ægro referuntur, cuncta inter se comparat; quod si his auxiliis morbi latentem detexit causam, demum examinat auxilia & methodum medendi, quæ optimum successum in inventa causa habuere, istis tunc utitur. Hoc nunc modo agere est *secundum rationem facere*. Detexit enim certis indiciis causam latentem, & adhibet auxilia probatissima & experientiâ comprobata, nihil præstantius excogitari potest, si enim morbus sit curabilis, hoc solo modo curari potest, & nullo alio meliore. Quod si valuisset semper ita eruere causam, & scivisset probatissima auxilia, Rationali medico nihil temere in medicina esset periclitandum, sed

quia

Rationalis
curatio.

quia sæpe nimis abscondita latet causa, quam perspicacissimo & expertissimo ingenio possit detegi; vel interdum desunt probata auxilia, quibus detectam causam valemus tollere, in illo cogimur sæpe uti conjectura, & in hoc facere periculum: hæc ergo conjectura & temeraria experimenta non sunt adscribenda medico, sed imperfectæ scientiæ.

II. Qui medicus ex certis criteriis latentem detexit causam, vel curandum habet Morbum ex evidente causa natum, huicque adhibet auxilia, methodum medendi & diætam, quæ probatissima in tali causa & morbo fuere inventa, eum monet Auctor, etiamsi ex voto non sequitur curatio, non transeundum esse ad aliud, sed ut viarum peritus inceptam debere persequi viam, donec attingit metam. Quoties enim decedit a curatione sua ad quamcumque aliam priori contrariam, vel temeritatis, vel inconstantiae, imo malivolentiæ potest insimulari, nam conscius ægrum a recta via curationis deflectit. Qui morbi causa cognita probatis non cedit auxiliis, incertis non est tentanda: quam primum enim Rationalis medicus conatur experimento vago tollere morbi causam, nihil differt ab idiota, & temerario, qui tentandi gratia omnia experiuntur. In Conjecturali autem causa ex juvantibus & lædentibus fieri debet curationis mutatio, quia causa est incerta. Hic autem monendum est, Auctorem nostrum nolle, nos debere semper iisdem uti medicamentis, sed si morbi genius mutatur, nostra auxilia quoque esse mutanda: si enim Inflammatio abierit in suppurationem, Auctor non docet medicum Rationalem in iisdem pergere debere auxiliis, nam hoc non est secundum rationem, sed curatio mutata cum natura morbi est secundum rationem. Ita etiam in Chronicis non debemus statim ab uno genere auxilii deflecti ad contrarium, si non satis cito sequitur curatio, sed si formata sit ex detectâ causâ legitima indicatio curativa, & huic appropriata fuere adhibita auxilia, in iisdem debemus perseverare, vel si natura assuescat, ut sæpe fit, medicamina sunt aliquomodo mutanda, manente in eodem genere auxiliorum, sed non transire ad aliud contrarium. Non parum igitur Hipp:

Quæ secundum rationem fiunt, non sunt mutanda.

hoc monitu perstringit Temerarios & fluctuantes medicos, qui omni die mutant auxilia, & periclitantur nova, ac si diceret, istos scientiæ ignaros esse, nescientes, quæ auxilia sunt adhibenda, vel temerarios experiundi gratia hominis vitam periclitantes.

LIB. II. APH. LIII.

78. **Q**icumque alvos habent humidus, dum quidem juvenes sunt, melius liberantur his, qui siccas habent. Ad senectutem vero, pejus liberantur: siccantur enim ut plurimum senescentibus.

I.

Sensus
hujus.

SI retineatur translatio hæc T. J. ab Almeloveen, sensus admodum esset obscurus, sed si conferatur cum Aph. 45. Facile erit veram sententiam Hippocratis concipere; ibi enim posuit mutationes naturales in duobus juvenibus, uno alvo constipata sicca, altero verò laxa laborante: in hoc nunc loco vult inter hos comparisonem facere, qui status sit melior censendus, ut nempe juvenis alvum humidam habentis, vel alvum siccam sit melior conditio: & concludit, qui juvenes alvum humidam habent, dum quidem juvenes sunt, melius degunt (seu juventutem melius agunt) his, qui siccam, rationem addit, ad senectutem vero pejus degunt, siccatur enim alvus ut plurimum in senescentibus. Quare alvus humida præfertur, & alvus sicca damnatur, præprimis si talis fiat ex naturali mutatione.

An alvas
sicca vel
humida sit
præferenda?

II. Molles & modice compactas reddere alvi fæces saluberrimum est, sed paulo magis compactas vel sicciores deponere, aut paulo liquidiores nostrum corpus fert sine detri-

trimento sanitatis: si vero hæc mutatio modum excedit, ad morbos refertur, ut ad alvi fluxum vel constipationem, de quibus hic non agit Auctor. Neque hic disputandum est, quid horum sit melius in morbis, uti fecimus in Compendio nostro T. 90. Ex iis, quæ supra exposuimus Aph. 45, VI. constat, alvum humidam juvenum propter defectum affluentium humorum sensim commutari in siccam: ergo ratione signi est malum indicium alvum exsiccare senioribus, fatius enim foret, ut mollis maneret alvus. Alterum est, si alvus sit modice humida, sine molestia deponunt fæces, dum sicciior sæpe multas molestias adferat. Denique in modica & humida alvi egestionem non est verendum, humores excrementitios retineri in intestinis; sed si sicciior sit alvus, vel omne excrementitium non deponitur in intestina, aut si deponitur, stagnans diutius & corruptum absorbetur, atque ita reliquos humores excrementitio corrupto inquinat. Auctor addit, quia magis senescentibus alvus reddi solet sicciior, ut tandem fiat morbus, qui alvus adstricta vocatur.

LIB. II. APH. LIV.

79. **P**rocerum corpore juventutem quidem degere liberale est, nec deforme: insensescere vero, incommo-um, & parvis deterius.

I.

Quod olim moris fuit, hodie etiam est acceptum, Procerum corpus laudare in juvenibus, ut corpore & verbis simul imperent, atque in tam procerum corpore fere omnes magnum & liberale ingenium censent contineri, adeo ut corpus procerum juvenum sit tanquam litteræ

teræ commendatitiæ, quod ingenio & ætate deficere videtur, id decore corpore suppleant juvenes. At vero ad senectutem si pervenerint, gravi senili auctoritate & ingenii præstantia præditi, non amplius ex corporis statura, etiam si non sit vituperanda, honores tribuuntur: tunc magis in senibus ad vitam commodam, quam decorum respicimus. An vero Hippocratis tempore pumilis magis quam corpora procera salubriter vixerunt, ignoro: his autem temporibus procera corpora magis sana & robusta vivunt, quam pumili. Quare hic Aphorismus in hoc sensu accipi potest, Procera corpora juvenibus magis decora quam senibus: parva autem deteriora juvenibus, quam senibus.




M E D I C I N A
 HIPPOCRATICA;
 EXPONENS
 APHORISMORUM
 HIPPOCRATIS
 LIBRUM TERTIUM.

APH. I.

80. **M**utationes anni temporum maxime pariunt Morbos: & in ipsis temporibus magnæ mutationes, aut frigoris, aut caloris, & alia pro ratione eode modo.

I.

 Tiamsi omnibus sit notum, annum dividi in quatuor tempora, vel facile ex calendariis possit addisci, observare tamen debemus, ab omnibus medicis hæc tempora non semper eodem modo accipi. Hippocrates enim fere semper distinguit Morbos secundum communia anni tempora, in Vernales, Æstivos, Autumnales & Hyemales. Alii duntaxat in Æstivos & Hyemales, quando annum dividunt in duas partes, ab uno Solstitio ad alterum. Quidam vero his adjiciunt morbos solstitiales hyemales & æstivos; atque morbos Æquinoctiales, vernales, &

Temporis
divisio.

H h

autum-

autumnales. Quid autem his temporibus præprimis sit observandum, in sequentibus demonstrabitur.

Cur mutationes anni temporum maxime pariunt morbos?

II. Inter causas morbum inferentes non infimum tenet locum, uti in hoc loco indicatur, observatio temporum anni, dicit enim *maxime* vel *potissimum*, quoniam omni momento aër est inspirandus, & quoniam sine ejus præsentia vivere non possumus: quoties itaque aër in natura sua est mutatus, protinus in nobis generantur morbi, imo interdum mors, ut patet in exhalationibus aëri mistis a nobis assumtis: imo bonus aër aliquoties a nobis inspiratus vitæ continuandæ fit inutilis, cum experimentis hodie constet, omne animal respirans vase quodam inclusum, si impediatur aëris renovatio, perire; hoc etiam experiuntur urinatores. Quare non solum sufficit, ut alterne dilatemus & constringamus pulmones ad continuandam circulationem, sed qui inspiratur, bonus debet esse aër & sæpe renovatus. Ex hac observatione non obscure indicatur, respirando aliquid a nobis ex aëre recipi, quod requiritur ad vitæ sustentationem, cum aliter animal potuisset facile in eodem vivere aëre. Si huic observationi adjiciamus aliud experimentum animalis viventis in vase clauso, in quo hæret etiam barometrum aëris quantitatem indicans, hoc barometrum suo descensu declarat, ab animali vivente aërem consumi. Nullum itaque est dubium, quin animal vivens consumat aërem. Quod vero in sanguine circulante ne guttula aëris inveniat, & quod non possit ingredi aër arteriam vel venam pulmonalem, ut multi contendunt, hoc non refutat experimentum certum de aëris consumptione ab animali vivente: potest enim aër unitus nostris humoribus amittere omnem vim elasticam, quemadmodum exstinguitur spirituosum in vino, si convertitur in acetum. Atque multis corporibus inesse magnam quantitatem aëris, nullum sui indicium præbentis, constat omni observatione combustionis, fermentationis, effervescentiæ, putredinis, congelationis, quibus modis multum aëris elicitur e corporibus, in quibus experimentis physicis aëris præsentia non potuit detegi. Ex iis, quæ disputavimus, probatum est, aërem consumi ab ani-

animali vivente, & eam consumptionem perpetuam esse debere, aërem vitiatum vitæ & sanitati conservandæ ineptum esse. Ergo solummodo restaret probare, mutationibus anni temporum mutari hanc aëris qualitatem, ut magis minusque prona sit ad producendos morbos. Verum hoc satis constare potest ex morbis, qui certis temporibus anni propullulant, ut observavit præ ceteris Sydenhamius. An vero hæ mutationes inducantur vario influxu siderum, varioque eorum aspectu, ut veteres astrologi voluerunt, inutile est medico observare, hoc naturæ perscrutatoribus relinquemus. Nobis sufficit observare, aërem mutatum potentissimam esse causam morbos inferentem, quia nec cibis, nec potus, nec externæ injuriæ, quibus nostrum corpus est expositum, tam frequentia sunt, quam aëris inspiratio.

III. Quoniam non solum ex varietate aëris diversis temporibus anni naturales generantur morbi, sed etiam morbi fiunt ab aëris mutatione quocumque tempore anni, qui regulariter eo tempore non fuissent nati, satis constat, non oriri morbos præprimis ab influxu siderum, sed ex quadam in aëre nata mutatione. Ex his mutationibus solummodo annumerat Calorem & Frigus, & addit *alia pro ratione*: scilicet observare quoque debet Medicus, quoniam morbi fiunt cœlo sereno, nubiloso, cœnoso, humido, sicco, in ventis variis, pruina, pluvia, grandine, tonitru, aliisque meteoris apparentibus. In his observavit Auctor, & post eum quoque omnes medici, mutationes subitaneas periculosiores esse, quod ex iis, quæ supra de Consuetudine Aph. 75, II., disputavimus, facile intelligi potest.

Aëris mutationes
magnæ in
ipsis temporibus.

LIB. III. A P H. II.

81. **N**aturarum, aliae quidem ad aestatem, aliae vero ad hyemem bene aut male sunt constitutae.

I.

Quae tempora anni hic intelliguntur?

IN praecedente monuerat, quænam erant expectanda ex variis anni temporibus, nunc vero ad illa tempora applicat varias hominum naturas, volens indicare, omnia illa anni tempora æque salubria & damnosa esse omnibus. Ex his temporibus duo citat, Aestatem & Hyemem. Existimo autem, Auctorem hic nolle indicare tantum anni partem quartam pro singulis, ut fieri solet in communi divisione (*Aph.* 80, 1.) sed intelligere partes anni ab uno æquinoctio ad alterum, ut passim quoque fecit Sydenham.

Natura quid denotat hoc loco?

II. Vocabulum *Natura* tot rebus variis adhibetur, ut vix valeamus simplici definitione determinare, quid sit natura; Aliud enim est naturæ directionem observare in evacuatione; *Aph.* 21, III. Aliud iterum morbus periculosus naturæ dissimilis; *Aph.* 59, II. Natura valde crassi magis subito moriuntur quam graciles; *Aph.* 69, I. Hoc loco notat Habitum, Constitutionem, Catastasin vel Temperiem corporis sive sit nativum, sive artificiale per consuetudinem, vel morbum acquisitum, quo quidam homines salubrius vel ærumnoser vivunt hyeme aut æstate. Hanc observationem veram esse, vita quotidiana comprobat. Miramur autem causas, quare cum medicorum maxime intersit, istas paulo penitus rimabimur.

Quæ natura non fert hyemem?

III. Hyems regulariter habet aërem humidiores & frigidiorem, ut indicant notiometa & thermometra: nostra igitur

igitur corpora ab aëris ambientis frigiditate magis friges-
cunt; humiditas per Insensibilem perspirationem expellen-
da, parcius aufertur: hoc tempore ventres esse calidissimos,
supra *Aph.* 15, II. contra Hipp: refutavimus. Frigiditate
hac minuitur actio vitalis, ut quædam animalia mortua ja-
centia, non nisi accedente calore reviviscant: sed omnia
corpora mortua per frigus densantur, id est in minus spa-
tium contrahuntur: quod tam constans, ut ex densatione
certam habeamus quantitatem frigoris; Thermometra enim
hac densatione quantitatem frigoris, & expansione per ca-
lorem, caloris gradum indicant. Ergo in nobis motus vi-
talis minuitur frigore, sed augetur contractio automatica
in fibris. Inde corpora gracilia, quia volumen majus pro-
portionatum habent ad superficiem, quæ ab aere frigido
tangitur, magis quam corpora crassa & procera ab aere
frigido læduntur. Maxime vero debilia, sive talia sint ex
nativitate vel morbo; vel quæ corpora insueta sunt aëri
frigido, ab aere frigido hyemali magis afficiuntur: cum de-
biliores motus vitalis in his per nimium frigus fere totus ex-
stinguatur; contra vero robusta ob auctam contractilitatem
in firmis partibus magis roborantur. Quibus itaque cor-
poribus vis vitæ superatur frigore, his frigus hyemale dam-
nosum; quibus vero non superatur, prodest. Aeris etiam hu-
miditas, quoniam minus absorbet exhalantem humiditatem,
corporibus difficile perspirantibus admodum noxia, cum per-
spirabile retentum varios generet morbos: quibus vero constans
est perspiratio, viribus corporis valentibus expellenda, aëris
humiditas minus noxia, cum corporis vires valeant id inutile
expellere, etiamsi per aërem sicciorem cito non auferatur.

IV. Calor autem Æstivus minuit contractilitatem in so-
lidis, rarefacit humores, omnes motus automatici putredi-
nis & fermentationis sunt promptiores; sed citior quoque
fit humorum exsiccatio, ut probant omnia experimenta;
in nobis motus vitalis moderato calore maxime valet, sed
nimio calore omnia corpora enervantur. Quæ corpora igi-
tur prona sunt in putredinem, ab accedente calore maxi-
me læduntur: obesa, ob defectum refrigerii nimium calo-

Quæ natura
non fert Æ-
statem?

rem in se concitantia, enervantur. Sed morbis chronicis, præprimis ex defectu insensibilis perspirationis natis, calor & siccitas æstiva prodest. Hæc generalia delibavimus, casus particulares & compositos examinandi, in sequentibus Auctor noster dabit occasionem.

LIB. III. A P H. III.

82. **M**orborum alii ad alia (tempora) bene aut male se habent : & ætates quædam ad tempora, & regiones, & victus.

I.

Connexio.

Etiam si Hipp: in compositione Aphorismorum raro observat nexum, quem tamen multi Commentatores sedulo quæritant, hoc in loco facile concipitur: agit enim de variis effectibus temporum anni; hoc proposuit in varia natura & temperamento, hoc nunc loco eosdem persequitur in statu morbofo, & ætate varia. Ergo primò ponendum est, hic velle indicare Hippocratem tempora duo antea citata, æstatem nempe & hyemem: in quibus dicit, quosdam morbos se bene & male habere. Itidem ætates variæ his temporibus se melius & pejus habent: his denique addit ad ætates pertinens, Regiones, & Victus. Totus hic ergo Aphorismus est generalis, & inde fundamentum multorum specialium.

Morbi facile & difficile ferentes hyemem.

II. Hoc loco duntaxat attendendum ad generalia, quæ hyeme contingunt, ut aëris humiditatem & frigiditatem, quoniam hyemis si sit sicca, ventosa, calidior, si varii flant ventus, hoc suis locis est exponendum. Superius notavimus, regulariter motum vitalem minui, & contractilitatem augeri,

augeri, parciolemque fieri difflationem; adeoque omnes morbi, qui conjunctam habent debilitatem virium, qui lentum habent humorem, motu vitali & calore majore solvendum, quique præprimis per insensibilem perspirationem expellere debent materiem, difficile ferunt hyemem: quales sunt omnes morbi nervorum, febris quartana, gravedo, tussis, hydrops, leucophlegmatia, vertigo, apoplexia, debilitas ex morbo relicta, cachexia, cruditas, pituita, & multi alii in particularium examine proponendi. Quibus vero morbis est motus vitalis major, putredo cum adjuncto calore, hyeme facilius illos morbos tolerant: in quo numero sunt Acuti inflammatorii, erysipelatosi & putridi, quibus, si in æstate obtinent, adhibentur antiphlogistica & refrigerantia diluentia.

III. Ordo dicendi tantummodo est invertendus, nam qui morbi facile ferunt hyemem, difficile ferunt æstatem; quique, difficile ferunt hyemem, facile ferunt æstatem, ut accedente calore & siccitate æstiva, sponte evanescant illi morbi, quos optimis medicamentis non potuimus expugnare.

IV. Cui ætati summus est corporis vigor, ut nimis instigatis viribus majus sit periculum expectandum, quam ex virium imbecillitate, talis ætas facile fert hyemem, quæ sua frigiditate & humiditate temperat prævalentem motum vitalem, & tonum contractionis laxat seu resolvit aliquomodo, qualis ætas observatur in juvenili & virili ætate, æstate autem magis periclitantur. Cui vero ætati est naturalis infirmitas fibrarumque atonia, sive quod non satis firmatæ sint, uti in infantibus & pueris, sive quod callosæ & inertes sunt factæ, ut in senibus, hæc ætas difficile fert hyemem; & in sola æstate bene degunt, apricaque loca quærunt, ut refocillentur senes.

V. In Regionibus solas qualitates manifestas observare volumus, ut maneamus in generalibus. Hæ sunt siccæ, frigidæ, humidæ & calidæ, vel de utrisque participant. Quare ex iis, quæ supra delibavimus, facile intelligi potest, Regiones calidas & siccas pueris & senibus conducere; sed frigi-

Æstatem.

Tempora
ætatibus
magis mi-
nusque con-
venientia.Regio æsta-
tibus magis
minusque
conveniens.

frigidas & humiditas magis juvenibus & viris, etiamsi nemini salubris statuitur Regio, in qua humiditas cum frigidityte jungitur, istud tamen incommodum facilius fert constans ætas viribus pollens, quum quorum corpora sunt imbecillia ex ætate, quum vires debiliores ab his noxiis causis facile superantur, quibus facile resistere possunt robustiores.

Viæus ætatibus magis minusque conveniens.

VI. Quali sensu accipiatur Viæus, superius *Aph.* 4, II exposuimus. Hoc in loco videtur solummodo restringi ad alimentorum assumptionem, vel nutritionem: quare videndum, qualia, & quanta alimenta singulæ ætati conveniant. Alimenta tenuia, facilis materiæ, sæpe & parum simul ingesta pueris conducere, supra *Aph.* 16, III demonstravimus. Eadem quoque diætæ ob corporis imbecillitatem senibus quoque convenit. Sed Juvenibus & viris alimenta copiosiora sunt danda *Aph.* 13, 1, & quæ minus facile solvuntur, quia eorum corpora valentia, nimis cito subigerent & expellerent præcedentia genera alimentorum.

LIB. III. APH. IV.

83. **I**N temporibus, quando eadem die, modo calor, modo frigus fit, autumnales morbos expectare oportet.

I.

Qui morbi dicantur autumnales.

OMnes morbi, qui in Autumno aggrediuntur hominem, ex tempore illo vocantur Autumnales, hos autem Hipp: hoc loco non intelligit, quoniam dicit in temporibus, quare quoque reliqua tempora anni intelligit. (2) Illi etiam morbi nominari possunt Autumnales, qui magis in Autumno visuntur, quam in aliis annis.

tem-

temporibus, quos in sequentibus tradit, ut sunt febres quartanæ, erroneæ, lienes, hydropes, tabes, urinæ stillicidia, lenteriae, dysenteriae, ischiades, anginae, asthmata, volvuli, epilepsiae, insaniae, melancholiae, semitertianæ, continuæ ex intermittentibus, rhachitides, podagra, arthritis, tusses, gravedines. Vel (3) Qui morbi aliis temporibus sævientes, typum induunt morbi autumnalis, nempe ut sint difficiliores curatu, pertinaciores, magis anomali, faciliusque recidivantes, & periculosiores, quam iidem morbi istis temporibus nati sine tali aëris frigidi & calidi vicissitudine prægressa. Utrumque mihi videtur hoc loco ab Hipp: intelligi per Morbos Autumnales: quoniam ex hac causa aliis temporibus anni nascuntur morbi, qui ordinario in autumno adoriri solebant; &, si morbi istis temporibus soliti nascuntur, fiant magis pertinaces &c:

II. Nostrium corpus ex consuetudine ferre posse deteriora, & consueta non facile mutanda esse, in antecedentibus Aph. 75 & 76, exposuimus; ex quibus colligitur, nostrum corpus multum affici ab omni subita mutatione, sit in melius, sit in pejus. At vero si eodem die, modo sit calor, modo frigus, plane constat, nostrum corpus vario modo affici, ut inde possimus generaliter pronunciare, vicissitudines caloris & frigoris, ut supra Aph. 80, morbos parere, præprimis si tam crebræ fiant mutationes eodem die. Non vero sensus Auctoris ita est accipiendus, ac si existimaret, si modo uno die hæc contingeret mutatio, hoc valere ad morbos autumnales producendos, addit enim in *temporibus*, quæ phrasis significat multos dies successivos. Ergo si per aliquot dies successivos, jam frigus, jam calor habeatur, Morbos Autumnales expectare oportet. Hoc habuit Auctor ex constante observatione, atque hodie quoque idem a medicis observatur. Multi hac pura observatione non sunt contenti, accusantes nostrum Auctorem, eum nullam addidisse rationem. Ego autem existimo, non opus esse in aphoristico scribendi modo, ubique observatis practicis ad-jicere rationes, sufficit enim in Aphorismis generales observationes promulgare: sed qui aggreditur expositionem

Cur crebra
aëris calidi
& frigidi vi-
cissitudo
producit
Autumna-
les?

sententiarum, ad maiorem fidem, usum, & faciliorem intellectum, bene agit, si addit rationes earum observationum, an respondeant legibus naturæ. Hunc sensum itaque in formam quæstionis commutavimus, cujus prima pars patet, morbos nempe generari hac aeris vicissitudine, quia in antecedentibus hæc res fuit agitata: sed cur Autumnales fiant, nempe illi, qui in Autumno adoriri solent, ex similitudine mutationis in aere profluunt, quoniam dicti morbi Autumnales præcipue formantur ex aeris vicissitudine, quæ nullo tempore anni frequentior est, quam in autumno: si igitur frigoris calorisque vicissitudo potest in autumno istos morbos generare, eadem causa alio anni tempore eisdem quoque potest producere morbos: & quia causa est similis, morbi nati eodem modo decurrunt, ut sint pertinaciores solito, & graviores.

Morborum
autumnali-
um natura.

III. Autumnus non solum morborum ferax, sed & quos producit, observantur *Pertinaces*, diutius durantes, quam similis morbus in alio anni tempore: qui enim corripitur quartanâ vel tertianâ, ut plurimum eadem vexari solet usque ad vernale tempus, cum aeris varietas jam prohibendo perspirabile, jam vero retentum superveniente calore & humiditate, (veteres autem dixerunt autumnum esse frigidum & siccum, sed notiometra nostram sententiam firman) in corruptelam convertit, & impedit exhalare, aut actione vitæ concoqui; quare morbi non tam facile superari possunt actione vitæ, quam vernali tempore, quod coctionem & exhalationem promovet. Et quia fere omnes morbi methodica curatione, id est directione virium, sunt expugnandi, ex eadem ratione data fiunt *Curatu difficiles*. Si vero materia morbi subacta videtur, quia symptomata silent, retenta vero sensim recrudescit, vel facit *Recidivam*, vel abit in aliud genus morbi. Quando autem viribus vitæ subigitur morbi materia & expellitur, talis sequitur typum regularem; sed si subigi & expelli non potest, sæpe mutat morbi faciem, pro diversa corruptela, quam subit retenta materia; inde redduntur autumnales sæpe *Anomali*. Neque caret *Periculo* toties vario genere morbi affligi diutius durantis.

LIB. III. APH. V.

84. **A**ustri Auditum gravantes, caligniosi, caput gravantes, segnes, dissolventes. Quum hic dominatum tennerit, talia in morbis patiuntur. Si vero aquilonium fuerit anni tempus, tusses, fauces asperæ, alvi duræ, urinæ difficultates, horrores, dolores costarum, pectorum. Quum hic dominatus fuerit, talia in morbis expectare oportet.

I.

Naturalis translatio aëris ab una telluris plaga in alteram ab omnibus vocatur *ventus* ut & aëris propulsio artificiosa, folle, flabello, vel quavis alia machina: hoc autem loco intelligitur ventus naturalis. Dum igitur ita transfertur aër, exhalationes atque vapores aëri misti simul transferuntur; atque ex plaga calidiore veniens simul calorem adfert, e contra vero ex frigido loco veniens frigiditatem asportat: & prout loca magis humida vel sicca sint, ex quibus ad nos veniunt venti, simul observantur sicciores vel humidiores. Venti corporis nostri superficiem lambentes secum ferunt atmospheram calefactam, & novum suppeditant aërem a nobis non calefactum; quare venti semper nobis videntur inferre frigus. Thermometra autem docent, aërem vento vel folle agitatam non producere majus frigus. Quibusnam causis generantur venti varii & inconstantes, atque etesiæ, non est hujus loci exagitare.

Ventus
quid sit.

II. Quoniam venti vel motu vel qualitate nocere & prodesse possunt, quæ ex aëris motu proveniunt, generalem usum habent, sed quæ aëris qualitate producuntur, pro re-

Ventorum
observatio-
nes in om-
nibus regio-
nibus qua-
drantibus

gionum situ admodum sunt diversa. Ex qualitatibus autem aeris generalibus, ut de humiditate & siccitate, calore & frigore, puritate & impuritate, generales possunt longa observatione constantes acquiri regulæ, sed quæ observantur in ventis, magis spectant ad singulares regiones, ubi homines habitant: quare observatio in hoc Aph: magis spectat ad morbos endemios, quam ad morbos universales.

Auster quos
morbos pa-
rit?

III. Duos hic proponit oppositos ventos, unum ex meridie, alterum ex septentrione spirantem, ergo ille venit ex loco calidiore in frigidiorum, hic vero ex frigidiorum in calidiorem. Non concipiendum est, nostrum Auctorem per Austrum vel motum solum illum voluisse ventum, quem Belgice vocant *Zuiden*, sed & omnes intelligit, qui aliquid de austro participant inter Zephyrum & Eurus. Quod etiam intelligendum est de Aquilone seu Borea. Experimentis constat, aquam ab aere calido elevari, & cum aere circumferri, qui aer magis refrigeratus vapore prægnans, ad corpora frigida applicatus facit vaporem in guttulas colligi, corporique frigido adhærere, imo guttatim destillare, quod non solum in instrumentis destillatoriis quotidie experimur, sed & quovis corpore frigidiorum exposito aeri calidiori experiri potest, quare lapides & parietes frigidi, dum mutatus ventus adferat aerem calidiorem, vaporem ex eo aere colligunt, quando vulgus existimat, humorem illum ex lapide vel pariete transsudare. Regulariter igitur Austri venti sunt calidiores & humidiores, nisi mutetur diversitate regionis, per quam transit ille ventus.

De hoc vento pronunciat, eum *auditum gravare*, βαρυήκοον dicit, id est eo flante vento minus acute audire valemus, quod vel in corpore sonoro, vel aëre transferente sonum, vel in ipso organo auditus latitare potest. Videtur mutatio aëri inducta aliquid in omnibus præstare. Corpora enim sonora aliquomodo humectata obtusiorum sonum edunt; atque aer vaporibus saturus minus elasticus, tremores suscitatos minus propagat; nostraque corpora tepore & humiditate aëris enervata, non tam acute sentiunt.

Ex

Ex eodem humido vapore aeri misto radii lucis non tam libere transeunt per aerem. Quo enim aer siccior, eo pellucidior; quare hi venti aerem aggravantes humiditate dicuntur *Caliginosi* αχλυνώδεις, quam visus caliginem veteres experimentis physicis non satis instructi, ex alieno principio, quod non est hujus loci exagitare, deduxerunt.

Eadem aëris humiditas & enervans tepor facit in partibus firmis atoniam, minuitque humiditas difflationem corporis, quare corpora in tali udo aere ad sensum fiunt graviora, & sæpe etiam ad stateram; ita enervata corpora, minus valentia firmare partes, videntur graviora: non quod ipse aër sit factus, ut indicant Baroscopia, gravior, sed quia nostrum corpus in tali aere amisit aliquid de viribus suis; inde non solum *Caput gravantes* καρηβαρικοί, sed *legnes & Dissolventes*.

IV. Ut Auster ex loco calidiore spirat, ita Aquilo seu Boreas ex septentrione veniens frigus inducit, in Belgia Zephyro Boreas seu Cirsius, Belg: *Noord west* plerumque simul humidus est & impetuosus; sed Euro-Boreas, seu Vulturinus, Belg: *Noord-oost*, siccior & frigidior fere semper, qui ventus anno 1740 in principio Januarii tam urens Induxit frigus, ut hydrargyrus sub signis in thermoscopio descenderet, seu superaverit 32 gradum sub signo gelu. Homines attamen vix ullo morbo in Belgia corripiebantur: si autem Cirsius spirat, aerque humidior est, multi observantur morbi, qui ab Auctore nostro citantur.

Aquilo
quos mor-
bos parit?

Si enim aër frigidior & humidior ingruit, prohibens exhalationem humiditatis ex pulmonibus atque corporis ambitu, hæc materia muco tracheæ intricata, acrior, irritando *Tusses* producit, tam diu durantes, donec vel subacta sit, aut per excreationem, perspirationem, vel urinam, ejecta sit.

Ea quoque materia retenta in lateribus faucium, ista tumere facit, & faucium æqualem superficiem exasperat, naturalique muco obliniente privat, unde vox rauca, & fauces in deglutitione & loquela, ac si essent epithelio suo privatae, dolent, quem morbum φάρυγες vocant.

*Alvum
durio-*

duriores non tam constanter observare potui in hominibus; neque *urinae difficultates*, nisi in debilibus & catarrhosis, qui in aere sicciore id acre per insensibilem perspirationem evacuari soliti, nunc magis ad renes ducebant, ut inde quædam nephritidis species, quam lymphaticam vel catarrhosam vocant, nasceretur.

Quoniam nulla pars nostri corporis magis est aëri exposita, quam pectus, quod non solum, ut reliquæ corporis partes, externe tangitur ab aere, sed intus singulis respirationibus aerem haurit, præ ceteris ab aëris mutatione afficitur, unde *Costarum* seu potius *Pleurae* & *Pectoris dolor*.

V. Quemadmodum illi ventus produciunt dictos morbos in hominibus sanis, ita etiam morbo aliquo decumbentes interdum iisdem insuper morbis corripuntur, qui ab aeris natura dependent, quod voluit monere Auctor, ne phænomena illa ex vento producta adscribantur morbis, quibus jam antea ægri decumbebant.

LIB. III. A P H. VI.

85. **Q**uam *Æstas sit Veri similis, sudores in febribus multos expectare oportet.*

I.

*Æstas veri
similis.*

Vere, quoniam ob telluris frigiditatem major est collecta humiditas in prægressa hyeme, per accedentem solis calorem multum vaporis ex terra elicitur, plantis præbens nutrimentum & incrementum, quod vero fensim in æstate evanescit: quare ex minori altitudine solis est tepidum, & per copiosorem exhalationem ex tellure est humi-

humidum ver: interdum vero vento vario, aliqua accedente alia tempestate, ver has solitas non obtinet proprietates. Æstas autem per maiorem solis elevationem, & continuatam exhalationem e terra facit aerem calidum & siccum, quoniam tellus humido privata, aerem non amplius humectare potest: interdum vero imbribus cadentibus, aliisque tempestatibus, & ventis ex septentrione spirantibus, naturalis constitutio mutatur. Quando igitur Hipp: dicit, Æstatem Veri similem esse, intelligit, naturalem tepidam & humidam aeris constitutionem haberi in æstate.

II. Expectare oportet, consuetus est Hippocratis dicendi modus, quando indicare vult, frequentissime aliquid fieri, sed tamen non semper. Ergo quando æstate tales oriuntur febres, hæc solent finire sudoribus. Inde valet hic Aphorismus ad prædictionem sudoris in febribus; atque in curatione quoque scimus, quid sit agendum, quænam evacuatio est promovenda, ut eliminetur morbi materia. Ut hæc Prognosis & Indicatio curativa firmetur, non solum experientia, ex qua noster Auctor hunc canonem desumpsit, sed etiam ratio est consulenda. Sciendum est, corpora temperate viventia hyeme ponderasiora esse, quam æstate, quia æstas calidior & siccior id abundans per insensibilem perspirationem aufert; largiorem quoque esse difflationem salubrem æstate quam hyeme, ut id, quod calore majore corrumpitur, magis in æstate quam hyeme hac difflatione copiosiore auferatur. Si igitur æstas sit frigidior & humidior, minuitur inde perspiratio insensibilis, atque materia, quæ debebat exhalare, colligitur in corpore. Ex hac materia sæpe generantur febres æstivæ in citata tempestate frequentiores, habentes materiem perspirabilem corruptam pro materia. Naturale igitur est & ratione conveniens, ut materia talis febrem excitans eliminetur per proprium suum organum, nempe cutim, quia huic organo magis quam aliis conveniens Aph. 21, iv. Sed quando perspirabilis humor majore copia exit, sudorem præbet; in tali febre sudoris evacuatio est critica. Potest tamen sine sudore finire, modo eadem materia minore copia insensibiliter diffletur, quod minus

Cur tunc
sudores
multos in
febribus ex
spectare o-
portet?

minus frequens est, evacuata parte crassiore cum urina, quæ laudabile sedimentum coctum continet.

LIB. III. APH. VII.

86. **I**N siccitatibus febres acutæ fiunt. Et, si annus quidem pro majori parte talis fuerit, qualem fecit constitutionem, ut plurimum etiam tales morbos expectare oportet.

I.

Aeris nimia siccitas quid faciat.

IN præcedente notaverat, æstate multos expectandos esse sudores in febribus, si æstas esset veri similis; ergo nunc in hoc Aph. aliam observat aeris constitutionem, in qua excellit nimia aeris siccitas; nam *αυχμός* magnam & nimiam siccitatem denotat, plerumque ex vehemente æstu proveniente; indicat interdum etiam siccitatem summam cum frigore, quali modo in altera parte hujus aphorismi est accipiendum; in qua non solum intelligit Auctor siccitatem æstivam ardentem, sed & siccitatem cum mitiori calore, imo cum frigore. Ergo in expositione hujus non est attendendum ad ullam aliam aeris qualitatem, quam ad solam siccitatem nimiam, seu quæ excessum facit. Experimentis constat, quo sicciior est aer, eo avidius aquosum humorem imbibit, corporaque humida humiditate privat, ut docent notiometa. Quare massa liquida, partim constans volatilibus aquosis, partim fixis aeri non miscibilibus partibus, in tali aere admodum sicco & præcipue æstivo tempore, privatur omni humiditate aquosa: & partes firmæ humidis naturaliter irrigatæ, fiunt aridæ. Ergo sanguis noster, qui totus non est volatilis & aquosus, amittit in tanta siccitate omne suum fere humidum, quare rema-

remanens magis spissum, continebitur in arteriis & venis. Membranæ, fibræ, vasa, in nobis semper humida, per tantam exsiccationem fiunt arida, & quia siccando simul accurtantur fibræ, partes firmæ fiunt graciliores, sicciores, magisque contractæ.

II. Ex hac inducta mutatione in humoribus & partibus firmis deducendum est, cur frequentius formentur Febres Acutæ, quam in alia aëris constitutione. Si tali in corpore nunc ponatur noxium morbosum, irritans actionem vitæ, facilius nunc, quam in alia constitutione generabitur Febris Acuta: nam partes firmæ per siccitatem admodum tensæ, validius se movent, quam dum essent laxæ & humidæ, ut chorda sicca tensa si pulsatur, validius oscillat. Inde motus corporum viventium stimulo morbofo agitur validiorem actionem exercet, qua formatur summus corporis ardor, quod est summum criterion febris acutæ. Hoc motu aucto, agente in ita inspissatum sanguinem, statim formatur Lentor seu inflammatoria dispositio in sanguine, qui in sanguine magna copia humidi diluto tam cito formari nequit; inde, quod restabat in sanguine fluidum, hoc motu compingitur in lentorem, cui accedit cutis summa ariditas, sitis intensa, ob humidi defectum. Quæ omnia juncta si inveniantur phænomena, uno nomine vocantur Febris Acuta. Si vero idem noxium stimulans accessisset, sed in sanguine magis diluto, & partibus firmis laxioribus & humidioribus, nondum inde tantus calor, & siccitas esset formata.

Cur in siccitatibus febres acutæ?

III. Quoniam talis dispositio nata in corpore per nimiam siccitatem æstate facilius producit febres acutas, aliis etiam anni temporibus idem genus morbi inferre potest. Hinc possumus formare prædictionem, si constitutiones aëris diu fuere siccæ, expectandas esse Febres Acutas, etiamsi adhucdum talis febris non sit præsens, quia hæc constitutio pronior est ad producendas Febres Acutas quam quævis alia. Inde tamen non inferre licet, aëris siccitatem minus salubrem esse, quam ejus humiditatem: unaquæque tempestas excedens suos morbos infert, sed si re-

Altera pars Aph:

spiciamus ad numerum & frequentiam, Tempestates humidæ multo plures & frequentiores inferunt morbos, quam siccitates.

LIB. III. APH. VIII.

87. **I**N constantibus temporibus, si tempestivè tempestiva reddantur, constantes, & judicatu faciles fiunt morbi: in inconstantibus autem, inconstantes, & difficiles judicatu.

I.

Tempora
anni Con-
stantia &
Inconstan-
tia.

Tempora anni a solis cursu pendentia (Aph. 80, 1.) *Constantia* sunt; sed & his temporibus regularis fit quædam aeris mutatio in caliditate, frigiditate, siccitate & humiditate. Potest etiam his temporibus alia esse aeris constitutio, ut, qualis solet esse in autumno vel vere, accidat Æstate vel hyeme, & vicissim: hæ mutationes lente vel subito incidere possunt. Quando igitur unaquæque naturalis cuicumque tempori anni habetur aeris constitutio, & illa sensim ingruit manetque constans, tempestivè tempestiva redduntur, & dicuntur *Constantia*. Si autem aliena & sæpe mutata aeris qualitas istis temporibus anni fiat, dicuntur tempora *Inconstantia*.

Constans
& incon-
stans mor-
bus.

II. Ex tempore anni, quo venit morbus, *morbus* dicitur *Constans* & *Inconstans*: & qui morbi autumno, vere, vel alio anni tempore venire solebant, si in alio tempore incidunt, dicuntur *Inconstantes*; sed suis temporibus venientes respectu temporis dicuntur *Constantes*: unde habentur morbi autumnales, vernaes &c. Sed & etiam morbi semel nati, si sequuntur regularem mutationem, etiam dicuntur *Constan-*
tes;

tes; qui vero anormalam mutationem faciunt, jam in melius jam in deterius tendunt, variaque symptomata inferunt, dicuntur *Inconstantes*.

III. Quod hic dicitur *judicatu facilis*, in Textu est *εὐκρινὲς* denotans purum, distinctum, ordine locatum. Intelligitur igitur morbus simplex, minime vero aliis morbis complicatus, aut anomalis symptomatibus stipatus: quare facile est judicium ferre, uti in omnibus rebus ordinatis & simplicibus, qualifnam exitus sit futurus; utque in his quoque facilius sit evacuatio critica, quam in morbo anomalo & composito, quare ex ratione tales morbi dicuntur *judicatu faciles*, tam quoad prognosin, quam ad curationem. *Difficiles autem judicatu* in Textu *δυσκρινὲς*, sunt morbi, qui admodum inordinati sunt, variis stipati symptomatibus, aut ex variis compositi, de quibus nulla certa prognosis aut curatio promitti potest, quique etiam difficilius curantur, quam tales morbi eodem nomine insigniti curari solent.

Facilis & facilis judicatu morbus.

IV. Admodum pauci oriuntur morbi, si singula anni tempora suam naturalem constitutionem caloris, frigoris, humiditatis & siccitatis habent; & tempestivè, id est una constitutio non subito, sed lente alteram excipiat, quoniam tunc corpus nostrum non patitur ex subita mutatione, quæ multos morbos parit (vid. Aph. 80). Si vero morbus fiat, quoniam interim corpus nihil patitur ex tempestatis inconstancia, vis vitæ medicatrix morborum, in sua functione non perturbata, constantem facit morbi materiæ mutationem, modo non avertatur præpostera curatione. Unde valet medicus in historiis morborum peritus præfagire naturales in eo morbo mutationes, atque auxilia adhibita multo certius, quia actio corporis per variam tempestatem non mutatur, suum effectum sortiuntur, ut æger citius liberetur a morbo, subacta & expulsa ejus materia.

Cur morbi judicatu faciles ex constitutione temporis?

V. Si vero admodum inordinata & intempestiva est æris constitutio, multo plures nascuntur morbi, & qui fiunt propter variam hanc causam magis observantur complicati, Cur morbi judicatu difficiles ex constitutione temporis?

seu plus quam uno morbo affligitur æger; quare ex confluentibus phænomenis non tam facile erit decernere, quibusnam morbis decumbat æger; nam quædam signa characteristicæ unius morbi, per causam alterius extinguuntur vel invertuntur: atque morbus tunc magis irregulares facit mutationes, tum quia morbus est complicatus, unus alterum perturbans, tum quod varia aëris constitutio perseverans morbi naturam aliquomodo invertat. Quare impossibile est, ut peritus etiam medicus certam prognosin formare possit ex regulari mutatione, quæ nunc omnino est irregularis. Et quoniam inde incerta fit cognitio, talis quoque fit curatio, quia vires corporis pluribus morbis pressæ non tam constanter & facile morbi materiem possunt subigere & expellere, ac si unicus morbus esset superandus. Impeditur insuper vis vitæ morbum superare per inæqualem illam constitutionem aëris, dum aliter in constitutione tempestitiva juvamentum accipit.

LIB. III. APH. IX.

88. **I**N autumno morbi acutissimi & perniciosissimi omnino: Ver autem saluberrimum, & minime exitiale.

I.

Scopus Auctoris.

IN hoc Aph: conatur Auctor describere discrimen temporis, ut medicus ex generali temporum observatione discat, quodnam tempus anni magis minusque salubre vel exitiale sit: ex istis temporibus eligit Ver & Autumnum seu tempora æquinoctialia. Pro Autumno intelligi possunt septembris, octobris, & novembris; & pro Vere Martius, aprilis, majus; quæ tempora multo facilius concipiuntur, quam

quam ab ortu & occasu stellarum. Neque opus est tam anxie definire hæc tempora in morborum Autumnalium & Vernalium observatione; aeris enim major & minor calor his temporibus morbos Autumnales & Vernales citius & tardius oriri facit.

II. Ut intelligatur, cur in Autumno sæpe vel omnino fi-
unt morbi Acutissimi & Pernitiosissimi, constare debet, qua-
lis morbus his nominibus a medicis accipitur. Morbum
Acutissimum idem fere semper indicare, quod Brevissimum,
ex iis, quæ supra Aph. 7, 1, & Aph. 24, III. exposuimus,
facile colligi potest. Hunc ut servant sensum maxime la-
borant Interpretes in hoc Aphorismo, quoniam experiuntur
Autumnales fere semper longiores esse Vernalibus morbis;
febris enim tertiana & quartana intermittens, imo ipsa fe-
bris continua diutius affligit ægrum in Autumno, quam si
simili febre vernali tempore corripitur Aph. 50. Quare non
credo Hipp. per morbum Acutissimum intellixisse morbum
brevissimum, sed vehementissimum & acerrimum. Atque
sensus hujus Aph: admodum est planus, si per morbum
acutissimum intelligamus morbum Acrem, Vehementem,
multos labores & molestias inferentem, quoniam ex pra-
ctica observatione constat, morbos Autumnales pluribus
& gravioribus symptomatibus stipatos esse, quam Ver-
nales.

Quinam A-
cutissimi
morbi?

III. Triplex est morborum exitus, nempe in sanitatem,
alium morbum & mortem. Morbos Autumno natos dicit
Hippocrates, Pernitiosissimos esse, id est, propter vehemen-
tiam, magnitudinem causæ, vel malignitatem, morbi Au-
tumnales frequentius mortem minantur, quam morbi Ver-
nales: quare Autumnus pertinaciorem vel majorem morbo-
rum causam generat, quam alia anni tempora.

Quinam
Pernitiosif-
simi morbi?

IV. Morbum Acutissimum denotare in hoc loco Morbum
Vehementem & Acrem, superius indicavimus, sed cur talis
morbus frequentius in Autumno, quam aliis anni temporibus
observatur, hoc loco inquirere restat. Quidam generatio-
nem morborum Acutissimorum in Autumno adscribunt fru-
ctibus, tunc copiosius nascentibus & assumtis; alii aëris

Cur in au-
tumno,
morbi acu-
tissimi?

inæqualitati, ut jam sit calor, jam vero frigus; alii denique cutis constipationi. Quare non satis inter Auctores constare videtur, quænam sit vera causa in Autumno horum morborum. Certe autem scio, nullum accedere Autumnum, quin præcesserit Æstas. Regulare est aeris calorem Æstate majorem esse quam in Autumno; atque in æstate humores disponi ad putredinem & acrimoniam; corpusque nostrum hoc tempore largius perspirare, quo facile expellit id corruptum & acre. Si nunc mutetur aëris caliditas in frigiditatem, & siccitas in humiditatem, qualis mutatio in Autumno est naturalis; quæ corrupta fuere in telluris ambitu & auferebantur, quam diu aderat aeris calor & siccitas, nunc ob telluris remanentem calorem attolluntur, sed per aëris frigiditatem & humiditatem non auferuntur, quare miasmata corrupta ad tellurus ambitum suspensa a nobis contiuuo hauriuntur, corporique nostro applicantur: quæ quum sint acria, aliena, & corrupta, sæpe nostrum corpus inficiunt, & quoniam nobis admodum sunt aliena, non facile actionibus nostri corporis subigenda, pariunt morbos suæ naturæ convenientes, id est Acutissimos, vehementes, & acres; corruptio enim per calorem inducta acerrimam acrimoniam inducit. Hæc fiunt ratione causæ applicatæ, sed ipsum nostrum quoque corpus hoc tempore parat morbosam materiem; nam æstivo calore humores excrementitii fiunt acriores, verum quia in calore exonerantur per insensibilem perspirationem, corrupti hi & acres humores nullum possunt inferre damnum. Verum facta mutatione aëris in Autumno, minuitur perspiratio insensibilis: corruptum id non amplius evacuat, sed in corpore retentum, mora sensim acrius factum, morbum Acutissimum generat. Ex hac vel illa, vel binis causis simul, generantur morbi Acutissimi Autumnales, quæ causæ tam frequentes aliis anni temporibus non concurrunt, quare Autumno frequentius morbi Acutissimi observantur. Conf. *Aph.* 50, IV.

Cur perniti-
osissimi?

V. Homo materiâ morbi infectus, ut in sanitatem redeat, debet hanc materiem vel subigere actione vitæ aut medicamenti, vel expellere: si vero hoc præstare nequit, vel
quia

quia materia nimis pertinax est, vel continuo additur nova, tandem superatis viribus vitæ, moritur. Ex præcedente descriptione liquet, utrumque malum in morbo Autumnali excellere: corruptum enim in aëre nobis communicatum, ut & quod in nobis natum fuit per æstivum calorem, ad summam acrimoniam fuit evectum, unde magis perniciosum seu lethale, quam quod minore calore productum fuit. Atque id alienum non solum est expellendum & subigendum, verum dum æger premitur morbo, continuo nova aggeritur materia, nam haurimus interim aërem miasmatibus similibus infectum, & quod in corpore receptum fuit, propter parciorem difflationem vix valeamus excutere, quare tandem detritis viribus succumbimus, vel difficulter superamus morbum. Quales morbi dicuntur lethales, & perniciosissimi, non quod semper mortem inferant, sed sæpius, quam similes morbi Vernales.

VI. Ut spatium trium mensium tribuitur Autumnno, ita etiam veri, hoc autem habet antecedentem Hyemem, in qua multi sunt collecti in corpore humores, sed vero multo minus ob præcedens frigus, corrupti. Quare morbi Autumnnales præcipue oriuntur ex vitiata qualitate, dum morbi Vernales fere semper ex abundantia proveniunt. Hæc autem abundantia per subsequenter calorem, atque largiorem perspirationem facillime tollitur, vel evacuantibus artificialibus demi potest. Quare rariores hoc tempore fiunt morbi, quam in Autumnno, & qui nascuntur ex abundantia, minus sunt exitiales, quam ex vitiata indole humorum fiunt, faciliusque tolluntur, quoniam nova non accedit materia, atque recepta malignitas per largiorem perspirationem facilius excutitur. Hæc autem omnia, quæ de morbis Autumnnalibus & Vernalibus dicta sunt, generaliter sunt capienda; interdum enim vere quoque observantur morbi acutissimi & perniciosissimi, dum in autumnno habentur morbi leviores; quare hæc observatio non est admittenda sine ulla exceptione; sed quod plerumque hoc observetur.

Ver salu-
berrimum
& minime
exitiale.

LIB. III. APH. x.

89. *Autumnus tabidis malum.*

I.

Connexio.

IN præcedente Aph: egit Auctor de infalubritate Autumn-
ni & salubritate Veris in producendis morbis acutissimis
& perniciosissimis: inde hoc loco statim subnectit obser-
vationem in Chronicis, & quemadmodum ex Acutis citavit
Acutissimos & perniciosissimos, ita ex Chronicis quoque
maxime Chronicum & perniciosissimum proponit, nempe
Tabem. Sed in oppositione hoc discrimen invenitur, quod
omittit ver saluberrimum & minime exitiale, quoniam Ta-
bidi etiam vere maxime periclitantur, multi enim martio
mense moriuntur. Satis ergo constat, alterum adjunctum de
vere non sine iudicio omissum esse. Ut autem constet sen-
tentia aphoristica, (1) Sciendum est, quid sit Tabes &
(2) cur autumnus his sit malus.

Tabes quid
sit.

II. Phthisis nomine duos distinctos complectuntur morbos
Medici, nempe Corporis emaciationem seu Maciem, atque
Corruptionem. Qui autem hos duos morbos mistos non
admittunt, confundunt Atrophiam & Ariduram cum Phthi-
si, in quibus medicus non attendit ad Corruptionem, sed
solam totius corporis vel alicujus partis Extenuationem vel
Maciem. Alii autem Cacochymiam & Cachexiam Phthisis
quoque speciem faciunt; verum in his non attendunt ad
corporis extenuationem. Hinc ut morbus vocetur Tabes
vel Phthisis; (1) Debet adesse summa macies; (2) Cor-
ruptio humorum vel & partium firmarum; (3) Atque hi
duo morbi debent totum corpus afficere; quoniam si pars
quædam particularis extenuetur & corrumpatur, manente
reliquo

reliquo corpore sano, talis homo non dicatur Tabe laborare. Qui igitur per nimiam quamcumque evacuationem, vel per rigidissimam inediam ad maciem fuit redactus, quam diu non accessit corruptio, non laborat Phthisi; sed accedente corruptela, ut frequentissime fit in hujusmodi humorum defectu, Maciei nomen mutatur in Tabem. Idem morbus videtur nasci posse ex vitiata alimentorum confectione in nobis, quoniam tunc quoque corpus privatur suo pabulo, sed quoniam tanta vitiata coctio nunquam existat sine corruptione, inde talis extenuatio statim ab initio nomen Tabis meretur. Non semper est opus, ut primo habeatur extenuatio seu macies, & dein accedat Corruptela, interdum enim Corruptela prægreditur, quemadmodum in Cachexia & Cacochymia, qui homines in principio læpe tument, & dein macie consumuntur. Quæ Tabes ab interna & veluti latente causa sine majore evacuatione vel detractatione nutrimenti adurit, ad tria genera referri potest.

III. *Purulenta* vocari potest, quoties pus alicubi in corpore formatum, retentum, in putrilaginem conversum, circulantibus mistum, sanguinis & reliquorum humorum crasin ita invertit, ut fiant nutritioni inepti: frequentissime hoc fit ex pulmonis ulcere, quare etiam auctores hanc speciem vocant *Phthisin veram*, dum maciem cum corruptione ex abscessu vel ulcere aliarum partium *Phthisin notham* placent vocare. Quod autem ex Pulmonis ulcere pertinacior & frequentior formetur Phthisis, ex his clare patebit. Puris generatio ex bonis humoribus, atque puris corrupti & resorpti permistio cum circulantibus, ut in reliquo corpore, Abscessus, Ulcera & Vomicæ, naturale consumit corporis pabulum, & circulantes bonos humores corrupta purulenta putrilagine inficit: sed præterea Pulmo pus formans, quia sursum contra naturalem puris gravitatem se evacuare debet, hic multo magis, quam alibi pus retentum corrumpitur & inficit. In hoc solo si consisteret differentia, vomicæ etiam viscerum internorum pari passu inducerent phthisin, quæ confectum pus non facile

Tabes Purulenta.

eliminare valent. Sed major differentiæ causa accedere debet, cur Pulmonis ulcus magis quam aliorum viscerum Tabem inducit: nullum enim est in nobis organum tam præstans præparationi humorum datum, quam Pulmo, cuius functio per ulcus vel vomicam vitiata facit, ut humores minus debito præparentur, quæ præparatio requiritur, ut commutetur ingestum alimentum in indigenos humores; dum vero reliquorum viscerum secretiorum & excretiorum, vitiata functione non ita Nutritio, quam Secretio & Excretio turbatur. Hoc si adhuc insufficiens videtur, suppleri potest observando, Pulmonis Ulcus aëri magis expositum esse cum difficili puris liberatione, quam ullum aliud internum viscus; quare hic magis, quam alibi pus stagnans in corruptelam vertitur, cum aëris aditus egregie promoveat putredinem humoris, qui in alio loco clauso sine multa putredine diu potuisset conservari. Ob has igitur non evitabiles causas corruptionem & emaciationem inducentes ex pulmonis ulcere *Tabem* ex hac causa natam *Veram* vocare placuit veteribus.

Tabes Catarrhosa.

IV. Altera species vocari potest *Tabes Catarrhosa* seu Colliquativa frigida, quæ a quibusdam refertur ad Phthisin nervosam. Corporis scilicet emaciatio cum humorum corruptione ab interna latente causa, in qua Tabe sæpe vixantur Catarrhosis destillationibus e capite veluti provenientibus & in pulmones descendantibus, a quibus sæpe & vehementer tussunt, multumque expectorant phlegmatis falsi & spumosi, vix cum ulla febricula, sed potius corporis refrigeratione & rosione circa dorsi spinam: interdum autem levi phlogosi tentantur, donec omni consumto corporis pabulo cum summo pallore & marasmo, moriuntur. In quâ specie mihi videtur esse tam debilis actio vitæ, ut, quæ ingesta fuere alimenta, loco commutationis in bonos humores, nunc per spontaneam corruptelam degenerent in humorem tenuem, acrem, deliquatum, ineptum nutritioni, quem humorem Veteres vocarunt Pituïtam falsam.

Tabes Colliquativa.

V. Non multum distat a præcedente, quam voco *Tabem Colliquativam*, in qua etiam sine visibili causa totum corpus con-

consumitur Tabe lenta, cum adjuncta erratica febre, & corporis incalescentia, frequentior observatur in locis calidis quam frigidis, atque in viris præprimis post febres diu toleratas. Videntur in hac specie per supervenientem putredinem humores sani deliquescere in humorem tenuem acrem & calefacientem, seu speciem ichoris, quæ ingesta alimenta in similem corruptelam convertit, consumens omne corporis pabulum, pinguedinem fundens, quæ sub forma urinæ oleaginosæ tinctæ & spumosæ exit, aut nomine sudoris colliquativi effluit.

VI. Qualem hic intelligit Auctor Tabidis speciem, non consentiunt Commentatores. Galenus dicit se conjectari non posse. Ego autem existimo, Hipp: præcipue intelligere Tabem ex ulcere pulmonis, quoniam Hipp: & alii Medici, si morbi nomen absolute ponunt, qui morbus varias habet species, semper intelligunt speciem frequentissimam, quam veram vocant: ita pleuritidem ab inflammatione pleuræ, Nephritidem a calculo renum intelligunt. Videbimus tamen, an non omnibus speciebus Autumnus malus sit. Contendunt, Autumnum Tabidis insaluberrimum esse frequentissima aëris variatione; sed quoniam frigoris & caloris crebra etiam invenitur in aliis anni temporibus vicissitudo, hæc causa soli autumnino non esset adscribenda. Verum caloris commutatio in frigus, quod corruptum in præcedente calore inhibet exhalare, quodque corporis ex ægritudine debilis motum vitalem fere totum exstinguit, nulli tempori magis quam Autumnino tribui potest. In Tabescentibus igitur corporibus, sive ex pure corrupto, vel catarrhoso, vel deliquata materia, quæ erant oppleta, in Æstate satis libere corruptum exhalantia, nunc accedente frigore autumnali, quo inhibetur corrupti difflatio, & motu vitali in his nimis languido, fere tota actio per frigus exstinguitur, unde ita accumulatur corruptum, & suffocatur vitæ actio, ut inde æger pereat.

Autumnus
Tabidis
malus.

LIB. III. A P H. XI.

90. **D**E temporibus, si quidem hyems sicca & a-
 quilonia fuerit, ver autem pluviosum &
 australe, æstate necesse est febres acutas fieri, &
 ophthalmias, & dysenterias, maxime autem mulie-
 ribus, & viris naturâ humidis.

I.

PRæter morbos, qui naturalem & consuetam temporis
 mutationem sequuntur, alii etiam sunt, qui variam
 istius temporis anni sequuntur, ut ex hoc Aphorismo
 constat, non enim regulare est, ut Æstate fiant Ophthal-
 miæ, Dysenteriæ, & febres acutæ; sed si antecesserit Hy-
 ems sicca & aquilonia, & ver pluviosum & australe: &
 tunc non omnibus hominibus, sed maxime mulieribus &
 viris naturâ humidis. Quare hic citatur series causarum
 se invicem excipientium, ex quibus collectis tandem hi mor-
 bi generari solent. Galenus existimat, Hippocratem hanc
 prognosin formasse ex lege naturæ, sed non ex pura ob-
 servatione. Si autem inspicimus locum, ubi horum mor-
 borum reddit rationem, quem invenimus *Hipp: Lib. de Aë-
 re, aquis, & Locis*, H. a. 342, non detego illam legem.
 Hæc sunt Auctoris verba, quibus probat hanc prognosin,
 (Quum enim Æstus derepente accedat, terra humida exi-
 stente a vernis imbribus & ab Austro, necesse est, æstum
 duplicatum esse, & a terra irrigua ac calida, & a solo u-
 rente: quum ventres in hominibus nondum constricti sint,
 neque cerebrum resiccatum. &c.) Nam aëris humiditas
 potius temperat nimium calorem ad Thermometrum, sed
 nobis

nobis toleratu facit molestiorem. Quid autem per ventres nondum constrictos, & cerebrum non resiccatum sit intelligendum, tam plane non constat, ut esset ratio sufficiens ad istos morbos præfagiendos. Videtur igitur mihi, Hippocratem, cum in ejus senectute collegit aphorismos ex præcedentibus suis operibus, puras & constantes voluisse observationes medicas, sive physicis istius temporis principiis congruerent, sive contrariari viderenter, modo Auctor certissime esset persuasus longa observatione medica, tales morbos fere semper secutos fuisse in humidis temperamenti post talem aëris vicissitudinem. Ex observatione hac & multis aliis mihi non obscure patere videtur, Hippocratem sibi conscripsisse Tabulas metereologicas, quæ quoque his temporibus a Medicis & Physicis conscriptæ in publicum emittuntur, ex quibus hanc prognosin practicam petiit, quæ autem Tabulæ deinceps turpiter fuere neglectæ. Sperare autem hodie possumus, aliquem inventum iri, qui ex hodiernis more Hippocratico nobis plures & utilissimas in medicina observationes ex collectionibus, variis in regionibus conficiat, & publici juris faciat; nam quamdiu versamur in particulari observatione, quemadmodum ipse quoque feci a multis retro annis, licet sine his comparari non possit, medica scientia non magnum usum inde mutuatur. Quare Edenburgensium inceptum non satis laudare possum, qui hanc ingressi sunt viam.

II. Multum tamen ad promovendam scientiam differre, sive experimenta vaga, sive de industriâ instituantur, omnes Medici & Physici norunt, qui in his multum laborarunt; multo enim magis promovetur doctrina per experimenta a peritis in scientia & cum judicio instituta, quam quæ negligenter pertractantur. Quare experimur etiam, medicos in arte medica consumptos, & frequenti praxi exhaustos, non raro tamen in medendo stupidos esse, qui praxin sine ulla norma, & negligenter excoluere, multa perversa detegentes & non emendantes; vel quia praxin obiter exercent, dum reliquum tempus in physicis, anatomicis, botanicis, chemicis, vel quavis alia utili scientia impendunt

Quid faciat
hyems sicca
& aquilonia.

vel, quod pejus est, in colloquiis, compotationibus, reliquisque vitæ deliciis vitam transigunt. Ut ergo cum fructu instituantur experimenta, illa obiter non sunt capienda, sed sedulo & accurata attentione omnes minutiae etiam sunt notandæ, ut facit Auctor noster, qui non Veris constitutionem notat, ut præfagiat æstivos morbos futuros; sed et etiam prægressam Hyemem. In qua Ventum & siccitatem citat, quare non sufficit, ut flet Aquilo, nam si simul adferret humiditatem, propositi morbi non essent expectandi, sed si spirat Aquilo, aerque simul sit solito siccior. Aquilonari vento, præ reliquis omnibus frigidus, quia ex telluris plaga venit, minus a sole irradiata, & apud nos quoque marina, si jungitur siccitas; effectus in nostro corpore deduci possunt ex aëris frigiditate & siccitate; quibus junctis partes firmæ fiunt robustiores magisque contractiles, unde humores continuata hac actione fiunt densiores magisque compacti.

Quid faciat
ver pluvio-
sum & Au-
stiale.

III. Auster autem ex regione calidiore delatus, si simul sit pluviosus, omnino priori oppositos præbet effectus, nam loco frigoris fit calor, & loco siccitatis fit humiditas, quare ob mutationes has generantur facilius morbi. Verum quamdiu in corporibus humidis & laxis, qualem naturam hic citat Auctor, per aëris frigiditatem firmabantur solida, & compingebantur humores, hæc corpora satis sana vivebant: nunc vero accedente vernali & australi calore firmarum partium relaxatur tonus, qui magis enervatur pluviosa tempestate. Hinc quod compactum fuit, iterum liquescit, sed quia virtus agens infirmior, tam ex propria natura ægrotantium, quam ex vento australi & humido, id liquatum, ineptum nutritioni & functionibus præstandis, tamen colligitur in corpore. Scatent igitur hujusmodi corpora materiâ crudâ resolutis & non expulsis humoribus natâ; quam ob rem se tunc sentiunt ponderosiora, tum ob multitudinem, tum ob firmas partes relaxatas; sed quia hæc materia vix ullam hucusque acquisiverit acrimoniam, nulla febris observatur.

IV. Illa

IV. Illa autem materia aliena evolare prohibita aëris humiditate & enervato tono solidorum in naturâ humidis & mulieribus, (nam corpora robusta, obstante hac causa, hanc materiem excuterent per insensibilem perspirationem,) longiori morâ retenta & calore æstivo sensim in majorem acrimoniam evehitur; quidquid enim in nobis est alienum quod etiam expelli non potest, mora & calore corrumpitur. In tali itaque Æstate corpora laxa & humida foveant in se humorem alienum, tenuem per deliquationem, & acrem. Hic humor tandem lateribus arteriarum applicatus, in arteriarum fibris per stimulum majorem motum facit, qui cum habentur per totum corpus, vocatur *febris Acuta*. Si vero præcipue inficit Lachrymas, oculi his lachrymis continuo irrigati, & irritati, ruborem contrahunt, quem morbum vocant *Ophthalmiam* seu Lippitudinem. Interdum vero ad intestina delatus copiosiore facit alvi dejectionem, & quoniam simul acris est, Tormina infert, qui morbus vocatur *Dysenteria*.

Cur æstas
deinceps fe-
bres acutas,
Ophthalmi-
as, & Dysen-
terias faciat.

V. Ad Prognosin formandam hæc vicissitudinum observatio egregia est; verum in arte Medica ægri evitacionem instantis mali, & curationem exigunt, si hujusmodi morbis conflictantur: quare medendi modus est exponendus præveniens instans malum. Facile constat, non esse in medici potestate hanc evitare tempestatum mutationem, quare medicina est dirigenda ad humanum corpus. Corripiuntur præ ceteris laxa & humida corpora, & propterea, quod liquatam materiem non expellant per insensibilem perspirationem. Igitur duo agenda sunt a Medico Vernali tempore, antequam nimius æstivus calor accedit, ut promoveatur insensibilis perspiratio, qua excluditur id retentum, & ut corpus firmetur raborantibus. Ergo nec venæ sectio, quia id inutile liquidum non evacuat, sed bonum sanguinem, nec Alvi ductio, sola aliena intestinorum excludens, non vero perspirabile corruptum, ad præveniendos hos morbos, ut multi faciunt, conducunt: sed promovenda est illa excretio, scilicet insensibilis perspiratio, cujus materia retenta dictos morbos infert. Si autem minus sero vocetur medi-

Hujus ob-
servacionis
usus.

Cus, dum scilicet materies sit acris facta, & febrem Acutam, Ophthalmiam, vel Dysenteriam induxerit, morbi genus primo est inquirendum. Hodie febrem Acutam & Ophthalmiam deducerent fere omnes Medici ex Inflammatione, aggredierentur hos morbos sanguinis missione, nitrosis, diluentibus, laxantibus, aliisque auxiliis Inflammationi appropriatis, exspectarentque in urinâ critica signa. Qui autem sedulo attendit subjectum, corpora scilicet humida & laxa, materiem corruptam tenuem esse causam, sæpe copiosam fieri alvi dejectionem cum torminibus, facile persuaderi potest, dicta non convenire Inflammationi, corporibus robustis & siccis frequentiori morbo, eamque conjunctam semper habere summam siccitatem & densitatem humorum. Unde non mirum alicui videri potest, hos morbos curari non posse solita methodo Inflammationis, sed nos debere antisepticis Diaphoreticis internis, qualia in putredine calida præscribi solent, tentare materiæ emendationem & expulsionem per insensibilem perspirationem, quia hujus organi materia retenta acrior facta, hos morbos producit, quæ non patitur per alienum organum, puta alvum, vel urinam, tam facile eliminari, quoniam observanda est naturæ directio, *Aph.* 21, III. Oculis interim applicari possunt, si Ophthalmia vexat, refrigerantia & leniter adstringentia: atque in Dysentericis parva dosi Rhabarbari sæpe repetita alvus servanda aperta, ne acris in intestinis effusus humor diutius stagnans exulceret intestina, dum interim maxima humorum colluvies educatur per cutim. Post evacuatam acrem humorem corporis remanens debilitas roborantibus cardiacis est curanda.

LIB. III. APH. XII.

91. **S**I vero hyems australis & pluviosa, & tranquilla sit, ver autem siccum & aquilonium, mulieres quidem, quibus partus in ver incidit, ex omni occasione abortiunt: quæ vero pepererint, infirmos & morbosos pariunt pueros, ita ut vel statim illi pereant, vel tenues & morbofi vivant. Cæteris verò mortalibus dysenteria, & ophthalmia sicca fiunt: senioribus autem catarrhi brevi perimantes.

I.

BIpartita sectio quia faciliorem huic Aph: præbebit intellectum, qui a Commentatoribus vario modo accipitur, magis est observanda, quam in aliis. (1) Proponitur causa generalis morbos inferens, consista in aëris & ventorum mutatione Hyeme & Vere. (2) Illa deinceps mutatio examinatur, quid faciat, in gravidis, infantibus, pituitosis, biliosis, & senibus.

Divise.

II. Aëris hæc constitutio plane opposita est præcedenti, nisi quod additum sit Tranquilla, Clemens vel Placida, quia a multis, uti a Celso Lib. 1. Cap. 1. Si vero *auster pluviosæ hyemem occuparunt*, omittitur, & ab aliis adstruitur addi non oportere, quoniam oppositum non invenitur in prægresso Aphorismo. Quare vero Hipp. Lib. de Aeribus, a quo & locis H, a, 345. huic sententiæ addat *idios* nullus est dubitandi locus, quin sit verus sensus nostri auctoris. Si ergo consueta frigida & tempestuosa Hyemis constitutio mutetur in Australem Humidam, & Tranquillam, seu clem-

Quid faciat
hyems au-
stralis &
pluviosa &
tranquilla.

mentem & placidam, id est magis tepidam & minus ventosam constitutionem, corpora sana in partibus firmis manent laxiora, humoresque manent tenuiores magisque prona ad corruptionem, atque propter aëris humiditatem perspirabile magis retinetur in corpore, quæ omnia amplius disputata sunt & exposita in *Lib. de Insensibili perspiratione*.

Quid faciat
deinceps
ver siccum
& aquilonium.

III. Si vere accedente aëris humiditas convertatur in siccitatem, id quod præcedente hyeme per aëris humiditatem fuit retentum, exhalaret, si simul adesset aëris calor, verum Ventus aquilonaris frigidus corporibus applicatus hanc liberam exhalationem immoratur: quare id quod exhalare debuit, ab aëre sicco & frigido partium firmarum contractilitatem augente fortius agitatur. Humores crudi hucusque non satis subacti, per validiorem firmarum partium agitationem assimulantur in bonos humores, sed humores evacuationi destinati, qui non patiuntur actione corporis validiore assimilari, eadem actione magis degenerant a proba indole, quod si corpus possit, obstante aëris frigiditate aquilonia, se liberare ab hac inutili materia, perfecta sanitate frueretur; sed si expellere eam materiem non valet, actione corporis ultra modum agitata, sui generis infert morbos, qui a priori non possunt ex natura materiæ definiri, quoniam differt pro natura corporis & humorum, qui in tali tempestate Vernali agitantur: propterea experientia est consulenda in subjectis variis, in quales morbos hæc materia Hyeme retenta & Vere agitata erumpere solet.

Cur in tali
vere frequentior
abortus?

IV. Mulieres in præcedente Hyeme gestantes utero, quoniam aër est solito humidior & calidior, laxans firmarum partium tonum, in suo corpore minus præparant humores, sed colligunt in se abundantiam crudorum indigestorum materiæ perspirabilis: laborant itaque duplici cruditate, scilicet ex alimentis non satis subactis, & materiâ excrementitia nondum expulsa. Vere nunc accedente frigido & sicco partes firmas contrahente, modo minima accedat causa ad Abortum disponens, quare dicit Auctor *ex omni occasione*, foetus crudo nutrimento nutritus, debilis, impetu humorum aucto ad uterum, facile excluditur, depulsa placenta

placenta ab adhærente utero. Talem instantem Abortum melius Hyeme quam Vere prævenire valet ars medica; si enim gravidarum corpus tanta copia crudorum sit onustum, non facile erit brevi tempore, dum mutatur aëris constitutio, istud ab his impuritatibus liberare, ut præveniatur Abortus: sed in tali constitutione Hyemali siccantibus, roborantibus, stomachicis, & diaphoreticis, curandum est, ne generetur in gravidis crudorum cumulus, ne forsan aëris mutatio, quam nemo præfagire valet, Abortus ansam præbeat.

V. Ut fortes creantur fortibus, ita ex infirmis & valetudinariis nati Infantes asportant non raro parentum infirmitatem, morbisque ex hæreditate natis luctantur, quemadmodum in his regionibus sæpe in rhachiticis infantibus experimur, sive quod Maritus crudum & indigestum vel morbosum præbuit semen, vel Mater valetudinaria immaturum vel corruptum continuo præbuit nutrimentum foetui tenello: ita enutritus foetus & ex immaturo femine natus nequit in firmum & validum adolescere infantem & puerum: infans enim debilis natus a matre separatus sua propria coactus deinceps præparare alimenta, vel succumbit impotens, vel diu luctatur valetudinarius. Hoc ergo loco solummodo adstruendum, prædictam aëris constitutionem præbere humorem nutritioni tenello foetui ineptum, vel non satis idoneum. Constat autem ex iis, quæ hucusque disputavimus, gravidam fœminam duplici crudo onustam esse, quem crudum humorem foetus in tenello suo & debili corpore acceptum non valet in probum nutrimentum & incrementum suum convertere; quare solito pumiliores & infirmiores nascuntur, vel brevi a partu moriuntur, quod malum eadem methodo, in abortu præveniendo tradita, præveniri potuisset.

Cur infantes nascuntur infirmi?

VI. Hippocratem intellexisse Dysenterias fieri in Pituitosis, liquet ex ejus allegato textu *de Aëre, aquis & Locis* ubi diserte dicit, *Pituitosis igitur Dysenterias fieri verisimile est, & mulieribus, pituita de cerebro defluente propter naturæ humiditatem.* Mutatio recensita ergo est applicanda ad homines pituitosos, humidos & laxos, dum vero sine interpretatione hac ipsius

Cur pituitosis fiunt Dysenteriae?

Auctoris sententia non esset sine dubio, an hic esset intelligenda Dysenteria sicca vel humida, quoniam statim subdit *Ophthalmia sicca*. Dum igitur in tali Hyemali constitutione corpora naturâ humida & pituitosa humoribus crudis scateant, accedente frigore boreali superante eorum corporum vires vitales, sed tamen aucta contractilitate solidorum per frigus, contenti humores ad quæcumque excretoria urgentur; sed quia frigus magis afficit cutem, quam lambit & tangit, ac intestina nunc laxiora, verisimile est, minui insensibilem perspirationem per cutim, sed humores se exonerare per alvum laxiorem; quod si in tam diu collecto humore quædam adsit acrimonia, ille transeundo rodens intestina, dejectionem copiosam facit cum dolore, quem morbum Dysenteriam soliti sunt medici vocare. Qui ergo in pituitosis prævenire satagit instantem Dysenteriam vernalem, id agere oportet, ut roborantibus, stomachicis & discutientibus hyemali tempore corpus liberetur ab abundanti pituita: sed si Dysenteria ex tali constitutione sit nata, primo purgante Rhabarbarino confluxos & acres humores ex intestinis exturbare debet, sed fluxum ulterius crudorum ab intestinis derivare ad cutim, viam naturalem, exonerantem, quod ex prohibita perspiratione fuit retentum, ubi facilius & minori molestia id crudum acre & corruptum potest evacuari, quam per intestina, quæ bonos & morbosos humores unâ evacuant, & propterea majorem debilitatem & imperfectiorem depurationem faciunt.

Cur bili-
osis oph-
thalmia
sicca?

VII. Ex allegato loco Auctoris constat, Hippocratem intelligere Ophthalmias in biliosis, quia etiam rationem addit, nempe *propter carnis caliditatem ac siccitatem*. Missa sententia nostri Auctoris, videbimus cur illa tempestatis mutatio in Biliosis sæpe Ophthalmias inferat. Biliosi statuuntur, qui in suo corpore habent vel facile generant humorem tenuem acrem calorem inducentem. His in hyeme australi & pluviosa quoque parciior fit diffusio, sed quando accedit ver siccum & aquilonium, id tenue propter calorem majorem corporis naturalem facile excutiunt aquosum, verum pinguitudo retenta & corrupta præcedente hyeme, tam facile excuti nequit,

nequit, privata parte meabili & aquosa, magis adhærens lateribus vasorum, calidas biliosas & erysipelatosas ægritudines parit, quæ videntur ex observatione practica cum lachrymis ad oculos delatæ, in albo oculorum proritare rubedinem, refrigerantibus & adstringentibus antisepticis temperandam, & mucilaginosi obvolvendam; atque derivantibus per alvum vel cutim per antiphlogistica diaphoretica evacuandam, quum relicta in corpore materia illa tenuis & acris, longiore mora, sensim reddatur acrior.

VIII. Denique assequitur morbos ex eadem tempestatum mutatione in valde senibus, de quibus allegato loco, *valde autem senibus defluxiones propter raritatem venarum, adeo ut aliqui derepente pereant, aliqui vero semi siderati fiant.* Ergo constat, Hippocratem voluisse valde senes, & non omnes derepente perire, sed & quosdam etiam hemiplecticos fieri, quod non satis ex ipso Aph: liquebat. Valde autem Senes, pituitæ productioni pronos, non est mirum in humida tempestate cruditatibus scatere, quæ tempestas etiam in robustioribus faciebat crudorum abundantiam: sed quando tunc accedit Verbo-
Cur sen-
oribus ca-
tarhi
re boreale & siccum, hæc pituita tam diu in aëre humido & tepido fluxilis, nunc incipit concrefcere & veluti coagulari, seu abit, ut loquuntur veteres, in pituitam vitream. Quia vero corpora senilia debilissima non valent pituitosum crudum viribus vitæ servare solutum, facile in locis quibusdam subsistens concrefcit; quod si fiat in encephalo, spinali medulla, gangliis nervorum, pulmonibus, ubi maximus est humoris pituitosi proventus, aut comprimendo nervos apoplexiam pituitosam, hemiplexiam, vel alios morbos periculosos, ut & mortem producit ex pituitæ abundantia & concretionem; vel ita opplet bronchia pulmonum, ut omnis interceptiatur respiratio. Hos autem morbos in valde senibus prævenire vix valet ars medica, cum senibus novas addere vires nescit medicina, Vinum malvaticum, Styrax, Benzoin, Balsamus peruvianus, & similia nervina calefacientia sunt præcipua hyemali tempore propinata, antequam vernale frigus & siccitas ingruit.

LIB. III. APH. XIII.

92. **S**I vero æstas sicca & aquilonia fiat, autumnus autem pluviosus & australis, capitis dolores ad hyemem fiunt, & tusses, & raucedines, & gravedines: quibusdam vero etiam tabes.

I.

EX quatuor anni temporibus solummodo observat duo recedere a solita sua constitutione, ut ver & hyems consuetam constitutionem servant, sed Æstas & Autumnus descripto modo sint mutata: sed ulterius non determinat, in quo temperamento corporis illi morbi sequenti hyeme sunt expectandi, ut fecerat in præcedente Aph: neque tradit morbos autumnales ex tali mutatione tempestatum, non quod nulli fiant, sed quod solum scopum habeat præfagire morbos Hyemales post has observatas temporum mutationes. Haud credo Hippocratem hos morbos deduxisse ex rationibus aut necessitate rei, sed hos invenisse morbos frequentiores observatos fuisse & notatos in suis tabulis observationum post Æstatem & Autumnum talem prægressum. Hæc igitur pura observatio sine ulla addita ratione satis esset firma & constans. Utinam vero etiam nostris temporibus ulterius sedulo excoleretur, ad firmanda a veteribus prolata, & adderentur plura alia scientiæ medicæ promovendæ, & sanitati conservandæ utilissima.

Æstas sicca
& Aquilonia
quid faciat.

II. Aquilonem commutare naturalem Æstivi aeris teporem in frigus, constans est observatio, huic si adsit aeris siccitas, ratione frigoris minuitur perspiratio, sed ratione siccitatis promovetur, quare in perspirationis quantitate non videtur fieri magna differentia ad aërem calidiorem sed humidum, Verum ab utrisque his partes firmæ majori contrahilitate operantur, cum & frigus aquilonare & siccitas aeris

ris intendant automaticam firmarum partium constrictionem: unde humores tranfluentes magis fiunt compacti, & humido tenui spoliati, tam validiore expulfione per constrictionem auctam, quam aëre ficcior abforbente. Ad finem igitur hujusmodi Æftatis folida funt contracta & ficca, humores vero compacti & denfi.

III. Si corpori ita prædifpofito applicatur aer humidus & tepidus, qualis fit in Autumno fpirante Austro, laxantur tunc folida contracta, humores compacti liquescunt, fed, propter aëris humiditatem minus exhalantes, talia corpora fiunt oppleta humoribus crudis, provenientibus ex liquatis bonis absoluto munere, non fatis per infenfibilem perfpirationem expulsi. Sed quoniam in Autumno non tantus eft calor, quam fi talis tempeftas fuiffet in æftate, hi humores liquefacti & retenti cum folidorum atonia, minorem acrimoniam habent, quam fi in æftate fuiffent retenti.

Quid deinceps
Autumnus plu-
vius &
Australis fa-
ciat.

IV. Supponit nunc Auctor poft talem Autumnum fequi Hyemem naturalem frigidam & humidam, in qua corpus crudo fucco plenum in partibus firmis majorem acquirit per frigus superveniens contractilitatem, fed quia in hac tempeftate tamen manet parca difflatio, id crudum copia majore atque vitiata qualitate afficit caput, unde partim diftenfio vaforum meningum & cerebri, partim a cruditate acri Caput Doloze vexatur. Qui ergo vellet hunc instantem prævenire Dolorem, id agendum haberet, ut in autumno prægreffo roborantibus & ftomachicis præpararetur retenta materies ad expulfionem; & firmaret corpus autumno relaxatum; atque ficcantibus difcutientibus & Diaphoreticis liberaret corpus ab abundante & nunc præparata materia, ut superveniens frigus hyemale non inveniret corpus crudo & acri fucco onuftum, quo deinceps generatur Capitis Dolor. Sed fi fine hac cautela homo ab hac caufa in Capitis Dolorem incidit, non tam facile erit eum curare. Alvi ductio enim & Sanguinis miffio quidem demendo quantitatem, & minuendo impetum, leniunt Dolorem, fed non valent id acre & crudum emendare. Sudorifera

Cum tunc
Capitis do-
lores hye-
me?

dorifera & Diaphoretica calida crudum expellentia & concoquentia non ferunt ægri, quia aucto motu Dolorem exasperant. Diuretica raro medentur capitis morbis. Quare satius erit Autumno hos prævenire Dolores, quam eorum curationem in Hyeme aggredi.

Cur tunc
Tusses, Rau-
cedines &
Gravedines?

V. Ex iis, quæ hucusque disputavimus, colligere possumus, istos homines ad finem autumnii scateri humore crudo & utcumque acri, accedens frigus, quia præ ceteris applicatur laryngi, tracheæ & pulmonibus, atque membranæ pituitariæ, quas partes respirando semper lambit transeuns aër, illas itaque partes contrahit, & si quos habent in se pituitosos humores, in suis vasculis, glandulis & cryptis colligit, atque ab aëre transeunte frigido & sicco subsistere & condensari permittit. Mucus igitur seu Pituita naturalis harum partium, etiam in sanitate satis copiosus, aeris caliditate & humiditate in Autumno servabatur fluidus, sed nunc accedente frigore inspissatur; &, qui antea vel circulantibus permisceri potuit, vel libere expectorari, vel emungi, ita fit tenax & cohærens, ut ex cryptis suis excuti nequeat. Quoniam autem humores retenti non carent acrimonia cruda, ex tali succo nati, in Trachea & Larynge mucus tenax has partes stimulat, qualis stimulus semper Tussim adjunctam habet. Membrana rimulam glottidis vestiens, majore mucii crassioris copia tumens, æquabilem glottidis superficiem mutat, quo vox formata per talem glottidem fit Rauca. Atque ab eodem mucro crassiore in Pituitaria membrana hærente, investiente nares adjectosque sinus, eum parit morbum, quem Gravedinem seu Coryzam vocamus. Qui morbi laudata methodo maxima ex parte præveniri potuissent, ad minimum brevioris fuissent durationis, cum minor crudorum copia in corpore tam multas suppetias non tulisset his morbis continuandis.

Cur quibus-
dam Tabes?

VI. Ex Textu facile colligi potest, minus frequentem generari Tabem ab hyeme superveniente talem constitutionem Autumnalem, quia addit *Quibusdam vero Tabes*. Hinc Commentatores fere omnes quæsierunt causam in varietate

tate subjecti, quod ab Hippocrate describitur pronum esse in Phthisin seu potius Hæmoptysin. Fateor equidem, quibus ex nativitate sunt pulmones debiles, his quoque facilius generari phthisin: sed dubito vehementer, an in hoc loco talis Tabes sit intelligenda, quæ ex ulcere pulmonis post hæmoptoen in juvenibus est frequentior: potius crederem hîc intelligi debere *Tabem Catarrhosam* superius (Aph. 89, iv) traditam, cum hic nulla sit suspicio morbi inflammatorii, sed catarrhosi & crudi: frequens enim est tussis & coryza in aliis; quare verisimile est istos morbos in quibusdam tam sævos esse, ut ipsam Tabem inferant in omni subjecto, in quo generatur Tussis, Coryza & Dolor Capitis, sed ex majori vehementia causæ morbosæ in tali constitutione natæ. Quod ut plane constet corpus in Autumno crudum & acre colligens ad Hyemen veniens, præcipue hanc materiem colligens in pulmonis aëreis vasis, in principio quidem crassitudinem habet humor, at diuturniore mora liquefcens abit in humorem acrem & rodentem, quem veteres vocarunt Pituitam falsam, natam ex pituita crassa, superveniente deliquante corruptione solutam. Hæc irritando perpetuam concitat Tussim; quæ invertendo laudabilem pulmonis actionem intercipit humorum in nutritivum commutationem; bonos huc affluentes simili corruptela liquefacit: unde tandem consumto corporis nutriente papulo, tussiendo, & ejiciendo multum sputi pallidi & spumosi pituitosi, minime purulenti, corpus lenta Tabe consumitur. Utinam æque constaret quibus auxiliis medicina valeret hanc incipientem curare Tabem! pectoralia enim omnia mollia, inducendo majorem pulmonibus debilitatem, pituitosi proventum augent: acriora exasperant tussim; quare pauca in Phthisi specifica huc conferunt. Hunc tamen morbum non esse incurabilem, nisi corpus ad marasum sit redactum, experientia practica me docuit: fumo aromatico, ex styrace, mastice, olibano, candenti prunæ injectis, suscitato, cum aëre inspirato, roborando pulmonis aërea vasa, simulque iisdem & aliis resinosis atque balsamicis, solventibus internis præveni no-

Nn

vam

vam pituitæ generationem in pulmonibus, atque ejus colli-
quationem impediui antisepticiis. Ita sensim & lente mi-
tescebat tussis, minuebatur spumosi expectoratio, atque
denique recuperatis viribus liberabantur a phthisi & illa de-
bili febre hæctica.

LIB. III. APH. XIV.

93. **S**I vero aquilonius & sine pluviis (autum-
nus) fuerit, iis quidem, qui natura sunt
humidi, & mulieribus, commodus erit: reliquis ve-
ro erunt ophthalmiæ siccae, & febres acutæ, & gra-
vedines, diuturnæ: nonnullis verò etiam melan-
choliæ.

I.

UT sensus hujus Aph: fiat perspicuus, accipiendus est,
ut pars altera vel continuatio præcedentis, in quo
supponitur antecessisse Æstatem Siccam & Aquiloniam,
& dein sequitur etiam Autumnus siccus & aquilonius, qua-
les tunc exspectamus morbos Hyeme. Verum in præce-
dente complexus est generalem prognosin in quovis sub-
jecto, hic autem facit subjectorum distinctionem, ut Pitui-
tosis & humidis sit commodum: Biliosis autem infestissi-
mum, quibus fierent Ophthalmiæ siccae & Febres Acutæ
ac Diuturnæ, & aliquibus Melancholiæ, ut videre est *Lib.*
de Aer. aq. & Loc. H. a 344.

Quid Au-
tumnus sic-
cus & equi-
lonaris faci-
at post simi-
lem æsta-
tem.

II. Si per æstivum aërem siccum & frigidum partes fir-
mæ fuere magis constrictæ & humores compacti (*Aph. 92*,
II), permanente eadem constitutione in autumnno, effectus
igitur fiunt majores per continuatam causam, quare in cor-
poribus temperatis ad Hyemem nimia obtinebit solidorum
con-

contractilitas, & in fluentibus nimia inspissatio & compactura: quare talia corpora magis disposita tunc sunt ad suscipiendum Inflammatorium morbum, & Rheumatismum.

III. Quæ autem corpora firmarum partium atonia & humiditatis abundantia suâ naturâ sunt prædita, tali aëris constitutione, qua humidi abundantia tollitur, & invigorentur partes firmæ, ad mediocrem & salubrem corporis habitum rediguntur; quare tales mulieres atque viri naturâ humidi bene degunt, imo melius quam quæ corpora aliter sunt bene temperata.

Cur humidis & mulieribus commodus?

IV. Quibus autem corporibus est naturalis siccitas & compactura humorum, hac continuata constitutione in morbosam dispositionem excedentem convertuntur. In Aph: tantum habet *reliquis vero*, sed in *Lib. de Aq. aer. & Loc:* diserte dicit *Biliofis autem infestissimum hoc tempus existit*. Sibi etiam appositam addit rationem, scilicet *quod liquidissimum ac aquosissimum in bile est consumitur, densissimum vero & acerrimum relinquitur*. Materia enim veteribus Biliosa & aquosa non habet similem naturam; Aquosa non patitur compingi, sed manet semper fluxilis & volatilis: verum materia Biliosa, quæ ipsis duplex est, nempe bilis ipsa oleosa & pinguetudo nostri corporis corrupta acris & calida facta veteribus est eadem materia, quæ non facile avolat, sed longa agitatione sensim redditur acrior; hæc vero humiditati mista & unâ macerata liquefcit, atque ita humido illo vehiculo absumitur, nisi longiori mora nimis oleosa & acris sit facta, amissa omni saponacitate, renuens cum aquosis unionem. Altera materia biliosa est pars magis nigra & terrestris, minus oleosa, sed magis glutinosa, potius ex sanguinis rubri parte compacta, quando ruber color in nigredinem convertitur, quæ ipsis Melancholia audit. Hæc quoque difficile redditur compingendo volatilis, sed humiditati mista liquefcit. In utroque igitur temperamento, Bilioso nempe & Melancholico, Autumnus materiem præcedente Æstate compactam, ulterius sua siccitate & compactura majore compingit, nullumque concedit tempus liquefcendi & volatilizandi; unde tandem utrique hi humo-

Quid B lio-
lis & siccis
faciat,

res incipiunt abundare, & in qualitate admodum degenerare, quod infestissimum est.

Cur Ophth-
almiæ sic-
ca?

V. Superius *Aph.* 91, vii observavimus, Ver siccum & aquilonium generare etiam Ophthalmiam siccam, post Æstatem australem & pluviosam; videtur ergo hic fieri non posse eundem morbum, cum antecesserit Æstas & Autumnus siccus & aquilonaris. Hoc quoque credo. Sed hic habetur quidem idem nomen morbi, Ophthalmia sicca, id est oculorum inflammatio, rubedo, dolor cum adjuncta siccitate, sed propterea non est eadem causa hæc phænomena inducens. In præcedente judicavimus dictum morbum naturam Erysipelatis sortiri, quia humor biliosis erat tenuis, acris & calida: verum quia eadem quoque phænomena oriuntur ab Inflammatoria diathesi, verisimile mihi videtur, hanc Ophthalmiam potius ex Inflammatoria dispositione provenire; quare non dubitarem in hoc casu sanguinem mittere, alvum ducere, antiphlogistica præscribere, emollientia & laxantia oculis applicare, quæ curatio præcedenti speciei Ophthalmiæ siccæ minus conveniebat, cui adhibebamus simul adstringentia refrigerantia.

Cur febres
acutæ?

VI. Si vero id pingue biliosum, longa compactura per æstatem & sequentem autumnum, perductum fuerit in Hyemen, nunc ex sua consueta natura magis humidam, aliquomodo liquefcere incipit; id compactum, tam diu retentum, nunc liquefcens, non carebit acrimonia, & quia Hyems quoque parcam habet perspirationem, corpus illo alieno liquefacto & acri non facile liberabitur, sed diu cum cæteris humoribus circumductum, sensim in majorem acrimoniam evehitur, quod tandem succum forsan articularum inficiens, arterias in majorem motum irritat, seu febrem Acutam, id est vehementem & calidissimam, in hoc loco, excitat, atque diu durantem, (in Lib. citato habetur *febres Acuta ac Diuturna*,) quoniam materia illa irritans, longa mora facta, non patitur actione febrili cito subigi & expelli. Conduceret ergo in tali autumno corporibus siccis venam secare, alvum ducere, & uti humectantibus, ut promoveretur Lentoris solutio & expulsio. Sed

si talis febris nata sit, tentanda est hujus materiæ commutatio in suppurationem, ut materia sub forma puris, vel per urinam, vel per abscessum, si aliter fieri non possit, eliminetur. In hujusmodi febribus acutis criticos dies observabiles esse confido; minus autem in iis, quæ ex præcedente, Aph. 91, constitutione nascuntur, observari criticas mutationes.

VII. In hoc loco variam invenio lectionem. In citato Lib. coryzam non invenio; multi omittunt χρόνιος, sed quoniam scopus non est omnia rimari exemplaria, ut vera habeatur lectio, sed ut perspiciamus rem ipsam, quæcumque lectio admitti potest, cum Hippocratis verba non majorem quam aliorum fidelium Observatorum auctoritatem habeant. Quare solummodo examinaturi, an, & quomodo præcedens æris constitutio inducat, & qualem Gravedinem. Ex materia in Bilem vel Lentorem commutabili nostrorum humorum non concipio in hyeme formari tunc posse gravedinem: sed quando humorum pars, in pituitam lentam commutabilis, nimis compacta fuit, tandem accedente Hyeme colligatur in Membrana pituitaria, mihi verisimile videtur coryzam generare: quæ pituita veteribus Gypsea & lenta tenax, tam longo tempore confecta, hanc partem occupat, non videtur verisimile Coryzam brevi cessaturam. Quamobrem rei magis conveniens videtur legere *Gravedines diuturnas*: & quoque omitti posse hæc verba, si nolumus respicere ad morbos in hac constitutione ex Pituita provenientes.

VIII. Ex Aphorismi sensu & loco citato plane constat, Melancholiam post talem Autumnalem constitutionem non tam frequens generari, quam morbos præcedentes. Hoc potuisset desumi ex minori numero Melancholicorum temperamentorum; sed tunc non credo Auctorem tantam in observationibus detexisse differentiam, ut hos morbos a præcedentibus distingueret. Credere malo Atrabilarios ex naturâ per hanc constitutionem non semper ita affici, sed interdum materiem tenacem & terrestrem sanguinis continuata æris siccitate & frigiditate resolvi & expelli; interdum vero compingi; quando vero materia hæc Melancholica.

Cur Gravedines diuturnæ?

Cur nonnullis Melancholicis?

lica compacta fuerit, verisimile est, ab hyemis clementia & humiditate resolvi, & circulantibus mista, ad cerebrum delata, cogitationes perturbare, & tale Delirium inducere cum tristitia, quod solemus Melancholiam vocare.

LIB. III. A P H. xv.

94. **E**X anni vero constitutionibus, in universum quidem, siccitates pluviosis sunt salubriores & minus lethales.

I.

VArios morbos ex aëris humiditate & siccitate se invicem excipientibus hucusque agitavit, in hoc loco suggerit generalem observationem comparativam inter has duas constitutiones & pronunciat siccitates salubriores & minus lethales esse pluviosis. De duplici hac prognosi multi intelligunt eandem esse sententiam; alii existimant differentiam esse pertinentem unam ad quantitatem, alteram ad qualitatem. Verum existimo constitutionem pertinere ad statum sanum, ut siccitates pauciores inferant morbos, & pluviosos plures; & propterea siccitates sanis salubriores esse. At minus Lethales perstringi puto ad morbis correptos, ut morbi ex siccitate nati pauciores interficiant homines; sed qui ex nimia humiditate nascuntur morbi; plures homines interimere. Intelligitur in utraque constitutione excessus, tam humiditatis quam siccitatis; cum mediocritas sit saluberrima; videndum igitur erit quali modo dictæ constitutiones inferant morbos, tam quoad frequentiam, quam ad difficultatem curationis, ut ex his observationis legitima comparatio possit elici generalis.

II. In

II. In hoc loco, quia determinati sumus ad generalem observationem, non debemus nobis proponere subjectum aliquo temperamento præditum: nam si respiciamus ad temperamenta humida, Tempestates siccae salubriores essent ipsa modica aëris constitutione; e contra vero in aliis temperamentis bona & mala potest dici Tempestas sicca. Quare consideremus Temperamenta, uti vocant, Temperata, in quibus Tempestas tam sicca quam humida in excessu morbos inferre potest. Aër itaque ficcior nos ambiens, & a nobis inspiratus, ratione humoris liquidissimum absumit, crassius relinquit; ratione partium firmarum, istas magis contrahere facit, ut exsiccatio solidorum accurtationem facit. His ita mutatis humidum, quod remanet in corpore, ultra modum compingit. Præcipuam humiditatem per insensibilem perspirationem aufert: quare inducit morbos ex nimia perspiratione, densitate humorum, & constrictis solidis. Si vero assequimur exitum horum morborum, & curationis difficultatem, experiemur hos morbos non admodum exitiales esse vel curatu difficiles. Quam primum enim aliquis ex hac causa in morbum incidit, statim quoque incipiunt partes firmæ oborta debilitate, se dimittere & relaxari; vel si hoc non satis cito veniat, promoveri potest instituta venæ sectione, & adhibitis humectantibus, quibus emendantur nimium compacti humores, & humectantur siccata & constricta solida; atque ipsa debilitate, per morbum inducta, non amplius compinguntur humores, sed minus compacti liquefcunt. Quare hi morbi non admodum inveniuntur exitiales & curatu difficiles.

Quid faciat
nimia aëris
siccitas in
sanis.

III. Si autem aër ambiens nimis diu fuerit humidus, morabitur insensibilem perspirationem, colligetur id excrementitium in pulmonibus & reliquo corpore; solida fiunt ab humiditate laxiora; humores minus compacti: quare in sanis corporibus per nimiam humiditatem, generantur morbi retento excrementitio perspirabili, humoribus minus justo præparatis & compactis, solidorum laxitate & humiditate. Isti morbi nati non tam faciles per se vel auxilio medicamentorum abiguntur; non accedente morbo, qui veres minuit,

Quid faciat
nimia aëris
humiditas
in sanis.

nuit, magis augentur hæc omnia mala, & crudum, tam diu retentum, solida uliginosa & laxa, humores crudiores, difficillime Medicamentis emendari possunt: imo non raro ægri his morbis diu vexati rapiuntur.

Siccitates
pluviosis
sunt salubri-
ores & mi-
nus lethales.

IV. Si nunc comparemus has duas constitutiones inter se, luce meridiana clarius patet, generaliter siccitates pauciores & facilius curatu morbos inferre, quam humiditates. Quare homines ad sanitatem conservandam non sine ratione quærunt loca sicca, elevata, arenosa; evitant autem loca humida, depressa uliginosa, minus propterea salubria. Unum præterea est morbi genus, quod tempestatem humidam infestam facit, prompta nempe degeneratio in putredinem seu corruptionem, quare humiditas a quibusdam dicatur mater putredinis. Quæ enim corpora diu sine corruptione potuerunt servari siccata, accedente humiditate in corruptelam deliquescent prompte. Quam difficile sit morbos ex putredine vel spontanea corruptione natos curare, norunt illi, qui sedulo exercuerunt aliquamdiu praxin medicam. Si modo hoc solo genere morbi aëris constitutio humida differret a tempestate sicca, satis esset hominibus infesta, cum vix ullum sit morbi genus difficilius curatu, & sæpius interficiens.

LIB. III. A P H. XVI.

95. **M**orbi autem in pluviosis quidem plerumque fiunt, & febres longæ, & alvi fluxiones, & putredines, & epileptici, & apoplectici, & anginae. In siccitatibus vero, tabidi, Ophthalmiæ, arthritides, stranguriæ, & dysentericiæ.

I.

Generalem regulam de Aeris Siccitate & Humiditate in hoc Aph. exemplis particularibus conatur Auctor adstruere: quare ad sequentium morborum frequentiam, & faciliorem vel difficiliorem curationem debemus

mus attendere, ut constet, quænam aëris constitutio humida aut sicca sit, magis minusque salubris aut lethalis.

II. Quid Pluviosum Ver (*Aph.* 90, III), Hyems (*Aph.* 91, I,) & Autumnus (*Aph.* 92, III) faciat, retro observavimus, prout una alteram excipiebat aëris constitutionem: hoc loco generalis est habenda observatio de iis morbis, qui plerumque fiunt omni anni tempore, modo Tempestas sit humida & pluviosa. Quid autem generaliter faciat Aer humidior & pluviosus in corporibus ceteroquin sanis, nulla Idiosyncrasia vel temperamento particulari præditi, recensuimus supra, (*Aph.* 94, III). Quare hoc loco videndum, cur producat febres Longas frequentius & curatu difficiliores. Frequentior nulla est causa febrem inducens, quam perspirabile excrementitium retentum: hæc enim evacuatio præstantissima & perpetua corpus nostrum liberat ab omni inutili excrementitio magis, quam per omnes sensibiles evacuationes simul, ut nos docuere experimenta statica (*Persp.* Cap. 12, XXXIX) Hoc retentum in Acrimoniam converti, etiam (*Persp.* 12, XLVI) demonstravimus. Acre istud organis motus vitalis applicatum suo stimulo febrem excitat, quæ durabit, donec id alienum vel sit subactum vel expulsum. Quia vero corpora tempestate pluviosâ sunt enervata, & manente aeris humiditate parcius perspirant, non facile erit eam materiem subigere & expellere: imo dubito, an subactio sit possibilis, cum materia perspirabilis actione vitæ inutilis facta haud possit eadem actione assimilari, aliud vero crudum facilius posse subigi, credere malo. Inde ex hac causa non solum febris frequentior, sed & diuturnior & periculosior generatur. Præstantissimum ergo esset ad præveniendas has febres uti Diaphoreticis roborantibus; sed si nata sit, amaris sudoriferis & calefacientibus diu adhibitis hujus materiæ præparatio & expulsio est tentanda, cum id alienum, quod exire fuit cohibitum, unica vice excutere non valeamus.

III. Materiem perspirabilem retentam ex tali aëris constitutione, interdum ferri ad intestina, facientem alvi fluxionem, olim (*Persp.* 12, LVII.) quoque observavimus.

In pluviosis
febres lon-
gz.

Alvi fluxio-
nes.

Sed quoniam quivis humor suo appropriato organo est discernendus & evacuandus (*Aph.* 21, III & IV), quod deponitur, minuit quidem copiam generalem, minime vero id speciale, quod prohibita perspiratione fuit retentum. Manet ergo alvi fluxus diu, sed sine levamine, cum morbi materiam hac via eliminare non valeat. Ut talem sistamus alvi fluxum, humor morbosus est ad cutim ducendus, & eò evacuandus, quod in permanente aëris humiditate difficulter obtineri potest, quare hic etiam morbus curatu est difficilis & non caret periculo. Præveniendus autem erat laudata methodo.

Putredines.

IV. Pluviosi dies multis modis inducunt morbos Putridos, & frequentes, & curatu difficiles. Corpora enim corruptibilia, quæ sicca potuissent ad longum tempus asservari, si humectantur, brevè putrescunt. Qui humores arcentur a corruptione modica actione vitali in nobis viventibus, debilitata hac actione, ut fit in enervatione virium, per aerem continuo humidum, sponte sensim incipiunt corrumpi & putrescere. Quod absolvit munus, nobisque inutile est factum, evacuationi destinatum, si retinetur in corpore, ut fit ab aëre humido inhibente perspirationem insensibilem, functionibus obeundis impar, tandem in putrilaginem convertitur. Imo aer in continuis pluviis, miasmatis putridis ex tellure assurgentibus mistus a nobis haustus, egregie vel in sanissimis corporibus putredinem inducit. Sed si morbus Putridus sit natus, eum difficile curari posse, diu durare, & non carere periculo, constans est observatio practica. His in casibus non solum cogimur antisepticiis uti, sed quæ etiam absorbendo abliguriunt omnem humiditatem, ut ulterior progressus putredinis ablato humido impediatur.

Epileptici.

V. Quid sit Epilepsia, superius (*Aph.* 70, II) definivimus, simulque demonstravimus, acre quodvis partibus nervosis applicatum hunc motum validum & inordinatum concitare posse: ergo demonstrare restat, ab aëre humido & pluvioso generari posse acrimoniam, quod cum satis in præcedentibus sit demonstratum, non eget ulteriore sermone.

Ob.

Observatio etiam practica constanter affirmat, passionem hysterica & hypochondriacam, multo frequentiores hujusmodi aëris constitutione facere paroxysmos, atque homines mobilitate laborantes convulsionibus tentari, quam temporibus serenis: Quia id acre, quod solent per insensibilem perspirationem evacuare, retentum, & nervis applicatum motum convulsivum hunc excitat. Quare hujusmodi species Epilepsiæ volatilibus, & Diaphoreticis, nisi nimis altas egerint radices, sustulimus omni mane exhibitis ad promovendam perspirationem.

VI. Apoplexiam superius (Aph. 67, I) definivimus, Apoplectici, eam generari posse ex omni abundantia humorum cerebrum comprimente, ita cuivis notum est, ut vix mereatur probationem, eamque esse morbum periculosissimum, demonstravimus (Aph. 67, IV). Ergo hic solummodo notandum venit, in aëre pluvioso generari humorum abundantiam, quæ obruens cerebrum, Apoplexiam infert: verum minuta perspiratio & solidorum laxitas hanc causam satis arguunt; quam ob rem frequentius expectamus in hac quam alia tempestate Apoplexiam. Quæ subitaneam sanguinis missionem & alvi ductionem exigit, ut minuatur humorum abundantia cerebrum opprimens, dein vero nova accumulatio est prævenienda, & partes laxiores roborandæ, evitando omne, quod humectat, sed adhibendo, quod roborando exsiccat.

VII. Difficilis respiratio vel deglutitio nata ex causa afficiente Laryngem vel Pharyngem, vel utrasque partes simul, a medicis generali nomine Angina vocatur: propterea, quot sunt morbi varii has partes afficientes, ut inde impediatur vel molestior fiat Respiratio & Deglutitio, vel unum ex his, tot sunt variæ species Anginæ. Ex his speciebus solent Anginam veram vocare, quæ ab inflammationis his partibus oritur. An vero Hippocrates in hoc loco intelligat Anginam veram, vehementer dubito; quoniam dies pluviosi non inferunt Inflammationes, sed potius tumores œdematosos & catarrhosos. Ex hac ratione judicarem,

Anginæ.

Anginam nunc fieri ex tumefacta membrana faucium & Laryngis, angustante viam pro cibi & aeris transitu. Causa hæc etiamsi sit levissima in aliis partibus corporis, hic vero summum periculum portendit, nam si pergat tumor occludens aëris transitum, homo suffocatus perit. Prompta igitur sunt adhibenda auxilia, quæ tumorem hunc laxum, œdematosum, seu pituitosum solvunt & discutunt, gargarizando, manducando, fovendo iis, quæ experti sumus sine tumefactione hujusmodi tumores discutere.

In siccitatibus Tabidi.

VIII. Quoniam auctor agit de constitutionibus morbum inferentibus, facile intelligitur, in hoc loco non concipiendum esse mediocrem sed excedentem siccitatem (*Aph.* 86, 1. *Aph.* 94, II.) quæ morbum producere potest; de hac autem dicit salubriorem esse, id est minus frequentes morbos producere & minus lethales. In pluviosis numeravit sex diversos morbos; in siccitatibus autem quinque, ergo hoc non facit tantam differentiam, ut inde major & minor salubritas potuisset deduci. At vero, qui sequuntur morbi, multo rarius ingruunt, quam præcedentes in humiditate. Ex hac ergo ratione potest siccitas dici salubrior. An vero minus Lethales sint, facile constabit, si difficultatem curationum in sequentibus conferamus cum curationibus præcedentium. Primus morbus citatus est Tabes, de cujus significatione non consentiunt Commentatores, & ipse Galenus existimat, hanc vocem pertinere ad Ophthalmiam, ut denotaret extabescentiam oculorum. Sed quid juvat auctoritatibus litigare; nonne his etiam temporibus valemus observationibus determinare, num Phthisis purulenta ex Pulmonis ulcere nascatur ex aëris siccitate? non experimur aërem sicciorem, modo absit nimius calor, generare Tabem, quare potius substituerem emaciationem, morbum corpulentiae oppositum, quia aer sicciior nimis absument humiditatem corporis. Sed si fiat oppositio inter Emaciationem per siccitatem, & Intumescentiam ex Humiditate, magna inveniretur differentia, forsan decies occurreret Intumescencia aquosa, dum ne semel accidat emaciatio. Atque Aër sicciior per

per vaporem exhalantem facillime humectari potest: verum ad aërem liberandum a vapore humido vix ulla habemus auxilia.

IX. Oculorum tunica adnata & cornea quia lachrymis continuo est irriganda, ex earum defectu non mirum, has membranas exarescere, ut fit ex nimia ablatione humiditatis per aërem sicciorem: hæ membranæ aridiores facilius aliquomodo inflammari incipiunt, sed si oculi foveantur liquido molli & humectante, similiaque instillantur collyria, nulla est Ophthalmiæ species, quæ faciliorem curationem admittit. Ophthalmiæ.

X. Si auctor indicaret dolorem vagum articulorum, vel Podagram, omnino erraret, quum hi morbi multo frequentiores fiunt in aere pluvioso, quam sicco: sed si quemcumque dolorem articulorum, verbi gratia ex mucis articulorum defectu & rigiditate ligamentorum, quibus articulus cum dolore movetur, indicaret, assentirer; verum talis morbus ex hac causa raro occurrit; & natus fotu & potu humectante facile tolleretur. Arthritides.

XI. Urina duplici constat materia, una est urinæ propria, quæ non patitur per alia organa excerni; altera est communis, auget, si cum priori exit, urinæ quantitatem, sed & potest etiam per Diaphoresin atque alvum evacuari: hæc est magis aquosa diluens & lenis. Quo urina de hac materia majorem copiam admistam habet, eo minus observatur acris: eâ autem privata redditur acrior & saponacea. Quoties vero aëris nimia siccitas omnem fere humiditatem abstulit per cutim & pulmones, non solum generatur urina parcior, sed & simul acrior & magis saponacea abstergens. Illa transeundo per urethram, mucum naturalem abstergens, tangit urethræ nuda latera, quæ irritata urethram toties constringunt, quoties urina per eam descendit, id est guttatim & cum molestia emitti potest urina: Fit quidem ab hac causa interdum stranguria, sed tamen frequentius ab humorum acrimonia. Unde hic morbus quoque minus frequens, quam præcedentes ex aëris humiditate. Atque hu- Stranguriæ.

Dysenteria.

jusmodi stranguæ curatio esset facile superanda largiori hydrogalactis potatione.

XII. Quod monuimus de Urinæ difficultate, etiam ad Dysenteriam applicari potest, ut defectu humiditatis in alvi excrementis, reliqua fiant acriora, intestina stimulantia, atque ita non solum dolorem seu Tormina ventris inferentia, sed etiam frequentem dejectionem flatuum, loco excrementorum faciant, quam speciem hodie vocarent Dysenteriam siccam. Morbus equidem ex hac causa rarissimus, & qui potione molli copiosiori facile cederet, vel injectione in intestinum colon ex similibus facta facile obtemperaret. Veritas igitur præcedentis Aphorismi his adductis exemplis plane constat, morbos ex humiditate aëris natos frequentiores esse & magis lethales.

LIB. III. A P H. XVII.

96. **Q**uotidianæ autem constitutiones, aquiloniæ quidem, corpora compingunt, & robusta, & facile mobilia, & bene colorata, & melius audientia faciunt, & alvos siccant, & oculos mordent, & dolorem circa thoracem, si quis præexistat, majorem faciunt. Austrinæ verò, corpora dissolvunt, & humectant, & auditus graves, & capitis gravitates faciunt, & vertigines, in oculis, & corporibus motum difficilem, & alvos humectant.

I.

Aphorismi
sensus.

Bipartito hoc Aph: conatur Auctor ulterius adstruere, Siccitates Pluviosis salubriores & minus lethales esse, & ut in priore solas mutationes humiditatis & siccitatis agitavit, in hoc Aph: siccitatem jungit frigori, & humida-

midatem calori: agit enim de Aquilone & Austro, qui venti his qualitatibus sunt præditi (Aph: 84.) De iisdem quoque egit supra (Aph: 84), ubi recitat morbos duntaxat si talis ventus dominatus fuerit: hoc autem loco bona & mala annumerat, quæ profluunt ex quotidiana eorum ventorum constitutione, ut probet siccitates cum frigidityte salubriores esse & minus lethales, quam humiditates cum calore: quam sententiam non potuit præcedente Aph: 84. adfirmare, in quo sola mala minime vero bona proponuntur: hinc necesse erat novam proferre sententiam. Quam ob rem vero hic primo proponit Aquilonem & dein Austrum, dum contrarium fecerat in præcedente, non video aliquid involvere arcani, potuisset enim æque ab Aquilone quam Austro incepisse. In hoc autem perpendendum est, quid boni & mali faciat Aquilo seu Aer siccus & frigidus, quid Auster seu Aer calidus & humidus, ut constet, aquilonem esse salubriorem & minus lethalem. Hic autem non intelligitur mutatio unius venti in alterum, sed si hi venti sint quotidiani in quovis fere anni tempore, ut si per totum annum vel Aquilo vel Auster multum spiret.

II. Quæ causæ duo corpora laxè cohærentia ita uniunt, ut acquirant majorem cohærendi firmitatem, compingentes dicuntur: in partibus itaque solidis nostri corporis per Aquilonem fieri debet firmior nexus; & in fluentibus, partes liquorem componentes majorem cohæsiõnem acquirere debent. Per Aquilonem intelligit aërem sicciorẽ & frigidiorẽ; nostras autem solidas partes modica exsiccatione, qua humidum partibus elementaribus partium fibrarum mistum aufertur, magis fieri cohærentes & tenaces, experimenta physica omnia comprobant, ita membrana, & chorda humida per modicam exsiccationem fit tenacior & firmitus cohærens. Atque frigus etiam, nisi modum superet, quando transit in fragilitatem, omnes membranas & fibras magis cohærentes facit. Binæ itaque causæ junctæ admodum compingunt partes firmas nostri corporis. Ita etiam in liquidis seu fluentibus fit, nam exsiccatione ablata pars aquosa ex reliquis magis concrecibilibus, facit ut massa remanens

Aquilonia
corpora
compin-
gunt.

magis

magis sit comphcta : atque frigus in omnibus liquidis ita auget cohæſionem , ut calor diſſolvit. Quod igitur olim obſervavit Auctor , id hodie experimentis phyſicis confir-
matur.

Robuſta
faciunt :

III. Robur hoc loco duplici ſenſu accipi poteſt. Primò, corpora, quæ ab externis injuriis non facile læduntur, dicuntur robuſta, qualia inveniuntur in regionibus ſeptentrionalibus : cum aquilonis frigiditate & ſiccitate non ſolum ſolida magis fiant compacta & tenaciora , ſed & potentioſiorem contrahunt actionem exerceant, quare non tam facile tonum per cauſas externas amittunt. Secundò, fibræ muſculares, quo ſunt magis contractiles, eo ab eodem ſpirituum influxu fortioſiorem & conſtantiorem exercere poſſunt actionem, quæ actio validior & conſtantior quoque vocatur Robur.

Facile mo-
bilia

IV. Facile mobilia corpora videntur oppoſita auctæ compacturæ, ſed nomen quo utitur Auctor, denotat agilitatem & mobilitatem, nempe talia corpora, quæ facile exercere poſſunt motum muſcularem: tunc autem omnino congruit præcedentibus, nam ſolida compacta & robuſta ſimul fiunt agilia, quoniam talia organa muſcularia a ſpiritibus influentibus promptius & majori vigore moveri poſſunt, dum vero corpora majori calore & humiditate redduntur ſegniora & laxa. Forſan frigus junctum ſiccitati puriores facit in noſtro corpore præparari ſpiritus minusque exhalantes. Invenimus enim, in hyeme ſicca non ſolum motum muſcularem expeditioſiorem fieri, ſed etiam viſcera chyliſicationis promptius & facilius ſubigere alimenta: quibus conſtat, omnes actiones tunc fieri validiores.

Bene co-
lorata.

V. Color partium firmarum nullus poteſt dici, quia omnis color varius in nobis dependeat a colore liquoris tranſfluentis, imo nigrum colorem æthiopum, & in oculis demonſtrant fieri a pigmento nigro partibus firmis adhærente, cum ſolida noſtri corporis omnia ab omni humiditate privata ſint candida vel pallida. Coloris igitur mutatio præprimis in facie, quoniam ad hujus partis colorem attendit Auctor, declarat varium humorum tranſfluentium ſtatum. Quod ſi ſanguis noſter conſtet colore eleganti ru-
bro

bro & lymphæ pellucida, faciei color est ruber vel roseus, qualis ab omnibus statuitur optimus, quia talis est sanguinis bene præparati color naturalis: quoties vero quantitas rubri sanguinis minuitur, facies pallet: si lymphæ autem corrumpitur & flavescit, faciei color fit luridus & ut hodie vocamus, cachecticus. Ille autem color constans esse debet minime fugax, uti in phlogosi & pudore. Hipp: dicit corpora ab Aquilone fieri Colorata, intelligit ergo Aquilonem plures facere globulos rubros in sanguine, & servare lympham ab omni corruptela. Globulos autem rubros valida actione circulationis fieri, ex iis quæ in *Comp. T* 31, XII ad XXIII adduximus, colligi potest. Humores quoque in tali vento sicco & frigido minus corrumpi, sed perfectius præparari ex antecedentibus deduci potest. Et quoniam in hoc loco comprobavimus actionem corporis vegetiorem fieri, nullum restat dubium, quin veram observationem protulerit Auctor, quæ etiam constanti observatione hodierna ulterius adstruitur.

IV. Duobus modis per aëris mutationem Auditus fit melior, id est, idem sonus ex corpore sonoro emanans facilius vel & ad maiorem distantiam potest audiri. Melius
audientia. Primo si aër sonum transferens omni humiditate sit liberatus; quo enim aer est magis vaporosus & nebulosus, eo magis a vapore minus elastico quam est purus aer, obtunditur tremulus motus soni, quare a nobis tam facile audiri nequit. Dein aer siccus & frigidus tendendo partes firmas nostri corporis facit, ut membrana tympani facilius contremiscat, ut inde melius sonum percipere possimus. Tot bona ex Aquilone profluunt, quare auctor concludere potest, Aquilonem esse salubrem. Alterum nunc est demonstrandum minime esse Lethalem.

VII. An alvus sicciior inter bona vel mala signa sit numeranda ambigo: eam autem exsiccari non recedit a ratione, quamvis ego hoc in ægris non satis constanter observare potui (*Aph.* 84, IV). Major utique actio per aerem frigidiorē & sicciorem potest promptiorē & perfectiorē facere ex intestinis absorptionem, unde feces fiunt Alveæ
siccant.

magis compactæ, modo continetur satis larga perspiratio: sed si aëris frigiditate parcior fiat in quibusdam perspiratio, alvus redditur laxior; quæ forsan fuit causa, quod minus constantem hunc effectum observaverim.

Oculos
mordent.

VIII. Aer autem siccus frigidus magis operatur in partibus nudis, quas tangit, ut in oculis, hi ab aëre frigido & sicco nimis constringuntur, & suppressa secretio smegmatis oblinientis facit, ut oculi nimis siccati, constricti in suis membranis, & smegmate privati aliquomodo doleant. Ille autem morbus curatu est multo facilior, quam præcedentes dolores ex ophthalmia, (*Aph.* 90, IV. *aph.* 91, VII. *aph.* 93, V. & *aph.* 95, IX.) nam si tegantur oculi molli fomento, brevi evanescit hic morbus.

Dolorem
pectoris au-
gent.

IX. Quod statim observavimus in morfu oculorum, id quoque in Pectoris dolore verum est: nulla enim pars magis est aeri exposita quam pectus, intus enim per totam pulmonis compagem singulis inspirationibus distribuitur inspiratus aer, qui frigidior & ficcior fibras pulmonum & pectoris magis constringere facit; in quibus si præcesserit Dolor, ab hac constrictione augetur. Sed incrementum huiusmodi doloris, quia vapore calido facile lenitur, non potest inter morbos lethales numerari, qui erat probationis scopus ab Auctore, quo hos omnes effectus constitutionis Aquilonaris adduxit.

Austrina
corpora dis-
solvunt &c.

X. Nunc tandem aggreditur alteram partem, ut constet aerem calidum & humidum minus salubrem esse & magis Lethalem: & dicit Austrinas quotidianas constitutiones Corpora dissolvere, auditum graviores facere, & capitis gravitatem producere ut supra *Aph.* 84, III. Videtur igitur inutilis repetitio: sed si perpendimus scopum, non erit ejusdem repetitio inutilis. Superius enim solummodo numeravit morbos ex Austrina constitutione provenire solitos: hic autem demonstrare vult, hanc quotidianam constitutionem minus salubrem esse & magis lethalem; quare necesse erat ut proferret morbos frequentiores & magis lethales ex hac quam ex Aquilonia constitutione. Qui nunc examinat frequentiam horum morborum & difficultatem curationis cum

mor-

morbis & effectibus ex aquilonia provenientiibus, facile perspiciet, Hippocratem veritatem dixisse. *Corpora dissolvere* hoc loco notat laxare, segnia & inertia facere, unde etiam in oculis & corporibus fit motus difficilis; id est, membra moventur majore difficultate, quasi facta essent ponderosiora, quando ægri accusant aëris gravitatem.

XI. Hæc sufficere potuissent ad generalem intellectum, Vertigines faciunt. sed quoniam invenio variam lectionem, & quia varia commentata sunt de Vertigine, hæc pauca clarioris intelligentiæ ergo adjicere volui. In Editione *Ab Almeloveen*, quam sequor, habetur *Vertigines in oculis*; ita etiam in *Lindeni* Editione. *Foesius* autem, & *Vertigines afferunt, oculis & corporibus*, &c: Mercurialis, Tozzus, Sorbait, Heurnius & fere omnes sequuntur *Foesium*, utpote rei magis conveniens, nam sufficit dicere Vertigine laborare brevitati studens, ut noster Auctor, ut non opus addere in oculis. Sed quod majoris momenti est, non satis exponunt modum, quo Astringinæ constitutiones inducant Vertiginem frequentiore & curatu haud facilem; quod hic requiritur ex scopo Auctoris nostri. Quid sit Vertigo, facile concipitur, si modo attendamus ad mutationem inductam in nervo optico in oculi fundo locato, quando revera videmus corpora in gyrum vel vorticem agitari. Imagines pictæ tunc successive in oculi fundo supra pulpam nervi optici mutant situm: quamdiu talis imaginis mutatio motu rerum extra oculum positarum producitur, intelligimus ea corpora moveri; si vero motu inordinato vel muscutorum vel fibrarum in tunicis oculorum, vel ligamento ciliari, vel etiam in capsula nervi optici, ita inordinate movetur oculus, ut incidentes imagines rerum externarum situm mutant inordinata agitatione oculi, hæc repræsentata imaginis motio vel circumgyratio est morbus, quem Vertiginem vocamus. Agnoscit igitur omnes causas, quæ dictas partes inordinate movere possunt, vel ipsum cerebrum agitare ad originem nervorum optico- rum: quæ causæ multiplices esse possunt, quarum quædam generari possunt a constitutione Australi, nam si modo propter aëris calorem & humiditatem putrefactum ducitur

ad cerebrum, vertigo generatur frequenter recurrens & non facilis curatu: in quo casu siccantia absorbentia forma epithematis capiti applicata magni sunt ulus, ut id tenue & acre stimulans motum inordinatum inducens auferatur.

LIB. III. APH. XVIII.

97. **S**ecundum tempora autem, vere quidem & prima æstate, pueri & his ætate proximi, optime degunt, & maxime sani sunt. Æstate vero, & autumno ad aliquam quidem partem, senes. Reliquo autem Autumno, & hyeme, qui medii sunt ætate.

I.

Scopus Au-
toris.

IN superioribus observaverat Hipp: (Aph. 82, iv) quibus temporibus anni ætates magis minusque erant convenientes generaliter; hoc autem loco speciatim agit. Ætatem in tria tempora distinguit. Ut (1) tempus Incrementi, per hæc verba *Pueri & hi ætate proximi*. (2) Decrementi, nempe *Senes*. (3) Status seu vigor vitæ scilicet *Media ætas*. Itidem dividit annum in tres partes inæquales, ut pro Vere & Autumno intelligat quartam singuli anni partem, sed pro Hyeme anni partem dimidiam: veris initium mihi videtur ponere circa æquinoctium vernale, & continuare ad solstitium æstivum, quam ob rem dicit *Vere & prima æstate*: ponens initium æstatis circa solstitium æstivum, & extendens ad æquinoctium autumnale: sed pro reliquo tempore accipit spatium temporis ab uno æquinoctio per hyemem ad alterum æquinoctium. Hæc Temporis divisio omnino quadrat divisioni Ætatis; ut Ver ponatur pro ætatis incremento; Æstas & reliqua pars Autumni pro Ætatis decremento seu senectute; denique ut dimidia pars an-

ni tribuitur Hyemi, ita etiam dimidium Vitæ tempus conceditur Ætati mediæ. Secundum hanc divisionem Temporis & Ætatis videndum erit, quomodo possit dici corpora optime degere & maxime sana esse.

II. Per Pueritiam hic cum Auctore non intelligo strictum tempus puerili ætati datum, sed totum tempus a nativitate usque dum corpus non amplius increfcit ad vigesimum, vel vigesimum quintum ætatis annum. Puerorum & veris naturalis convenientia. Toto hoc tempore corporis vires non satis sunt firmatæ, sed quo minus distat ætas a nativitate, eo vires sunt minus firmatæ, non potentes ferre externas injurias, egentes auxiliis rerum externarum, donec satis confirmatæ sint. Vicissim autem constitutum est cum anni Tempestate, ab æquinoctio vernali ad solstitium æstivum sensim fit majus fructificationis incrementum, quare etiam corpora animalium fere eodem modo ut vegetantia facilius acquirunt incrementum: in plantis hoc certo constat experimento, Vernali tempore ceteris paribus semina terræ commissa melius progerminare quam post solstitium æstivum: hoc etiam Hippocratem sedula observatione in nostris corporibus incrementibus detexisse, quod manifeste in plantis observatur, non est sine ratione. Inde ver non solum omnibus saluberrimum Aph. 88, vi. sed maxime Pueris ex allegata ratione. Principium autem veris maxime conveniens videtur infantibus, sed finis veris adultioribus.

III. Post constantem autem ætatem si vires nostri corporis sensim magis languere incipiunt, hoc tempore nulla spes est Vernali tempore ut in pueris novas recuperari posse vires, sed quod viribus languentibus non potest concoqui, res externas exigit coctionem promoventes. Senes defectu coctionis præprimis laborare, superius (Aph. 65, v), & egere calefacientibus (Aph. 14, v) observavimus: quamobrem istud anni tempus, quod fructus crudos maxime ad maturitatem concoquit, ut est tempus anni a solstitio æstivo ad æquinoctium autumnale, admodum conducit senibus. Sed quod observavimus supra de Incremento ætatis contra incrementum anni, id quoque hic locum habet: nam circa solstitium de-

Senum & Ætatis naturalis convenientia.

crepita senectus optime degit, sed crudior senectus facilius fert æquinoctium autumnale.

Medic
ætatis &
hyemis na-
turalis con-
venientia.

IV. Media autem & constans Ætas per se satis valens ingesta præparare, & expellere aliena, viribus pollens, plus periculi ex nimis instigatis quam debilitatis viribus exspectat, quare a solstitio vernali ad solstitium autumnale sæpe incidunt in Hæmorrhagias, Inflammationes & morbos acutos calidos, quod tempus anni calore luxurians nimis intendat eorum corporum actiones. Hyemalis autem frigiditas temperans hunc nimium motum facit, ut talia corpora rarius corripiantur morbis. Ex his igitur constat, quibusnam in corporibus ad sanitatem conservandam instituere Diætam debemus calefacientem aut refrigerantem: scilicet califacientem conducere pueris, sed maxime senibus, sed refrigerantem constanti ætati & robustis.

LIB. III. APH. XIX.

98. **M**orbi autem omnes quidem in omnibus temporibus fiunt: nonnulli vero in quibusdam ipsorum magis & fiunt, & exacerbantur.

I.

A Principio hujus sectionis seu Aph. 80 proposuit morbos ex anni temporibus, tempestatibus & ætate vario modo inter se mistis: nunc vero ulterius tradet regulas observationum in quatuor anni temporibus, & dein in ætate varia: ne igitur aliquis judicaret hæc omnia absolute poni, hunc Aphorismum interponere voluit, ut cuilibet constaret, dictas observationes non ita constantes esse, ut quoque iidem morbi non potuissent fieri aliis anni temporibus; inde enim præcipit, omnes morbos quidem in omnibus temporibus fieri, sed tamen istis temporibus frequentius generari

rari & magis exacerbari. Duo in hoc Aph: sunt exponenda, primò omnes morbos omni tempore fieri posse, & dein si fiant morbi, temporibus conspirantibus magis exacerbari, & frequentiores esse.

II. Si sola anni mutatione in nobis generantur morbi, necesse foret, ut statis temporibus quoque haberentur iidem morbi; sed & sunt præterea multo plures classes causarum morbos inferentium sibi proprios; ita enim supra observavit, ætatis mutationem certa genera morborum inferre, ita ventus, atque varia aëris tempestas: non raro in victu commissus error, vel quævis res externa omnibus temporibus morbos inferre solet. Morbi Endemici & Epidemici ab aëre infecto non ita constanter sequuntur anni tempora. Quare etiam in Æstate conspicitur Hydrops, Vere febris quartana, Hyeme febris Ardens & morbi biliosi, cum accedentes causæ alieno anni tempore insolitos istis temporibus morbos inferant.

Morbi omnes anni tempore fieri possunt.

III. Quoniam vero omnes causæ morbum inferentes omni tempore incidere possunt, qui morbi favens habent simul anni tempus, necesse est, ut hoc tempore frequentius fiant: sæpe enim causæ solitariae, nisi cooperans habent anni tempus, non producerent morbum, imo sola anni mutatio certum genus morbi cum levissima morbosa causa morbum generare potest; unde his temporibus morbi temporales fiunt frequentiores: raro enim vere & principio æstatis fiunt morbi ex prohibita perspiratione; & hyeme morbi putridi, quoniam aëris naturalis mutatio his temporibus parum favet generationi horum morborum. Qui autem dictis temporibus corripiuntur morbo, de iis dicit magis exacerbari, id est, graviores paroxysmos faciunt, & medicamentis vel benignitate naturæ curati frequentius recidivant: ut experimur in Hydrope & febre quartana autumnali tempore. Huic sententiæ obstare videtur, quod dixit Auctor Aph. 59, v. sed si accipiatur morbus tempori magis similis, ut ibidem interpretati sumus, nulla restabit differentia.

Morbi magis sunt suis temporibus & magis exacerbantur.

LIB. III. APH. XX.

99. **N**am vere quidem, insania & melancholia, & epilepsia, & sanguinis fluxiones, & angina, & gravedines, & raucedines, & tusses, & lepræ, impetigines, & vitiligines, & pustulæ ulcerosæ plurimæ, & tubercula, & articulorum dolores.

I.

UT probet, quod posuit in præcedente, morbos omnes omni tempore fieri, initium facit ab iis, qui Vere interdum fiunt, & tamen ad morbos aliorum temporum potius pertinent; uti insania, epilepsia, melancholia, angina potius referuntur ad morbos Autumnales; gravedo autem, raucedo, tussis, ad Hyemales; hæmorrhagiæ, pustulæ ulcerosæ ad morbos Æstivos. Ex quibus constat, hos morbos plerumque fieri aliis temporibus anni, sed & etiam Vere observari provenientes ex causis aliis quam a naturali mutatione aëris. Hoc certissime constat in iis citatis morbis, qui nomen habent ex causa. Sed in aliis, qui ex phænomeno, ut insania, epilepsia, angina &c: nominantur, admittentes causas varias, non est opus præter naturalem temporis mutationem, aliam assignare causam, cum tales morbi æque ex causa hyeme æstate &c: nata quam quæ vere generatur, produci possunt: ita alia est Angina Inflammatoria, Erysipelatosa, Pituïtosa, Convulsoria, etiamsi morbus generaliter vocetur Angina, quod etiam de ceteris est intelligendum.

Ver quales
morbos
producit.

II. Demonstravimus superius (aph. 88, vi) Ver esse saluberrimum, videtur autem obstare, hic tam multos citari morbos etiam curatu difficiles & periculosos. Si vero attendimus ad scopum hujus Aphorismi, nulla erit difficultas.

Nam

Nam in superiobus demonstratum fuit, Ver saluberrimum esse & minime exitiale, quoniam naturalis aëris mutatio conducit ad sanitatis conservationem & curationem morborum, quod quoque in hoc loco adstruitur: sed etiam si anni tempus sit admodum favens, aliena hoc tempore tempestas, vel & reliquæ causæ morbum inferentes possunt tamen Vere generare morbos, quod in hoc Aphorismo adstruere vult. Imo ipsum saluberrimum Ver, uti dicit Galenus, corporibus impuris morbos parit, sed puris est saluberrimum. Ut cum fructu sequentes morbi deducantur ex naturali aëris mutatione vernali tempore, in memoriam revocandum est, antecessisse hyemem, in qua minor fuit facta perspiratio, collectio humorum tam sanorum, quam excrementitiorum & morbosorum, qui vere accedente debebant diffilari: si autem illa collecta materia evacuationi inepta actu non evacuatur, quæ in frigore mansisset quieta, nunc ab accedente calore magis maturescit, tam in malam, quam bonam indolem; & quæ in malignitatem commutata fuit, nunc magis quam præcedente hyeme sævit, quamvis puris corporibus Ver sit saluberrimum.

III. Infania seu *Mania* vocatur omnis morbus, in quo observatur mentis aberratio vehemens cum furore & sine febre; nam quoties febris adest, Phrenitis vocatur; sed si sit sine febre, verum cum tristitia & timore, Melancholia vocatur, quare in sequentibus indicabitur, Infaniam interdum solvi fluxu hæmorrhoidum, quando est Delirium ex atra bile: si vero absit furor & febris, sed fiat delirium cum mansuetudine, dicitur Fatuitas. In hoc loco citat Auctor Maniam & Melancholiam, videntur hi morbi utrique ex eadem materia hyeme collecta, & vere acriore facta generari. Quando enim antecedente hyeme materia tenacior, coloris nigri, quam veteres vocant humorem atrabilarium seu melancholicum, in vena portarum præcipue fuit retenta, ab accedente solis calore vernali tempore incipit solvi, & acrior fieri, sanguini venæ cavæ tradita fertur ad cerebrum, ita cerebri actionem perturbat, ut homo mentis impos fiat, generatur inde varia species insipientiæ, prout magis minus-

Infantias &
Melancholia.

que fuerit exaltata & degenerata, ut inde fiat Delirium sine febre, sed cum furore, vel cum tristitia & timore. Qualis autem sit propria hic mutatio produciens Maniam vel Melancholiam, determinare non valeo; neque in prædictione aut curatione ullam parit differentiam, sufficit enim scire, hominem Vere Deliraturum: & in utrisque id agendum est, ut eo tempore, antequam melancholica liquata materia tradita fuerit sanguini venæ cavæ, educatur per viam huic materiæ naturalem, vel per venas hæmorrhoidales, vel per alvi ductionem, ut forsan rami venæ portæ, quæ mesentericæ venæ dicuntur, se exonerent in intestina, vel forsan per ductum choledochum exoneretur; quare alvi laxantia melanagoga dicta in principio Veris data & aliquamdiu continuata, Maniam & Melancholiam prævenient, & natam compescent, citiusque cessare facient.

Epilepsias.

IV. Epilepsiam superius (Aph. 70, II.) definitam variis causis oriri posse, citato loco indicavimus, inter quas frequentissima est causa humor crudus tempore hyemali collectus, & vernali tempore liquatus, acrior factus, nervis applicatus, quo attactu partes inordinate & cum vehementia constringuntur. Hujusmodi Epilepsiæ species, quæ satis commode ad Mobilitatem vel Passionem Hystericam aut Hypochondriacam potest referri, non est impossibilis curatu: qui enim stomachicis & anticachecticis hyeme prævenit cruditatis generationem, & instante Vere Diureticis & Diaphoreticis, id quod assimilari non potuit, evacuat, interim condit humores Resinosos, Balsamicos, ne formetur corruptela chronica, instantem Epilepsiam non solum præveniet, sed & multos alios morbos ex tali corruptione nascentos.

Sanguinis
fluxiones.

V. Nullus morbus frequentior Vere, quam Sanguinis fluxiones qualescunque, cum hyeme confectus sanguis a vernali calore magis expanditur, & partes firmæ eodem calore relaxantur, magisque moventur, facile generatur ex hac abundantia & minori cohærendi potentia in solidis, ruptio vel dilatatio vasorum, & effusio contenti sanguinis: quare hæmoptoici hoc tempore maxime periclitantur, nisi in-

in-

instituta venæ sectione prius tollatur id abundans. Hæc evacuatio nisi modum excedat, modo non fiat ex pulmonibus, salubris solet esse, sed quoniam plerumque modum excedit, in hoc Aph. inter morbos recensetur.

VI. Quod medici vocant Anginam (Aph. 95, vii.) varias agnoscit causas, quare necesse erit perscrutari; quænam sit primaria causa Vernali tempore anginam inferens. Si Ver generalem suam habet aëris constitutionem, debet esse Angina sanguinea, seu quæ ex sanguinis abundantia generatur: sed quoniam interdum varia est aëris tempestas, & hoc quoque tempore variæ possunt incidere Anginam producentes causæ, tunc magis investigandæ causæ, quam naturalis constitutio Vernalis, ut inveniatur proxima Anginæ causa.

Anginas

VII. Quid per Gravedines vel Coryzas sit intelligendum, exposuimus (Aph. 65, iii): istas Vere etiam fieri posse, modo habeat tempestatem inæqualem ex iis, quæ supra (Aph. 92, v, & Aph. 63, viii.) disputavimus, facile colligi potest: sed si corpus sit purum, & Ver solitam mutationem sequitur, raro observantur Gravedines. Unde patet, nostrum Auctorem voluisse adducere hos morbos, ut probet generale monitum (Aph. 98) morbos omnes in omnibus quidem temporibus fieri posse.

Gravedines.

VIII. Eodem etiam modo Raucedines (Aph. 65, ii.) & Tusses, quæ irritatione Laryngis concitantur, sunt accipiendæ, ut diximus de Gravedine: possunt quidem Vere incidere, sed ex naturali veris constitutione non profluunt.

Raucesines
& Tusses.

IX. Ad morborum cognitionem & curationem nihil magis obest, quam eodem nomine varium intelligere morbum, & eundem morbum multis nominibus insignire, quæ interdum alium quoque morbum exprimunt: nam morbus est res ab omni alia distincta, sæpe habens multas proprietates, quas omnes concipimus intelligi eodem nomine; si ergo unus medicus per aliquod nomen alium morbum intelligiat quam alter, hinc maxima confusio, uti patet in Lepra; qui hanc Leporam eandem faciat cum Lepra Arabum,

Lepras.

turpiter erraret. Celsus videtur Lepram referre ad primam speciem Impetiginis. Hodie ille morbus haberetur species Scabiei, vel Herpetis, vel Porriginis. Necesse est igitur, ut recitemus notiones, quæ præsentiam hujus morbi declarant. (1) Adesse debet pruritus, (2) secessus squamularum, nam si furfures secedunt, Pfora vocatur. (3) Cutis aspera & arida, & durior, ejusque foeditas. Accusat Hipp: in uno loco pituitam, in alio autem Melancholiam. Hic morbus quoque interdum infestat vesicam urinariam, qui nomine scabiei a Ruyschio describitur, inveniens vesicam admodum duram & crassam, intus squamulis obsessam. Ex crescentibus & sæpe renovatis squamulis patet, hunc humorem esse tenacem & semivolatilem, ut fluidus maneat usque in cutis superficiem, sed ibidem subsistens exhalante parte volatili in squamulas concrevit: habet præterea acrimoniam, qua pruritus excitat. His temporibus si vere duntaxat oritur, facile cederet alvi ductione cum mercurio dulci, & abstergente & mercuriali linimento aut lavamento, facile sanaretur, præcipue si insuper diebus a purgatione vacuis æger biberet apozema diaphoreticum resolvens.

Impetigines

X. Impetigines in Textu dicuntur Leichenes, sed quoniam Impetiginis nomine a Celso alius intelligitur morbus, & Leichenes Græcorum magis quadrant Celsi Papulis, in cognitione & descriptione multum variant auctores. Græci & in hoc loco Hipp:, per Leichenes intelligit talem cutis foedationem, in qua summa cutis pustulis siccis admodum prurientibus exasperatur: qui morbus sæpe Vere conspicitur, sed & aliis quoque temporibus, cum materia evacuada per cutim præcedente hyeme retenta, nunc vernali calore ad cutim delata, acrior facta, in cutis poris subsistens pruritus excitet; sed quia humor totus fere volatilis est, non relinquit squamas ut lepra, neque furfures ut pfora, sed siccam & asperam pustulosam cutim, qui morbus leni abstergente antiseptico facile sanatur, quo residuum cuti inherens aufertur.

Vitiliginæ

XI. Celsus Lib. 5, Cap: 28. tres species Vitiliginis numerat,

rat: *άλφος* vocatur, ubi color albus est, fere subasper & non continuus, ut quædam quasi guttæ dispersæ esse videantur. Interdum etiam latius & cum quibusdam intermissionibus serpit. *μελας* & *λεύκη* sunt præterea Celso duæ reliquæ species Vitiliginis: quare facile constat, quia Hipp: scribit *άλφος*, qualem speciem hic debemus intelligere, scilicet vitium cutaneum, ut duo priora, sed quod neque squamas, neque pustulas siccas aut duram asperitatem facit, sed relinquit cutim fere æqualem, verum ejus colorem immutat in foedam albedinem. In hac specie quoque videtur adesse humor lentescens hyemali tempore confectus, calore vernali ad cutim delatus, sed sine acrimonia lentescens in minimis vasculis cutaneis subsistens exsiccatus. Hujus igitur curatio solis abstergentibus & diaphoreticis absolvi potest, non ita egens antisepticis, ut priora duo genera; hanc speciem facilem curationem admittere, novit quoque anti-
quitas.

XII. Hipp; habet *ἐξανθήσεις ἐλκωδεις* seu Efflorescentias ulcerosas, quali modo nostris temporibus conspiciuntur Variolæ; Pustulas
ulcerosas. verum quia præcedentia vitia fiunt sine prægressa febre, non potest hæc species morborum cutaneorum a præcedentibus avelli, ut demonstraret morbum nostris variolis similem, præcipue quia his etiam temporibus hujusmodi efflorescentiæ vernali tempore sæpissime in juvenibus observantur, quæ in parva ulcuscula degenerant. Materia quoque hæc præcedente hyeme collecta, Vere ad cutim delata, lentoris naturam habere videtur; illa in poris cutaneis subsistens, stimulo suo parit pustulosas inflammationes, quæ in abscessulos dein ulcusculos degenerant. Ut hujusmodi pustulæ præveniantur, conducit primo Vere mittere sanguinem, & ducere alvum antiphlogisticis, quibus etiam si natæ fuere pustulæ, curantur: & si non facile cedunt, ablutione per lavamentum saponaceum acescens, & dein refrigerans & leniter adstringens facile evanescent.

XIII. Tubercula seu *φύματα* a pustulis magnitudine differunt, sunt etiam tumores inflammatorii pustulis majores, qui interdum ovi gallinacei magnitudinem habent, uti phleg-
mone,

mone, furunculus, & similia tubercula limitata, quorum contenta materia in pus, vel lentam tenacem albam, vel flavam, vel subnigram materiem, tandem convertitur. Ex eadem materia, qua pustulæ nasci videntur, sed majori copia in folliculis vel glandulis cutaneis collecta, Tubercula generantur: prout natura est materiæ collectæ, ita etiam est diversus Tuberculorum exitus, generale hoc habent, quod simili modo præveniri debeant, ut Pustulæ, sed nata Tubercula fortioribus suppurantibus sunt maturanda, & fortioribus abstergentibus sunt depuranda.

Articulo-
rum dolo-
res.

XIV. Num Hipp. hoc loco intelligat quemcumque Articulorum dolorem, quum dicat *ἄρθριμα*, vel specialem morbum, quem hodie vocant Podagram, non satis constat ex nominis significatione. Celsus hunc locum clare exponit Lib. 2. Cap. 1. his verbis. Hi quoque morbi, qui in articulis nervisque modo urgent, modo quiescunt: tum maxime & inchoantur & repetunt. Podagram vernali tempore præcipue paroxysmum facere constans est observatio, sed & etiam aliis anni temporibus aggreditur, quare vera est quoque Auctoris nostri observatio generalis ex hoc morbo, ubi statuit, morbos omnes quidem in omnibus temporibus fieri, etiamsi magis uno quam alio tempore anni observentur.

LIB. III. A P H. XXI.

100. **Æ** State vero, & horum nonnulli, & febres continuæ, & ardentes, & tertianæ plurimæ, & quartanæ, & vomitus, & alvi fluxus, & Ophthalmiæ, & aurium dolores, & oris exulcerationes, & pudendorum putredines, & sudamina.

I.

Æstate cur
nonnulli fi-
unt morbi
vernales?

Æ Statem sequi ver, omnibus notum est, quando igitur omnis morbi materia vere non fuit expulsa, vel quod tenacior fuerit, vel ver solito frigidius fuerit, regulare

lare est, ut prima æstate similes fiant morbi, qui vere observari solent, præprimis si Æstas sit Veri similis Aph. 85, i. aut si ver nimis diu continuare fecit hyemale frigus.

II. Multiplices species febrium ex invasionis modo commode distingui possunt in febres Continuas & Intermittentes, illa quæ unico paroxysmo absolvitur, hæc vero quæ iteratis paroxysmis tandem finitur relinquens inter paroxysmos inducias, quas tempus apyrexiae vocant Medici. Videtur autem unum genus febrium Remittentium omissum, verum hæc species partim referri potest ad Intermittentes, partim ad Continuas: nam cujus febris intermittens paroxysmi ita prolongantur, ut nullum tempus supersit apyrexiae, manet tamen febris intermittens in sua natura, etiamsi videatur continua, sequaturque curationem intermittentium, sed ob protractos paroxysmos facta sit periculiosior. Quæ vero Continua febris multas habet exacerbationes, uti febres putridæ & hemitritææ, propterea non patiuntur e classe continuarum expungi, cum hæ exacerbationes accipi possunt tanquam recidivæ, quæ etiamsi fiant, non constituunt propterea aliud genus morbi. Ex his febribus duas species citat in utroque genere, nempe febrem Continuum & febrem Ardentem in priore genere. Quod si voluisset auctor eandem intelligere febrem per Continuum & Ardentem, non interposuisset particulam &, sed dixisset febrem continuum ardentem: quare mihi videtur hic indicari duplicem speciem. Omnis febris, quæ unico paroxysmo absolvitur, vel per recidivas, ut monuimus, vocari potest Continua, ut sæpe observatur in febribus putridis & erysipelatosis: sed constans febris ex Inflammatione ob summum fervorem vocatur speciali nomine febris Ardens: unde non sine ratione hic citat duas distinctas febres, Continuas scilicet & Ardentes. Quare autem hæ febres præcipue æstate regnant, paucis videndum. Æstas regulariter habet majorem aëris calorem, qui si jungitur humiditati, producit febrem non solum calidam, sed & simul putridam remittentem, quod satis patere potest ex iis, quæ supra (Aph. 90, iv, & Aph. 94, iii) disputavimus; hujusmodi febris

Cur febres
continuae
& Ardentes?

non est perfecta continua, sed remittens, quæ ab Auctore dicitur *συνεχὴς*, quod nomen ob variam significationem multis difficultatem paruit; nam notat febrem, quæ eodem tenore sine ulla remissione a principio ad finem durat, sed a recentioribus, ut inquit Galenus, vocatur *σύννοσος*, nobis Continua. Notat etiam febrem Remittentem seu Continentem, quæ non plane dimittit ægrum, sed tamen per intervalla exacerbatur, uti omnes febres putridæ, quales hic intelliguntur: imo febris intermittens prolongata, ut nullam apyrexiam faciat, eodem hoc nomine intelligitur. In posterum autem semper faciemus differentiam inter Continuas, Remittentes, & Intermittentes. Quæ febris hic vocatur Ardens, non videtur mihi confundendam esse Febri Remittenti, sed esse aliam febris speciem, quæ Continua est vocanda, proveniens ex Inflammatoria dispositione, & propterea alio nomine ab Auctore insignita, ut hanc febrem Continuum distinguat a præcedente Remittente. Quando itaque aëris calor æstivus jungatur siccitati, non oriuntur febres Remittentes Putridæ, sed Continuæ Inflammatoriæ (vid. Aph. 86, II.)

Cur Tertianas & Quartanas.

III. Variam hic invenio lectionem: in Editione Ab Ameloveen, quam sequor, habetur *Tertiana plurima & Quartana*; in aliis autem invenio *Tertiana febres & quartana*. Celsus Lib. 2, Cap. 1. solummodo citat *Tertianas*. Fateor, Literatoribus emendandi & disputandi hic egregius invenitur locus, nos autem, magis attendentes ad rem ipsam exponendam, quam emendationem variæ lectionis, contenti erimus, si veritatem practicam eruere valeamus. Si dicta a nostro Auctore conferamus observationibus medicis, non erit difficile, quid sit sentiendum, invenire. Auctor posuit duo genera febrium continuarum, nempe Remittentem, & Continuum; persequitur sermonem in Intermittentibus, ex quibus etiam Tertianam & Quartanam adducit, quod autem Celsus & alii omiserunt Quartanam, hoc adscriberem hypothesi, quia statuebant quartanam febrem nasci ex Melancholia, quæ Æstate generari non potuit: sed qualiscumque prævaleret opinio, experimur tamen in praxi Æstate & Vere etiam

am generari Quartanas, sed breviores (Aph. 50, III): Tertianæ autem frequentiores observantur. Inde non inutile est, ut Hipp: dicat, *Tertianæ plurimæ & Quartanæ*, quoniam indicare voluit, raro fieri Quartanas, sed Tertianas frequentes. Judicarem, si æstas sit calidior & humidior, frequentiores observari Tertianas, in quibus fere semper bilis corruptæ adsunt symptomata: si vero Æstas sit frigida magis & humida, habens constitutionem Autumnalem frequentius generari Quartanas.

IV. Experimentis constat, nullam causam fastidium, nau- Vomitus.
seam & vomitum magis concitare, quam si putridum vel ingeritur vel colligitur in stomacho: hoc putrefactum quoniam promovetur calore Æstivo magis quam ullo alio tempore, frequens est Vomitus causa; præprimis quia Bilis in ventriculum confluens ad famem concitandam, præ ceteris humoribus corrumpitur, quum non volatilis sit, ut reliqui humores, qui corrupti facilius evanescunt, sed & maneat in corpore, sensim magis corrupta tandem ventriculum ad vomendum instigat. Ex hac observatione colligere itaque possumus, hunc vomitum non esse sedandum per narcotica, sed promovendum diluentibus abstergentibus, & saponaceis acescentibus, ut corpus liberetur ab hac corrupta bile; dein saponaceis acescentibus stomachicis præveniendum, ne nova fiat bilis corruptæ generatio & collectio in ventriculo.

V. Contrarium hoc loco videtur statui, quam quod superius (Aph: 95, III) fuit observatum, augeri scilicet alvi fluxum minuta perspiratione, quoniam æstate omnium largissima habeatur perspiratio. Sed eo in loco non statuimus sola minuta perspiratione fieri alvi fluxum, verum inter frequentissimas recenseri causas. Putredo præprimis Bilis, quæ copiosius generatur æstate, non raro est alvi fluxus causa: illa enim sua acrimonia stimulat intestina ad egerendum, & sua putrefaciendi virtute omnes confluentes etiam humores in liquamen convertit, præcipue si æstas calidior simul sit humida, quando non solum fiunt Diarrhoeæ,
R r
sed

sed etiam Cholerae, de quibus testantur Observatores practici, istas fere semper inter Augusti limites contineri.

Ophthalmiz.

VI. Ætatem generare Ophthalmias notavimus (*Aph.* 90, iv): an vero sicca vel humida hic sit intelligenda Ophthalmia, ambigunt Commentatores: existimo utramque speciem intelligi posse. Nam si æstas sit humidior putrefaciens humores, lachrymæ copiosiores & acriores (*Aph.* 90, iv) generatur Ophthalmia humida: si vero sit solito siccior (*Aph.* 95, ix) producitur Ophthalmia sicca.

Aurium dolores.

VII. Quod diximus de ophthalmia, applicari quoque potest ad Aurium dolores: nam humores acres, qui delati ad oculos dolorem movent, iidem ad Aures depositi simili modo excitant dolores, & quidem atrocissimos interdum, quoniam membrana meatum auditorium cingens acutissimo sensu est prædita, atque cerumen auris acrius factum doloris causa esse potest. Veteres autem ex smegmatis amarore & flavedine existimarunt, morbos biliosos, qui maxime observantur æstate, præcipue afficere aures: an hæc sit vera observatio practica, infra examinabitur.

Oris exulcerationes.

VIII. In sequentibus trium partium affectiones annumerat; nempe Oris exulcerationes; Pudendorum putredines; & Cutis sudamina, qui tres morbi diversi ab eadem tamen causa oriuntur, quamobrem horum morborum diversitas ex natura partium est deducenda. Primo occurrunt Oris exulcerationes, si saliva in os confluens acrior, epithelium oris corrodens, ulcus apertum faciat, quod leniter adstringentibus, acidis, antisepticis est curandum.

Pudendorum putredines.

IX. Cum vero maxima pars excrementorum, quæ putredini magis obnoxia sunt, ano & pudendis redduntur, quæque partes simul sumtæ etiam dicuntur obscoena, huc ergo confluentes humores æstate ab aëre calidiore præcipue putredine tentantur, foetoremque contrahunt, quæ frequentiore ablutione per antisepticum adstringens calefaciens lene, & antisepticum curatur, cum pudenda minus ferant refrigerantia quam oris exulcerationes.

Sudamina.

X. Galenus ἰδρωα dicit esse pustulas in summa cute; Celsus

sus autem inquit, quidquid sudore hominem resolvit, ubi hunc aphorismum in Latinam linguam vertit: utraque interpretatio admitti potest: nam Æstate frequentiores generantur pustulæ exiguæ prurientes: atque sudoribus copiosioribus enervantur corpora: verum curationes horum morborum inter se differunt, quum sudamina indicent acrimoniam calidam prurientem, quæ est temporanda; verum sudor copiosior deliquationis est indicium antisepticis prævenien-
dum.

LIB. III. APH. XXII.

101. **A**utumno autem, & multi ex æstivis, & febres quartanæ, & erroneæ, & lienæ, & hydropes, & tabes, & urinæ stillicidia, & lienteria, & dysenteria, & coxæ dolores, & angina, & asthmata, & volvuli, & epilepsia, & insania, & melancholia.

I.

Autumnus morborum feracem esse (Aph. 83, i), morbosque producere curatu difficiles, pertinaces, anomalos, recidivantes, periculosos, (Aph. 83, iii) acutissimos, & perniciosissimos (Aph. 88, iv & v), quoniam aer calidus & siccus mutatur in frigidum & humidum, quo humores in calore corrupti deinceps retenti morbos pariunt, observavimus: hoc nunc loco videre est, retentam eam materiem, prout origine differt, variamque subit corruptelam, diversos producere morbos.

II. In præcedente Aph. 100 dixerat, nonnullos morbos vernaes observari æstate; hic autem dicit, multos morbos fieri Autumno ex Æstivis, quo indicare voluit morbos æstivos plures extendi per Autumnum, quam vernaes per

Autumno
multi mor-
bi ex æsti-
vis.

æstatem, quod non est sine ratione: quæ enim morbi materia vere excitaverat morbum, sæpe sequente calore & siccitate aëris æstivi reddebatur volatilis & evolabat; quæ autem in æstate peperit morbum, accedente Autumno frigidiore & humidiores pertinaciter retinetur, vel continuat morbum præcedentem, vel degenerans in aliam malignitatem, producit ex eadem sed mutata materia morbos Autumno magis proprios.

Febris
Quartanæ.

III. Quænam dicatur Febris Quartana traditum est (*Aph.* 50, II), eamque vere breviorē (*Aph.* 50, III) Autumno longiorē observari (*Aph.* 50, IV) demonstravimus. Quod autem hoc tempore frequentissime generetur Quartana, id speciali humoris generationi est adscribendum, vel speciali mutationi in morbosa materia præcedente æstate mota & nunc in morbum erumpente. Veteres contenti erant dicere, autumno generari melancholiam, & eam materiem formare Quartanam: ego autem judicarem, quoniam præcedens Æstas suo calore frequentiorē induxit corruptelam, quæ tamen materies, quam diu manet æstivus calor, exhalat, Autumnus sua propria aëris commutatione hanc corruptam materiem retinere, & in talem commutare indolem, quæ in corpore vivente, omni quarto die parit paroxysmum, quo hæc materia subigitur & expellitur pro maxima parte per sudorem & urinam, sed ut mala herba relinquens semina intra biduum vel triduum maturanda. Si quis quærit expositionem hujus causæ, fateor me nescire, sed hanc vidisse mutationem fieri, ut invenio post fermentationem generari vel vinum vel acetum, & post putrefactionem oleum foetens cum alcali volatili; quoniam autem motu automatico vel intestino in hujusmodi corporibus hæc mutationes fiant, nemo chemicorum determinare ausus est, solummodo observavit hoc vel illud corpus fermentare & putrescere posse, istasque actiones quibusdam auxiliis promoveri & retardari posse. Idem quoque sed non amplius perspicere valeo in materiæ febris Quartanæ generatione: invenio enim materiem æstate corruptam, autumno retentam, speciali aëris mutatione commutari in materiem

producentem febrem Quartanam, ut invenit chemicus produci vinosum, acetum, oleum foetens, alcali volatile. Ex quibus constat, quoad generationem materiæ febris Quartanæ plus exigi non posse aut debere, quam datur in aliis rebus, quæ manu tractari possunt. Etiam si ulterior non datur accessus, id tamen lucri habemus in curatione, quod valeamus continuando materiæ corruptæ, circa finem æstatis vel principio Autumni, expulsionem, prævenire hujus febris originem, cum in nostra potestate non sit immutare naturalem aëris mutationem in autumno, vel dando aliquid, quod hanc commutationem intercipit, ut chemici adjectis quibusdam præveniunt fermentationem & putredinem: hoc autem experientia est inveniendum, ut fecerunt in arte sua chemici.

IV. Febres Erraticæ seu Incertæ ita vocantur ex inordinato reditu paroxysmorum, vel inconstantia symptomatum, ut jam leviores jam vero graviores fiant febres, atque inconstantem moliantur crisin. Quod facile in Autumno contingere potest; si enim multiplex materia retinetur atque in morbosam indolem convertitur, variæ hæ inter se agentes causæ non possunt constantibus temporibus æqualia generare symptomata: imo, modo simplex formetur inde putrefactum, febris ex omni putredine est Incerta & vaga. Inde constat, cur febres Erraticæ Autumnales minus solent obtemperare antidoto quam febris legitima quartana, cum aliam sæpe foveant causam, quæ antidoto extinguere non potest.

Erroneæ

V. Lienis fabrica, situs & usus ex anatomicis & physiologicis peti debet, quia non est hujus loci omnia dubia, quæ de hoc viscere moventur, agitare, num sit viscus utile vel inutile, num excindi possit nec ne, num atram bilem conficiat vel alium humorem & centena hujusmodi farinæ. Sufficit observare *σπλῆνες* apud Hipp: indicare morbum vel morbos Lienis, præcipue autem ejus Tumorem & Indurationem. Hos itaque morbos Autumno sæpe occupare Lienem in hoc Aph. statuit. Ex antea disputatis assumo, in præcedente æstate magnam fuisse factam tenuium

Lienis.

exhalationem, reliquam massam in partibus firmis per calorem enervatis, quamdiu manebat aëris calor, circumduci, sed accedente frigiditate autumnali, magis lentescere, quasi massa fermentans abiret interdum in vappam tenacem & glutinosam. Tali glutinosa materia vix acri si corpus sit oppletum, accedente Autumnali frigore omnium facillime subsistere potest, ubi omnium minime agitur motu vitali, & ubi habetur tardissima circulatio: quæ enim materia actione vitæ satis valente potuit retineri fluida & mobilis, huc vero appellens, subsistit, eamque partem implet & infarcit. Nihil ergo exponere & probare restat, quam ut demonstretur, lienem esse viscus intricatissimum, parvo motu vitali donatum, atque tardissimam habere circulationem, suum sanguinem exonerare in venam portarum, quæ sanguinem nequit in venam cavam, nisi superatis angustiis arteriæ portarum in hepate, exonerare, & inde hic magis quam alibi pati remoram. Hæc autem omnia tam plana sunt & evidentissime demonstrata ab hodiernis physiologis, ut actum agerem, si hæc repetere vellem. Ex his autem inter se collatis evidentissimum est, si autumnus vappam tenacem format, generari debere splenes. Sed & id egregium inde habemus, quod possimus circa finem æstatis usu medicamentorum resolventium & moventium, corporisque exercitatione frequente & modica, in principio Autumnus talem prævenire morbum, præveniando hujus lentæ materiæ concretionem & collectionem ad viscus, tardiozem circulationem habens.

Hydripes.

VI Quoniam auctor dicit in plurali Hydripes, non obscure declarat, se non intelligere simplicem Hydropis speciem, sed & ejus species varias, tam ratione humoris retenti pituitosi, lymphatici & cacoehymici, quam ratione variarum partium in ambitu corporis, quando Leucophlegmatia vocatur, vel quando colligitur in quadam particulari parte. Omnes hæc species frequentissime generantur Autumnus, præprimis si sit solito humidior: corpora enim calore æstivo enervata, frigore Autumnali pressa, parciorem perspirationem habent, quæ humiditas collecta, vel ob frigus

minus

minus fluxilis facta, facile hærere potest in vasis lymphaticis & cellulis pinguedinosi relaxatis. Qui igitur morbus præveniretur, si circa æstatis finem & principium Autumni talis homo usus fuisset roborantibus siccantibus: nam si Latex vel pituita collecta fuit, non tam facile erit corpus ab hac sarcina liberare, quoniam fibræ collecta lymphâ prolongatæ & atonæ factæ, accedente autumnali frigiditate & humiditate, in pristinum tonum difficulter redigi possunt.

VII. Qualem Tabem hic intelligit Auctor, & quomodo generatur præcipue Autumno, utcunque ex supra dictis (*Aph.* 89) intelligi potest: omnes citatæ species in Autumno augentur, cum cohibeatur humoris corrupti axhalatio: Phthisis autem, ex Hæmoptysi hoc tempore raro incipit, cum corpora vere & æstate in Hæmoptysin sunt proniora, sed si inde nata sit phthisis, quam maxime promovetur majore inducta corruptione pure in pulmonibus contento.

Tabes.

VIII. Cum in autumno semper accusamus aëris majorem frigiditatem & humiditatem, illa causa non videtur inferre posse stranguriam, quia in superioribus (*Aph.* 95, xi) demonstravimus, siccitatibus generari stranguriam. Verum non semper est unica causa, quæ generat morbum, sæpe enim morbus nomine idem ex contrariis generatur causis: ita quoque stranguria generatur, quoties in siccitatibus detrahitur commune vehiculum liquidum: sed & urinæ stillicidium inferre valet corruptela humoribus inducta & acris, quæ cohibita evacuari per insensibilem perspirationem, mandatur renibus. Ita urina ex hac materia acriore & corrupta, impedita exhalare, infecta, transeuns per urethram inducere potest stranguriam. Vel etiam materia catarrhosa, in succum, oblinientem interna latera urethræ, deposita, stranguriæ causa esse potest. In utroque hoc casu constat, optimum esse auxilium, derivare a viis urinæ id acre ad cutim per Diaphoretica.

Stranguria.

IX. Lienteriam, Celso alvi Lævitatem, indicare nimis citam assumptorum alimentorum & confectorum in ventriculo

Lienteria.

triculo per intestina transitum & egestionem ex ano, indicavimus *Comp. T. 90, xiv*, & hujus morbi causas *Comp. T. 90, xxix ad xl*; sed quomodo autumnus talem morbum inferre potest, non tam plane constat. Si vero observamus, æstatem præcedentem relaxavisse partes firmas, sequentem vero Autumnum sistere solitam perspirationem, quo major copia humorum fertur ad intestina; aut quod magis veritati convenit, humores æstatis calore solubiles si autumnus frigiditate glutinescent, ita ut mucus intestinorum tenacior factus, assumptorum introitum in vasa lactea intercipiat, potest cibus assumptus in ventriculo præparatus, sed defectu absorptionis intestinorum, quæ mucosæ obfusa, ut os interdum Aphthis, introitum denegans chylo, contenta & præparata alimenta per ita lævigata intestina cito duci ad colon & rectum & ita exonerari. Quo in casu requiritur resolutio & absterfusio hujus muci, ut referantur oscula lacteorum: quæ methodus mihi sæpe in hoc morbo felicem præbuit curationem.

Dysenteriz. X. Quoties vero autumnali frigore humores ad intestina devoluti simul habent acrimoniam, vel eam acquisiverunt, antequam ad intestina ferantur, vel stagnando in intestinis corrumpuntur; vel quia acre niduletur in mucosæ intestinorum internam superficiem tegente, perpetuo hoc stimulo non solum urgentur ad frequentiores egestionem, sed simul acris hic humor multa infert tormina ventris: qui morbus non facilius ex hac causa natus curatur, quam levi purgante educta materia, quæ in intestina confluit, per sudorifera vel Diaphoretica humorem illum acrem derivare ad cutem.

Coxæ dolor.

XI. Qui morbus Hippocrati vocatur *Iſchias*, Celso est *Coxæ dolor*. Videtur quibusdam species *Podagræ*; aliis autem ad *Arthritidem* refertur; aliis iterum species *Rheumatismi* habetur: cum omnibus his maximam servat analogiam, sed in quibusdam ab omnibus distat, quare ut specialis morbus solet pertractari, quod non est hujus loci agitare: sufficit hunc dolorem generari ab acrimonia, quæ in succo hujus articuli magis quam aliorum articulorum nidula-

dulatur: & nos inde intelligere, ea, quæ in Autumno corpora servant perspirabilia, egregie hunc morbum prævenire posse.

XII. Superius demonstravimus (Aph. 95, vii) quid medici per Anginam intelligant. Antea observavit in Pluviosis & Vere (Aph. 99, vi) nasci, nunc vero dicit generari Autumno; num vero sit Angina cum vel sine signis externis, laryngem vel pharyngem magis afficiens, qualem veteres faciunt distinctionem, magis Prognosis quam Curationis exhibentem differentiam, determinare nequeo, cum utraque hæc partes a materia perspirabili Autumno retenta affici possint. Ut eliciamus diversam causam Anginæ autumno natam, præscire debemus, qualis antecesserit Æstas, & qualis nunc sit Autumnus magis minusque frigidus, calidus, humidus vel siccus; quamobrem ad firmam curationem hæc generalis observatio non multum præstat.

Anginæ.

XIII. Respiratio difficilis anhelosa, ut plurimum cum sono aut sibilo, quæ vehementior est (inquit Celsus) dyspnœa, ut æger spirare non possit sine sono & anhelatione, sine febre, seu quæ ex paroxysmo febrili non producitur, neque oritur ex majori cursu, sed a causa interna morbofa, in qua respiratione æger debet aërem haurire motu musculorum, actioni animali inservientium, vocatur Asthma, dum vero reliquæ difficiles respirationes hoc speciale nomen non habent. Asthmatis causæ multæ sunt ut in sequentibus demonstrabitur: cur autem frequens fiat Autumno, facile intelligitur, cum mucus bronchiorum antea fluxilis per aëris Autumnalis frigiditatem compactus, lentescens, bronchia & vesiculas pulmonales ita oppleat, ut non sint satis capaces ad aërem recipiendum, nisi vi majore per actionem animalem dilatentur. Quare in Asthmate Autumnali conducunt Expectorantia resolventia magis, quam alia mucilaginosa.

Asthmata.

XIV. Qui morbus ab Hippocrate vocatur ἐλεός, Celso est Tenuioris intestini morbus, quoties vehemens dolor occupat ventrem in eo loco, ubi hæret Intestinum tenue ileon dictum, qui hodie communi nomine Colicæ passionis

Volvuli.

recipitur: sed est ex Colicæ affectionis specie gravissimus & vehementissimus dolor, cui sæpe adjungitur vomitus contentorum ex intestinis, cum alvo constipata pertinacissime, & ano ita sæpe contracto, ut non admittat suppositorium. Quia vero ille dolor generari potest ab omni acrimonia, quæ in autumno acerrima generatur, maximeque determinatur propter minutam perspirationem versus intestina, hoc tempore frequentius quam aliis generari potest Volvulus.

Epilepsia. XV. Quoniam Epilepsiam (*Aph.* 70, II) generari pluviosis tempestatibus (*Aph.* 95, V) demonstravimus, quod acre exhalare solitum, nunc retentum & magis corruptum, applicatum partibus nervosis hunc motum inordinatum & validum concitet, facile liquet, idem quoque frequentius fieri Autumno, cum autumnalis aër frigidior & humidior humoris acris exhalationem quoque inhibeat, quod acre retentum quoque frequentibrem paroxysmum Epilepsiæ producit. Scimus inde, medicamentis Diaphoreticis utiliter præveniri posse hanc speciem Epilepsiæ, quæ autem in reliquis speciebus minus valerent.

*Infantia &
Melancholia.*

XVI. Ut Ver (*Aph.* 99, III) contentum humorem facit acrem, turbantem æquabilem cerebri motum, ita Autumnus retinendo acre, quod exhalare debebat, ad cerebrum quoque delatum simili modo mentem turbat, quare Autumno & Vere moventur Infantia, quæ in Autumno præveniuntur conservata perspiratione insensibili. Ex eadem quoque causa sæpe corripuntur Melancholia, quæ magis exigit alvi ductionem, cum atra bilis hac via commodissime evacuari possit.

LIB. III. AP H. XXIII.

102. **H**yeme vero pleuritides, peripneumoniae, lethargi, gravedines, raucedines, tussēs, dolores pectorum & laterum, & lumborum, & capitis dolores, vertigines, apoplexia.

I.

Superius specialem constitutionem hyemalem (Aph: 90, II, & Aph. 91, II) notavimus, hoc nunc loco videndum, quid Hyems generale faciat ad morbos producendos. Hyeme regulare est, ut sit frigus majus, aërque minus exsiccat, quam aliis anni temporibus: unde partes firmæ magis contractiles & humores spissiores, ex quibus deduximus, Ventres hyeme esse calidissimos (Aph. 15, II) corporaque facile ferre alimenta (Aph. 18, IV). At morbi hoc tempore producti, pro naturarum in hominibus differentia, admodum possunt esse dissimiles, ut in sequentibus constabit.

Hyems quid faciat.

II. Quibus hominibus est corporis & ætatis vigor, sanguis a frigore hyemali magis compingitur, & partes firmæ admodum tensæ, hoc tempore facile incidere possunt in morbum inflammatorium, præcipue autem in Pulmonibus & membrana Pleura, quoniam nulla pars est in nostro corpore ita aëri exposita, quam partes hæ: extus enim non solum pectus ut ceteræ partes tangitur ab aëre, sed etiam idem aër omnes pulmonis latebras permeans, si solito sit frigidior, quibusdam in vasculis ita cogere potest sanguinem vel lympham, ut subsistat. Quæ obstructio facta in corpore ita valente, & sanguine denso prædito, sua irritatione his in partibus suscitât inflammationem: quæ promptam & repetitam exigit sanguinis missionem, medicamentaque pectoralia laxantia & humectantia: Quibus mature adhibitis sæpe resolvitur morbus sine subsequente suppuratione.

Pleuritides & Peripneumonias.

Leithargum.

III. Quibus vero corporibus id excrementitium, quod exhalare debebat, retinetur in corpore per frigus hyemale, in humorem acrem tenuem & calefacientem conversum, ad cerebrum delatum, quod opprimit, producit ex cerebri compressione soporem cum oblivione, ex quo resuscitati statim relabuntur cum leni, sed continua vel circa vesperam aggravante febre, sæpe tussunt, salivamque liquidam & multam educunt, cum summa impotentia, si tenuis acer ille humor simul feratur ad pulmones. Si id liquidum feratur ad alvum, plerumque moriuntur. Hipp: monet curandum esse ut plurimum spuatur, & calefiat, & a vino abstinere: si vero effugerit suppuratus fit H. b. 99. Quibus constat, hunc morbum non esse inflammatorium, sed prope accedentem ad Erysipelas.

Gravedines
Raucedines
& Tusses.

IV. Gravedinem (*Aph.* 65, III) Raucedines *Aph.* 65, II & Tusses sæpe generari a materia perspirabili retenta hyeme, ad pulmones delata, superius (*Aph.* 92, V) quoniam demonstravimus, non erit opus eadem hic repetere.

Dolores
pectorum
& laterum
& lumborum.

V. Quæ autem corpora sunt debiliora, generantia in se acrimoniam crudam nitrosam, quam tamen largiora perspiratione exonerant, per frigus hyemale id acre in suo corpore retinent, quod ad partes membranasas & nervosas applicatum infert dolores. Inde forsitan noster Auctor distinguere voluit Pleuritidem a Pectoris dolore, etiamsi a multis idem censeatur morbus, cum viderit hujusmodi pectoris & lateris atque lumborum dolores, quos hodie practici vocarent Dolores Lymphaticos, admodum differre a pleuritide vera inflammatoria & Erysipelatosa. Quali modo hi Dolores generantur, cognoscuntur & curantur, exposuimus *Persp.* Cap. 7, xxii ad xxv. Ex quibus, & quæ notavimus *Comp.* T. 45, LIX, satis constat, non solum dictas partes dolere posse, sed & multas alias.

Cephalalgia.

VI. Quum Hippocrates non persequitur annumerationem partium, quæ dolore pertentantur, sed hic ponit *Cephalalgiam*, videtur mihi indicare velle, caput hyeme non unico genere doloris corripiri posse, sed a diversa superius recensita materia Inflammatoria, Erysipelatosa & Catarrhosa.

VIII. Ex

VII. Ex iisdem causis nervo optico applicatis, Vertiginem generari posse, (Aph. 96, xi) non inficior; sed quoniam statim subnectit Apoplexiam, quæ hyeme potius a Pituita comprimente cerebrum, generatur, & quia Vertigines præcedunt Apoplexiam, judicarem Hippocratem hic intelligere velle collectionem pituitæ, quæ produceret Vertiginem & Apoplexiam. Vertigo, a
poplexia.

LIB. III. A P H. XXIV.

103. **I**N Ætatibus autem talia eveniunt. Parvis quidem & recens natis pueris, apht hæ, vomitus, tusses, vigilie, pavores, umbilici inflammationes, aurium humiditates.

I.

Generalem divisionem fecerat Auctor noster (Aph. 82) in morbos Temporum & Ætatum, de quibus dixit, alios morbos ad alia Tempora bene aut male se habere, quod hucusque persecutus est: nunc vero examinat morbos Ætatibus frequentiores quam in alia ætate. Unde colligere possumus, certa Ætate generari causam huic vel illi morbo faventem. Hanc itaque mutationem naturalem perscrutabimur, licet propositus morbus possit etiam a variis aliis causis generari.

II. Tota Ætas a nobis in tria tempora divisa fuit (Aph. 97, i) in Incrementum, Statum & Decrementum. Hic vero Incrementum subdividitur; (1) in parvis seu recens natis; (2) ad Dentitionem accedentibus (3) qui sunt ætate majores; (4) ad pubertatem accedentibus; (5) juvenibus. Deinceps agit de morbis constanti ætati contingentibus; & ultimo de morbis senum. Quoniam veteribus perplacuit numerus septenarius, & quoniam his temporibus quoque Ætatis di-
visio.

maxime observantur in corporibus mutationes, ut Cl: Hoffmannus quoque observavit, non erit inutile tempora *Ætatis* secundum numerum septenarium dividere. Ut Hipp: fecit citat (1) morbos primis septem diebus a partu, & qui primis septem hebdomadis contingunt ulque ad septimum mensem. (2) A septimo mense usque ad mensem decimum quartum, quod est naturale Dentitionis tempus. (3) Qui sunt *ætate* majores pueri intelligi potest tempus a 14 mense ad septimum annum, quando dentes renovari solent, (4) Dein ab hoc tempore ad annum decimum quartum. (5) A 14 anno autem ad 21 vel & 28 annum, cujus primum tempus potest dici Adolescentiæ, posterius autem juventutis. Quænam mutationes naturales fiant his *ætatibus* & quales nascantur morbi, in sequentibus exponemus.

In Parvis
& recens
natis mor-
bi.

III. In Parvis & recens natis Infantibus, nempe a natiuitate usque ad sextum vel septimum mensem, quando dentes erumpere incipiunt, varios numerat morbos, quos in duo genera distinguerem, qui scilicet veniunt a natiuitate, dum meconium fuit omne evacuatum, & umbilicus consolidatus, & qui fiunt post istud tempus usque ad dentitionem. Dum enim nascitur infans, ejus os, oesophagus, ventriculus & intestina mucos sunt impleta, atque colon meconio turgens; ejus abscinditur umbilicus; prima vice haurit ore lac vel & alia alimenta; mutatur in suo corpore circulatio impedita via per vasa umbilicalia; præprimis nunc debet conficere nutrimentum; pulmones moventur & hauriunt aërem, qui pulmones hucusque quieverunt; mutatur externa pressio, antea enim undique sustentabatur corpus latice, nunc aër levior premit: cuncta hæc minimo temporis spatio mutantur, unde non mirum, Infantis corpus tot & tantas mutationes subeuns, admodum affici, ut mirandum sit, aliquem posse manere superstitem. Omnes nunc velle recitare morbos ex his mutationibus naturalibus provenientes, integram exigeret exercitationem, quare contenti erimus istos solos assequi, qui ab Auctore proponuntur.

Aphthæ.

IV. Non quævis oris ulcera dicuntur Aphthæ, imo similis morbus interdum occupat tracheam, oesophagum, ventri-

tri.

triculum intestina, imo interdum pudenda feminarum, quare non obtinuit nomen ex parte, quam occupat hic morbus; sed ex quibusdam phænomenis, quoniam hic morbus in infantibus & in fine acutorum & putridorum in adultioribus natus idem retinet nomen, etiamsi variam agnoscat causam. Si os & lingua obtegitur tenaci mucagine varii coloris, quæ collutione auferri non potest, corrodens epithelium, vocatur oris Aphthæ, unde est morbus veluti medius inter sorditatem & ulcus. Hujusmodi Aphthis recens nati infantes frequentius corripuntur, & quidem sine morbo prægresso, dum vero in adultis raro nisi post morbum putridum conspiciuntur. Constat, totius corporis infantis superficiem tectam esse lenta mucagine, dum nascitur, quam sorditatem abluendo auferunt obstetrices, & in capite sæpe adhibere debent pinguedinem, ut primo emolliant: hæc lenta materia partim ex liquore, in quo natavit foetus, partim vero ex proprio corpore deposita, formata lentescens, cuti adhæret, cum sæpe ablata renascatur: simili quoque modo formatur in ore, oesophago, ventriculo & intestinis, hic vero saponacitate salivæ reliquorumque humorum saponaceorum, soluta materia primis diebus cum meconio redditur. Si vero tenacior sit, vel infantis saliva non sit satis saponacea, vel si uti non possit propriæ matris colostro abstergente, lenta hæc materia toti oris superficiei adhærens corrumpi incipit, quia humores, quamdiu non exponuntur aëri, diu a putredine possunt servari; sed iidem aëri traditi prompte corruptelam induunt; lentescens hic & corruptus humor partibus oris adhærens, corrodens epithelium vocatur Aphthæ. Quæ quo citius eo melius sunt auferendæ Medicamento abstergente, adstringente, & antiseptico, in forma lincti, ne diutius persistens majorem induat corruptelam.

V. Ventriculus post nativitatem non assuetus accipere alimenta, a novis istis assumtis, tanquam sibi alienis, in motum inordinatum instigatur, & ita assumpta vomitu reddit: atque mucosum in ventriculo quoque hærens, assumpto lacte vel colostro fluxile redditum, ventriculi latera lambens

Vomitus.

nauseam & vomitum generat. Dein in adultioribus lac in ventriculo coagulans frequens est in infantibus vomitus causa. Hujusmodi igitur vomitus vix meretur inter morbos recenseri, cum sit naturæ conamen se liberans a sarcina opprimente. Quamobrem mulierculæ experientia edoctæ vomitus hos frequentes inter bona præfagia vitæ recensere solent.

Tussis.

VI. Plures sunt causæ Tussim excitantes quam in cetera ætate, & inde Tussis quoque frequentior. Mucus enim in trachea hærens post nativitatem non expectoratus, sed acrior factus; pulmo non assuetus admittere aërem frigidum; assumpta acescentia in debili hoc corpore in acidum commutata; valent in hac ætate magis quam in alia Tussim concitare.

Vigilia.

VII. Naturale est in recens natis multum & fere assiduo dormire, ita ut sanissimi infantes ne quartam partem diei vigilent: si vero hi tantum vigilent ut adultus, morbus erit: hic autem laudabilis somnus non raro turbatur, quia quidquid turbat æquabilem circulationem per cerebrum, id somnum interrumpit, ut demonstravimus (*Exerc. de somno*). Infans autem suo corpore tenello facile permittit ingesta alimenta corrumpi, ex qua causa acrimonia nata in ventriculo & intestinis hærens per consensum cerebri æquabilem circulationem perturbat. Scio equidem multis in consuetudine esse, hujusmodi infantes per opiata vel papaverina in somnum urgere, præstantius autem foret perscrutari irritantem causam & eam tollere, qua sublata, infans ex propria natura satis dormiet.

Pavorcs.

VIII. Sæpe quoque Infantes e somno concitantur cum tremore & variâ agitatione artuum & ejulatu, ut adulti ex re quacumque terrorem inferente, quare nonnulli existimant, mentem infantis agitari cogitatione terribili; quia vero hucusque in infantibus nulla apparuere indicia mentis, & corpus tenellum hoc ab acrimonia vellicatum in hujusmodi convulsiones facile adigitur, hujusmodi Pavores affectioni corporis, minime vero mentis adscriberem, & propterea, quod acre acidum frequens sit causa, non est sine ratione:

ratione, Pavores puerorum sæpe curari terreis & alcalicis, atque reliquis medicamentis acidum corrigentibus.

IX. Primis a partu diebus frequentiores fieri Umbilici inflammationes, non eget explicatione, cum umbilicus ligatus vel abruptus, ut ceteræ læsiones, facile inflammationem suscipiat.

Umbilici
Inflamma-
tiones.

X. Aures in recens natis madescere tam frequens est observatio, ut nutricibus sit notissimum, quæ inde sentiunt, si aures non madescant, puerum non recte valere: hanc autem naturalem Infantibus excretionem non intelligit Auctor, quoniam inter morbos non est recensenda evacuatio: sed quoniam sæpe ad hanc partem confluat tantus humorum confluxus, ut inde partes circumquaque excorientur, dolent & foetorem inducant, illa major depositio humorum hic intelligitur, quæ non est adstringentibus sistenda, sed moderanda, quum evacuatio hæc moderata sanitatis conservationi admodum conducatur.

Aurium hu-
miditates.

LIB. III. A P H. XXV.

104. **A**d dentitionem vero accedentibus, gingivarum pruritus, febres, convulsiones, alvi profluvia, & maxime ubi caninos dentes producant, & iis qui inter pueros sunt crassissimi, & qui alvos duras habent.

I.

Alterum stadium temporis (*Aph.* 103, II) a mense septimo in Infante ad mensem decimum quartum, quo maximus numerus Dentium nasci solet, ventriculus nunc magis lacti assuetus, sensim quoque accipit alia alimenta, modo autem hæc sint facilis materiæ & lacti matris analogæ, Infans ab hac mutatione non multum turbatur. Verum tunc Dentes erumpere incipiunt, qui non par-

Dentitioni-
bus quinam
morbi fiant.

vam molestiam quibusdam infantibus afferre solent; quales morbos hic recenset Auctor, breviter, amplius autem de his agit in *Libro de Dentitione* H, a, 590. Annumerat hoc loco quatuor morbos, quos credo ex Consensu generari, quia increescens Dens inferens dolorem facit in tenella ætate, ut reliqua organa in consensum trahantur.

Dentitionibus gingivarum pruritus.

II. Ex Anatomicis observationibus constat, etiam ante nativitatem semina dentium latitare in utroque margine maxillæ, ubi postea sunt erupturi Dentes, per limam enim si abradatur maxillæ os, ex fœtu vel infante edentulo desumptum, invenitur eo in loco, ubi postea hærebit dentis radix, folliculus liquore limpido plenus, qui sensim increscens in verum Dentem degenerat: quod si hoc tentetur in maxilla pueri, cujus dentes sunt renovandi, sub radice Dentis prioris similis detegitur folliculus, qui dein increscens priorem dentem sæpe extrudit, vel sibi novam format sed alienam sedem. Ut itaque primus dens erumpat, membrana hujus folliculi, periosteum & gingivæ tegentes maxillæ marginem perrumpenda sunt. Quæ divulsio si incipit fieri primo, ut omnis levis attactus, parit Pruritus, sed pergens sæpe magnum Dolorem excitat. Hunc Pruritus adesse demonstrant infantes, semper fricantes margines maxillarum: dein vero ejulatu, contorsione membrorum & inquietudine cum vigiliis satis declarant, Dentitionem inferre dolorem: quam ob rem nutrices semper præbent aliquid durum sed lævigatum in ore, ut mordendo disrumpantur integumenta supra erumpentem dentem extensa. Quidam suadent in graviore dolore incisionem levem in eo loco, ex quo dens est erupturus. Quia vero ab hac læsione gingivæ admodum dolent & calent, utile est ad gingivas applicare gratum mucilaginosum refrigerans.

Febres.

III. Per irritamentum ex Dentis eruptione natum motus vitalis circulatorius tandem in consensum trahitur, ut etiam fit in adultis, si pars quædam vulnere fuerit affecta, aut si spina carni sit infixæ, eò autem magis in infantibus, quorum corpora tenella multo magis consentiunt, quam in adultis. Quò majorem autem Dentitio infert dolorem, eò quo-

quoque gravior febris nascitur, quæ quum sit symptomatrica, nullam sanationem afferre potest, neque auscultat febrifugis laudatis, sed sponte cessat facta ruptione in gingivis, & cessante dolore, quare in hujusmodi febribus præcipue conandum, ut ipse Dentitionis dolor leniatur, & præveniatur, ne nimia circulatione corpus istud tenellum nimis patiat-
tur.

IV. Ex læsione quacumque tam in adultis quam infantibus facillime motus vitalis primo in parte læsa, dein per totum corpus in consensum trahitur, quamobrem pars vulnerata semper incipit post paucos dies inflammari, & dein generatur febris symptomatrica: minus autem frequens est, per læsionem motum animale consentire, nisi in vulneribus & puncturis nervorum & tendinum, quando summum imminet periculum. Sed in infantibus ex multo leviori causa motus animalis in consensum trahitur, his enim ex ventris torminibus frequens convulsio, in adultis autem raro, quoniam corpora tenera facile patiuntur, ut per levissimam causam omnes turbentur actiones. Hujusmodi Convulsiones non carent periculo, quum augeant constrictionem & non tollant mali causam. Quæ in hoc casu præscribuntur antepileptica, quæ toties valuerunt curare Convulsionem Infantum ex acido intestina vellicante, nihil præstare possunt, cum in hoc morbo leniendus sit dolor Dentitionis, minime vero extinguenda acrimonia acida, quæ frequens est causa Epilepsiæ Puerorum.

Convulsio-
nes.

V. Si vero motus naturalis, id est Peristalticus ventriculi & Intestinorum in consensum ita trahitur, ut inde copiosior fiat humorum confluxus ad chyli organa, & copiosior depositio per alvum, minus tentantur Convulsionibus. *Quibus in Dentitione alvus amplius subducit, minus convelluntur, quam quibus parum.* *Quibus in Dentitione febris acuta accedit parum convelluntur.* H, 2, 590. Inde forsan, quia acre crudum acidum frequens convulsionis causa motu majore febrili subigatur, & alvi fluxu reddatur. Nisi autem hoc haberemus ex constante observatione practica, ex ratione a priore, ut ajunt, vix inveniri potuisset: sed cum hoc nunc

Alvi Pro-
fluvia.

constet, lucem præbere potest in curatione, nos debere lenioribus calefacientibus, si febris absit, facere febrem artificialem, atque servare alvum apertam, priusquam Dentiens infans convulsione tentatur, ut acre crudum primarum viarum subigatur & expellatur.

Quibus illi
morbi ma-
xime fiunt.

VI. Tres vel quatuor illi morbi citati maxime fiunt erumpentibus dentibus caninis, pueris crassioribus & quibus alvus est dura. Constans est medicorum observatio, Dentitionis morbos plures & graviores fieri, quando *Dentes Canini* erumpere conantur, quod ex figura mucronata & acutiore magisque pungente deducunt. Maxime autem afficiuntur pueri *Crassissimi*, hi enim succo abundantes, qui fere superat actionem vitalem partium, ut observavimus (*Aph.* 69, III) in majore versantur periculo, pluribusque cruditatibus sca- tent: si talia corpora itaque crassiora per Dentitionem agi- tantur, majore sarcinâ humorum onusta, se tam facile ne- queunt liberare. Quibus vero *Alvus est dura* retinentibus cruda in intestinis, hi magis quam si alvus fluat febre & convulsione tentantur, cum acre retentum junctum cum den- tis irritamento, motum perturbatum admodum augeat.

LIB. III. APH. XXVI.

105. **I**s autem qui ætate sunt majores, tonsillæ inflammatae, ventriculi in occipitio introrsum extrusiones, asthmata, calculorum generationes, lumbrici rotundi, ascarides, verrucæ pensiles, satyriasmī (*stranguriæ*) strumæ, & alia tubercula, maxime vero supra dicta.

I.

Puerorum
morbi post
dentitionis
tempus.

Absoluta dentitione Pueri non omnium morborum sunt immunes, quare præcipuos annumerare voluit istos, qui aggrediuntur pueros inter septimum & decimum quar-

quartum ætatis annum. Inter hos nullam mentionem facit morbillorum & Variolarum, qui morbi his temporibus huic ætati admodum infesti sunt. Quare clare patet, Hippocratis & dein etiam Galeni temporibus hos morbos non existisse: citantur quidem exanthemata quædam ab his auctoribus, sed si tunc temporis variolæ & morbilli ita fuissent cogniti atque pueris frequentes quam nostris temporibus, nullum est dubium, quin in hoc Aphorismo invenirentur.

II. Locum ad finem oris angustiores, postquam ampliantur iterum fauces, *παροδῖα* vocat Auctor, Latini Tonsillas seu potius angustias faucium. Atque hæ partes ex morbo tumentes idem retinent nomen, sive sit tumor inflammatorius vel quivis alius. Cur autem ad ætatis decimum quartum accedentes hæ partes magis tumeant, naturalis debet esse causa. Observamus ita nostra corpora nata esse, ut ad hoc tempus accedentia pubescere incipiant, barba erumpat, vox fiat gravior. Dum ergo primo faucium partes tumere incipiunt, nova hac inducta mutatione sæpe modum excedunt, ut nimium tumeant Tonsillæ, quare frequentissime quoque hac ætate vox solito obscurior fit. Ne autem hæ partes tumentes molestiam adferant, utile erit colluere fauces aliquoties de die refrigerantibus & adstringentibus, inter quæ præcipua nitrum, alumen, rosæ rubræ, saccharum saturni, ut coarceatur nimia intumescencia.

Tonsillæ.

III. Spondylas hic proprie denotat secundam colli vertebra, supra quam caput vertitur; hanc dicunt nonnulli intro versus tonsillas luxari, alii vero melius exponunt Trudi. Hanc autem Luxationem vel Extrusionem fieri non posse per validam vim, ut ceteræ luxationes, tam planum est, ut nemo dubitare possit, cum generetur ex ætatis incremento, quare judicarem incrementum corporis hujus vertebrae, & incrementum cartilaginis Thyroideæ & Tonsillarum ab eadem pendere causa, nempe mutatione facta ab accedente pubertate.

IVertebræ luxatio.

IV. Asthmatis definitionem dedimus (Aph. 101, XIII):

Asthmatis

T t 2

hunc

hunc morbum huic ætati frequentem esse, fere omnes statuunt Commentatores, ob crudorum copiosiore ingestione, vel pituitæ generationem. Si autem illæ causæ generent Asthma, frequentius esset infantibus & senibus. Sed Asthma deducendum est ex naturali mutatione in hac ætate. Dum enim Pueri & Puellæ ad pubertatem accedunt, sensim augentur quoque cum corporis incremento vires, sed sensim minus proportionate increfcit moles corporis. In Pueris increfcunt generationis organa; in puellis menstrua purgatio incipit: partes igitur omnes magis turgent luxuriante sanguine. Hæc intumescencia naturalis, qua etiam in puellis mammæ fororiantur, si quoque fiat in tracheæ & bronchiorum interna membrana, pulmonum vasa aërea angustans, Asthma generat, quod superveniente hæmorrhagia in pueris, & mensium fluxu in puellis levatur: quare huic succurrere possumus mittendo sanguinem, si Asthma nimis urgeat.

Calculorum
generatio-
nes.

V. Pueros sæpe vesicæ Calculo laborare, sed senes nephritide seu Calculo renali, hodierna observatio confirmat; raro enim adultis lithotomia, frequens autem pueris instituitur: in utrisque autem minor est vitæ actio, ex qua ratione vel causa non absurdum est deducere Lithiasis originem, cum partes terrestres cum alimentis assumptæ, non satis attenuatæ, cum reliquo urinæ liquore evacuatæ, primo in sabulum dein arenulas, postea in lapides seu calculos concrefcant, quæ majore vitæ actione in ætate constante magis attenuatæ amittunt concrefcendi illam potentiam: unde vitam sedentariam agentes, ac si corpus in tali otio minus valeret, frequentius tentantur calculo. Quod autem pueri sæpius Calculo vesicæ, sed senes nephritide corripiantur, mira sed tamen constans est practica observatio, quia in utrisque est debiliior actio partes terrestres dissolvens, sed in increfcente ætate organa præparantia sunt validiora, emunctoria autem debiliora, cum corpus sensim increfcere debeat: verum ætas declinans præparatorium organorum amittit valorem, dum tamen emunctoria utcumque valeant. Renes itaque in senibus videntur debiliores, facili-

faciliusque permittentes partium terrestrium non satis attenuatarum concretionem, quam in pueris. Hæc autem ratio videtur major in infantibus quam pueris, sed & infantes quoque calculi initia sæpe habent, & antequam calculus ad satis magnam molem increverit, septimus annus sæpe præterlapsus est. Quod autem pueri frequentius quam infantes tententur Calculo, hoc vitæ generi adscriberem in infantibus, non præbenti tantam calculo materiem, utpote infantes lacte aliisque alimentis levis materiæ sustentati, partes terrestres optime solutas assument, dum pueri sensim utentes cibo solidore & magis terrestri, attamen corpus non satis valeat has partes dissolvere, Lithiasi materiæ majorem copiam suppeditat.

VI. Ex tribus vulgo vermium generibus, qui in intestinis puerorum nasci solent, solos Lumbricos rotundos seu teretes, atque Ascarides numerat, utpote frequentiores, omittens Lumbricos latos Tænias dictos, quia minus frequentes. Utraque Lumbricorum genera etiam generantur in quavis alia ætate, sed quia frequentiores sunt Pueris, in hoc loco numerari debebant. Lumbrici rotundi in colo & reliquis intestinis, imo & in ventriculo sedem habere solent; Ascarides autem minores ut plurimum ad finem intestini recti seu in ano nidulantur. Utrorumque originem putredini adscribunt veteres, sed quia hodie a physiologis demonstratum est, cuncta insecta ex suis propriis ovis excludi, sed denegare alio nacta pabulo, veterum sententia corruit. Hoc autem verum est, per putredinem multa animalcula ex ovis insectorum excludi, quæ aliter sine accedente fotu putredinis non fuissent exclusa ex suis ovulis. Quamdiu igitur intestinorum actio peristaltica intestinorum valens non permittit spontaneam hanc corruptelam, hæc ova, quæ satis copiose cum alimentis & forsan cum aëre inspirato, assumentur, non producant suos vermiculos: sed quando intestinorum actio debilior, in pueris utentibus omni genere alimentorum, hanc putredinem permittit, animalcula ex ovulis suis excluduntur & excrescunt in lumbricos. Nimis longum foret hoc loco

Lumbrici
& Ascarides.

loco totam vermium generationem persequi, sufficiet notare, vermes in intestinis nasci defectu actionis intestinorum, quo permittitur spontanea exclusio, quæ actione vitæ inhibebatur. Ut igitur curentur & præveniantur vermes, utile erit per calefacientia amara augere intestinorum actionem, & per antiseptica cohibere promptam putredinem: qui autem nati sunt lumbrici mitissimo medicamento mercuriali vel necantur vel expelluntur, modo lene addatur purgans aloëticum.

Verrucæ.

VII. Ex Verrucarum genere est quod Græcis dicitur ἀποχόρδων, Latinis Verruca pensilis, id est cum gracili basi ac si a filo penderet. Credo autem nostrum Auctorem in hoc loco amplecti velle verrucas cum lata basi, quæ sæpe in superficie finduntur, & ex similitudine vocantur Porrum, quoniam hujusmodi Verrucæ in hac ætate frequentissime conspiciuntur, manus deturpantes. Pensiles verrucæ constricto filo facile auferuntur, cum ablatae raro renoventur, sed Verruca tessilis & Porrum caustico sæpe renovato sunt consumenda. Sæpe etiam incremente ætate, ut sponte fuere nata, etiam evanescunt nullo relicto vestigio.

Satyriasmus.

VIII. Satyriasmus nomen ex similitudine satyri desumptum esse, omnibus constat, sed qualem morbum hic intelligit Hipp: admodum ambigunt, quidam dicunt esse Tentiginem, seu priapismum; alii contendunt esse tumores glandularum circa aures oblongos; denique alii esse speciem verrucæ quam minores aliæ cingunt. Adeoque manet nomen, rem incertam indicans, quod admodum remoratur scientiam medicam. Galenus & Celsus hoc nomen non habent. Si autem Auctoris textum inspiciamus, plane constat, esse speciem Tuberculi, nominavit verrucas, satyriasmus, strumas, & dein addit, & alia tubercula: quare satyriasmus speciem Tuberculi facit. Quod autem interposita sit Stranguria non exstat in omnibus exemplaribus, & credo imperite interjectum esse, sed post Calculorum generationes locandum esse, quoniam pueri calculosi etiam frequente stranguria laborant. Videtur ergo mihi, Satyriasum denotare tuberculorum genus, quod faciem præprimis dehonestat

nestat, cum æque ex faciei turpitudine quam ex tentigine puer satyro similis evadat. Quum igitur his temporibus in pueris non invenio aliquod genus tuberculorum frequens, verisimile mihi videtur in Regione Hippocratis & istis temporibus morbum Puerorum fuisse frequentem, qui his temporibus non observatur, sed in cujus loco accepimus morbillos & variolas.

IX. Struma seu *χολπᾶδες* sunt Tubercula duriuscula sub cute in collo, alis, & inguinibus hærentia, vix differentia a scirrho, quæ omni dolore carent, nisi vehementer tangerentur, vel tandem contentus humor deliquescens acrimoniam induerit: raro unicum tale tuberculum habetur solitarium, plerumque multa simul tactu deteguntur, nam vix faciunt eminentem in cute tumorem, sed tactu explorata, videntur tanquam nuges vel glandes mobiles majores & minores sub cute hærentes, quæ huc illucque moveri possunt, occupantes glandulas hic hærentes, quæ transmittunt vasa lymphatica. Hujusmodi Scrophulos multo frequentius observavi in Puellis quam pueris circa hanc ætatem. Videntur mihi nasci ex materia gelatinosa concreta & subsistente in glandulis, quæ vasis lymphaticis accretæ sunt. In animalibus junioribus invenimus succum gelatinosum concrescibilem copiosorem, quam in vetustis; sed si animalia non satis adoleverint, hic succus vix aliquam consistentiam habet, unde ante ætatem septem annorum in hominibus, quum hic succus non satis concrescibilis generetur, minus frequentes conspiciuntur hi tumores adenosi; sed quando major copia hujus gelatinosæ materiæ ex naturali ætatis mutatione generatur, frequentius hæc gelatina circa has glandulas collecta & concreta Strumas generat. Adultiores autem homines interdum etiam his tuberculis corripuntur, sed tunc sæpe contenta materia liquescens, corrodens involucrum glandulæ, parit ulcera fistulosa curatu difficilia. Priusquam aperiantur in pueris vel puellis, feliciter curari solent gummis & balsamis aromaticis, radice Bryoniæ, & Scrophulariæ, cum mitissimo mercuriali applicatis.

Strumæ.

X. Plura genera Tuberculorum (*Aph.* 99, XIII) hac æta

Alia Tubercula.

te nasci posse, ut furunculus, anthrax, atheroma, ceterique tumores folliculosi, & scirrhus, nullus dubitare potest, sed ex istis omnibus nulla tubercula tam frequentia in hac ætate visuntur, quam quæ recensuit Auctor, quam ob rem hanc cautionem adjicere voluit, ne aliquis existimaret reliqua Tubercula in hac ætate generari non posse.

LIB. III. A P H. xxvii.

106. *Ætate adhuc provectioribus, & ad pubertatem accedentibus, & multa ex illis, & febres diuturnæ magis, & ex naribus sanguinis fluxiones.*

I.

Adoleſcentiæ tempus.

Galenus & Celsus non eodem modo interpretantur hunc aph: Celsus enim ita Latinè se exprimit *Incipiente vero jam pube, ex iisdem multa*. Quibus verbis exprimit tempus post annum decimum quartum, vel inchoatam pubertatem. Galenus hic intelligit annum 12, 13 & 14, & in sequente (Aph. 108) idem Auctor Hippocratem miratur, quod intermiserit adolescentum ætatem, quæ medium obtinet locum inter puberes & illos, qui consistentes ætatis vigorem habent. Ego vero existimo secundum generalem ætatis divisionem (Aph. 203, 11) hic intelligi debere tempus ætatis a decimo quarto ad vigesimum primum, quod tempus Adolescentiæ solet vocari Pubertas, etiamsi ipsius Hippocratis verba hoc tempus non satis clare expriment.

Qui morbi hoc tempore ac suat.

II. Non omnibus hominibus idem tempus est pubertatis, quidam enim maturius, quidam vero serius pubescunt, ut viderim puellas, quæ ante vigesimum primum non conspexerant menses; & quidam adolescentes ante hoc tempus non pu-

pubescunt, quare in hoc septennio etiam multi morbi in præcedente Aphorismo notati adolescentes infestant, præcipue istos, qui fero pubescunt. Sed præter dictos morbos insuper duos allegat, scilicet febres longas & ex naribus sanguinis fluxiones.

III. Videtur Hipp: voluisse in utroque sexu indicare morbum frequentissimum, & primo in Puellis febrem diuturnam seu Chronicam, quæ hodie vocatur Chlorosis, qui morbus in hac ætate tam frequens est, ut nullus sit qui nesciat. Primis enim vicibus menses non tam facile fluunt quam in maturiore ætate, quibus subsistentibus puellæ fere semper in talem febrem albam chronicam incidunt, cujus curatio frustra suscipitur manentibus mensibus suppressis, iis vero in ordinem reductis sponte evanescit Chlorosis.

Febres longæ.

IV. Adolescentibus hæmorrhagiæ narium frequentissimæ sunt: iisque enim ad dicimum quartum annum magnum accipiebat corpus incrementum, ut id, quod plus conficiebatur, quam requirebatur ad corporis nutritionem, per incrementum tollebatur: post hoc autem tempus auctis viribus conficientibus cum corporis minori incremento, generatur sanguinis abundantia, quæ sæpe sibi viam pandit, & quoniam narium membrana est mollissima, & vasa hic maxime patula, ex istis sæpissime adolescens fundit sanguinem: quæ hæmorrhagia, nisi modum excedat, salubris est, tollens sanguinis abundantiam, sed quoniam interdum nimia quantitas profunditur, sæpe exigit medicorum auxilium: promptissimum est, turundam mollem liquore styptico ebriam indere naribus, & succenturiata venæ sectione prævenire recidivam, quæ sanguinis missio rarius & minori copia est celebranda, ne tandem adultior factus adolescens huic evacuationi nimis sit assuetus.

Sanguinis fluxus.

LIB. III. APH. XXVIII.

107. **P**lurimæ quidem affectiones pueris judicantur, aliæ in quadraginta diebus; aliæ in septem mensibus: aliæ in septem annis: aliæ ipsis ad pubertatem accedentibus. Quæ vero pueris permanserint, neque solutæ fuerint circa pubertatem, aut fæminis circa menstruorum eruptiones, perseverare solent.

I.

Ætatem in tria tempora commode distingui posse demonstravimus (Aph. 97, 1). Absolverat Auctor hucusque morbos in ætatis incremento per partes in infantibus, pueris, adolescentibus, usque ad ætatem constantem; jam ulterius vult persequi morbos in ætate reliqua. Hinc præbet primo generalem regulam præcedentis ætatis in Incremento, qua finit sermonem morborum hujus ætatis. Totam hanc ætatem pueri nomine complectitur.

Puerorum
morbi quo
tempore
judicantur.

II. Medici in temporis assignatione solent initium ponere in primo die, quo incepit morbus. Hoc autem loco temporis initium est statuendum nativitas: ut si morbi fiant in quavis ætate, hi præcipue vel interficiunt puerum, vel solvuntur, seu pueri his temporibus liberantur a morbo. Quales affectiones vel acutas vel chronicas hic intelligat Auctor, facile colligitur, cum quadraginta dies ponantur pro fine acutorum, & qui diutius durant, censeantur inter Chronicos. Potest tamen Puer morbo acuto correptus quadragesimo die, vel septimo mense ætatis perire. Quare duntaxat indicare voluit Auctor, quibusnam temporibus ætatis pueri maxime periclitantur, & a morbis liberantur. Observavit Hipp:

cita.

citata tempora in textu maxime observanda esse, quod quoque in præcedentibus exposuimus. Ex qua autem ratione hoc profluat, plane me latet, nisi quod hæc observatio in mera experientia sit fundata. Ut si quis quæreret, cur non æque annus septimus, vel verbi gratia quinquagesimus, sit tempus pubertatis, quam decimus quartus. Cur non etiam anno secundo ut quibusdam animalibus, sit hominibus matura ætas? Nihil reponendum habeo, nisi quod Deo in creatione ita placuit certos hos ponere limites. Quamvis causam nesciamus, observatio tamen manet constans, multos morbos puerorum circa hæc tempora periculosissimos esse, & qui diu fuere morbis conflictati circa pubertatem liberari, ut demonstravimus (Aph. 70, iv.)

III. Si Puer vel puella morbo longo vexatur, huic magna est spes, cessaturum morbum, si ad pubertatem veniat: si vero ulterius continuetur morbus, raro deinceps liberantur, ut hodie quemadmodum olim constans testatur experientia. Si inspiciamus Celsum, qui dicit *neque primis coitus, neque in femina primis menstruis finita sunt, fere longa sunt*, statuendum videtur, seminis & sanguinis menstrui evacuatione liberari. Ego vero his evacuationibus, quamvis phænomenis manifestis, nollem tribuere horum morborum solutionem, sed viribus auctis, quum morbus, qui non potuit hucusque incrementibus viribus superari, tam pertinacem habet causam, ut vix ulla remaneat spes, eam postea superari posse.

Morbi circa
pubertatem
aut men-
struorum e-
ruptiones
non cessan-
tes perseve-
rare solent.

LIB. III. A P H. XXIX.

108. **I**uvenibus autem, sanguinis sputiones, tabes, febres acutæ, epilepsiæ, & alii morbi, maxime vero supra nominati.

I.

Qualis juvenum ætas hic intelligatur.

Celsus hunc Aphorismum sequenti modo exponit. *Adolescentia morbis acutis item comitialibus, tabique maxime objecta est: fereque juvenes sunt, qui sanguinem exspuunt.* Quibus verbis plane constat, hic intelligendam ætatem eam, quæ inter xviii & xxxvi annum continetur, etiamsi Galenus nostrum Auctorem carpit, cum oblitus fuerit Adolescentiæ, in quo tamen temporis spatio Adolescentia & juvenus concipi potest.

Juvenibus sanguinis sputiones.

II. Naturalem hæmorrhagiæ causam in Adolescentia exposuimus (Aph. 106, iv) consistere in cessante corporis incremento, dum tamen maneat conficiens abundantiae causa: quando igitur ille sanguis non tollitur narium hæmorrhagiâ, non raro ex pulmonis vasculis ruptis effunditur, & una cum tussi ejicitur spumofus sanguis: præcipue si simul corpus ad hæmoptosin sit figuratum; vel juvenis abutatur spirituosis, vocemque nimis intendat. Qui vero trigessimum sextum annum ætatis superarunt, quoniam vasa sensim magis fuere confirmata, minorque generatur abundantia, rarius in sanguinis sputum incidunt, & qui eo corripuntur, minus periculum subeunt.

Tabes.

III. Qualem speciem phthisis (Aph. 89, ii) hic intelligat Hipp: non consentiunt Commentatores; puto tamen plane constare sensum, quum statim post sanguinis sputiones ponit Tabem, quo indicare voluit eam speciem, quæ solet sanguinis sputiones sequi. Quæ species hodie quoque juve-

venibus est frequens, cum post sanguinis sputum ex pulmonibus ulcus relictum tandem Tabem generet. Frequentiorem Tabis generationem ex hac quam alia sanguinis evacuatione ex variis deducere causas. Nam in sputentibus sanguinem non omnis in bronchia effusus sanguis emittitur ita, ut nihil restet, sed semper, quia sursum contra naturalem sanguinis gravitatem ducendus est sanguis, quædam portio in bronchiis & vesiculis pulmonalibus restitat, quæ corrupta hic format ulcus, quod quoque difficulter suum confectum pus evacuare potest, & propterea ab incumbente & corrupto pure latius sensim serpit ulcus. Hoc etiam viscus continuo motu respirationis agitatum vix permittit consolidationem. Atque libero hic aëris aditu summopere promovetur corruptela. Susceptum hoc ulcus minuens Pulmonum præparationis actionem, & corruptum pus miscens sanguinis massæ, ita corrumpit totius corporis pabulum, ut inde vera phthisis purulenta generetur.

IV. Ex morborum acutorum genere febris Acuta est species, quare hæc phrasis non solum indicat morbum vel brevem vel vehementem, sed qui adjunctam habet febrem aut continuam, remittentem vel intermittentem præprimis tertianam, cum quotidiana & quartana febris raro vocetur febris acuta. Si huic febri jungatur Inflammatio alicujus partis, generaliter a practicis vocatur morbus acutus vel Inflammatorius. Hujusmodi febres Acutas juvenibus frequentes esse non solum testatur experientia, sed & ratio dicitur. His enim est humorum abundantia atque corporis vigor cum igitur morbi propter vires admodum valentes calidiores esse solent, quam in ætate alia, causa quæ in alia ætate lentam induxisset febrem, in hac vero calidam & acutam: imo febrilis causa in tali ætate propter vim vitæ prævalidam redditur acrior & magis calefaciens, quam materiem veteres Bilem vocare solent. In hujusmodi febribus Sanguinis missio, Alvi ductio & Refrigerentia præstantiora sunt, minuendo quantitatem & impetum, quam in febribus reliquis: cum abundantia & vigor major admodum augeat morbi periculum.

Febres acutæ.

Epilepsiæ.

V. An Hippocratis tempore & in ejus Regione in Juvenibus frequens fuerit Epilepsia, negare haud possum, sed nostris temporibus & in hac Regione rarum est observare, nisi aliquis a pueritia eo morbo correptus fuerit. Si vero per Epilepsiam vult intelligere eam convulsionis speciem, quam in puellis referunt ad Passionem hystericam, omnino hujus morbi in hac ætate frequens est observatio; cum fœminæ mensium suppressione vel & profluvio laborantes, sæpe tentantur insultibus epilepticis, quem morbum hodie referunt ad suffocationem uterinam, etiamsi omnes characteres Epilepsiæ (Aph. 70, II) habeat.

VI. Tandem addit aliis quoque morbis obnoxios esse juvenes, quoniam multi in pueritia nati hac etiam in ætate continuantur; ut & aliis corripuntur morbis, sed ex omnibus istis annumerati morbi sunt frequentissimi. Quando igitur in sequentibus citantur morbi Juvenum, hos præcipue intelligere vult.

LIB. III. A P H. XXX.

109. **U**ltra hanc ætatem vero progressis, asthmata, pleuritides, peripneumonia, lethargi, phrenitides, febres ardentes, alvi profluvia diuturna, cholera, dysenteria, lienteria, hæmorrhoides.

I.

Adultorum
ætas.

AB anno ætatis xxxv ad xlix dicitur virilis vel constans ætas, cum finis juventutis apud medicos ponatur annus xxxv, & initium crudæ senectutis annus xlix. Non tamen ita striete hoc tempus est accipiendum, quoniam in quibusdam citius in aliis tardius veniat Adultorum ætas, & finitur pro viribus corporis magis minusque valen-

valentibus: communis autem terminus virilis ætatis his quatuordecim annis continetur.

II. Ut in Incremento ætatis sensim quoque increfcebant vires, & in Decremento minuuntur vires, sed in medio hoc tempore Adulterum in eodem tenore fere persistebant: ita sensim a finito corporis incremento circa xxi ætatis annum ad xxxv sensim minuitur humorum abundantia, ut qui morbi fiebant in adolescentibus & juvenibus ex abundantia, nunc minus infestant. Post annum igitur ætatis xxxv tolerabilis est humorum quantitas cum valentibus viribus. Unde morbi ex corporis vigore cum mediocri humorum quantitate hac ætate prævalent.

Adulterum
naturalis
mutatio.

III. Ex Asthmatis definitione (Aph. 101, xiii) satis constat, morbum esse ex quibusdam phænomenis nominatum, & agnoscere varias causas, sæpe enim fiunt Autumno (Aph. 101, xiii) & in Pueris (Aph. 105, iv) sed quæ adoriuntur Adultos aliam agnoscunt causam. Cum Adulterum corpora robusta sanguinem admodum compactum & tenacem faciant, videtur in his generari Asthma ex sanguinis lentore, quo majori molimine per pulmones possit trajici. Quamobrem asthmata adulterum, quæ ex hac ætate nascuntur, commode tolli possunt antiphlogisticis solventibus, lentorem sanguinis minuentibus.

Adultis
Asthmata.

IV. Pleuritidis nomen a Pleura desumptum generaliter significat omnem dolorem in hac membrana, sive sit in hoc vel illo latere pectoris, antèrius vel posterius, ad superiorem vel inferiorem partem pectoris, cum has partes omnes hæc membrana pleura interne cingens dolore correpta Pleuritidem inferat. Si vero absolute ponatur Pleuritis, ut in hoc loco ab Hipp: & aliis practiceis, intelligitur Dolor Pleuræ ab Inflammatione, quæ ex signis huic Dolori junctis innotescit. Ut sit Dolor punctorius urens, uti in omni inflammatione, sed qui externo tactu vix augetur, cum pleura intus pectus cingens externo tactu vix moveatur: si vero ad tactum multum augetur dolor, aut si inflammationis signa externe in pectore conspiciuntur, hunc morbum vocant pectoris inflammationem. Huic Pleuritidi adest pul-

Pleuritide

sus durus & frequens cum corporis siccitate & ardore cum febre continua ex natura inflammationis : sed Tussis molestissima & dolorifica, Respiratio difficilis, ab affecta pleura veniunt. Duo igitur genera signorum ad detegendam Pleuritidem veram requiruntur, unum, quod declarat Pleuram esse affectam, alterum quo morbo ille dolor generatur. Et Quando adjuncta signa declarant Inflammationem, talis Pleuritis dicitur Vera; sed si aliorum morborum dolorem inferentium adsunt signa, omnes illæ species Pleuritidis dicuntur nothæ. Hoc itaque loco duntaxat demonstrandum est, Adultos proniores esse in Inflammatorios morbos. Hoc loco suppono, quod alibi demonstrabitur, Inflammationem esse motum vitalem auctum in quodam ramo arteriæ, quo generatur in sanguine Lentor, & producantur in parte omnia signa, quibus distinguimus Inflammationem a quovis alio morbo (vid. *Comp. T.* 47, 1.) Hunc motum validum fieri posse in adultis, quibus est summus vigor corporis, nullus dubitare potest : atque sanguinem facile compingi jam aucto motu, qui sanguis in sanis Adultis densior est, quam in quavis alia ætate, ut fidem facit sanguinis missi exploratio, nemo iusticias ire potest. Cur autem Pleura sæpius hac tentetur Inflammatione, illi non erit mirum, qui novit, hanc membranam scaterere arteriis, admodum esse tensam, valide agitari suis fibris, expositam esse aëris injuriis cum intus a suscepto aëre frigido, & externe tenuibus integumentis sit tecta membrana. Quibus concurrentibus causis hæc membrana frequentius quam aliæ partes Inflammatione corripitur. (Conf. *Aph.* 102, 11).

Peripneu-
monia.

V. Quamvis Peripneumonia ut Pleuritis nomen accepit ex parte, non tamen omnes Pulmonum affectiones vocantur Peripneumonia, sed quando Pulmo vel Inflammatione vel Erysipelate corripitur, est Peripneumonia, unde non opus hunc morbum in verum & nothum distinguere. Cognoscitur etiam ex generalibus notis Inflammationis vel Erysipelatis, cum mutatis functionibus pulmonum: sed quoniam hæ functiones impeditæ etiam mutant consuetos characteres inflammationis, imprudentem medicum facile fallere potuissent,

sent. Calor æstuans, siccitas & febris continua acuta ex natura inflammationis manent. Sed pulsus fit mollior & debilior propter impeditum sanguinis transitum per pulmones. Dolor admodum obtusus, imo potius fit *Anxietas*, quia paucis nervis sensui dicatis gaudet Pulmo. Ex Pulmone affecto difficillima & laboriosissima sublimis fit *Respiratio*, ut ægri erecte sedentes cogantur spirare, etiamsi ex debilitate decumbere amant, quod Pulmo inflammatione turgens vix admittat aërem, qui si efflatur, calentibus nimis pulmonibus, fervidus sentitur. Facies phlogosi suffunditur magis quam in *Pleuritide*. Hunc morbum frequentiore adultis fieri, ex iis, quæ supra de *Pleuritide* diximus, facile colligi potest. Et mirum est *Peripneumoniam*, cum Pulmo nudo aëri exponatur, non fieri frequentiore: forsan inde, quod suus specialis motus, quo caret pleura, & paucitas arteriarum ex *Bronchialibus* venientium, Inflammationis sit minus capax.

VI. Ex soporoso morborum genere species est *Lethargus*, etiamsi interdum accipiatur pro omni soporoso morbo. Adeste debet somnus morbosus diuturnior & profundior, quam in hominibus sanis observatur, ita tamen ut e somno possint excitari, sed excitati protinus in eundem relabantur cum oblivione omnium rerum. Auctores non consentiunt, an ad morbos pituitosos vel biliosos *Lethargus* sit referendus, quare inter *Coma*, *Carum*, & *Lethargum* magna confusio significationis. Multi *Lethargum* ad morbos pituitosos referunt, natum ex lenta frigidaque causa, dum autem in hoc loco ponatur inter morbos ardentes calidos, & in adultis, in quibus minime conveniret accusare pituitam, sed lentorem, qui cum minus libere duci possit per cerebri vasa, contenta encephali comprimendo, soporem generat, quemadmodum *Asthma* (III) recensitum impedito fluxu per pulmones. Unde toties *respiratio* difficilis jungitur *Lethargo*, & describitur a practicis *Lethargus* pulmonum. Signa igitur lentoris in corpore cum somno profundo oblivioso *Lethargi* præsentiam arguunt, talem quoque curationem exigunt. Quibus satis constat, quam male

Lethargi.

multi agunt, qui volatilibus & aromaticis conantur hujusmodi soporem curare. Et plane concipi potest, robustos & adultos huic morbo magis esse obnoxios, quam quævis alia ætas.

Phrenitides. VII. Eadem causa in superioribus morbis recensita si afficiat meninges, producit symptomata, quæ collecta uno nomine vocantur Phrenitis; morbus enim est inflammatorius cum febre continua, pulsu duro & frequente, atque corporis æstuante calore, sine ulla intermissione, quod etiam verum est in recensita pleuritide & peripneumonia. Quando vero meninges agitantur inflammatione, subjectum cerebrum ita movetur, ut homo deliret, & nullus concedatur somnus, sed, nimis compresso cerebro, interdum videntur dormire, dum tamen tales homines dicantur a nostro Auctore valde Phrenitici. Qui vero insaniunt ex paroxysmo febrili non vocantur phrenitici. Non est opus demonstrare, Phrenitidem esse morbum Adultis frequentionem, cum a præcedentibus duntaxat differat in loco inflammationis.

Febres ardentes.

VIII. Ex æstuante seu fervido calore cum febre, hæc species veteribus fuit vocata Causos: & quoniam febris Inflammatoria, Erysipelatosa, & Biliosa, tertiana intermittens vel remittens, ardore vexant, sæpe omnes dicuntur Ardentæ. Proprie autem febris Inflammatoria sanguinem compingens in lentorem, est Causus, si nomen ponitur absolute uti in hoc loco, ad quam ceteræ species biliosarum febrium ob urgentem calorem referuntur, in quibus tamen sanguis admistu bilis acris saponaceæ, quamvis valide compingitur, magis manet fluidus. Hæc igitur febris eandem cum præcedentibus morbis agnoscit causam, eandemque postulat curationem. Tantum differt, quod motus arteriarum vehementior habeatur per totum corpus, dum in reliquis quædam pars præ reliquis magis agitabatur. Ut sit febris Ardens inflammatio generalis.

Alvi profusio diuturna

IX. Quanto cum judicio Hipp: morbos adultis frequentiores, annumerat, ex hoc *Aph*: constare potest. Hucusque enim citavit morbos inflammatorios primo particulares, dein finem imponit cum inflammatione generali seu febre ardente.

te. Jam vere aggreditur morbos biliosos, seu qui ex bile liquefcente & corrupta, per majorem motum nata, nascuntur. Bilis enim majore motu non compingitur in humorem lentum, uti formatur majore motu ex parte gelatinosa concrefcebili nostrorum humorum, sed liquefcit, fit acris & urens, ut omnia pingua per majorem calorem. Ita Bilis materia majore corporis robore & motu in Adultis secreta, & deposita in intestina, ea sua vellicante acrimonia in perpetuam dejectionem sollicitat: & quoniam manet bilis scaturigo, etiamsi deponatur alvus, generari debet Alvi profluvium diuturnum; tam diu durans, ac generatur in hepate & vesica fellea bilis tenuis & acris. Hæc alvi copiosior & diuturnior egestio curanda est evacuatione & emendatione bilis acris & calidæ corruptæ; nam si constipetur alvus adstringentibus, diuturniori mora in intestinis contenta bilis sensim fit acrior & furens. Conducit igitur eam bilem eliminare purgante acescente saponaceo, & dein compescere egestionem per acida, bilem tenuem & acrem compescentia, interim interdum intermiscere purgans, ne accumuletur corrupta Bilis in Intestinis. Sic sensim & sponte in ordinem redibit alvi egestio.

X. Bilis tenuis illa & acris calida iisdem causis nata, sed congregata magna copia in vesica fellea, ductuque cholecho, tandem abundans in duodenum erumpens, sua rodente solvente virulentia non solum Intestina in motum inordinatum validum & inversum concitat, sed in ventriculum per pylorum delata, totum chyli organum mirifice agit, ut ipsa bilis, ceteraque contenta intestinorum, & in ea confluentes humores, concitato hoc motu magna vi pellantur per vomitum & secessum non sine ægri discrimine, ut hac nimia evacuatione, & valide motu perturbato interdum ægri paucis diebus moriantur.

Cholera.

XI. Transít nunc ad tertium genus humorum, quod in robustis sæpius generatur, scilicet ad humorem acrem tenuem minus biliosum, quod majori motu generatur, quodque compingi non potest, sed in rodentem & tenuous humorem convertitur, quemadmodum id acre speciale, quod podagri-

Dysenteria.

cum dolorem infert & Rheumatismum, quale genus raro nisi in adultis & robustis habet originem; simile fere acre ad intestina depositum, multa infert tormina ventris, quæ dicuntur Dysenteriae.

Dysenteriae. XII. Si vero humores concrecibiles adutorum compinguntur in glutinosum lentescens, quod in intestina depositum interna obstipat oscula lacteorum, cuncta alimenta deglutita in ventriculo quidem præparata, ob transitum in vasa lactea denegatum, deponuntur per alvum sub chyli vel alimenti confecti forma, qualis dejectio compesci nequit, nisi saponaceis reſeratis lacteorum oîculis, illo glutinoso obturatis.

Hæmorrhoides.

XIII. Si Hæmorrhoids vel Hæmorrhoides pro morbo accipiuntur quemadmodum in hoc loco, duo genera morborum significant: vel exprimit intumescentiam venarum circa anum; vel earum disruptionem, ut sanguinem fundant. Quoniam autem hic absolute ponuntur Hæmorrhoides inter recensionem morborum in adultis, non sine ratione est conſicere, Hippocratem utrumque morbum intellexisse. Cur autem Juvenibus hæmorrhagias frequentiores, sed Adultis Hæmorrhoides, meretur attentionem. Experientia constat, sanguinis abundantiam, qualis est in juvenibus, magis petere vasa narium ex aorta provenientium, ut arteriæ sanguine turgentes sibi viam parent per extremitates arteriarum: sed in Adultis dum vires magis per ætatem sint firmatæ, minorque sensim generetur abundantia, sed sanguis reddatur magis compactus, lentior ille sanguis ob tardioſam circulationem in vena portarum facile colligitur, totamque venam portarum turgere facit, & quoniam ita lentescens nigrum sibi comparat colorem, existimarunt Veteres esse bilem atram. Collectus ita in vena portarum hujusmodi sanguis, quia hæc vena caret valvulis, istis in partibus, ubi rami portarum minus sunt suffulti, ut circa anum, primo tumere incipiunt non raro cum dolore; dein pergente impletione & distentione harum venarum, venæ tumentes ruptæ sanguinem nigrum fundunt. Quod autem seniores, quibus etiam lentus est sanguis, rarius corripiantur hæmorrhoidibus,

bus, intellectu est facilis, quoniam ad hanc collectionem sola non sufficit tenacitas ex concretionem per minorem motum, verum compactus major viribus vitæ, & quædam etiam abundantia, quæ junctæ causæ senibus raro contingunt.

LIB. III. APH. XXXI.

110. **S**enibus autem spirandi difficultates, catarrhi tussiculosi, stranguriæ, dysuriæ, articulorum dolores, nephritides, vertigines, apoplexiæ, cachexiæ, pruritus totius corporis, vigiliæ, alui, & oculorum, & narium humiditates, visus hebetudines, glaucedines, auditus gravitates.

I.

Finit hunc Librum cum hominis vita, seu exponit morbos, quibus ultimus vitæ terminus ex naturali ætatis mutatione est obnoxius. Divisionem senectutis in Crudam, Mediam & Decrepitam senectutem dedimus (*Aph.* 65, 1) Videtur Auctor in hoc loco tres has intelligere species, sed præcipue ultimam. Ut vires vitæ a nativitate increpant ad ætatem constantem, perstant dein, sic postea sensim incipiunt minui. In hac observatione nullam habemus rationem, nisi quod Deus ita placuerit omnia animalia viventia creare, & hanc ponere legem inviolabilem, non solum in hominibus, verum etiam in cunctis animantibus; quidquid garriunt chemici & alii rerum naturalium perscrutatores, constans tamen manet lex, tandem omnia animalia, etiamsi nullus accedat morbus, perire tamen morte senili, in quo ætatis anno ita sensim evanescunt corporis vires, nullo auxilio restaurandæ, ut tandem corpus fiat impar suis muneribus, ad vitam continuendam peragendis.

Senum naturalis mutatio.

sive.

sive quod vascula minima sensim in callum conversa & oblitterata; sive quod spiritus ceterique humores functionibus peragendis fiant inepti; sive quod id vitale a Deo viventibus concessum, sit extinctum, determinare non audeo. Invenimus tamen pergente vita hæc tria fieri. Vitæ enim actio sensim fit infirmior; multa vascula antea aperta & mobilia sensim occluduntur, fiunt callosa & rigida, humores omnes sensim minus perfecte præparantur: quæ omnes mutationes sunt inevitabiles. Sed diverso genere vitæ hæc præmature fieri possunt, corporis validior motus citius occalescere facit vasa: intemperantia citius consumit actionem vitæ: quare non sunt excusandi, qui immoderatis exercitiis, vel intemperantia aliquid veluti de suo vitæ curriculo detrahunt.

Senibus
Dyspnœæ.

II. Ex sola virium diminutione Difficilior fit Respiratio, cum ad eam peragendam actio vitæ requiratur. Verum etiam pulmonis ut aliarum partium febræ rigidiores factæ & minus sequaces motus impedimenta pariunt. Hæc nulla arte sunt tollenda. Sed humorum viscositas, qua pulmo magis impletus in alia ætate satis facile tollitur, in hac autem ætate nullis pectoralibus laxantibus obtemperat, imo eadem difficiliorem inducunt spiritum: quamobrem medici experientia edocti detexerunt vino málvatico, resinosis & balsamicis calefacientibus omnium optime senum difficilem respirationem levare.

Catarrhi
difficiliosi.

III. Humor tenuis crudus & aër ex capitis internis partibus destillans ad ejusdem partes externas, vel fauces, pectus, aliasque partes remotiores, vocatur humor catarrhosis, atque ipse descensus dicitur destillatio seu Catarrhus. Hic humor destillans in interna laryngis membrana titillando Tussim parit. Materia Catarrhosa videtur in senibus esse, vel humor perspirabilis retentus huc depositus, vel materia mucosa liquefcens. Et quoniam virium defectu mucî proventus est copiosior, ejusque liquatio promptior in humorem acrem stimulantem, hinc ætati senili hic morbus debet esse frequentior, ut supra observavimus (Aph. 65, iv). Quam
vero

vero difficilis sit hujus morbi curatio, cum respuat omnia mollia bechica, & morbi senum omnes chronici ad mortem durare soleant (Aph. 64, iv.) facile colligi potest.

IV. Ex guttatim cum crebra cupiditate mingendi, & dolore, emissum lotium stranguriæ seu urinæ stillicidii obtinuit nomen, sed varias agnoscit causas, ita supra ex siccitatibus (Aph. 95, xi,) autumnis (Aph. 101, viii.): hic vero in senibus observavit Hipp: frequentem fieri stranguriam. Cum aliis statuo senes calculosos sæpe laborare stranguria, sed in hoc loco puto magis respici debere ad duas in senectute præcipuas causas. Observamus, corpora viventia quo magis recedunt a nativitate, eo generare in se urinam acriorem, quæ abstergens & acrior si abstulit urethræ mucum, tangens nuda urethræ latera, parit mingendi perpetuum desiderium, sed quam primum ex vesica in urethram descendit urina, urethra irritata se protinus constringens, aliquot saltem guttulas urinæ transmittit non sine dolore, manente mingendi cupiditate. Atque in senibus, quemadmodum mucus tracheæ fit acrior & tussim parit, ita etiam mucus viarum urinæ in hac ætate fit acrior liquefcens, qui irritando urethram, crebiam mingendi cupiditatem parit, & in transeunte urina magis ad urethram applicatus hic mucus acer, protinus quoque urethram constringi facit. Mollia quidem & diluentia temperant urinæ acrimoniam, sed resinosa, aromatica oleosa, ut monuimus in Tussi senum, magis opitulantur stranguriæ senum ex mucæ acrimonia natæ. Ex iisdem etiam facile intelliguntur, quæ de Dysuria dicenda sunt.

V. Variis generibus dolorum Articuli infestari possunt, podagra, arthritide, rheumatismo, & aliis, verum hujusmodi dolores non magis invadunt senes, quam alias ætates; unde in hoc loco quædam species doloris articulorum assignari debet, quæ frequentior est senibus. Deducerem itaque hunc dolorem ex eadem materia colliquativa acri, quæ deposita in Laryngem producebat tussim, & in vias urinæ pariebat urinæ difficultatem: sed quando id acre colliquatum miscetur smegmati naturali articulorum, tunc ligamentis articulo-

Stranguriæ

Articulorum dolores.

rum inferret dolorem, præcipue si movendo articulum magis prematur acre ad illa ligamenta. Quales dolores tentarem lenire balsamicis resinosis, calefacientibus, ad articulos applicatis, ut prævenirem spontaneam smegmatis liquationem, & excuterem, quod in articulis erat collectum.

Nephritides. VI. Omnes morbi Renum sæpe dicuntur Nephritides, sed præcipue Dolores. Non constat inter auctores, num renum calculus, num vero Inflammatio vocanda sit nephritis vera. Quantum vero ex loco hoc colligere possum, Hipp: hic intelligere vult renum dolores, quoniam nephritidem inter dolores aliarum partium citat. Et quoniam versatur in annumeratione morborum, qui ex liquata acri lymphâ oriuntur, non facile credere possum, hic intelligi debere nephritidem calculosam vel inflammatoriam, sed Lymphaticam dictam, quæ mihi quoque sæpe contigit observare in senibus, quamque feliciter balsamicis, resinosis, & oleis aromaticis sustulij.

Vertigines. VII. Si vero humor pituitosus liquatus, senibus frequens, ex meningibus secretus, ad infundibulum cerebri, unionemque nervorum opticorum collectus, hos nervos afficiens ita, ut inordinate moveantur eorum fibrillæ visui destinatæ, mens percipit eandem idæam ac si imagines in oculo supra retinam pictæ inordinate moverentur; cum mens non valeat distinguere, num nervus opticus moveatur ab imaginibus rerum externarum in oculo pictis, num vero idem nervus moveatur a causa in calvaria hærente. Inde senum vertigini medemur cephalicis, aromaticis, calefacientibus, & volatilibus, & etiam apophlegmatizantis, quibus hunc humorem opticos prementem & agitantem, evacuamus & discutimus.

Apoplexiæ. VIII. Si vero Pituita majore copia collecta, ita opprimat cerebrum, ut ejus functiones aboleantur, generatur apoplexia (*Aph.* 67, 1) pituitosa senibus frequens & periculosissima, cum haud facile sit hanc collectam pituitam discutere, & cerebri diu abolita functio, vel & sensim compressum cerebellum mortem adferat. Quoniam in nulla alia ætate tam copiosus est pituitæ proventus quam in senibus, inde etiam
his

his frequentius accedit apoplexia pituitosa quam cuivis aliæ ætati.

IX. Virium debilitas senibus naturalis non solum permittit humoris boni gelatinosi naturalem degenerationem in lentam pituitam, vel in humorem tamen liquatum acrem, sed etiam quæ assumuntur alimenta, minus justo præparata in tali corpore debili primo formant materiem crudam, qua quoque corpora senum scatere solent, dein vero cruditas non emendata, sed corruptione alienata præbet humorem flavescensem, qui per corpus dispersum, transparens luridum producit colorem, quem cachexiam vocare solemus. Nulla cachexiæ species difficiliorem promittit curationem, quam quæ generatur, cum curanda sit restauratis viribus, quas in senibus restaurare nescit medicina.

Cachexia.

X. Sensus titillationis est Pruritus, quem ad scalpendum vel fricandum instigat, qui si major fiat, in dolorem commutatur: unde patet esse doloris causam vellicantem sed partes sentientes tam leviter tangentem, ut dolorem inferre non possit: multæ species acrimoniæ in principio, ubi leviter incipiunt operari, Pruritus inducunt. Quamobrem in hoc loco duntaxat demonstrandum est, senibus frequentius ad cutim colligere humorem acrem. Hoc autem ex antecedentibus palam fit, quoniam senum corpora debilia in producenda acrimonia spontanea per debilitatem prona sunt; hæc acrimonia ad cutim pulsa, ut cum perspirabile exhalet, propter minutam perspirationem facile in poris cutaneis hæret, & ita pruriginem excitat, quæ diaphoreticis antisepticis est corrigenda & auferenda.

Pruritus totius corporis

XI. Non semper nomen humiditatis designat majorem copiam humorum comparative ad partes firmas in nostro corpore, sunt enim corpora inacilenta admodum uliginosa quædam, dum succi plena videantur sicca: imo sanguinis missio & purgans detrahendo humoris copiam humectant. Sed si humores retinentur in laxatis & minus motis partibus firmis, ut ad visum & tactum exhibeatur humiditas & laxa frigiditas, tales partes dicuntur esse uliginosæ & humectatæ. Hoc autem maxime fit in senibus, quorum corpora ef-

Alvi oculorum & variorum humiditates.

foeta & inertia, deficiente motu vitali frigescunt, & vix valentia excutere humores per insensibilem perspirationem, in vasculis cutaneis quasi leucophlegmatia laborant. Cur autem alvus oculi & nares humectata dicantur, videndum est. Dum corpora parcius perspirant quemadmodum senes, id aquosum, quod aliter per cutim exhalat, nunc ad intestina depositum *Alvum humidiorum* facit. Eadem quoque perspiratio minor etiam in sanis *oculos* & *nares* humectare solet; præcipue si harum partium simul adsit atonia, quemadmodum in senibus jam per ætatem debilitatis. Quare lachrymæ & narium stillicidium senum veluti sunt characteres.

Visus habet
tundines.

Glaucedines.

XII. Senibus ob multas concurrentes causas fiunt amblyopiæ. Parcius enim & imperfectior spirituum fit confectio; oculi bulbus laxior corrigatam veluti facit corneam; tunicæ oculorum amittunt pelluciditatem; humores oculorum sensim fiunt pallescentes minus pellucidi, ut tandem in senectute decrepita his causis auctis omni lumine priventur. Et quoniam turbatur aqueus humor, vel opacitas lentis cæsum adspicientibus præbet colorem, glaucedine cum visus diminutione vel & perfecta cœcitate laborant.

Auditus gravitates.

XIII. Quum auditus ut visus exerceatur spirituum bonorum influxu per nervos, ex generali causa debilitante & extinctione actionis nervorum & spirituum, eodem modo ut visus redditur habetior: atque tympani membrana relaxata, cum mucosi collectione in concha interna & forsan etiam in labyrintho, non parum promovetur Baryecoia, quæ ex his causis nata nullam capit medelam.



M E D I C I N A

H I P P O C R A T I C A ,

E X P O N E N S

A P H O R I S M O R U M

H I P P O C R A T I S

L I B R U M Q U A R T U M .

A P H . I .

III. **P** Rægnantes purgandæ, si materia turgeat, quadrimestres, & usque ad septimum mensem: hæc vero minus. Juniores autem & seniores fœtus caute vitare oportet.

I.



Non sufficit in Praxi Medica simplicis casus cognitionem possidere, cum sæpe in compositis a recepta medendi methodo debeamus recedere; si ulla, hæc sane pars magno judicio eget, vixque patitur regulis generalibus complecti, ut olim indicavimus (*Comp. T. 54. xi*) Sed in speciali fere semper proposito casu judicium est ferendum. Egregium præbet Auctor in hoc Aph: exemplar, supponit enim fœminam gravidam, quæ si sana sit, omnem purgationem vetat, in hac supponit morbum Purgationem postulantem: quid autem sit faciendum, concludit, Purgandam esse, sed non nisi gravi ratione, adeo ut leves indicationes Purgationes exigentes in gravida fœmina sint

Contra-
indicationes
agendi dif-
ficultatem
pariunt.

omittendæ ob abortus metum. Atque magis vetat medicationes in juniori & seniori fœtu. Videndum igitur, qui morbi vel causæ in gravidis postulant Medicationem; cur uno tempore graviditatis periculosiores censeantur, quam alio tempore.

*Prægnans
quæ dicatur.*

II. Quæ fœmina ætatis maturæ, in uteri cavo, clauso ejus orificio, continet ovum fœmineum semine virili prægnatum, istudque fovet, nutrit, & incrementum præbet, donec in illo ovo, utero recepto, formetur perfectus fœtus, qui finito termino certo gestationis, nisi prius abortu pereat, excluditur, ea fœmina a conceptionis tempore usque ad partum vocatur Prægnans & Gravida. Regulariter toto hoc tempore os uteri clausum esse oportet, sanguisque menstruus omnis in fœtus incrementum & nutritionem consumi debet. Si fœtus incrementum tantum circiter consumit de naturali sanguinis abundantia, quantum in naturali menstruatione evacuari solet, fœmina gravida æque sana vivere potest, quam non gravida; si vero consumptio confectioni sit impar, talis fœmina ex æquilibrio destructo in morbos vel ex defectu vel abundantia sanguinis incidere potest, quod Medici gravidarum curam gerentes sedulo observare debent, ne præpostere addant vel detrahant ad præveniendos vel curandos prænantium morbos. Regula autem aliqua generalis ex quantitate purgationis menstruæ utcunque desumi potest. Quæ enim fœmina parce purgatur, ex defectu sanguinis solet abortire; quæ autem copiosos solet habere Menstrues, frequentius per abundantiam profudit fœtum immaturum.

*Qui morbi
& causæ
exigunt
purgationem
in gravidis?*

III. Verbum *Ἐπιχειρεῖν* multiplicem significationem habens hoc loco solummodo indicat ex Galeni sententia, cui hac in re maxima habenda est fides, purgationem per alvum: quare duntaxat examinaturi sumus, qui morbi vel causæ in gravidis exigunt Purgationem. Etiam si hoc loco non monet, Prægnantes non esse purgandas, plane tamen ex hac prolata sententia colligi potest, cum moneat, purgandas non esse, nisi materia turgeat, quasi diceret, tuto possumus quosvis homines sanos purgare, nihil inde periculi

culi expectandum; foeminam autem gravidam & sanam non licet purgare, nisi materia turgeat: atque in aliis hominibus morbo correptis levi ex indicatione propinamus purgans, at in gravidis tantum, si materia turgeat. Hæc autem sententia experimentis & rationibus adstrui potest, quum prægnans sana & morbo correpta a purgante forti dato facile abortiat: atque purgans concitando motum in intestinis versus anum, sæpe adjacentem uterum in consensum trahens foetum elidit præmature. Hoc autem magis a Veterum pharmacis quam hodiernorum erat expectandum, quibus Elaterium, Scammonium, Helleborus, Colocynthis, Granum Gnidium, aliaque validiora erant in usu, dum vero hodie Cassia, Manna, Rhabarbaro, Senna, aliisque mitioribus vel in parva dosi datis alvum laxare conamur. Neque mitiora in Gravidis sanis conducunt, quoniam sine urgente necessitate non sit subeundum periculum: sed si alvi ductionis urgeat indicatio, hæc mitiora præ drasticis sunt eligenda. Indicatio urgens secundum Auctorem est, si *Turgeat*. Turgescentia refertur vel ad copiam majorem humorum vel ad impetum versus aliquam partem. At nullam in his invenio indicationem in gravidis alvi ductionem suadentem præter contentorum in intestinis abundantiam. Si enim sanguinis adsit abundantia retentis menstruis, levi purgante dato, quo magis determinatur sanguis turgens ad uteri vasa, extrudetur foetus depulsa placenta ab adhaerente utero. Gravidæ autem morbo acuto laboranti cum aucta circulatione, si ille impetus per purgans determinetur magis ad alvum, facile fiet abortus. His autem in morbis tam ex turgescentia quam impetu majore conduceret sanguinis missio, quæ minuendo copiam & orgasmum humorum præveniret Abortum. Si ergo liceret contra Galenum aliosque Interpretes per φαρμακείαν intelligere sanguinis missionem, apposita esset Medicatio gravidarum, si materia turgeat; sed si notare debeat Alvi ductionem, nemini suaderem in gravidis hanc regulam practicam imitari.

Quando
purgandum
seu potius
sanguis
mittendus
in gravidis?

IV. Quoniam demonstravimus tam in gravida sana quam morbo correpta non conducere Alvi ductionem ad minuendam sanguinis turgescientiam, frustra esset hoc loco persequi tempus gestationis, quo magis minusque conveniret purgans: hujus itaque loco substituemus sanguinis Missionem, quæ Medicatio in juniori & seniori foetu est omitenda. Primis mensibus si concepit foemina, ex menstruo sanguine retento non tanta timenda est turgescencia, quæ urgeret sanguinis missionem; progressu autem temporis crescente embryo in foetum grandiore, quibusdam gravidis, quibus menses solent esse copiosiores, generatur sanguinis tanta turgescencia, cum increscens foetus omnem sanguinis copiam insumere nequeat, ut inter quartum & septimum mensem gestationis abortus fiat, quia vasa uterina tanta copia sanguinis turgescencia detrudunt adhærentem placentam. Grandiore autem facto foetu plus nutrimenti capax facile potest id, quod foemina naturaliter abundans in suo corpore conficit, in incrementum sui auferre, ut inde nulla tunc remaneat indicatio minuendi sanguinis copiam per sanguinis missionem. Contra hanc autem rationem his temporibus experior, invaluisse quibusdam consuetudinem mittendi sanguinem ultimis gestationis mensibus & instante partu, proferentibus, venæ sectionem facilitare partum. An recte vel secus faciant, ex allata ratione facile erit discernere.

LIB. IV. APH. II.

112. **I**N purgationibus talia e corpore sunt ducenda, qualia etiam sponte prodeuntia utilia sunt: contrario autem modo prodeuntia, sistenda.

I.

Evacuatio-
nis necessi-
tas.

Nostrum corpus ea est lege creatum, ut actione vitæ continuo se ipsum destruat, mutando humores in liquamen inutile, partesque firmas deterat: eadem

dem autem actione ex assumptis alimentis bonos conficit humores & refarcit firmas partes, ut maneat vita in longum tempus; sensim vero magis debilitata hac actione morte senili perit inevitabili lege. Corpus igitur perfecte sanum ex bonis tandem in se colligit inutiles humores, partesque firmas abrasas, quæ si non eliminantur, statim aliquo ex retentis corripitur morbo. Neque ita valens est nostri corporis actio, ut quævis alimentorum nomine ingesta in bonum & alibilem succum possit commutare, sed quæ resistant, non subigenda & commutanda, si retinentur, sui generis itidem morbos inferunt. His solis ex rebus si generarentur morbi, omnes facile in duo genera potuissent discerni; quorum unum genus complecteretur morbos ex retenta materia inutili, alterum quod permetteret bonos evacuari. Præter hæc autem duo infinita est morborum series alia, cum corpus nostrum injuriis externis expositum vario modo affici possit, humoresque vel nimis moti, vel minus agitati, aut stagnantes in variam alienam convertantur naturam. Ita mutatus a sano statu liquor interdum cum levamine, interdum cum detrimento evacuatur: hæc dicitur symptomatica, illa critica, cujus diversitatis cognitio sola observatione practica detegitur. Ut si pus modica copia emittatur, evacuatio dicitur critica; Putridum autem exeuns, vel evacuatio quævis immodica, sola observatione practica æstimanda, vocatur symptomatica evacuatio, cum detrimentum adferat. Unde intelligitur in materiæ morbosæ evacuatione, eam solam esse bonam, quæ modicam quantitatem materiæ, evacuationi adaptatam educit (Aph. 21, II); Evacuationem vero copiosiore, & crudorum, & corruptorum (Aph. 22, VII.) esse symptomaticam.

II. Evacuatio autem est duplex, generalis scilicet & particularis. De generali satis egimus passim; hoc loco de particulari evacuatione per alvum est agendum. Ut de hac speciali evacuatione stabilis & firma habeatur doctrina, animadvertendum est, Intestina nobis esse data ad alimentorum confectionem, quod confectum per vasa lactea

Qualia purgantibus evacuanda.

ceteraque absorbentia conceditur corporis nutritioni, huc quoque ad eundem scopum multi confluunt humores. Quod autem confici non potest, & qui confluentes succi præparando inutiles fuere facti, sensim ad anum devolvuntur & exonerantur: unde non inepte alvus a veteribus habetur emunctorium primæ coctionis. Nullibi autem vel in ventriculo vel toto intestinorum tractu invenio organum depuratorium totius massæ circolantis, sed multa, quæ fecernunt bonos humores ad chyli confectionem destinatos, vel quæ intestina munire debent, ne ab alienis afficiantur, qualia multa ad intestinorum finem mucum oblinientem fecernendum destinata. Tria igitur præcipue genera inutilium vel malorum humorum hac via evacuari possunt; (1) Naturalia assumptorum recrementa & inutiles hic agendo facti humores; (2) Humores hic confluentes morbos, & assumpta corrupta, quæ cacochyliæ vel cacochymia vocari potest; (3) Humores boni in generali abundantia hic copiosius depositi & evacuati. Cuncta hæc vel sponte, id est ipsa corporis actione, vel medicamenti auxilio eliminantur. De Purgantibus itaque hoc loco Auctor præcipit talia ducenda esse, qualia etiam sponte prodeuntia utilia sunt (*Aph.* 23, iv) (*Aph.* 25, ii) id est, quæ evacuada sunt, ut sanitas conservetur, vel amissa restituatur, nam quæ utilia sunt nutritioni, si evacuantur per alvum, ratione evacuationis dicerentur inutilia & cruda. Ducenda ergo sunt purgantibus recrementa chylicationis, si in intestinis restitent, quod ex alvo tardiore facile innotescit, & facili alvi ductione obtineri possit. Ducenda quoque cacochyliæ in intestinis collectæ, quæ sæpe præegredientem præparationem exigit & fortio rem alvi ductionem. Humorum abundantia hac quoque aucta evacuatione cum levamine potest minui, cum alvi fluxus in abundantia veniens sæpe curationem attulit. Quid autem sit sentiendum de evacuatione materiæ morbosæ toti massæ mixtæ, ambigo. Omnes fere contendunt, corpus optime depurari alvi ductione, ita ut propterea tale medicamenti genus dicatur Purgans: sed quando morbi quædam materia bonis

mista sit, nemo valet medicamentis facere depurationem, sed exigit organum fecernens (*Aph.* 21, IV), quod segregat, dum transmittit humores, malum a bono, unamque speciem humoris ab alia, ut supra quoque notavimus (*Aph.* 21, III). Adeoque si morbi quædam materia est in corpore, nemo valet ex theoreticis definire, quali organo morbosum segregari possit, num valeamus detectam morbi materiem ducere per alvum: sed observationes practicæ in variis morbis sunt consulendæ, qualisnam materia sponte & critice per alvum fuit exonerata, qualia multa exempla ex Practicis collegimus in *Comp.* T. 90.

III. Alvi fluxum interdum promovendum esse, interdum ^{Quinam} sistendum, supra (*Aph.* 2, XIV) indicavimus. Hoc autem ^{alvi fluxus} sistendus? loco dicit Hipp: si alvus reddat talia, quæ sponte prodeuntia utilia sunt, talis alvi egestio est sistenda. Desumit igitur indicationem ducendi vel sistendi alvum ex spontanea evacuatione. Vix dici potest non solum in Alvi ductione, sed & in omni molienda evacuatione, quantum juvet imitari naturam: si enim vires valent morbi materiem ducere, ad organum opportunum solent ferre quod valet morbosum secernere a bono & utili, atque deinceps evacuare. quæ tunc evacuatio minuit morbum & erigit vires: sed si ex viribus deficientibus morbi materia decumbit in aliquam partem, ibique evacuator, neque levat ex ratione morbum, neque permittenda talis est evacuatio, sive fiat natura sive arte, nam qualia purgari oportet, purgentur (*Aph.* 25. II); si vero contraria, non confert, sed sistenda est talis evacuatio, ne majus damnum inferat.

LIB. IV. APH. III.

113. **S**I quidem, qualia purgari oportet, purgentur, confert & facile ferunt: contraria vero, difficulter.

I.

EAdem verba superius (*Aph.* 25,) & fere eadem sententia (*Aph.* 2) recensita invenietur, ut non opus sit eundem repetere sermonem. Hoc autem loco ab Hipp. adducitur, ut inculcet ea, quæ a natura cum levamine solent evacuari, non esse relinquenda, si natura sponte non moliatur evacuationem: & ut sistamus spontaneam evacuationem, quæ detrimentum adferre solet.

LIB. IV. APH. IV.

114. **P**urgandum, æstate quidem, magis superiores ventres: Hyeme vero, inferiores.

I.

PEr φαρμακείαν hoc loco intelligendum esse Vomitorii & purgantis exhibitionem, plane ex sequentibus constat, quoniam utilitatem utriusque in sequentibus persequitur. Sensus igitur hujus *Aph.* est, Æstate magis, id est, non semper adhibenda esse Vomitoria; Hyeme vero purgantia per alvum. An vero hæc sententia observatione practica & ratione sit fundata, sedulo est indagandum, ne junior medicus auctoritate Gravissimi auctoris alicujus quidquam faciat, quod ægris obesse possit.

An magis
Æstate vomendum?

II. An Hipp. in hoc loco intelligat dimidiam partem anni, uti supra (*Aph.* 81, 1) an vero unam quartam solum

lam partem non consentiunt Commentatores. Hoc autem certum est, modicam temporis portionem inter utraque solstitia accipiendam esse, in qua major est aëris caliditas. In hac calidiore aëris constitutione magis conducere dicit Vomitorium. Hoc autem constare debet (1) quod natura hoc tempore sæpe soleat vomitum cum levamine proritare, ut firmetur sententia superior (*Aph.* 112): (2) quod æstate plures generentur morbi vomitu tollendi: (3) quod sit ex ratione, ut æstate aliquis sæpe vomat. At invenio Vomitum æstate obortum (*Aph.* 100, IV) inter morbos numerari, quare vomitus sponte obortus non potest indicare vomitorium, quod fecisset, si vomitus æstate ortus tolleretur morbum æstivum. Num plures frequentioresve generentur morbi Æstate, quam Hyeme vomitorio curandi, facile constare potest ex comparatione morborum æstivorum (*Aph.* 100,) ad Hyemales (*Aph.* 102.) Generales Æstate morbi sunt Inflammatorii, Biliosi & Putridi; ex quibus soli Biliosi Vomitoriis interdum tolluntur, sed Inflammatorii & Putridi intenduntur. Hyemales autem multi sunt Puitiosi & Catarrhosi, qui vomitoriis magis auscultant, quamobrem ex hac quoque ratione non invenio Æstate magis Vomitorium esse propinandum. Tandem Ratio hoc tempore suadere debet Vomitorium, ut præveniat morbus æstivus. Aëris æstivi major caliditas & siccitas auget insensibilem perspirationem, humoresque in citam putredinem disponit: sed largior perspiratio non est minuenda vomitoriis, imo putrefacti exhalatio si derivetur ad ventriculum, multorum morborum est causa. Atque corpora calore dissoluta si Vomitorio urgentur, facile in ruptionem vasorum per vehementem vomitorii actionem incidunt, dum solum putrefactum in cavo ventriculi hærens & forsan vesicula fellea vomitu elici possit, relicto corrupto in reliquo corpore. Ex quibus omnibus liquet, Æstatem non indicare Vomitorium. Quod autem homines intemperantius Æstate viventes magis quam hyeme egeant Vomitorio, quod sarcinam collectam exonerat, hoc non propter

Aaa

pter

pter æstatem, sed propter intemperantiam indicatur, quæ etiam aliis anni temporibus committi potest.

An Hyeme
alvus du-
ecnda.

III. Ut discernatur, num alvus hyeme sit ducenda nec non (1) videndum est in sanis num alvi fluxus præveniat morbos. Si quis hyeme in alvi profluvium ceteroquin sanus incidit, nimis sentiet suum corpus debilitatum & refrigeratum; Vere autem & prima æstate, quando superveniens calor ferre nequit solitum pondus humorum, cum euphoria alvi fluxus obortus fuit; quamobrem non habemus præeuntem naturam per spontaneam evacuationem (*Aph.* 112). Si vero ex materia morbi hyeme concite-
tur alvi fluxus levamen adferens, id omni tempore bonum est, & talis evacuatio non ratione temporis sed materiæ est imitanda. (2) Morbi Hyeme frequentissimi sunt, qui oriuntur ex prohibita perspiratione: eam autem materiem per alvum ducere frustra conamur, conducit eandem augere excretionem, ex cujus diminutione morbi fuere nati (*Aph.* 2, XII. & *Aph.* 21, IV). (3) Neque ex ratione est, ut aliquis habeat Hyeme alvum laxiorem, cum Hyeme homines habeant Ventres calidissimos (*Aph.* 15, II) facileque ferant alimenta (*Aph.* 18, IV) sed laborent frequentissime morbis ex prohibita perspiratione: unde regulariter non debet fieri alvi fluxus, quin sit indicium, viscera ventris esse labefactata & materiem perspirabilem minus evacuatam, ut inde symptomaticus, minime autem criticus fiat alvi fluxus.

LIB. IV. APH. V.

115. **S**UB cane & ante canem difficiles sunt purgationes.

I.

HOC in *Aph.* satagit Hipp: demonstrare, quonam anni tempore molestiores sunt medicationes, id est alvi ductio & vomitus, cui quidam addunt sanguinis mis-

missionem: sed quoniam Auctor in his Aphorismis præcipue agat de vomitorio & purgante, hæc genera medicationis hoc loco persequemur. Primo difficiles esse dicit, quare non interdicit horum usum in morbis, sed solummodo indicat, sanos hoc tempore ad præveniendos morbos non debere assumere vel purgans vel vomitorium: si vero aliquis hoc tempore aliquo laboraret morbo purgans indicante, hoc tempus non vetat purgantis usum.

II. Anxie admodum multi inquirunt hoc tempus, qui ex astrorum imperio quærent medicationes, mihi autem videtur, nostrum Auctorem adduxisse stellarum nomina, ut certum præberet anni tempus, quod hodie in Calendario correcto incipit xxii Julii, & terminatur xxiii Augusti, sed quoniam Dies Caniculares circa x Julii incipiebant annumerare, & Auctor addit *Ante Canem*, sine multo errore hoc tempus accipi potest ab initio Julii fere ad finem Augusti, quo anni tempore maxime urget aëris calor.

Quod tempus anni hic intelligitur.

III. Qui stellarum imperio multum tribuunt, responderent, a Canis ortu corpora ita debilitari, ut non facile ferant purgantia vel vomitoria, huncque aphorismum adducunt ad stellarum imperium probandum: sed quoniam cuncta hæc hypothesin sapiunt, nullisque experimentis firmata, nulla huic doctrinæ potest esse fides. Quod autem hoc anni tempore quædam fiant, id non propterea tribuendum Canis imperio, sed quoniam hoc tempore maximus regnat cœli ardor, huic causæ cognitæ majori jure tribui potest damnum purgantium & vomitoriorum. Observavimus cum Hipp. (Aph. 100) Æstate frequentissimos morbos esse putridos, fieri Vomitus & Alvi fluxum, hos autem præcipue generari Diebus Canicularibus hodierna quoque experimenta firmant. Quum igitur hæ evacuationes sint symptomaticæ, licitum non erit contra regulam generalem (Aph. 112) alvum vel vomitum concitare, quoniam hac via non valemus depurare putrefactum a sanis, imo si putrefactum sit in corpore, sollicitatis his emunctoriis non raro humores liquefacti tanta copia confluunt, ut eam symp-

Cur sub cane & ante canem difficiles purgationes?

364 MEDICINA HIPPOCRATICA *Aph.* 115.
tomaticam evacuationem non amplius sit in medici potestate comperere.

LIB. IV. APH. VI.

116. **G**raciles, & facile vomentes, sursum purgandi, vitantes hyemem.

I.

Vomitoria
veteribus in
frequentiori
usu.

Sursum purgare hoc loco idem significare quam exhibitionem Vomitorii, clare patet, quoniam adducit facile vomentes, quibus non magis quam aliis prodesse expectorantia. Hippocratis tempore vomitoria in frequenti usu esse, tam in sanis hominibus quam ægrotantibus, ex ejus scriptis facile colligi potest: an vero bene fecerit vel male, non est hujus loci agitare. Hoc autem observamus a prudentioribus Medicis, & qui perpendunt vomitum non esse evacuationem naturalem, atque ventriculum non esse organum excernens, sed recipiens & præparans, vomitorium propter summam efficaciam & virulentiam non nisi urgente necessitate præscribi (Vid. *Comp.* T. 89.)

In gracilibus & facile vomentibus.

II. Ne autem vomitorii frequentior usus inferret damnum, præcipit Auctor in istis sanis, qui facile vomunt, & qui sunt Graciles (*Aph.* 69, 11) vomitorium exhibendum ex levi indicatione, quum facile Vomentes per minimam dosin vomere possint, natura quoque assueta sit se hac via liberare. Addit insuper Graciles, primo quoniam hi minus incidunt in vasorum ruptionem per violentam vomitus actionem: & quoniam existimant, istos bilis abundantia sæpius laborare, quæ hac via facillime exonerari potest. Ego autem a vehementissimo hoc Medicamento abstinendum esse existimo, nisi urgeret vomendi indicatio. Vid. *Comp.* T. 89, LII.

Hyeme ma-

III. Quoniam Hyeme vetat ex levi indicatione Vomitoriū

rii exhibitionem, non sine ratione aliquis concluderet, *Æstate* ^{gis vitan-} tutum esse vomitorium exhibere, quod ulterius deduci ^{dam vom-} potest ex superius dictis *Purgandum esse æstate magis superiores* ^{torium.} *ventres*: sed quoniam hæc sententia a nobis (*Aph.* 114, II) est denegata, non erit opus eandem hic repetere. Si autem vomendi indicatio urget, an non minus hyeme quam æstate Vomitorium exhibendum, aliquis quærere potest. Quoniam Hyeme corpora facilius ferunt alimenta (*Aph.* 18, IV) *Æstate* autem difficilius (*Aph.* 18, II) frequentior generatur Vomitorii indicatio æstate, quod cacochyliam collectam exonerat e ventriculo. Atque Hyeme homines sæpius laborant prohibita perspiratione, quod perspirabile retentum non est versus ventriculum alliciendum, sed ad solitum organum reducendum: *Æstate* autem cum largior fiat difflatio, frequentior vero cacochyliæ collectio, sæpius bona vomendi indicatio urget; ut inde sæpius æstate quam hyeme profuerit vomitus.

LIB. IV. APH. VII.

117. **D**ifficulter autem vomentes, & mediocriter car-
nosi, deorsum, vitantes *Æstatem*.

I.

UT in superiore Aphorismo desumfit indicationes propinandi vomitorium ex corporis habitu & anni tempore, idem quoque assequitur hoc loco ad propinandum purgans. Propterea statuit, ex levi indicatione vel ad conservandam sanitatem conducere mediocriter carnosus ducere alvum omni anni tempore, excepta æstate. Videndum igitur cur hoc ægre vomentibus & mediocriter crassis conceditur, & cur æstate præprimis indicatur.

II. Sorditates primarum viarum vel per Vomitus vel per alvum duntaxat emitti possunt, hæ igitur si abundant ^{Cur ægre vomentibus conceditur purgans?} vel

vel purgans vel vomitorium est propinandum, hoc autem præcipue ventriculum ductumque choledochum exantlat, illud autem naturali sed majore motu concitato cuncta aliena præcipue intestinis contenta emungit. Si igitur vomendi & purgandi valet indicatio, præcipit Alvum ducendam esse in Difficuler vomentibus, id est in iis, qui non nisi magna dosi vomitorii in vomitum adigi possunt, vel qui dum vomunt, admodum torquentur, multamque inde percipiunt molestiam, quales sunt *δυσήμεοι*: quippe per utramque viam potest fieri evacuatio, quæ igitur facillime exonerat, illa est sollicitanda, quasi natura monstraret viam. An vero nulla egente indicatione alvus sit ducenda, ut quibusdam placet ad conservandam sanitatem, his assentiri nequeo, cum a nobis supra (*Aph.* 3) satis disputatum sit corpus sanum nulla egere medicina.

Cur mediocriter carnosus purgans dandum?

III. Corpora sana in tria genera distinguuntur ratione molis, in gracilia, de quibus egimus, obesa, & mediocriter carnosæ. In ultimis his, quorum corpora neque multitudine carnis nimis sunt expansa, in quibus admodum periculosa sunt vomitoria, neque propter gracilitatem defectu humorum laborant: his, inquit, admodum conducit ex levi indicatione alvum ducere. Talia mediocria corpora possunt quævis genera Medicamentorum facilius ferre, cum soleant esse robustissima, quare si minima valet alvi exonerandi indicatio, sine periculo propinari potest purgans. sed si perfecta sanitate fruuntur, nemini essem auctor, purgantibus fatigare corpus sanum.

Cur æstate purgans evitandum?

IV. Quod antea observatum fuit de vomitoriis & purgantibus in diebus canicularibus (*Aph.* 115, III) sine multa mutatione hic conferri potest: assignatum enim tempus maximam æstatis partem conficit, quare adductæ rationes, quæ generaliter omnem evacuationem abrogant, ad hunc locum referri possunt.

LIB. IV. APH. VIII.

118. **T** Abidi vero, vitantes purgationes sursum.

I.

U Titur Auctor vocabulo, quod denotat hominem phthi-
si correptum, & dispositionem ad phthisin habentem:
inde vetat vomitorium in utrisque. Si igitur effe-
ctus vomitoriorum comparentur utrisque, facile patere
potest, Hippocratem veritatem dixisse.

II. Vomitoriorum generalis effectus ad tria genera referri
possunt (*Comp. T. 89, LI.*) (1) ad evacuationem ex pri-
mis viis, sed præcipue ventriculi: (2) Evacuationem to-
tius massæ, quod difficile sit, quoniam ventriculus non est
organum secernens malum a bono, sed conficiens: (3)
Motum majorem. Inde constat morbis ex abundantia in
primis viis opitulari vomitoria, quæ valida concussione e-
gent; ceteris autem inferre damnum, dum evacuant, quod
erat retinendum, & movent, dum erat quiescendum.

Vomitorii
generales
effectus.

III. Qui dictos effectus vomitorii conferat cum variis spe-
ciebus Phthisis (*Aph. 89.*) non difficile huic erit perpen-
dere, quam præpostere agunt, qui phthisicis præbent Vo-
mitoria. Nam Tabes Purulenta sive pus alicubi in corpo-
re sive in pulmonibus habeat originem, cum levamine
nunquam vomitu potest rejici. Ut enim pus sanguini
mistum segregetur, requiritur organum, quod creatum est ad
alienorum secretionem a bona massa, seu organum excre-
torium, uti renes: non est enim in Medici potestate ali-
quod excernens fingere organum, quod non prius existat.
Quod si hoc deficeret creatum organum, frustra laboraret
Medicus omnibus suis auxiliis facere urinæ secretionem a
communi massa, sed valet Medicamentis aliquam augere
vel minuere excretionem. Cum vero naturalis ventriculi
actio sit secernere salivofum humorem, huc usque non con-
stitit

Vomitori-
um nocet
phthisi con-
firmatæ.

stitit Medicum ventriculi actionem ita invertere potuisse, ut fecernat, relicto bono sanguine, pus a communi massa. Si autem per Vomitum reddatur pus, ut interdum observatur, id confectum fuit in ipso ventriculo, vel eo per patentes vias fuit delatum, aut si ex communi massa veniat non per modum secretionis, quod fieri debet, sed colliquationis unâ cum reliquis humoribus bonis huc confluit & deponitur, quando nunquam infert levamen, aut depurationem, sed debilitatem virium. Neque ulla per anatomiam vel praxim fuit detecta via ex pulmonibus in ventriculum, qua cum levamine fuit evacuatum pus, sed pus natum in pulmonibus rejectum fuit expectorando, aut secretum a sanguine per renes, & ita evacuatum. Imo in omnibus morbis purulentis, præcipue si pulmo ulcere sit infectus, non erit licitum tam validam concitare actionem, qualem concitat vomitorium, cum vasa semi lacerata ab ulcere, facile violenti concussione vomitorii disrumpi possunt. Neque tutum erit in Tabe Catarrhosa (*Aph.* 89, iv) dare Vomitorium; hæc enim corpora debilia non ferunt violentam Vomitorii actionem; neque valemus materiem catarrhosam vomitu reddere; potius autem ventriculum antea liberum catarrhorum collectioni exponemus, quæ materia ducenda erat per cutis spiracula. In Tabe colliquativa (*Aph.* 89, v.) summo cum periculo ducitur colliquatus humor ad ventriculum vel intestina, semel enim si talis referata sit via, non erit amplius in Medici potestate, eum sistere humorum confluxum. Recte igitur Auctor præcipit, Vomitorium in Tabe confirmata esse vitandum.

Atque
phthisi in-
stante.

IV. Ut Junior Medicus intelligat, qualia signa Phthisin præfagiunt, quibus apparentibus non licet propinare Vomitorium, præcipua ex iis hoc loco sunt recensenda. (1) Ex phthisicis nati sæpe si ad juventutem veniunt, in eundem morbum, etiam si temperate vivunt, incidere solent, qualis phthisis vocatur hæreditaria vix ullam capiens medelam, cum medicina non valeat naturalem habitum immutare. Videntur his hominibus cruenta pulmonum vasa tam

tam tenera, ut si in juventute generetur sanguinis abundantia & motus major, facile rumpantur: caute itaque hi homines sunt tractandi, ne violentioribus, uti sunt Vomitoria, in sanguinis sputum & dein Phthisin per nostram præposteram curationem incidant. (2) Ex habitu etiam phthisin præfagire valemus, qui indicat pulmones pro mole corporis esse parvos, atque aëris exitum per glottidem difficiliorem esse; ut inde tales homines in respirando & loquendo atque cantando suos pulmones magis afficiant: Quemadmodum gibbosi aliaque mala figura pectoris laborantes, aut quibus pectus est planum & angustum, minus spatium pulmonibus concedens: aut quibus est collum oblongum gracile, vox acuta gracilis, glottidis angustiam arguens. Hujusmodi quoque homines frequentius in hæmoptysin incidunt, quam alii. (3) Quibus autem latens est in pulmonibus vitium, quod facile in phthisin degenerare potest, hi quoque caute tractandi, ne Vomitorii vehementia prompte in Phthisin commutetur: hoc vitium latens vel ex generalibus signis, vel pulmonibus propriis conjicimus; uti habitus cachecticus, œdematosus, calor hecticus in plantis pedum & volis manuum, inappetentia pertinax, non leve indicium præbent, pulmones affectos esse, præcipue si catarrhis sæpe tentantur; magis autem firmatur judicium per signa pulmonibus magis propria, ut sputa flava, pallida vel rufa, granulosa, sive amara, dulcia vel falsa sint, multa phlegmatis viscosi matutina excretio, tussis frequens, angustia seu oppressio pectoris; maxime autem minatur Phthisis, si semel tussiendo ex pulmonibus sanguinem ejecerint. Quoniam Vomitorium nullam ex allatis causis tollere potest; & quoniam sua agitatione non leve adfert periculum, optimo jure Auctor vetat in his omnibus Vomitorii usum.

LIB. IV. A P H. IX.

119. **M***elancholicos autem, uberius deorsum purgabis. Eadem ratione contraria adhibens.*

I.

Sensus ex-
positio.

PRior hujus Aphorismi pars ab omnibus bene concipitur, nisi quod ἀδρτορώς pro Vehemens, & ab aliis pro Plenius seu Uberius accipiatur, quod ex infra dicendis facile deduci poterit. Altera autem pars vel non attingitur, vel refertur ad alias evacuationes. De his verbis inquit Mercurialis, non est ita facile mentem Hippocratis ad ipsam verborum significationem accommodare. Ego autem existimo hujus sensum planum & simplicem esse Hippocratis brevitate dignum. Monet enim in parte priorē, uberius alvum ducendam esse Melancholicis, sed quoniam omnia purgantia non sunt melanagoga, cum quædam potius Melancholiam, alia pituitam, alia lympham, vel bilem ducant, ex his monet talia esse purgantia propinanda, quæ causæ sunt contraria: hoc est eadem ratione contraria adhibens, quoniam scopus tibi est, monet, Melancholiam curare uberiore alvi ductione, ex eadem igitur ratione adhibenda sunt Medicamenta contraria causæ, quæ scilicet Melancholiam curant & evacuant sua specifica virtute.

Qui dicantur
Melancholici.

II. Sensu duplici accipiuntur Melancholici, vel ex animi pathemate, ut exposuimus (*Aph.* 99, II.) vel ex materia, quam vocant Bilem atram. Hanc dixerunt veteres esse Nutrititiam, Excrementitiam & Morbosam: alii autem distinguunt in Humorem Melancholicum, qui ipsis mitior est, & in Melancholiam ipsam. Si autem hunc Aphorismum conferamus præcedenti de Tabidis, videtur Auctor monere velle Melancholica materia laborantes, & quorum corpora sunt prona ad hujus morbi generationem, ut est temperamentum sic dictum Melancholicum, uberius purgan-

ganda esse. Ut autem paucis constet, qualis materia dicatur Melancholica, forsan dabitur opportunior locus deinceps de ea amplius differendi, pauca notare sufficiet, quo intelligi possit utiliter præscribi purgantia. (1) Si sanguis ipse privatur parte sua aquosa, ut inde reddatur spissior, ejusque pars oleosa aliquomodo corrumpatur, quæ unita copiosioribus partibus terrestribus, simul exhibet materiem lentam, tenacem & nigram. (2) Si sal ammoniacalis sanguini naturalis convertatur in salem austerum, multis sanguinis rubri colorem in nigrorem convertentem, præprimis si lenta simul accedat corruptela. (3) Bilis flava, privata suo sale alcalino saponaceo, lentescens & nigrum colorem induens, etiam generat Melancholiam, quæ dein corrupta pessimum genus Melancholiæ inducit, quando etiam dicitur turgens. Præter hæc etiam contendunt, formari ex Melancholia nutrititia compacta; ex Lentore morborum inflammatoriorum; imo ex Pituita vitria corrupta. Omnis autem materia ex quocunque humore nata dicitur veteribus Melancholia, quæ habet has notas; (1) Splendorem; (2) Nigredinem; (3) Tenacitatem, nisi sit soluta a superveniente corruptione; (4) Acrimoniam; (5) Majorem specificam gravitatem, quam in sanguine sano detegitur. Corpora igitur prona ad formationem hujus materiæ, vel quæ talem materiem continent, dicuntur Melancholica.

III. De alvum ducentibus satis fuse egimus (*Comp. T.* 90;) ea copiosiores facere alvi egestionem, cuique notum est: cur autem ita extolluntur in Melancholicis, operæ pretium est rimari, comparando alvi copiosiores egestionem cum loco & natura materiæ Melancholicæ. Duæ in materia sunt proprietates, quæ ex naturali lege circulationis faciunt eam præprimis colligi in vena portarum ante Hepar, Pondus scilicet majus cum adjuncta Tenacitate. Ponderosa autem præcipue deorsum ferri, ex fontibus salientibus, aliisque liquoribus fluentibus per canales quotidiana firmat observatio, & a nobis (*Tractatu de Secretione* §. XIII) demonstratum est. Quia vero omnes arteriæ sanguinem exonerantes in ramos

Cur Me-
lancholici
ubius
purgantur?

venæ portæ ex trunco inferiore aortæ ducunt originem, si aliqua sit in lege circulationis statuenda gravitatis differentia, pars ponderosior eo versus præcipue ducetur. Hoc autem solum sufficere non videtur, cum ad pedes æque quam chyli organa similis ducatur sanguis, verum conjuncta Tenacitas videtur hanc Melancholicam dein Materiem magis colligere in vena portarum: omnes enim reliquæ arteriæ se exonerant in venas sese in cavam venam exonerantes, quæ valvulis instructa multum minuit resistantiam fluxuro sanguini per illas arterias, præcipue si motu musculari agitentur. Sanguis vero in venam portarum delatus valvulis carentem, qui sanguis iterum in hepate debet superare angustias, extincto fere omni impetu a corde accepto, propellendus motu speciali venæ portarum (*Mot. vit. LVII.*) tarde procedens, ex insita tenacitate facile moram necit in lata hac vena, non potens facile duci per hepar, ut veniat in cavam venam. Manens hic ultra consuetum tempus a bona indole sensim magis degenerans, tandem quædam portio stagnando liquata & corrupta, sanguini venæ cavæ tradita, circulantem massam inficit, quæ specialis infectio Delirium melancholicum inducit, ut quæcunque specialia inquinantia sua propria symptomata producant. Priusquam igitur longiori mora hæc materia fuerit corrupta, ejus tentanda est evacuatio per eam viam, quam nobis demonstravit natura salubrem fuisse: illa est vel per Hæmorrhoides vel alvi dejectionem, raro enim per urinam vel vomitum cum levamine hæc fuit evacuata materia. Quoniam vero non ita est in Medici potestate concitare hæmorrhoidum fluxum, quam ducere alvum, per hanc igitur viam tentanda est evacuatio, non unica vice dando purgans, sed Uberius, id est aliquoties ducenda est alvus, ut continuata hac evacuatione auferatur ex vena portarum lentescens materia melancholica, quemadmodum non unica hæmorrhoidum eruptione, sed aliquoties repetita evacuatione sanantur Melancholici. Summa hic videtur nasci difficultas, quum ad intestina nullum sit organum secernens, quod

quod segregatam atram bilem deponere possit, unicum enim apertum est ductus choledochus, qui prope ventriculum se exonerat in duodenum, & propterea videretur atram bilem facilius per ventriculum quam intestina exantlari posse. Verum aliter cum ramis venæ portæ quam cavæ venæ est constitutum, illæ enim carentes valvulis opposito cursu a trunco ad ramos quoque derivare possunt sanguinem, quoties in uno vel altero ramo tollitur sustentaculum, quemadmodum experimur in hæmorrhoidum fluxu. Credibile itaque mihi videtur, Hepar esse organum secernens bilem ab allato sanguine, minime autem valere bilem atram separare, quare si bilis atra turgat, ducaturque per ductum choledochum in duodenum & ventriculum, tam dira excitat symptomata, & copiosas evacuationes sine levamine. Quum vero radices venæ portæ ad intestina, uti fit in hæmorrhoidum fluxu circa podicem, dilatantur, ut sanguinem atra bile infectum in intestina deponant, homo simili modo per alvi egestionem hujus materiæ liberari potest, ut alter hæmorrhoidum fluxu. Hic autem non deponitur secretus humor, uti fit, si pus renum actione segregatur a reliqua bona massa sanguinis, sed deponitur sanguinis communis massa ex vena portarum: unde unica vice evacuari non potest, sed repetitis evacuationibus ex vena portarum per dilatatas venas intestinorum, dum interim per arterias bonus sanguis ex reliquo corpore suppeditetur venæ portarum. Sic tandem sensim evacuato sanguine Melancholiâ infecto, ac accedente puro, qui in portarum vena remanet, magis purus fit, ut jam exigua Melancholiæ portio multitudine boni sanguinis patiatur emendari. Ergo utile erit alvum servare laxiorem uberiori alvi ductione, sed non expedit forte aliquod unica vice dare purgans. ut præcipit Noster Senex. Hoc etiam faciendum videtur in Temperamento Melancholico, seu in quibus observatio Medica docuit facile generari Melancholiam, est enim in his curatio præservatoria, qua primordia atræ bilis, quæ retenta lentiora facta, veram Melancholiam induxissent, hac via protinus eliminantur.

Eadem ratione contraria adhibens.

IV. Eadem ratione, inquit, contraria adhibens, monere volens medicum in solis Alvum ducentibus acquiescere non debere, ut tantum det quodlibet purgans, sed insuper inculcet (1) alvum ducentia eligenda esse, quæ experientia docuit melancholiam præcipue evacuare, qualia hodie dicuntur Melanagoga. (2) Eadem etiam ratione contraria adhibenda in Temperamento melancholico, priusquam morbus atrabilarius sit natus. (3) Denique eadem ratione contraria, quæ generationem bilis atræ præveniunt, uti olera, resolventia saponacea, corporis exercitium, animi hilaritas. (4) Ultimo, quæ melancholiæ collectæ resolutionem promovent, ut ejus inde facilior fiat evacuatio. Tam multa præclara præcepta novit noster Senex sapientissimus medicorum paucis verbis complecti, sed quod dolendum est, illa nimia brevitatis non paucis summam parvit obsecritatem, non nisi versatissimo in praxi medica discutiendam. Qui autem cuncta præcepta sedulo & mente attenta rimatur, eaque cum hodiernis observatis practictis conferat, novisque detectis in anatomicis, in magnitudine ingenii quasi divini hujus Senis abripitur, qui istis temporibus potuit tam solidos & inconcussos canones practicticos condere, ut nullus posterum eum imitari, multo minus superare potuerit. Imo, si Galenum magnum illum medicum, atque Celsum huic comparo, vix puer magis a viro distabit. Unumquemque igitur allicere debent hujus viri dicta. Sincere fateor, quo nostri senis observata magis pervolvo, eo me magis instigant, atque placent, quod etiam aliis medicis placebunt, modo non obsit nimia brevitatis & inde nata obscuritas, confido.

LIB. IV. APH. X.

120. **P**urgandum in valde acutis, si turgeat materia, eadem die: morari enim in talibus malum est.

I.

Qui sint Morbi acuti, ex superius dictis (Aph. 7, II & Aph. 24, III) facile colligi potest. De his monuit (Aph. 24,) in Acutis raro, & in principiis purgante utendum. Atque (Aph. 22.) Concocta purgare & movere oportet, non cruda, neque in principiis, nisi turgeant. Plurima vero non turgent. Quæ omnia sibi invicem collata multis magnam præbuerunt difficultatem. Ego autem existimo per hunc Aphorismum præcedentes sententias firmari. Quippe in hoc loco præcipit purgans sub quadam conditione, si scilicet materia turgeat, quæ adjecta admonitione indicare voluit regulariter in principio Acutorum non esse purgandum, quod etiam demonstravimus (Aph. 24, v). Si vero turgeat, illa turgescencia detrahit generalem regulam, & indicat plane in principio invasionis, eadem scilicet die purgans exhibendum esse, & ac si illa admonitio non sufficeret, addit, *morari enim in talibus, malum est*. Non quod omisso purgante mors esset expectanda, sed quod morbus acutus invadens cum turgescencia materiæ, si non liberetur per purgans plane in principio datum, plures labores majusque periculum facere soleat.

Quando in valde acutis eadem die purgandum?

II. Turgens humor vel materia, species est abundantia & plethoræ, ab ea tamen quibusdam in rebus distat: nam non solum per ὀργάνω denotare vult Auctor majorem humoris copiam in corpore, quam requiritur ad ejus usum necessarium, vel qui sua multitudine opprimens sæpe inordinem facit evacuationem, aut depositionem in aliquam partem debilitatam; inde Lymphæ abundantia in hydro-picis non turget. neque pituita in parte œdematosa turgere dicitur; neque copiosior alvi evacuatio vel urinæ aut sudoris

Si turgeat

doris profluvium cum corporis refrigeratione, etiam si multus humor sit in corpore, ex Turgescentia deducitur: si vero cum aucto motu vitali, caloreque corporis, per vires incitatas humores ejiciuntur, ut feminis evacuatio in juvenibus post longam abstinentioniam a coitu, tales evacuationes ex Turgescentia fieri dicuntur; atque hi humores ante evacuationem dicuntur Turgere. Ergo ut Turgescentia adsit, duo requiruntur (1) copia humorum major, (2) organum eum humorem continens validum & instigatum, ut conetur contentum ejicere: quare mediocris copia, modo instigantur vires moventes, in Turgescentiam commutatur, ut illi, qui sani mediocrem sanguinis quantitatem habebant, febre acuta correpti, dicuntur orgasmo humorum affecti, quando in iis exspectamus salubrem hæmorrhagiam, vel imperamus sanguinis ductionem. Superius autem Auctor (*Aph.* 22, ix) dixerat, movendum & Evacuandum esse si turgeat, tanquam esset regula generalis in omni Orgasmo; hic autem præcipit Purgandum in valde acutis si materia turgeat, si hoc loco cujuscunque humoris Turgescentia accipiatur, præpostera in acutis ex dato purgante fieret curatio. Quando enim Turgescentia præfagiens largam hæmorrhagiam, vel materia critica disposita ad sudorem turgeat, si daretur purgans, perverteretur salubris hæc instans evacuatio, & ita perversa medelâ æger conduciretur in discrimen vitæ, ducta materia critica ad intestina, ubi evacuari non potest, cum locus debet esse conveniens evacuationi (*Aph.* 2, xii, *Aph.* 21, iii & iv). Ex dictis plane constat, Hipp: intellexisse Turgescentiam in intestinis, vel partibus, quæ se per alvum exonerare possunt, ergo hoc loco intelligit cacochyliam in primis viis hærentem, motu instigato intestinorum agitatam. Quibus autem signis junior medicus hanc turgescentiam dignoscere possit, alio opportuniore loco exponetur. Secundum Auctoris sententiam si concipiamus majorem bonorum vel morbosorum copiam circa intestina, quam potest æger febre acuta correptus sine damno ferre, bina inde mala nascuntur, pressus enim est morbo, atque insuper premitur multitudinem

titudine materiæ conaturque actio vitæ sine successu se ab eo onere liberare, ut inde vires perdat: sed dum ita frustra molitur, qui antea benignus & mitis erat humor, continuata hac agitatione in corruptelam convertitur, ut nunc non solum vitiata quantitate opprimatur, sed & accedente malignitate in pejorem redigatur statum. Recte igitur præcipit, Morari enim in talibus malum est, nam cunctando amittit æger vires, & sibi comparat humorem corruptum, quæ mala prævenirentur dato purgante eodem die invasionis.

LIB. IV. A P H. XI.

121. **Q**uibus tormina, & circa umbilicum dolores, & lumborum dolor, qui neque purgante, neque aliter solvitur, in hydropem siccum firmatur.

I.

Totus hic Aphorismus prognosin exhibet Hydropis siccici non ex rationibus desumptam, sed frequente observatione practica, nam non ita est hæc sententia accipienda, ac si semper post dicta phænomena in ægris detecta, si non cedant purgantibus, vel alio modo solvantur, hydrops siccus esset expectandus; quum non raro in meis ægris observaverim, hujusmodi tormina & dolores perseverantes ægros sine tympanitide ad mortem usque concomitari: sed in quibusdam tamen ante mortem generabatur hydrops siccus. Itaque operæ pretium erit rimari causas, hæc phænomena inducentes, quæ tandem Tympanitidem inferunt.

II. Hipp. tribus utitur vocabulis σπρόφοι, πόνοι, & ἄλγυμα ad phænomena in ventre, circa umbilicum & in lumbis exprimenda, quæ omnia variam & interdum eandem rem designant, scilicet Dolorem, unde nascitur in expositione

C c c

magna

magna difficultas : nam aliud est phænomenon, si diceretur ventris seu intestinorum cruciatus, vel tormina, umbilici dolor, & lumborum affectus, quam si simpliciter diceretur Dolor harum trium partium. Sed quoniam noster Auctor semper brevitati studet, mallem credere, eum voluisse etiam triplicem speciem designare; scilicet intestinorum omnium tormina seu contorsiones; sed circa umbilicum dolorem constantem; atque in lumbis aliquam simul sentiri affectionem.

Hydrops sic-
cus.

III. Acriter disputant Veteres, num Tympanites seu Hydrops siccus exstare possit, nempe an in cavo ventris possit colligi aër, ventrem illum distendens, ut tympanum aëre plenum, unde hic morbus suum accepit nomen, quum nulla detur via, nisi rupto intestino, per quam ire potuisset aër in abdominis cavitatem. Verum hodierna Experimenta satis evincunt per motum automaticum præprimis putredinis, aërem liquoribus adhærentem sine virtute elastica ab iis liberari, & recuperare naturalem expandendi virtutem; unde in corporibus putrescentibus ingens copia aëris continuo eructat. Ergo sufficit, ut in ventris cavo effusus aliquis hæreat humor, qui corruptionem subit.

Quomodo
a tormini-
bus &c.

IV. Dum igitur intestina patientur tormina varioque modo agitentur, notat motum intestinorum vermicularem esse perturbatum ab irritamento instigatum, quod simul dolorem infert circa umbilicum & lumbos constantem. Talis causa constans, non cedens purgantibus, declarat, malum non hære in cavo intestinorum, quia hic hærens simul expelleretur; quare irritamentum hæret vel in lateribus intestinorum vel in mesenterio, quæ pars ultima hic videtur indicari, quum circa umbilicum & ad lumbos sentiuntur dolores. Quare videntur mihi hujusmodi dolores generari a tuberculo mesenterii, constantem inferente dolorem, sed tandem rupto effundente pus vel ichorem in cavum ventris; qui humores pedetentim effusi, stagnantes in loco calido, putrescentes, nullibi inveniunt exitum, tandem abdominis cavitatem aëre ex putredine nato adimplent, sensimque magis distendunt incurabili incremento. Quia vero hujus-
modi

modi tubercula non semper rumpuntur, & fundunt humorem in cavum ventris, etiamsi similia inferant tormina & dolores, non est quoque constans observatio, post dicta tormina semper sequi Tympaniam.

LIB. IV. APH. XII.

122. **Q**uibus alvi sunt *Lienteriæ*, eos hyeme sursum purgare, malum est.

I.

Alimentorum in ventriculo & intestinis præparatorum citiorem ejectionem per alvum nominari *Lienteriam*, <sup>Lienteriæ
Causæ.</sup> aut *Levitatem intestinorum*, superius (Aph. 101, IX) indicavimus. Hujus morbi autem causæ supponunt actionem, &, ut Veteres dixerunt, facultatem concoctricem Ventriculi & Intestinorum valere, id est satis affluere humores saponaceos ad solvendam pinguetudinem assumptorum; & motum peristalticum ad permiscendum valere: sed motum propulsivum versus intestinum rectum esse nimium, cum absorptione per lactea & venas meseraicas parciore. In organis enim chylopoiëticis particularis observatur motus, quo in sanis non solum versus anum propelluntur reliquia, nutritio privata, sed etiam nutrientia præparantur in chylum, nulla arte imitandum, & ducuntur utilia in oscula absorbentia. Hic autem motus sui juris est non dependens a motu generali cordis vel arteriarum, cui tamen interdum consentit, suas proprias mutationes in morbis subit, ut sit vel languidior, vel fortior, vel inversus, vel inordinatus, uti omnes actiones a motu dependentes. Si ergo deficiat absorptio cum motu propellente majore, alimenta assumpta quidem mutantur in chylum, sed confectus ejicitur. Inde quædam inveniuntur medicamenta, confectionem alimentorum promoventia, quæ dicuntur stomachi-

machica, & itidem alia, quæ actionem propellentem augent, uti purgantia. Quare tanquam certum assumi potest, in intestinis varium motum esse admittendum.

Vomitori-
um in his
cur malum?

II. Vomitorium non solum ventriculi motum vermicularem invertere, sed utcumque etiam intestinorum, nemo ignorare potest, quum iterato vomitu interdum quædam intestinorum contenta reddantur, præcipue si exhibemus Elleborum, quo usi sunt Veteres. Si ergo aliquis motu expulsivo validiore ventriculi & intestinorum laborat cum deficiente absorptione, hoc novo addito stimulo, invertente motum, faciet, ut ea, quæ naturali utcumque directione ferrebantur ad anum, nunc inverso ordine truantur sursum & reddantur per vomitum: qui motus inversus multo difficilius potest tolerari ab ægro quam præcedens in Lienteria; atque non promovet chyli absorptionem, sed facit, ut, si adhuc aliquid de confecto per vasa lactea in intestinis absorberetur, protinus, antequam eo veniat, per vomitum reddatur, simulque æger fiat fastidiosus, qualis sensus in nobis semper fit, si motus inversus habeatur in ventriculo.

Cur maxi-
me hyeme.

III. Hyeme vitandum esse Vomitorium, superius (*Aph.* 116, III) demonstravimus, cur autem hoc omnino sit observandum in Lienteria, hoc loco inquirere restat. Non est opus multis verbis hoc adstrui, cum per se pateat, si una indicatio vetat Vomitorium ut est hyems, & accedat altera istam vetans ut est Lienteria, quod gravius fiet malum, si quis contra duas indicationes quam unam exhibeat Vomitorium. Ita egit noster Auctor, ut non solum præcipiat, quæ sunt agenda, sed & moneat, quæ sunt vitanda, quoniam in propria vel aliorum praxi observavit, vomitorium in tali morbo & tempore datum, malum habuisse eventum, ne sequentes medici in eosdem scopulos illidant, & æger ducatur in periculum vitæ. Præceptum est egregium in iis, qui tam promte in quovis morbo & tempore propinant vomitorium, ut prudentiores fiant sedula admonitione nostri Auctoris.

LIB. IV. APH. XIII.

123. **A**D Elleboros qui non facile sursum purgantur, iis ante potionem corpora præhumectanda, copiosiore alimento, & quiete.

I.

UT hodie in malam consuetudinem introductus fuit usus Nicotianæ, ita Hippocratis tempore in Græcia & Ægypto valebat usus Hellebori ad concitandum vomitum: quare Hipp. integrum librum de Elleboro conscripsit, ut fatetur Galenus, qui Galeni tempore desiderabatur, & hodie quoque non existat. Ille mos quum omnino exolevit, & in his Regionibus a nemine, nisi forsitan agyrtis, amplius ad vomendum propinatur, non erit opus sedulo omnes cautelas Elleborismi rimari. Sed solummodo notare volui, qua specie Veteres usi fuere; & deinceps cautiones propositas in generali Vomitoriorum usu, examinare. Duæ species Ellebori Veteribus fuere in usu, nempe Helleborus albus & niger. Et quoniam utitur plurali, forsitan utramque speciem intelligit, maxime autem Helleborum album, quia magis ad vomitum, sed niger ad purgandum adhibebatur. Quoniam vero Helleborus albus & niger non sunt species ejusdem generis, substituerunt Veratrum pro Helleboro albo. Veratrum flore subviridi H. Boerh: 1, 296, 1. Royen. Prodr: 45, 1. Linn: H. Cliff: 468, Tourn: 272. Helleborus albus, flore subviridi. C. B. P. 186. M. H. 3, 385. Elleborum album Matth: Diosc: 2, 559. Sed hodierni Botanici fere omnes nomen Hellebori nigri tenuere. Inde Helleborus niger verus. R. H. 697, 1. Helleborus scapo florifero, subnudo pedunculo communi bipartito. Royen: Prod. 484, 3. Linn: H. Cliff: 227. Helleborus niger, flore roseo H. Boerh: 1, 297, 3. C. B. P. 186, 4, M. H. 3, 359. Veratrum nigrum

Helleborus
quotuplex?

grum primum. Dod: 385. Ejus loco a quibusdam substituitur alia species, quæ vocatur Helleborus niger, hortensis, flore viridi C. B. P. 185. Hæc nomina sufficere reor ad inveniendas has plantas ex hodiernis Botanicis, quarum radicibus usi fuere Veteres.

Ufus.

II. In usu radicis Ellebori quatuor præcepta tradit Auctor. (1) Quid sit faciendum ante exhibitionem (2) Quid tum, dum datur. (3) Deinceps quid inter operandum (4) denique quæ mala ex ejus usu sint observanda; quæ omnia sequentibus aphorismis præcipiuntur. Supponit ergo Auctor satis notam esse eo tempore potionis istius præparationem & dosin.

Exhibitio vomitorii in non facile vomentibus.

III. Dum exhibetur Vomitorium, observandum est, ne detur illi, cui omnia vomitoria obsunt (*Comp.* T. 89, LIV). Sed in quibus permittitur Vomitorium, observare vult Auctor, ut distinguamus inter facile & difficile vomentes. In facile vomentibus non videtur præmittenda præparatio, sed in iis, qui difficile vomunt. Quoniam vero vomitus non est excretio naturalis, ipsi ægri, nam sani non egent Medicina, interdum nesciunt, num facile vel difficile ab emetico dato vomant, quare tentandum esset alio leviori vomitorio, num talis æger facile vel difficile vomat. Si ergo constat vel ex ægri relatione, vel experimentis, ægrum difficile vomere, tunc monet, corpus esse præparandum ad vomitum.

Præparatio ante exhibitionem vomitorii.

IV. Hujusmodi in corporibus si vomitus per Elleborum sit concitandus, monet, ea corpora esse præhumectanda, simulque suppeditat auxilia humectantia, nempe alimenta copiosiora & quietem. Nos vero (in *Comp.* T. 89, LVII) Præcepimus resolutionem materiæ in ventriculo contentæ, & ad mala præveniendæ venæ sectionem. Etiam si nostræ cautiones non sint eædem, nihil tamen est, quod repugnat. Noster enim scopus est vomitu rejicere aliena & morbosa contenta ex ventriculo, & prævenire mala, quæ ex violentia vomitus nasci potuere. Hipp: autem indulget malæ consuetudini; etiam si nihil reddi debeat per vomitum, sed reddit modum, quo ægri difficile aliter vomentes per Elleborum,

borum, commodius vomunt. Præcipit corpora præhume-
ctanda esse, quod ad scopum suum recte monet, nam si
ventriculus admodum est humectatus, majorem copiam vo-
mitu reddere potest, & ventriculus humectatus, quia laxi-
or, instigatus non tanta vi convellitur, ut omnes partes
laxiores. Corpora autem præhumectari copiosiore alimento
& quiete, paucis videndum.

V. Nostrum corpus tali est virtute creatum, ut actione
sua se ipsum deterat, & ex assumptis alimentis conficiat
succum, qui amissum resarciat, ad hoc faciendum corpus
sanum nullo alio eget auxilio. Illa autem actio præpa-
rans, & abalienatorum expulsionem faciens non ita est in-
finita, ut quamcumque copiam alimentorum ingestam su-
bigere possit & expellere: si ergo copiosiora alimenta in-
geruntur, corpus istud oneratur multis crudis humoribus,
partim non subactis, partim spontanea corruptione degene-
ratis. Inde major copia humidi tali in corpore est collecta
quam in sanis requiritur, seu ut noster Auctor loquitur,
istud corpus est præhumectatum.

Alimenta
copiosiora
humectare.

VI. Quo præcedens actio præparans minus exercetur,
eo minus alimenta subiguntur & expelluntur inutilia; seu
quod idem est, quo minus exercetur hæc actio, eo major de
assumptis alimentis copia colligitur in corpore, & quoniam
alimenta omnia, quæ lactea vasa intrant, sunt humida, tale
corpus, præprimis si copiosiore simul utitur alimento, præ-
humectatur. Ergo id esset duntaxat hoc loco probandum,
in quiescentibus debiliorem fieri actionem. Hoc autem pu-
to tam planum ut cuivis pateat, cum in quiescentibus solo
motu vitali hæc actio sit absolvenda, dum vero in exer-
citiis non solum fiat major detritus & expulsio motu mus-
culari, verum in iisdem quoque circulatio sanguinis & res-
piratio fit citior, ut constat ex calore corporis, pulsu fre-
quentiore & pleniore, atque ex respiratione celeriore &
profundiore,

Quies hu-
mectat.

VII. Tandem ad conclusionem veniens statuit Auctor,
In corpore ita præhumectato Vomitorium dandum esse, at-
que hoc non sine gravi ratione. (1) Humectata illa cor-
pora

In præhu-
mectato
corpore vo-
mitorium
dandum.

pora vomitorii actione multum humidi evacuare possunt, & quod magis est, eadem evacuatione ipsis restituitur æquilibrium, quia abundabat humidum, si vero antea fuisset datum vomitorium, eadem evacuatio fecisset destructionem æquilibræ, tollendo aliquid de mediocri quantitate humorum. Nunc vero illa corpora crudis onusta & humiditate scatentia levamen percipiunt a vomitorii exhibitione, sed præstantius foret illam abundantiam sibi non conciliare, quam natam vehementi vomitorio tollere. Quia vero ægri sentiebant ex mala consuetudine post ingluviem & desidiam summum ex Vomitorio levamen, istud medicamenti genus multis encomiis celebrarunt. (2) Corpora quiete & pleniore cibo enervata a vomitorii stimulo minus exagitabantur, quam quorum vires magis valebant.

LIB. IV. APH. XIV.

124. **P**Oto Elleboro, corpus movendum potius, quam somno tradendum, aut quieti. Nam vel navigatio indicat motione turbari corpora.

I.

Quid faciendum post assumptum vomitorium?

AGendi regulam in altero temporis articulo hoc loco præcipit Auctor, quid scilicet sit agendum postquam vomitorium fuerit assumptum, dum adhuc non sequatur vomitus. Inter assumptum vomitorium & vomitum sequentem aliquod tempus, unius vel alterius horæ, præterlabitur interdum; quid ergo in hoc tempore sit agendum, docet, nempe corpus potius esse movendum, quam somno aut quieti tradendum.

Cur corpus movendum?

II. Non præcipit Auctor corpus movendum esse, sed potius quam ut indulgeat quieti & somno, quia interdum satis cito & valide operatur Helleborus, ut non requiratur corporis agitatio ad vomitum promovendum: sed dum Vomitorium est assumptum, & adhucdum tempus non est, ut suam

suam operationem exequatur, suadet non sine ratione corpus potius movendum esse. Nam scopus est magnam copiam humorum per vomitum elicere, quod fieri non potest, si corpus tradatur quieti vel somno, in quibus compescitur ille motus, quo ducuntur humores ad ventriculum, ut vomitu ejiciantur; imo per hanc quietem inductam compesci potuisset vomitus, ut frustra fuisset datum Vomitorium. Sed potius corpus movendum, quo augetur Vomitorii actio, & majore copia ad ventriculum ducta, copiosior vomitus fieri potest. Non constat autem inter Commentatores, quo tempore a vomitorio sumto corpus sit movendum, an statim post assumptionem vomitorii, vel post aliquot horas. Si vero attendamus ad scopum, nempe copiosiores evacuationem per vomitum, facile est invenire istud tempus. Si enim statim ab assumptione moveatur corpus, ut ejiciatur Vomitorium assumptum, quia parva inducta est commotio, post ablatum Vomitorium brevi tempore compescitur motus inordinatus inductus: sed si per horam unam vel alteram relictum sit in ventriculo vomitorium, continuata agitatio tantum motum inversum induxit, qui tam cito compesci non potest, & qui disposuit organa, ut ad ventriculum majorem copiam humorum ducant, & ita plus per idem vomitorium evacuari potest. Quare non statim movendum corpus, neque tam diu expectandum, donec virtus vomitorii omnino evanuerit. *Potius* dicit, quoniam interdum per Elleborum satis valida commotio inducitur, ut non sit necesse vomitum promovere motu corporis.

III. Ut Auctor probet generali observatione & omnibus nota, motum promovere vomitum, adducit navigationem, qua fere omnes homines redduntur nauseosi & tandem vomituri. Galenus dicit in quibusdam manuscriptis inveniri *ναυτία nausea*, non vero *ναυτιλία navigatio*. Tunc esset sensus talis, *nam vel nausea indicat motione turbari corpora*. Quia vero sensus magis planus est legere *Navigatio* quam *nausea*, vulgatam lectionem esse retinendam puto. Quomodo autem Navigatione generatur in multis nausea & vomitus, non constat inter Auctores, quidam hoc deri-

Navigatio
Cur nause-
am & vom-
itum inducit?

vant a terrore & timore navigationis, alii a falsedine aquæ marinæ, alii ex odore speciali. Sed quamvis illæ fuissent assignatæ causæ veræ, non tamen magis illa constaret veritas, & assignatio hæc nihil lucis præberet huic generali observationi. Comperimur quidem non solum navigationem, sed etiam vectionem præprimis adverso corpore, atque actionem in gyrum, omnemque insolitum motum, ut est oscillatio, multis in hominibus generare nauseam & vomitum: sed quando illa corpora diu tali motu agitantur, tandem ita assuescunt, ut in ipsis neque nausea neque vomitus ex navigatione generetur. Est ergo nausea & vomitus navigantium species regulæ generalis, qua constat, corpora fere omnia motu insolito agitata incidere in motum inversum motus vermicularis ventriculi & intestinorum. Adeoque hæc observatio nihil aliud est, quam detectio consensus inter concussionem corporis & motum particularem Ventriculi & Intestinorum, quo experimur, quali lege, & quali consensu Deus nostrum corpus creavit, nam hoc ex legibus Mechanicis in rebus mortuis deducere velle, frustra omnem impenderemus operam. Egregia autem est observatio legis naturalis, quum lege hac uti possimus, si velimus turbatum motum vermicularem inducere, quemadmodum fecit Auctor in hoc Aphorismo.

LIB. IV. APH. xv.

125. **Q**uando vis magis ducere Elleborum, moveto corpus. Quando vero cessare, somnum facito, & non moveto.

I.

Post datum vomitorium evenire potest, ut evacuatio non respondeat voto, ut scilicet æger semel aut bis vomuerit, sed non satis evacuaverit: vel quod nimis diu continuetur vomitus, ut inde malum sit expectandum
per

per supervomitum. In utroque casu præbet Auctor regulam. Si Elleborus vel quodvis aliud vomitorium non satis operatur, corpus est movendum. Si vero supervomitum faciat, somnus est inducendus & corpus non movendum, atque his auxiliis compescitur nimius vomitus. Scopus Hippocratis in hoc loco non est omnia auxilia vomitum promoventia & sistentia, sed solummodo ea, quæ consistunt in corporis motu & quiete proponere. Et ut imitemur Auctorem, sola illa auxilia examinaturi sumus, reliqua vero a nobis tradita sunt. (*Comp. T. 89, LVIII. & LX.*)

II. Quum in superioribus observavimus inter motum corporis & motum vermicularem ventriculi locatum esse consensum, uti inter multas quoque alias corporis actiones, non est mirandum, quod agitatione unius promoveatur quoque altera actio. Si ergo Helleborus vel quodvis aliud vomitorium induxit ventriculi motum inversum, ille motus debilior proritari potest, si moveamus istud organum, cujus motui consentit motus vermicularis ventriculi. Inde si in assumpto vomitorio non satis movetur ventriculus, ille motus est insuper concitandus, cui ventriculus consentit. Quoniam autem non quivis corporis motus æquali modo turbat ventriculi motum, ex corporis motu is est eligendus, quem experientia docuit, motum ventriculi turbare, ut est Vectio adversa, oscillatio, actio in gyrum, navigatio, illeque motus continuandus, donec satis per vomitum fuerit ejectum.

Motus
promovet
vomitum.

III. Quo penitus perscrutamur corporis actiones, eo plura in viventibus detegimus miranda Dei opera, quæ non nisi propriis suis phænomenis patiuntur detegi, nulla arte imitanda; nisi enim constanti observatione constaret, inter motum animale & motum particularem vermicularem esse quendam consensum, nullus Mechanicus ex detectis suis legibus motus, aut anatomicus ex inventa fabrica valeret hunc mirabilem consensum eruere, sed per inventa in viventibus experimur in corporibus æque constantem hujus rei esse legem, quam quæ leges naturæ in mortuis rebus deteguntur, in quibus non amplius inquirimus, unde proveniant,

Quies &
somnia
compescunt
vomitum.

sed tantum qualem ordinem servant: ita quoque in viventibus est faciendum. Invenimus inter ventriculi motum & corporis agitationem quendam esse consensum. Verum hoc non solum, sed inter motum ventriculi & organa sensus, imo inter animi etiam pathemata, ut conspectu circumgyrationis moveatur primo vertigo dein nausea & vomitus; atque ex auditu vel visu, imo sola cogitatione rei nauseosæ nobis quoque formetur nausea & vomitus. Hic autem consensus non omnibus hominibus est æque valens, quibusdam enim facile, aliis autem minus ex dictis commovetur ventriculus. Hac lege generali scite novit Auctor noster uti in Medicamentorum operationibus, dum præcipit, si velis cohibere nimiam Ellebori operationem, corpus est componendum ad quietem, ne corporis agitatione, quæ est in nostra potestate, commoveatur simul motus ventriculi. Atque inducendus est *Somnus*, ut ita adimatur omnis consensus per organa sensuum & per animi pathemata, quæ in somno perfecto silent. Quia vero somnus non dependet ab arbitrio nostro, uti corporis motus & quies, igitur si sponte non oboritur in supervomitu, hypnoticis est conciliandus. Inde est, quod hypnotica toties in quovis vomitu & alvi fluxu tantis encomiis celebrantur, quoniam compescunt motum inordinatum ventriculi & intestinorum: an vero hoc faciant immediate, ut inferant somnum, an vero per consensum, quia sopiunt sensus, hucusque determinare non valeo. Id autem inde elicere possumus, Hypnotica egregia esse auxilia, si post ablationem stimuli vomitivi remanserit in ventriculo motus perturbatus, nauseam & vomitum faciens: sed si remanserit irritans, hypnoticum datum, inhibens evacuationem, ut plurimum augebit malum. Si ergo Elleborus supervomitum faciat, antequam inducatur somnus per hypnotica, ventriculus est eluendus, ne quidquam de Helleboro remaneat.

LIB. IV. APH. XVI.

126. **H**elleborus periculosus est sanas carnes habentibus: Convulsionem enim inducit.

I.

Generalem regulam Medicationis in sanis corporibus (*Aph. 62.*) nunc specialem facit, & exponit in usu Ellebori; huic addit facile tunc inde fieri posse Convulsionem. Aliqua tamen status differentia notanda venit, cum in præcedente dixerat, *qui sana habent corpora*, hic autem *qui sanas habent carnes*. Ex differentia hac desumi potest, quod in præcedente egerat de corpore perfecte sano, at in hoc loco tam in corpore perfecte sano, quam in eo, quod morbo quodam particulari laborat, non habens malum & morbosum humorem per totum corpus dispersum. In utroque itaque statu præcipit Hellebori usum esse periculosum, atque addit rationem, quia convulsionem inducit.

II. Hippocratem hic & in antecedentibus intellexisse Helleborum album nullus erit, qui dubitat, si modo rimatur vehementes operationes, quas Helleboro tribuit, qualem virulentiam in Helleboro nigro non invenimus. Hujus enim Hellebori albi tanta est deleteria vis, ut quædam gentes ejus succo intoxicare potuerint tela. Quare admodum mirandum, quod hoc medicamenti seu potius veneni genus apud Veteres in tam frequenti fuerit usu, quum, si modo paulo largiori dosi sumeretur, vel ab homine non assueto, vel difficile vomente, vel qui carnes habet sanas, in discrimen vitæ conjiciatur. Tantum valent insana consuetudo & mores inversi, ut non dubitarint lubentes volentesque summum subire vitæ periculum, si quis hodie faceret, imprudentiæ pœna esset plectendus. Sed quid dicam de mala consuetudine Veterum, rovi agyrtam, qui gloriabatur se omnes febres quartanas profligasse arsenico & mercurio sublima-

Helleborus
cur sanas
carnes ha-
bentibus
periculosus

to in aqua soluto propinato, sed si recordor eorum, qui hoc venenum assumerunt, quidam fuere curati, hoc fateor, sed plures post ingentia tormina morte sequente a febre quoque fuere liberati. Exhorrescimus enim talia audire, quæ interdum ab agyrtis peraguntur, si vero huic perversæ medicationi esset imposita pœna, haud credo istos tam facile periclitari multorum hominum vitam. Recte igitur & cum gravi ratione monet noster Auctor, postquam cautelas Helleborisini proposuerat, in hoc medicamento, ita usu recepto, summam deleteriam latitare virulentiam, ut si assumatur, quibus carnes sunt sanæ, periculum faciat Convulsionis. Quamobrem majus periculum convulsionis his, quam quibus carnes alieno succo sunt plenæ, ex iis quæ supra recensuimus facile liquere arbitror. Quæ enim corpora carnem habent sanam, per nullum evacuans a malo succo, qui non adest, possunt liberari, ut demonstravimus (*Aph.* 62, III). Quæ autem corpora morbo particulari laborant, malus ille humor per vehementem illam evacuationem inde elicitur, duciturque ad interiora & ita ad loca periculosiora, & talia corpora per vehementem vomitum non liberantur. Ergo in utroque casu periculum intenditur: propterea usus Hellebori & omnium Vomitoriorum in dictis corporibus nunquam est concedendus.

Helleborus
Cui inducit
Convulsio-
nem?

III. Per spasmus in hoc loco intelligi alternam violentam musculorum motus animalis contractionem nemo ambigere potest. Eum motum muscularem voluntarium ab influxu spirituum, imperio mentis in sanis hominibus copiosius ad istos musculos fluentium, derivari, ex physiologicis assumo, quia nimis copiosum foret hoc loco adstruere. Si igitur per aliquam causam morbosam iidem spiritus copiosius & majori impetu ad dictos musculos ferantur, sequetur constrictio, sed violentior plerumque quam ex voluntate. Quærenda ergo est causa hunc majorem spirituum fluxum faciens, & dein videndum, an ea dependeat ab Elleboro. Dum in nobis inordinate & sursum versus incipit fieri motus vermicularis ventriculi, generatur in nobis

bis nausæ sensus: ille motus si validior fiat, musculos voluntarios ventris in consensum trahit, ut sua constrictione cum motu inverso ventriculi ejiciantur contenta ventriculi sursum per os. Ergo patet inter motum inordinatum ventriculi & motum voluntarium musculorum abdominis tantum valere consensum, ut homo mente constans, si urgeat vomendi conatus, non possit horum musculorum motum convulsivum cohibere. Si vero ille motus ventriculi diu continuetur & sensim reddatur validior, non est mirum, tandem quoque omnem motum voluntarium in consensum trahi. Inde reliqua acria medicamenta, quæ non ita exigunt ventriculi motum inversum, minus quoque solent inferre Convulsiones. Propterea adduxit Auctor Convulsionem, ut demonstret periculum, quare illa Convulsio non est levis censenda, quod infra faciet (Lib. v. Aph. 1) Si Medicus in hujusmodi casu vocaretur, non sufficeret dicere periculosum esse, sed & ejus exigeretur auxilium. Omnia decantata antispasmodica nullius essent usus, sed rejecto per vomitum Elleboro & eluto ventriculo, compescendus esset inordinatus ventriculi motus per acida grata & hypnotica, quam regulam deduximus ex præcedentibus (Aph. 145, III). Quo compescito motu inordinato ventriculi, sensim etiam cessabit Convulsio totius corporis, nisi prius extinguatur æger.

LIB. IV. A P H. XVII.

127. **N**on febricitanti, cibi fastidium, oris ventriculi morsus, & tenebriosa vertigo, & os amarescens, sursum purgante opus esse, indicat.

I.

Si quis sit in cavo ventriculi corruptus & vitiosus humor, quem Cacochylia vocant, omnium commodissime is per superiora evacuari potest, quia via est brevissima, Cacochylia
exigit vomitorium.
nam

nam si transeat per intestina, sua acrimonia potuisset inferre ventris tormina, & ob longiorem moram sensim reddi acrior, atque forsan pars tenuior corrupta liquefcens absorbetur, atque inficiet totam massam. Dandum ergo Vomitorium, sed an sit Elleborus exhibendus, quia superius de eo egit, ambigo; Si enim voluisset Elleborum, continuaret Auctor sermonem, & non simpliciter dixisset, sursum purgante opus est, sed helleboro opus est. Atque ex contextu quoque constare potest, Auctorem innuere aliud genus vomitorii, quum in priori dixerat, periculosum esse Elleborum sanas carnes habentibus, & incipit hunc Aph. non febricitanti, quasi vellet indicare hominem sana carne præditum, sed particulari ventriculi affectione laborantem. Denique expedit in cacochylia, ut non solum fiat vomitus, sed ut inter vomendum ventriculus simul eluatur, ut ita liberetur ab omni alieno contento. Ergo in Cacochylia expedit mitius dare vomitorium cum copiosiore potatione. Quia vero medicum oportet scire, num in ventriculo latitet cacochylia, quædam debet habere signa quibus hoc colligere valet, priusquam vomitorium propinat; Nam si loco cacochylia hæreret in lateribus ventriculi Inflammatio aut Erysipelas, aut ulcus; vel si circa ventricularum orirentur affectiones symptomaticæ a febre per totum corpus, a vomitorio dato irritarentur crabrones. Hinc summo iudicio tot collegit phænomena, quæ collecta Cacochyliam commonstrant, quorum quædam etiam ex lateribus ventriculi affectis, vel a generali febre quoque produci potuere. Hæc ergo phænomena seorsim sunt examinanda, ut in singulis constet, ea provenire posse ex Cacochylia, sed quædam inter hæc esse, quæ non possunt ex ventriculi lateribus affectis provenire, aut ex febre.

Cacochyliz
signum fa-
stidium.

II. Fastidium seu *ἀποστία* non solum denotat abstinentiam a cibo, sed quando simul cibum averfatur, in quo differt ab inappetentia, qua ægri quidem non appetunt, sed tamen non sunt simul fastidiosi & cibum averfantes: hanc invenimus differentiam, si ventriculus vario humore alieno sit affectus; nam cujus ventriculus cibo est plenus,

aut

aut in quo tanta hæret pituitæ copia, ut percipere non possit sensum famis, talis laborat inappetentia: si vero in fibris ventriculi levis motus inversus simul habeatur, ut sit initium nausæ, talis homo fastidiosus est. Hoc phænomenon generatur, si aliquid corrupti aut putrefacti hæret in ventriculo, nam putrefacta assumpta statim tale fastidium inferunt. Potest etiam generari ex inordinato motu febrili ventriculi motum perturbante, unde hodie adhuc habentur febres fastidiosæ. Interdum leviter affecta ventriculi latera simile fastidium inferunt. Quare solum fastidium non declarat Cacochyliam. Inde addit Auctor in non febricitantibus, ut demonstret fastidium non fieri ex febre; & addit oris amaritudinem, quæ non fit ex lateribus ventriculi affectis.

III. In textu habetur καρδιαγῆς, quod secundum Galeni interpretationem vertitur, Cordis dolor, seu morsus cordis, id est oris ventriculi, nam hoc quoque Veteres Cor appellabant. Ille dolor seu morsus a multis causis potest oriri, quod hic nimis longum foret recensere. Oritur symptomatice ex febre vel ex ventriculi lateribus affectis, vel ab acrimonia intus hærente, quare admodum incertum est cacochyliæ signum; sed si absit febris, & cetera adjungantur signa, tunc unum est ex signis cacochyliæ rodentis; quod signum distinguit fastidium a viscido vel pituita insipida, ut loquuntur veteres.

Oris ventriculi morsus.

IV. Quoniam integram Dissertationem de *Vertigine* publici juris fecimus, non erit opus multis hunc morbum exponere, contenti erimus observare, quod Auctor hic intelligat *Tenebricosam vertiginem*, id est, quod non solum æger videat omnia ante oculos in gyrum agi, sed ita videntur obscurari & obfuscarì oculi, ut visus exstinguatur. Hoc phænomenon ex cacochylià ad oculos delata deducere vellet, nimis absurdum esset, cum ipsi oculi non obfuscentur, sed ita appareant ipsis ægris, quia potentia visus minuitur. Si Cacochylià sit in ventriculo fastidium faciens commovendo inordinate ventriculum, hic motus inordinatus per consensum turbat visum. Tantus enim consensus inter

Tenebricosam Vertigo.

ventriculum & oculos, ut vicissim operentur & afficiant; ita ex cacochylia generatur scotomos, & conspectus rerum circumactarum inducit fastidium, nauseam & vomitum. Ergo scotomos in hoc loco duntaxat declarat ventriculum motu inordinato agitari, dum cetera signa probent, eam inordinatam commotionem produci ex cacochylia.

Oris amaritudo.

V. Inter præcipua non solum signa Cacochyliæ, sed & exhibentia naturam contentorum ventriculi est oris amaritudo. Ille enim sapor amarus in ore notat Cacochyliam amaritudinem habere, qualis sapor observatur in bile corrupta & pinguedine putrefacta. Et quoniam pingue hoc natura levius supernatat, facile, si ructus eduntur, una assurgit & ita os suo amarore inficit; vel forsan inverso œsophagi motu in fastidiosis & nauseosis, quædam ejus portio truditur versus os.

VI. Constat ergo, in ventriculo contineri humorem alienum, pinguedinosum & corruptum, ventriculum pronum esse ad faciendum motum inversum pro vomitu, inde summo jure dicit Auctor, hæc signa indicare purgationem per superiora. Nam si maneat diutius, ejus humoris augebitur corruptio, absorptus humor inficeret totum corpus, pulsus per intestina multa tormina inferret, & forsan subsisteret huc illucve in tam longa via.

LIB. IV. APH. XVIII.

128. **S**upra septum transversum dolores, qui purgatione egent, sursum purgante opus esse, indicant. Qui vero infra, deorsum.

I.

Agit hic Aph. de generali evacuatione, vel per superiora, vel per inferiora, in doloribus evacuatione egentibus, qui occupant loca supra vel infra Diaphragma.

phragma confita. Sed quoniam in textu habetur τῶν φρενῶν, quæ vox aliquam dubitationem inducit, & quia disputari potest, quænam intelligantur evacuationes, hæc sententia prolata ab Auctore strictius erit exponenda.

II. Etiam si ex Lexicis constat φρήν denotare mentem, intelligentiam, aut sapientiam, φρένες autem ab Hippocrate accipitur pro septo transverso, quod ventrem inferiorem a pectore sepit, hodie Diaphragma appellatum, habens principium a lumborum vertebris octo ut plurimum capitibus; ascendunt hæc capita sensim carnosiora facta junguntur ante spinam, relicto spatio semilunari pro transitu Aortæ, venæ azygos, ductus chyli ferri & nervi. Media pars convexa versus pectus tendinea est & vocatur speculum. Juxta spinam versus sinistrum latus habet rimam, transmittentem Oesophagum; ad alterum latus in diaphragmate apertura est magis ovata pro transitu venæ cavæ. In ambitu diaphragma nexum est costis & sterno. Vasa omnia per Diaphragma distributa, ad motum & nutritionem vocantur Phrenica: nervus ex pari II, III & IV. colli oritur, unde forsitan magis ejus affectiones consentiunt menti, quam morbi aliarum partium.

Diaphragma quid sit.

III. Determinandæ nunc sunt partes dolentes, quæ purgandæ sunt sursum vel deorsum. Omnes partes, dicit, supra Diaphragma dolentes indicantes purgationes, sursum sunt purgandæ. Quia vero Diaphragma sursum ita est convexum, ut altitudinem papillæ mammæ interdum superet, facile potest Medicus in assignatione doloris externa falli, num dolor sit in cavo ventris inferioris, num vero in pectore ipso supra Diaphragma. Quare non pauci fuere, etiam ex senioribus Medicis, qui dolores in partibus ventris inferioris, sub hypochondriis hærentibus, qui interdum ob consensum protenduntur usque ad jugulum, pro dolore pleuritico habuere, & inde putarunt pleuritidem alvi fluxu sanari. Partes superiores seu supra Diaphragma in tria genera distingui possunt. (1) In cavum pectoris, ubi est pleura & mediastinum, nam pulmo & cor si afficiantur, potius inducunt anxietatem quam dolorem. (2) Collum, in

Quæ partes superiores & inferiores.

quo larynx & pharynx atque fauces. (3) Caput, in quo partes encephali & organa sensuum corripì possunt. Huc etiam conferri possunt brachia. Partes autem Inferiores in ventrem, qui varias continet partes & pedes distingui possunt. In his jam diversis partibus dolentibus imperat purgationem. Sursum & Deorsum, quod paucis videbimus.

Quæ sit
purgatio
sursum.

IV. Solebant Veteres Evacuationem per vomitum & per Expectorationem vocare Evacuationem sursum, ut hoc passim occurrit in peripneumonia, pleuritide, & empyemate. Hic autem ex nexu cum præcedentibus videtur Auctor intelligere vomitum & præcipue per Elleborum, in qua sententia quoque fere omnes ejus sunt Commentatores, qui multis verbis conantur hanc tueri sententiam, quam jamjam sumus examinaturi.

An vomito-
rium dan-
dum in do-
loribus su-
pra dia-
phragma?

V. Omnes morbi inflammatorii & purulenti pulmonis, pleuræ, faucium, capitis, egent evacuatione sursum, in his vero omnibus si daretur vomitorium, & præcipue ex Helleboro fortissimo, induceretur æger in summum periculum: quam ob rem credere haud possum, Hippocratem in ea fuisse sententia, vomitorium Helleborinum dandum esse in dictis morbis, ut ejus Commentatores ex nexu Aphorismorum deducere voluerent, quum ipse Auctor in instante & confirmata phthisi, (*Aph.* 118) quæ est morbus supra diaphragma, evacuatione egens, omnino vetat vomitorium. Neque quisquam hodie auderet phrenitide, ophthalmia, vel angina inflammatoria laboranti dare vomitorium. Sed si quamcumque intelligamus evacuationem, tunc omnino convenit in doloribus supra Diaphragma, sed præcipue in pectore hærentibus, qui egent evacuatione, per superiora evacuare: & qui dolores in ventre hærent, per inferiora. Vice versa enim si moliamur evacuationem, neque facile procedit, & si fiat, aggravare solet ægrum. Hippocratis sententia absolute posita vera est & praxi conveniens, sed si ad præcedentes Aphorismos connectitur, multas haberet difficultates.

LIB. IV. APH. XIX.

129. **Q**ui in purgantium potionibus non sitiunt dum purgantur, non cessant, priusquam sitiverint.

I.

Sitim speciem sensus naturalis esse in nobis concitatam. Quomodo sitis a purgante?
 ex deficiente humiditate confluente ad os, ut moneamur defectum esse humidi in corpore, olim in particulari *Exercitatione de siti* exposui. Ubi simul observavi, inultas quoque alias minus naturales esse causas sitim excitantes. Inter has est copiosior alvi evacuatio multum humidi tollens e corpore: adeo ut naturale sit ex generali regula post assumptam potionem purgantem sitire. Experientia tamen docet, quædam purgantia nullam sitim inferre, quod huic regulæ obstare videtur. Sed sciendum est, Medicamenta raro unicam simplicem possidere virtutem, plerumque enim variæ unitæ in unico simplici inveniuntur, ut quædam ex purgantibus simul refrigerent, calefaciant, resolvant, adstringant, quæ virtus purganti juncta potest facere, ut unum purgans resolvendo & refrigerando simul minuat sitim, aliud vero siccando & forsan speciali virtute sitim excitante, sitim intolerabilem inferat, quæ non ita a virtute purgante, quam quadam alia adjuncta qualitate dependet. Quoniam Auctor suo tempore usus fuit Helleboro nigro ad alvum ducendam, ex frequenti hujus medicamenti usu didicit, post potionem hanc, alvi evacuationem non subsistere, priusquam sitiverit æger, quod non ita est recedens a communi lege naturæ. Quippe quamdiu alvus ex purgante dato fluit, requiritur, ut excretio humorum in cavum intestinorum sit major absorptione, quam non solum ex intestinorum cavitate per purgans eliminantur humores, qui raro tanta copia hic inveniuntur collecti, verum etiam ex corpore reliquo hic secreti & de-

positi. Quamdiu igitur continuatur motus determinans ad excretionem in vasculis intestinorum, tamdiu etiam durat alvi fluxus, ut tandem etiam fiat hypercatharsis; si vero ille motus cessat, nihil amplius deponitur, ut experimur ex hypnotico dato, compescente solummodo eum motum inordinatum inductum, qui alvi fluxum produxit. Eo igitur magis sistitur, si motus excretorius convertatur in motum absorbentem: unde toties compescitur alvi fluxus anodyno diaphoretico vel sudorifero, mutante directionem humorum ab intestinis ad cutim. Inter signa autem mutationis hujus directionis excellit sitis, nam quamdiu humores copiosiores deponuntur ad chyli vias, inter quos etiam est saliva, tamdiu etiam servatur os humectatum, nullusque concitatur sitis sensus; sed si ille motus convertatur in absorptionem, saliva, utique reliqui humores, non amplius confluit in chyli organa, inde os salivæ confluxu privatum exarescit, quam exarescentiam demonstravimus esse sitis causam naturalem.

LIB. IV. APH. XX.

130. **N**on febricitantibus si fiat tormen, & genuum gravitas, & lumborum dolor, deorsum purgante opus esse indicat.

I.

*Tacochylia
intestino-
rum pur-
gante eget.*

Consuetus est Hippocrates magis ex phænomenis in ægris detectis imperare medicamenta, quam ex designatis causis, quoniam detexit in praxi apparentibus istis signis, profuisse vel nocuisse data medicamina, quod egregie est praxin exercentibus, quoniam non debent ratiocinari, num ex inventis in ægris symptomatibus hæc vel illa causa lateat purgationem indicans. Quia vero multo facilius memoriæ mandari potest, si primo proferantur omnes

nes notiones cacochyliae, & dein dicatur, in cacochylia convenire purgans, quam si toties repetantur phaenomena, utile esse ratus sum assignata phaenomena exagitare, ut pateat, ea provenire ex Cacochylia intestinorum, ut feci supra (Aph. 127) pro vomitorio in Cacochylia ventriculi Per Cacochyliam hic intelligo humorem crudum, vel indigestum, vel spontanea corruptione affectum, praepremis haerentem in cavo intestinorum vel vasis Mesentericis: vasa autem lactea valvulis instructa si quid contineant, remittere nequeunt versus intestina; sed vasa tam arteriosa quam venosa succo alieno plena per oscula patentia in papillis intestinorum, contentum humorem in cavum intestinorum deponere possunt, ut evacuetur. Talis crudus in his partibus haerens humor omnium commodissime per purgans ejici potest & debet, nam purgans, ut notavimus, non solum auget motum intestinorum, ut contenta ejiciat, sed etiam auget humorum directionem versus intestina. Atque debet dari, quoniam corruptus ille humor sensim deteriorem inducit corruptelam; difficile potest ejici ex intestinis per vomitum; & vasis absorptus totam massam inquinat.

II. Quid designet Ventris Tormen, indicavimus, (Aph. 121): istud autem oriri posse ex cacochylia & egere purgante, hoc loco est adstruendum. Quivis alienus humor contentus in quadam cavitate humida & calida, praecipue si simul accedere potest aer, per insitum suum motum naturalem corrumpi incipit, tam in corpore nostro, modo non cohibeatur corruptela per actionem vitae, quam extra corpus in simili loco calido & humido. Post peractam illam corruptelam duo inveniuntur, nempe magna nata est copia aeris, qui per actionem putredinis est liberatus & ita elasticus factus: atque relictus humor, qui etiam si antea erat mitis, nunc invenitur acris, & quo diutius agitur, eo redditur acrior. Hoc acre stimulans intestina, vel & vasa mesenterii, motum inordinatum excitat cum dolore, & quia adest simul multum aeris in intestinis, is inordinate propulsus per inaequalem intestinorum internam
super-

Ventris tormen
ina ex ca-
cochylia.

superficiem sonum format in ventre. Hæc tria juncta, Dolor, Motus inæqualis intestinorum, & Murmura ventris, vocantur Tormina. Quæ medicamenta ergo liberant Intestina & Mesenterii vasa ab eo humore acri, curant quoque Tormina, qualia sunt Purgantia; sed ut constet, hæc Tormina oriri ex Cacochyliā, cetera signa adesse debent cum absentia febris, quum Tormina sola ex variis possint oriri causis, ut passim demonstravimus, quæ usum purgantis vetarent.

Genuum
gravitas ex
Cacochyliā.

III. Duplex est genus gravitatis, alterum ex copia, alterum ex virium defectu. Quid ex his sit intelligendum, clare patet, quia nulla mentio fit tumoris, qui semper jungitur copię, in hoc loco diminuta potentia movendi est intelligenda. At vero omnia corpora debilitata, cacochylica, scorbutica conqueruntur de genuum gravitate, quare incertum esset indicium cacochyliæ, nisi cetera adjuncta essent signa, quæ judicium firmant. Quomodo autem ex Cacochyliā generari possit Genuum gravitas, operæ pretium est rimari. Dum primæ viæ crudo scatent, reliquum corpus utili & præparato chylo privatum redditur lassum & debilitatum; sed præprimis muscoli, qui movent genua, quoniam tollere debent totum corporis pondus, & quia nervi ad mesenterium tendentes & ad hos musculos ex eadem fere veniunt origine, ut ita mesenterii & intestinorum nervi cacochyliā in sua actione oppressi, reliquos ad femora tendentes, magis quam alios in consensum trahant. Nisi demonstratum fuisset, genuum gravitatem generari ex cacochyliā, & eam tolli posse purgante, paradoxum videretur, aliquem velle purgante mederi genuum gravitati, quod nunc vero satis plane constat.

Lumborum
dolor ex
Cacochyliā.

IV. Ut præcedentia phænomena ex variis nascuntur causis, ita etiam lumborum dolor, nam non solum variæ causæ dolorem inferentes lumbos infestant, sed etiam partes variæ ad lumbos locatæ, vel lumbos in consensum trahentes, diversas species doloris lumborum inferunt: ut sæpe exercitatissimi in arte rimari nequeant, qualis sit doloris causa, & qui locus affectus. Si vero Lumborum dolor conjuncta
habet

habet annumerata signa, ut plurimum ex cacochylia mesenterii & intestinorum provenit, quæ ibidem colligitur, quoniam motus vermicularis debilior non valens præparare & digerere assumpta, permittit hic colligi: atque collecta cacochylia, suo pondere tendens mesenterium lumbis annexum, facit dolorem plerumque gravativum, qui interdum unico purgante levatur, vel servata alvo laxiore perfecte curatur. Cuncta hæc signa adesse debere sine febre recte monet Auctor, quia sæpe illa omnia conjuncta sunt symptomata febris, vel morbi inflammatorii vel erysipelatosi, in quibus non conducere Helleboro purgare.

LIB. IV. APH. XXI.

131. **D**ejectiones nigræ, qualis sanguis niger, sponte prodeuntes, & cum febre, & sine febre, pessimæ. Et quanto colores dejectionum plures fuerint peiores, eo deterius: cum purgante autem melius, quoque plures colores fuerint non pravi.

I.

An te omnia constare debet sensus hujus Aphorismi, ut deinceps veritas & usus dictorum facile intelligi possit. Agit in hoc Aph. de signis ex alvi excrementis desumendis, proponit Dejectiones nigras, atque coloris varii, & primo Sponte cum vel sine febre; dein per Medicamentum purgans. In his observat colores in excrementis conspectos malos esse, si sponte fiant dejectiones diu durantes; sed meliores esse seu minus malas dejectiones, si a purgante dato fiant. Multas igitur scitu necessarias complectitur sententias, quas sigillatim exposituri sumus.

II. Alvum reddere fæces nigras ex variis causis, notavimus (in Comp. T. 90, xx.) quæ majus minusque periculum

Quid sint
nigæ de-
jectiones.

portendunt, prout diversa est causa. Quia vero hoc loco declarat pessimas, quædam adjecit epitheta, ut hæc nigra Dejectio decernatur a reliquis; nempe debet esse qualis sanguis niger, sed quia sanguis niger potest esse solutus vel grumofus, hoc loco acciperem sanguinem nigrum solutum, aliter enim adjecisset *Grumofus*. Hanc quoque distinguit ab Atræ bilis evacuatione, quæ habet acrimoniam & quæ terram fermentat, ut recte ad hunc Aph: notat Galenus, quoniam in sequente Aph. de Atra bile agit. Hæc dejectio sponte debet fieri, non unica vice, tanquam ex vomica vel varice rupta, sed debet continuari per aliquod tempus, quod *ῥόνος* designat. Denique sponte cum vel sine febre, ergo intelligit evacuationem sanguinis nigri soluti, qui sponte per aliquod tempus evacuatur.

Nigræ de-
jectiones
pessimæ.

III. Hæ nunc nigræ dejectiones cum vel sine febre declarantur pessimæ, quoniam observavit Auctor post tales dejectiones fere semper mori homines. Galenus autem dicit, *quamplurima ejusmodi excrementa pestilentiali morbo illo longo vidimus, quæ non magis in iis, qui perniciose, quam qui salutariter agrotarunt, apparebant*. Qua sententia infringi videtur prior. Videndum ergo est, num ipsa evacuatio inferat mortem, an vero sit signum latentis mali. Ipsa dejectio declarat, sanguinis massam intus contentam ita corruptione esse solutam, ut vasis Mesentericis non amplius coarceri possit, sed perpluat in intestinorum cavitatem: nam si flueret per hepar seu porum biliarium, sanguis ille non esset niger, sed flavescens. Arguit ergo illa dejectio summam sanguinis venæ portarum vel arteriæ mesentericæ solutionem inductam putredine. Quæ putrilago sanguinis actione vitæ raro emendatur; unde indicia putrilaginis semper pessima censentur, præprimis si simul quædam fiant putredinem promoventia, ut est evacuatio major debilitatem virium inducens, ut fit hac dejectione, quum actione vitæ reliqua massa sanguinis bona erat conservanda, quibus viribus detractis conceditur facilior spontanea corruptela. Quia vero addit *Cum vel sine febre*, duplicem videtur innuere velle putrilaginem. (1) Si febris validior ita corrumpit san-

sanguinem, ut ex lentore confecto convertatur in materiam sphacelatam (*Comp. T. 90. xxvii.*) (2) Si sanguis minus motus sine febre corripitur spontanea putredine, liquefcit etiam in putrilaginem nigram foetentem, amiffa feu exftincta omni potentia concrefcendi, ut sæpe obfer-
vamus in diu periculofe decumbentibus cum fumma debilitate sine febre, per alvum reddi ante mortem. In his omnibus morbis etiam hodie obfervamus, fi fiant Dejectiones nigræ, mortem instare, nifi forfan aliquis benignitate eluctetur. Quare fummo jure hæc dejectiones pessimæ sunt censendæ, uti etiam morbi pestilentiales, etiamfi unus alterve evadat.

IV. Si nigræ illæ dejectiones ita censentur pessimæ, paradoxum videtur, quod, a purgante fi reddantur, dicantur meliores: sed fi res ipsa intelligatur, non modo plane constabit, sed & magnam habet utilitatem. Nam fi absolute posuiffet nigras dejectiones pessimas esse, certe fi post purgans datum apparuiffent, summum terrorem inducerent: propterea recte adjecit Meliores esse, non quod sint laudabiles ejectiones, sed minus periculofæ, quam fi sponte fiant & per longum tempus, cum talis dejectio prodiens a dato purgante non arguit putrefactum esse sanguinem, sed sanguinem nigrum, qualis semper continetur in vena portarum, vi purgantis per dilatata oscula in cavum intestinorum fuisse elicited, & ita evacuatum, quæ evacuatio quoque cessat finita operatione purgantis: quare hæc evacuatio minus periculosa est censenda.

Nigræ de-
jectiones a
purgante
meliores.

V. Inter colores excrementorum etiamfi niger censeatur pessimus, non tamen reliqui colores omni malignitate carent, fi obfervantur in dejectionibus sponte prodeuntibus & diu durantibus cum vel sine febre. In his duas proponit sententias, primo colores plures, & dein inter istos peiores. Naturalis color excrementorum ad flavedinem accedens est unicus, fi autem plures in fæcibus inveniuntur, illi notant alienos humores tingentes fæcibus admistos esse; quo igitur plures diverfi in fæcibus inveniuntur colores, eo quoque plures adfunt humores morbofi in corpore,

Dejectio-
num colo-
res plures
peiores sunt
deteriores.

quod semper malum est, si varii hi morbi diu durant, ut ex indiciis excrementorum colligitur. Sed si ex coloribus istis constare potest, num sint humores evacuati, magni vel parvi morbi, eo majus erit periculum, quo major designetur morbus per aliquem colorem. Attamen hi colores prodeuntes per medicamentum purgans sunt parvi periculi, vi enim medicamenti varii possunt elici humores, vel ipsum medicamentum suo quoque colore inficere potest fæces, ut patet in Polypodio, Rhabarbaro, Cassia, & similibus, quando ex colore eo nihil boni vel mali est expectandum.

LIB. IV. A P H. XXII.

132. **M**Orbis quibuscvis incipientibus, si bilis atra vel sursum vel deorsum prodierit, lethale.

I.

IN præcedente egerat Hipp: de omni dejectione nigra in morbis, hic vero specialiter agit de evacuatione nigra, quæ provenit ab atra bile, in qua determinat primo tempus evacuationis, & dein loca, per quæ fit, nempe sursum & deorsum: atque concludit talem evacuationem esse lethalem. Tempus est morbis incipientibus, quod idem notat quam morbi principium (*Aph.* 24, IV). Hoc tempus quia exposuimus, non est opus repetere. Ibidem autem egit de morbis acutis, hic vero de morbis quibuscvis incipientibus, ergo non solum damnat talem evacuationem in acutis & ardentibus, qui cum febre valida incipiunt, sed & in aliis, qui sine tali vehementia inchoant, & non solent fervare tempora critica. Ergo ita sentiendum est de hac sententia, si bilis atra evacuatur statim in principio morbi, per commotionem morbi, vel quod in corpore primo concitet morbum & dein sursum vel deorsum erumpit, talis evacuatio est lethalis.

II. Quum

II. Quum veteres triplicem posuerunt Atram bilem, Nutritivam, Excrementivam & Morbosam, primo determinanda est species ex his. Quoniam vero Auctor dicit atræ bilis evacuationem lethalem esse, nullus dubitare potest, quin hoc loco intelligat Atram bilem morbosam, quæ has habet notiones: (1) Nigredinem: (2) Splendorem: (3) Tenacitatem summam, aut fluorem non concrefcibilem: (4) Acrimoniam variam; vel Austeram; vel Acidam terram fermentantem; vel Putridam cum summo fœtore; vel Rancidam urentem. Hæc materies atrabilaria non subit coctionem aut præparationem, ut alii humores, qui actione vitali patiuntur mitigari, sed quo magis hæc materia agitur, eo redditur acrior.

Qualis Atrabilis hic intelligitur.

III. Atra bilis seu materia melancholica, sive nata sit ex sanguine nigro lentefcente, sive ex pinguedine vel bile corrupta in nigredinem commutata, quamdiu non acquisivit acrimoniam, vel nimia copia collecta in vena portarum sine multa molestia diu latitare potest in corpore ceteroquin sano. Sed si accedente corruptione acquirit acrimoniam, loca in quibus diu collecta hæsit, exagitare incipit, multa & varia anomala symptomata inducit: viscera enim ventris in motum inordinatum & perturbatum concitat sua acrimonia stimulante: sæpe etiam inficit transfluentes humores, atque ita totum corpus perturbatum facit morbi principium. Si tunc sursum vel deorsum erumpit atra bilis, exesis vel dilatatis finibus vasorum meseraicorum vel pori bilarii, raro eluctabitur æger hunc morbum, nam atra bilis corrupta in ventriculum & intestina effusa corrumpet ibidem omnes confluentes humores, tantumque concitabit in his partibus motum, quem æger ferre non poterit: imo quæ materia corrupta tamdiu hæsit in vena portarum, etiamsi omnis hac via evacuetur, quod vix sperandum est, impurum & admodum corruptum locum relinqueret. Si ergo morbi incipiunt ex corrupta atra bile, non immerito Auctor pronuntiabit mortem instare. His autem in locis septentrionalibus multo rarius hic morbus occurrit, quam in regionibus calidioribus, in quibus ha-

Cur atrabilis sursum vel deorsum erumpens, lethale?

bitavit Hippocrates: vidi autem istos, in quibus nec per narcotica potui compescere dolorem, nec per adstringentia cohibere evacuationem. Si vero corpus atra bile non admodum acri onustum sit, & corripiatur morbo quovis alio, in cujus principio redditur vi istius morbi atra bilis sursum vel deorsum, pessimum quoque est signum; notat enim atræ bilis abundantiam; ejus evacuatio tantum tunc debilitat, ut vires debilitatæ hunc aggredientem morbum superare non possint; atque atra bilis humoribus mista inhibet alterius morbi coctionem, ut tandem æger, copia atræ bilis, & vi morbi accedentis pereat.

LIB. IV. A P H. XXIII.

133 **Q**uibuscunque, ex morbis acutis, aut ex diuturnis, aut ex vulneribus, aut aliter quocunque modo extenuatis, bilis atra, vel qualis sanguis niger, prodierit, postridie moriuntur.

I.

IN *Aph.* 131 damnavit dejectionem nigram, instar sanguinis nigri, sponte prodeuntem: in *Aph.* 132 etiam damnavit dejectionem bilis atræ, sed in incipientibus morbis. Hoc loco pronunciat postridie mortem, si hic vel ille humor prodierit in extenuatis (*Aph.* 32, III). Quia omnes illæ partes superius sunt expositæ, perpendendum solummodo erit, in quibus extenuatis nigra hæc evacuatio instantem mortem præfagit.

Qualis extenuatio hic intelligitur.

II. Extenuatio a macie distingui potest, quod macilenti æque censeantur fani, quam obesi. At Extenuantur nunquam corpora sine fanitatis detrimento. Sive in hoc loco non concipitur ea Extenuatio, quæ multis laboribus vel inedia comparatur, redigitque corpora obesa ad mediocrem crassitudinem, aut corpora sana ad sanam macilentiam; sed quan-

quando corpora per morbum quemcumque ad summam macilentiam cum debilitate & perseveratione morbi maciem inducentis, rediguntur. Arguit talis Extenuatio plus humidi e corpore auferri, quam accipit ex nutrimentis. Vitium igitur in his utrisque quæri potest. Sed quoniam Auctor addit morbos Extenuationem inducentes, inedia aut labor hic recenseri non potest. Si morbus Extenuationem nimiam inducit, (nam semper a morbo corpora aliquomodo extenuantur Aph. 53, v), denotat humores in tali corpore deliquescere & nimis evacuari. Habetur igitur in tali corpore extenuato humorum tenuitas cum putredine liquefaciente, quod vix valet emendare medicina. Tenuitas enim sola vitæ actione compingi potest in sanam & mediocrem spissitudinem, quæ actio vitæ in hujusmodi extenuatis debilior est, quam ut de hac compactura aliquid sperare possimus. Putrefactum in corpore natum difficulter emendatur. Quare omnes morbi colliquativi periculosi, & curatu difficiles.

III. Nimiam Extenuationem ex febre infirmitatem præ-
 sagire, superius (Aph. 53, vi) notavimus, eadem quoque
 ratio non solum valet in Acutis, sed est major, nam acu-
 ti inflammatorii, aut erysipelatosi, ut & maligni si con-
 versi fuere in colliquationem, nulla spes coctionis restat,
 quum putredo liquefaciens non solum morbi materiem, ve-
 rum etiam reliquos humores sanos ita dissolvit, ut undi-
 que effluant. Miror sæpe, quapropter morborum acutorum
 mutatio tam frequens, non censeatur a Dogmaticis inter
 naturales eorum morborum exitus, dum tamen conversio
 in scirrhum, quæ raro fit, ab omnibus assignetur. Inde
 forsan est, quod medicinam exercentes toties fallantur in
 prognosi, si morbus acutus transeat in colliquationem,
 quum hanc mutationem non audiverunt ab antecessoribus
 suis.

Extenuatio
a morbis acu-
tis.

IV. Ut morbi acuti nimio motu vitali vires deterentes
 tandem humores in putrilaginem convertunt brevi tempo-
 re, sic sensim in morbis chronicis a motu vitali debiliori
 permittitur spontanea corruptio tarde procedens, qua tan-
 dem

A morbis
diuturnis.

dem omnes humores eo usque liquefcunt, ut fiant inepti functionibus peragendis, & ad emunctoria delati, sponte & nimis copiose effluant. Ita observavimus ptyalifmum, urinæ & alvi profluvium, sputi tenuis & copioſioris evacuationem, sudorem colliquativum, poſt inductam ſummam extenuationem, ſine ulla febre, ſed cum ſumma debilitate tandem induxiſſe mortem. Pallent hi ægri toto corpore, horrent frequentiffime, & frigent cum corporis extenuatione & debilitate, ceteroquin ſatis commode degunt, vix medicinam expoſtulantes, tandem placida mors obrepit.

Ex vulneribus.

V. Vulnera, vel ut morbi chronici corpus debilitantia, vel nimia profuſione ſanguinis aut aliorum humorum, ita exhauriunt vires, corporiſque naturales ſuccos, ut deſtructo æquilibrio inter quantitatem humorum & actiones agentes, omnes functiones languſcentes permittant bonos humores in ſpontaneam corruptelam degenerent, atque ita ſummam extenuationem inducant. Inde igitur conſtat, non ſolum morbos acutos & chronicos internos, ſed etiam externos vi allatos, ſi inferant nimiam Extenuationem, periculoſos eſſe, ut eſt contuſio, uſtio, fractura, luxatio & ſimiles morbi.

His evacuatione nigra, poſttridie moriuntur.

VI. De his nunc ita Extenuatis pronunciat, ſi evacuent Atram bilem, vel humorem nigrum inſtar ſanguinis nigri, poſttridie mori. Tam brevem inſtanteſſe mortem non exſpectamus ex ejuſdem materiæ nigræ evacuatione, ſi non præceſſerit illa Extenuatio; ergo aliquid ſpeciale in his fieri debet, quod tam cito vitam exſtinguit. Qualem hic intelligit Auctor evacuationem, non conſtat inter Commematores, an ſolam alvi egeſtionem, an etiam vomitum, an vero quancumque. Sed quoniam Auctor dicit generaliter *Prodierit*, atque in præcedentibus aphoriſmis egit primo de dejectione per alvum, deinceps vero de evacuatione ſuſum & deorſum, atque denique in hoc Aphoriſmo de generali evacuatione in omnibus morbis, non ſine ratione concludendum eſt, Auctorem hic non ſolum intelligere nigram evacuationem per alvum & vomitum, ſed per quo-

quodcumque emunctorium. Ut igitur constet, cur extenuati si reddunt Atram bilem vel humorem nigrum instar sanguinis nigri, sequentia sunt perpendenda. Corpora ita extenuata, omnibus fere humoribus sunt privata, & infirmissima, qui restant humores, sunt tenues & corrupti, his si superveniat evacuatio materiæ nigræ, sive sit atra bilis sive sanguis niger corruptus & solutus, talis evacuatio & ut signum & ut causa, valde mala est: nam nigra prodeuntia declarant, nihil aliud præterea restare, quam nigrum hoc corruptum & liquefactum, quod ineptum est ad suppediandos humores functionibus exercendis. Atque id minimum, quod adhuc restabat, cum hac evacuatione eliminatur, quare talis homo defectu humorum a longo tempore laborans, nunc ulterius privatus, nihil ampliùs habet, quod vitam sustentare potest; unde brevi tempore moritur.

LIB. IV. A P H. xxiv.

134. **D**ysenteria, si ab atra bile inceperit, lethale.

I.

Alvi difficultas, Tormina, & Dysenteria etiamsi multis Medicis idem designant, atque alvi cruenta egestio omnis vocatur Dysenteria, puto tamen, inter dicta nomina differentiam esse statuendam; nam Alvi difficultas dolorem ventris & alvum constipatam designare potest; Tormina frequentissime Medicis denotant ventris dolorem cum intestinorum veluti contorsione; & invenitur Cruenta alvi egestio cum & sine dolore. Si ergo cuncta hæc vocentur Dysenteria, incertus semper hæreo quemnam morbum per Dysenteriam intelligere debeo. Quapropter tot phænomena conjuncta sunt enumeranda, quæ semper præsentia esse debent, ut morbus ille conjunctis phænomenis

Quid sit
Dysenteria.

constans, constanter vocetur Dysenteria. (1) Adesse debet alvi egestio copiosior & frequentior, atque aliquamdiu continuata, sine Medicamenti exhibitione concitata, deponens alvus excrementa varia, non vero chylosa. Si enim copiose fiat, sed statim desinit, amittit Dysenteriae nomen, aut si excitetur ab assumpto purgante, vocaretur enim Hypercatharsis: si alvus deponit chylosum, potius ille morbus refereretur ad Lienteriam. (2) Præter dejectionem illam adesse debet ventris dolor seu Tormen, unde a Celso vocatur Tormina, sine quo vocaretur Diarrhoea, & sola tormina sine dejectione pertinerent ad Colicam vel Iliacam passionem. Si ad dejectiones has & ventris tormina accedat vomitus frequens, vocatur Cholera, præprimis si biliosa ejiciuntur. Dum loco excrementorum liquidorum emittitur sanguis, vocatur Dysenteria cruenta; si vero continuo emittuntur flatus sine excrementis, dicitur Dysenteria sicca. Quare alvi egestio frequens cum ventris dolore vel torminibus veram ideam Dysenteriae exhibet.

Cur dysenteria ab atrabile incipiens, lethale.

II. Generaliter superius (*Aph.* 132, III) demonstravimus, atram bilem sursum vel deorsum erumpentem incipientibus morbis lethale esse. Cur autem post hanc generalem regulam hic proponendus sit specialis casus, qui non facit exceptionem, neque adducitur ad probandam regulam generalem, mirum forsân videbitur. Puto autem hunc brevem specialem aphorismum non sine ratione ab Auctore fuisse notatum, quum passim in Melancholicis inculcavit dejectionem atræ bilis etiam in principio prodesse, sed ex hoc Aphorismo constat, illam dejectionem fieri non debere cum Dysenteria, id est ventris simul torminibus, quoniam tormina illa declarant, in atra bile tantam esse acrimoniam, ut possit inferre dolorem. Illa igitur atra bilis in vena portarum tam diu collecta, donec hanc acquisivit acrimoniam, & tandem erumpens, cum levamine evacuari nequit. (1) Relinquit locum infectum, in quo hæsit. (2) Facile intestina exulcerat. (3) Conficienda alimenta in intestinis coinquinat. (4) Facile cum iis intrat & turbat totum corpus. (5) Potest ita acris facta perrodere vasa tenera hepatis, & multa alia mala patrare. Quare tales homines raro evadunt.

LIB. IV. APH. XXV.

135. **S**anguis sursum quidem emissus, qualiscunque sit, malum: Deorsum vero niger dejectus, bonum.

I.

Qui putaret, hoc loco intelligendam esse omnem sanguinis evacuationem sursum & deorsum, in exercenda praxi turpiter erraret, & sæpe alienam proferret prognosin: nam hæmorrhagiæ narium sæpe salubriter fiunt, & ex faucibus excreatu rejectus sanguis non multum periculi portendit: sed qui ex pulmonibus vel ventriculo redditur, semper est mali ominis, & nunquam, nisi casu prodest vel non multum periculi portendit. Quare pro sanguine sursum emissio accipiendus est vomitus cruentus & Hæmoptysis. Idem quoque verum est de sanguinis evacuatione deorsum; rarissime enim per urinæ vias cum bono indicio redditur sanguis niger; &, qui ex ruptis vasis mesentericis in intestina deponitur, non caret periculo; verum ex hæmorrhoidalibus veniens, qui semper est niger, melancholicis sanitatem adferre solet. Quare pro sanguinis nigri dejectione accipiendus est hæmorrhoidum fluxus modicus. Si autem concipimus sanguinem nigrum in intestinis concretum, tunc recte inquit Galenus, pro *bonum* dicendum esse *minus malum*; nam si sanguis sine mora destillat, designatur vas aliquod hiare, & sanguinem fundere, sed si primo concrevit, spes est consolidationis, ut etiam experimur in narium hæmorrhagiis.

Qualis sanguinis evacuatione sursum & deorsum hic intelligitur.

II. Sanguinis evacuationem prodesse & nocere posse, alibi demonstratur, sanguinem coloris varii salubriter & cum damno emitti aliis in locis est exponendum: verum cur qualiscunque sanguis, & quacunque quantitate emittitur, malum censetur, hoc loco exponendum est. Hæc malignitas

Cur vomitus cruentus & hæmoptysis, malum.

tas vel ex sanguinis præstantia, ut multi existimarunt, vel loci natura deduci potest. Sanguis autem ut satis ex doctrina circulationis constat, sive ex uno sive altero ramo venæ cavæ vel arteriæ aörtæ fluat, in indole seu præstantia tantum non differt, ut inde malum vel bonum pronunciari posset. Præcipua ergo ratio in organis est quærenda, & facile invenitur, nam tam ex ventriculo, quam pulmonibus contra naturalem legem gravitatis sursum pellendus est sanguis, qui propterea propria sua gravitate facile subsistit in dictis visceribus effusus. In ventriculo hærens nauseam & vomitum creans, facit, ut debita quies non concedatur vasculis consolidandis, ex quibus apertis continuo stillat sanguis. In pulmonibus per continuam respirationem non minus difficilis conceditur consolidatio, & si accedat tussis, cum impetu extruditur sanguis, qui collectus in bronchiis & vesiculis pulmonalibus, aëri nudo expositus in loco calido, facile putredinem accipiens, frequentissime pulmonum ulcus & phthisin infert.

Quando
hæmorrhoi-
dum fluxus,
bonum.

III. Quibus in vena portarum major sanguinis nigri copia collecta est, sive intulit per reliquum corpus alios morbos, uti melancholiam, maniam, aut quemcumque alium morbum, qui atræ bili adscribitur, sive solummodo latens hic hæreat, his inquam sanguinis nigri dejectio ex venis hæmorrhoidalibus prodest, quæ detrahit illam abundantiam, modo non sit nimis copiosa evacuatio, vel diutius durans. Hæc autem salubris evacuatio sanguinis ex venis hæmorrhoidalibus in locis calidioribus frequentius observata fuit ab Hipp: quam a nobis in regionibus frigidioribus & septentrionalibus.

LIB. IV. APH. XXVI.

136. **S**I a Dysenteria detento velut carunculæ secesserint; lethale est.

I.

Quid veteres intellexerunt per Dysenteriam, superius (134, 1) exposuimus; hoc autem loco non dicit generaliter in Dysenteria omni tempore, sed si aliquamdiu duravit, hoc notatur enim a Dysenteria detento, ut inde non sit conjiciendum in incipiente dysenteria si velut carunculæ secesserint, lethale esse signum: quum sæpe mucus in lacunis intestini concretus in principio dysenteria ejiciatur referens carunculas, quæ tamen excretio non est lethalis. Sed si diu duravit Dysenteria, hujusmodi mucus concretus evacuari nequit, cum non concedatur in his tempus sufficiens ad concretionem. Unde certi sumus, si in vetusta Dysenteria reddantur carunculæ, istas partes secedere ab ipsis intestinis: nam carunculæ σάρκες hic non solum denotant corpuscula sphaerica seu globosa carnei coloris, sed etiam ipsas membranas & filamenta. Quare si talia exeunt, designatur, portionem intestini esse mortificatam & una cum aliis excrementis evacuari, quod periculosissimum est, quum in tanta mortificatione vel exulceratione raro maneat intestinum clausum, & ita devoluta excrementa in ventris cavum reliqua adjacentia coinquinant & ita mortem inferunt corpori præcedente nimia evacuatione debilitato. Potest tamen esse, ut quædam lacunæ intestini recti exulceratæ emittantur, & tandem homo multas miseras passus moriatur, sed quoniam a tali morbo plerumque moriuntur, non sine ratione pronunciavit Auctor, lethale esse signum. Si in tali casu vocaretur Junior Medicus, omnino incertus hæreret, quid esset agendum, quum topica externa nulla novit applicare; clyisma injectum ultra locum

affectum fertur; interna data Medicamenta priusquam locum attingunt, sunt corrupta & mutata. Maximum commodum & utilitatem expertus sum huiusmodi in morbis intestini recti, si formentur parvæ turundæ ex terebinthina & melle ad consistentiam coctis, aliis consolidantibus mistis, quæ aliquoties de die indantur, præcipue toties ac alvus fuit exonerata.

LIB. IV. A P H. XXVII.

137. **Q**uibus per febres sanguinis copia undecunque eruptit, in refectionibus, his alvi humectantur.

I.

EAndem sententiam repetit Auctor in *Coacis* binis in locis, nisi quod in uno loco dicat, *Magna in principiis sanguinis eruptiones, circa refectionem alvos humectant.* Quare non præcipitanter hæc sententia est prolata, sed quia hæc sæpe ab Auctore vel ejus antecessoribus fuit observata, hanc regulam plusquam uno loco voluit posteritati relinquere, ut non mirentur medici videre alvum laxiorem, quæ ita fuit constipata in principio; & ut caveant progrediente tali morbo propinare purgans, quod tunc facile hypercatharsin induceret.

Quomodo
sanguinis
eruptio al-
vum hu-
meetat.

II. Hippocratis scopus non est in hoc Aph: cuncta bona & mala recensere, quæ ex sanguinis eruptione oriuntur, sed duntaxat notare in his, circa refectionem alvum fieri laxiorem. In hac sanguinis evacuatione notat copiam majorem, & ita excludit omne sanguinis stillicidium: & addit *undecunque*, sive per naturales, sive præternaturales, sive per artificiales vias emittatur sanguis, semper debemus alvum humidiores expectare. Qui continua febre vel morbo acuto laborat, ejus semper corpus est siccum, & prompte humidum applicatum imbibens: hoc itaque tem-
pore

pore quidquid liquidi est in excrementis intestini coli, simul absorbetur, solæ fæces duriores, quæ absorberi nequeunt, relinquuntur: quare naturale est in hujusmodi morbis, ut alvus sit constipata & reddat fæces compactas, siccas. Si vero demonstrari potest, sanguinis largam evacuationem, tam naturalem, quam artificialem, minuere hanc absorptionem & siccitatem, ex ea demonstratione liquebit facile, alvum quoque humectari debere. Sanguis autem compactus in lentorem si continuatur compingi per motum validum vitalem, sensim in majorem spissitudinem condensatur, & quidquid compingi nequit, id valido hoc calore & motu invisibiliter evanescit: si vero magna dematur sanguinis portio, ut aliquomodo destruat æquilibrium, protinus cessat ille calor major & actio vitalis validior, atque ita compacti humores iterum liquefcunt, atque validior contractio firmarum partium dimittitur, ita ut loco cutis siccioris, generetur sudor copiosior cum temperato calore. Quemadmodum in cute convertitur siccitas in humiditatem, ita etiam in intestinis, quæ per receptam humiditatem etiam reddunt excrementa liquidiora. Insuper alimenta & potulenta assumpta circa refectiorem minus absorpta adjuvant liquiditatem alvi. An vero hoc conducat convalescentibus, non addit Auctor. Sed judicandum est alvum modice laxam hoc tempore conducere, sed si nimis fluat, nimiam debilitatem indicat, & sanitati obest, quoniam determinatio humorum ad intestina invertit naturalem crisin per cutim, per quam salubriter febrium materia solet evacuari, & quoniam nutrimentum in intestinis confectum simul eliminat.

LIB. IV. APH. XXVIII.

138. **Q**uibus biliosæ sunt egestionēs, surditate superveniente, cessant. Et quibus surditas, biliosis supervenientibus, cessat.

I.

SI auctoritate esset disputandum, multa mihi essent in promptu loca ex Hipp: & aliis hanc adstruere sententiam, ex quibus omnibus hoc solum colligi potest, hoc sæpissime a Practicis in ægris detectum & verum inventum, ut etiam indicavimus *Comp. T. 90, XLIX.* Sed de- tegimus etiam alvi egestionem biliosam non tollere aut curare surditatem; atque surditatem obortam non compescere semper alvi egestionem biliosam. Operæ pretium igitur erit rimari, quid notet alvus biliosa, & qualem surditatem inferat, quænam etiam surditas alvi egestionem biliosa levetur.

Qualis sur-
ditas intelli-
gatur.

II. Facile concipitur, omnem surditatem depravato organo auditus natam tolli non posse alvi fluxu, sive sit biliosus vel alius, neque illam, quæ prævenit a surditate in meatu auditorio vel tympano hærente: quare ea est concipienda surditas, quæ oboritur in febribus, quod morbi generalis materia feratur ad aures seu nervum acousticum, uti fieri solet, si morbus acutus metastasim moliatur per Parotides, in morbis Acutis Inflammatoriis, Purulentis & Erysipelatosis. Verum surditas talis in Inflammatoriis prævenitur hæmorrhagiâ, in Purulentis per sedimentum urinæ copiosius & purulentum, verum in Erysipelatosis, qui dicuntur etiam Biliosi, admodum conducit materiem illam biliosam evacuare per alvum, quæ evacuatio si non contingit, surditas ea in morbis biliosis præfagit Delirium. Condu-
cit

cit ergo in tali surditate ducere alvum per purgantia refrigerantia aciescentia, quum natura indicet, naturalem esse viam. Inanis est oppositio, nullam esse viam ab auribus ad alvum, quoniam non concipimus materiem biliosam circa aures subsistentem, inde duci per viam particularem ad alvum, sed quando materia tenuis biliosa acris cum communi massa feratur ad aures, facta directione ad intestina cum hujus materiæ evacuatione, tunc massa hac materiâ liberata non potest impetu suo majore inferre surditatem.

III. Hippocratem expertum esse, surditatem omnem in morbis seu febribus natam non tolli quavis alvi egestionem, inde constare potest, quoniam nominat Biliosam, non vero generalem, vel quamcumque aliam evacuationem. Observavit enim *suppuratis surditatem obortam, cruentam significare egestionem, hisque ad finem nigra prodire*. H, a, 563. Qualis egestio biliosa bona vel mala est. Biliosa autem egestio ea est, quæ habet colorem flavum, estque tenuis, acris & calida, qualis materia accusatur in morbis Biliosis & Erysipelatosis, hæc mobilis admodum frequentissimam metastasin facit, quare si feratur ad intestina, non amplius infestare potest caput & aures, quando bona censetur.

Qualis alvi egestio intelligatur.

IV. Auctor in hoc Aphorismo præcipit vicissitudinem surditatis cum alvi egestionem biliosa, sed simul non monet, num sit bona vel mala, quod tamen ex disputatis superius facile colligi potest; nam quemadmodum tenuis & acris materia per generalem circulationem derivari potuit ab auribus ad alvum; ita etiam materia illa per alvum evacuanda derivari potest ad caput, ut ibidem inferat surditatem, sed quoniam tunc aliunde ducitur materia biliosa acris, minuitur quidem ejus egestio per alvum, ast non evacuatur materia e corpore, talem igitur metastasin admodum malam esse sentio, quoniam repit materia ad locum, ubi turbando actionem plus periculi infert, & ubi non tam commode evacuari potest.

Surditas ex-minuta alvi egestionem biliosa, malum.

LIB. IV. APH. XXIX.

139. **Q**uibus per febres sexto die rigores fiunt, difficulter judicantur.

I.

Sextus dies
cur difficul-
ter judicet.

EX iis, quæ supra (*Aph.* 49.) exposuimus, facile colligi potest, quid sit sentiendum de observatione temporum in morbis, istamque observationem non ita inutilem esse, ut quidam contendunt; sed & sæpe mutari, prout morbus acutus sit Inflammatorius, vel Erysipelatosus, vel Putridus, aut si aliena methodo tractetur. Ex iisdem etiam constat, febrem acutam inflammatoriam, si viribus vitæ subigitur & non turbatur in ordine suo, vel per causas externas vel præposteram curationem, accuratissime sequi dies criticos. Si ergo die alio concitantur symptomata, quæ criticam commotionem concomitari solent, ut sunt Rigores, indicio est, vel non esse febrem inflammatoriam, sed putridam; vel vires vitæ aut debiliores esse, aut instigatas per alienam causam. Omnia hæc difficiliorem solutionem portendunt. Sive quod sit morbus acutus Putridus, vel Inflammatorius ab ordine turbatus. Quid notet *δύσκριτα*, ut habetur in Textu, verba fecimus (*Aph.* 87, III). Hoc autem loco notat, eam febrem non tam certo finituram, ac si Rigores fierent die septimo, sed sæpe eam febrem continuari, vel in alium morbum abire, vel si delitescit, deinceps sæpe recidivam facere. Hoc autem non inde dependet, quia ipse dies sextus, qui dicitur Vacuus, sit malus, sed quoniam acutus inflammatorius morbus regularis isto die non facit crisin.

Rigores
sexto die
cur mali?

II. Noster Auctor (*H. b.* 27.) Rigores fieri dicit ab externis ventis, aqua, cibo, potu, aliisque causis externis; sit etiam, dum recidivat morbus, vel abit in corruptelam, atque

atque ex critica perturbatione. A febre ardente occupato, rigore accedente, solutio fit. (H. a. 87.) quod repetit (H. a. 445) cum his adjunctis verbis. *In febre ardente si insuper corripit rigor, exudare solet.* Ex quibus, & iis, quæ in praxi experimur, concludere possumus, Rigorem inferri, si aliquid alienum applicetur organo vitali. Quod si id alienum sit materia morbi præparata ad expulsionem, tunc viribus instigatis, id alienum nomine evacuationis criticæ expellitur: sed quidquid præterea Rigorem infert, id semper malum portendit. Dum ergo sexto die, quando raro materia critica est præsens & matura, fiunt Rigores, hujusmodi ergo Rigores sunt semper mali ominis.

LIB. IV. APH. XXX.

140. **Q**uibus exacerbationes fiunt, quâcumque horâ dimiserit febris, postridie eâdem horâ si corripuerit, difficulter judicantur.

I.

Non omnes Commentatores eodem sensu accipiunt hunc Aphorismum. Galenus judicat, hic intelligi debere regularem reditum paroxysmorum, ut nec postponat, nec anticipet, sed omni die redeat eadem hora. Hurnius autem, quod respiciendum sit ad horam, qua prior paroxysmus desiit, existimat, ut si hora sexta desiit paroxysmus, alter incipiat postridie etiam hora sexta. Alii vero putant, Hippocratem voluisse indicare eam horam sequentis diei, in qua desiit febris, ut finis paroxysmi habeatur in hora eadem, in qua sequens paroxysmus incipit. Cum ita deceptant Auctores, nil certi de difficili judicatione hauriri potest, nisi omnes hi tres modi difficilem judicationem habeant.

II. Non laborabimus veram Hippocratis sententiam eruere, ^{Judicium difficile ex}

paroxysmi
rimari.

ruere, quum in observatione & prædictione non habeat majorem auctoritatem, quam dicta Galeni & aliorum: sed videbimus, quid sit sentiendum ex diverso reditu paroxysmi ad difficilem judicationem statuendam. Præ omnibus sciendum est, triplex genus febrium inveniri, nempe febres Continuas, Intermittentes, & Remittentes. At vero febres Continuæ, quia non faciunt Paroxysmorum reditum, in hoc loco examinandæ non sunt, sed febres vel Intermittentes vel Remittentes. Si *febris Intermittens* regularem paroxysmum faciat, id est, si quotidie eadem hora paroxysmus incipiat, ut nec anticipet, nec postponat, talis febris non observatur difficilius solutionis, quam quæ postponit vel anticipat vel vage infestat, etiamsi Galenus hanc profert rationem, *quæ firmata sunt, & impacta, robusto quodam ut dimoveantur quasi vate opus habent, qui & longo tempore, & cum fortibus, & pluribus auxiliis adhibeatur.* Quippe noster Auctor (Aph. 87) contrariam habet sententiam, *In Constantibus temporibus constantes & judicatu faciles fiunt morbi: in Inconstantibus autem inconstantes, & difficiles judicatu.* Unde Constantia præmittit faciliorem solutionem (Conf. Aph. 52, II & III.) Imo si vires vitæ prævalentes sunt in morbis, signa quoque constantia inveniuntur; sed viribus labefactis omnia fiunt Inconstantia. In febribus autem intermittens, quæ constantem paroxysmorum reditum habuere, si paroxysmi incipiunt inconstantes fieri, cum diminutione vehementiæ & augmento virium, tunc sæpe observavi facilem fieri solutionem, quod materia febrilis aliquomodo subacta non potuerit ulterius tam regularem paroxysmum facere. Sed si paroxysmi constantes cum diminutione virium reddantur inconstantes, aut si simplex intermittens reduplicatur, semper observavi solutionem difficiliorem, quia paroxysmi iterati aliquam induxerint corruptelam pejorem, quæ ordinem turbat. *Febres autem Remittentes* sive constantes sive inconstantes Paroxysmos faciant, semper sunt solutu difficiles, quia si tales fiant ex Intermittentibus, designant, febrem intermittentem fuisse prolongatam: si fiant autem ex fomite latente purulento vel putrefacto,

facto, regularis vel irregularis paroxysmus nihil boni promittit. Sed quando sequens paroxysmus incipit eadem hora, qua prior desierit, valde timendum est, nam corpus tunc vix liberum est a febre. Sed si aliquod intervallum inter febris paroxysmos habetur, vires recuperari possunt, & tales induciæ notant, tantam non esse morbi materiem, quæ valet continuare febrem. Quare etiam convenienter hic Aph. intelligi potest de reditu eadem hora, qua desit paroxysmus prior.

LIB. IV. APH. XXXI.

141. **L** Assatis per febres, ad articulos, & circa maxillas maxime, abscessus fiunt.

I.

Quid sit Lassitudo & quotuplex, supra (Aph. 30) observavimus; ex quibus colligi potest, Lassitudinem tunc fieri per febres, si tanta sit facta consumptio in spiritibus, qui ad motum animale sunt destinati, ut inde similis impotentia vel molestia movendi nascatur, qualem experimur post multos labores: simulque humores & fibras musculares per febrem fuisse agitate, ut nunc magis quiescente febre totum corpus sentiat quasi laboribus fractum. Quæ ergo febris singulis paroxysmis talem relinquit Lassitudinem, quammaxime quoque minuet corporis vires, ut id, quod præparandum & expellendum sit, non subigatur aut expellatur.

II. Observavit Noster Auctor, sæpius circa finem hujusmodi febris Abscessum fuisse natum ad articulos vel maxillas, quemadmodum etiam hodie in praxi comperimur: sed illa observatio non ita est constans, ut si per febrem Lassitudinem observemus, inde concludere possimus, semper esse expectandum abscessum. Quod si febris lentorem for-

Lassitudo
per febres.

Cur præparat
git abscessum?

mat, qui sensim commutatur in purulentiam, illa nata Lassitudinem inducit, quum spirituum materia generetur ex eadem gelatina, quæ motu febrili convertitur in lentorem & postea in pus, qua gelatina consumpta producit lassitudo. Ergo lassitudo per febrem denotat, tandem gelatinam fuisse commutatam in purulentiam. Inde autem non sequitur, ut formetur abscessus per metastasin seu collectionem puris ad aliquem articulum; nam si tunc reddatur urina cum multo sedimento albo, abscessus non esset expectandus. Sed si talis non prodit urina, dum tamen ex signis constet, purulentiam fuisse formatam, conjicere possumus abscessum ad aliquam partem, qui pus in se recipit. Quod autem talis Abscessus fiat ad maxillas vel Articulos, nihil arcani continet, nam generalis lex est, si materia morbosa per emunctoria evacuari non potest defectu virium, proxime est, ut deponatur ad aliquam partem externam, unde toties post longas febres abscessus fiunt ad partes exteriores superiores vel inferiores. Si autem vires adhuc sunt debiliores, ut nequeant purulentum deponere ad partem aliquam externam, pus tunc moram necens in corpore convertitur in putrilaginem, qua homo sæpe moritur.

LIB. IV. A P H. XXXII.

142. **Q**uibus ex morbo resurgentibus aliquid dolet, ibi abscessus fiunt.

I.

Quomodo
abscessus in
convalescentibus?

IN præcedente Aphorismo egerat de Abscessu expectando circa finem morbi seu febris, hoc autem loco non solum brevi sententia prælagit Abscessum finito morbo, sed & magis determinat abscessus locum: nam in præcedente docuit, ex materia purulenta in corpore nata & non

non evacuata, quæ inducebat lassitudinem, expectari posse abscessum ad aliquam partem; verum si jam materia purulenta sedem figere incipit, facile erit determinare locum, in quo expectandus est abscessus. Constat ergo, si quis post morbum, id est in Convalescentibus, dum totus antecedens morbus fuerit finitus, ut nulla amplius restent signa, nisi debilitas, morbi materiem mutatam quidem & subactam non evacuaverit, facile deinceps deponi posse ad aliquam partem, ut ibi formet abscessum, modo inflammatorius morbus, qui in purulentiam abire potest, antecesserit: quare duobus temporibus generari potest metastasis purulenta, nempe durante adhuc morbo, uti in præcedente, & eo jam finito, uti in hoc aphorismo.

II. Per Dolorem proprie in hoc loco & absolute intelligitur Dolor, sed in latiore significatione intelligitur etiam Labor & Molestia, unde multi Interpretes Laborem habent, quum Hipp. indicare vult, priusquam abscessus post morbum in parte formatur ex relicta post morbum materia, eam partem non statim maturum abscessum habere, sed dum in ea colligitur morbi materia, eam sensim concoqui in pus, quo pars sentit aliquam molestiam aut dolorem, id est laborat. Adeoque si ex antecedentibus signis morbi inflammatorii, sine crisi abeuntis, colligere possumus, materiem crudam adhuc in corpore oberrare, & dein incipiat quædam pars laborare, fere semper pars ea in se recipiet eam materiem & formabit Abscessum. Itaque omnis Labor alicujus partis, post quemcumque morbum acutum observatus, non est præsagium abscessus, sed tunc tantum, quando observatur post morbum, qui in purulentiam abire potest, & tunc si ex aliis signis constet, materiem purulentam confectam non evacuari per aliquam criticam evacuationem.

Cur locus
dolens ab-
scessum re-
cipit?

LIB. IV. APH. XXXIII.

143. *S*ed & , si quid doluerit ante morbum , ibi se
figit morbus.

I.

Cur pars
dolens ante
morbum
præ ceteris
affligitur?

IN duobus præcedentibus demonstravit per signa, quomodo in morbo & post morbum quadam in parte potuimus expectare abscessum, quoniam illa signa declarabant, materiem morbi jam incipere colligi in ea parte. Illa igitur signa producebantur a formata materia per totum corpus oberrante, quæ deinceps magis collecta, in parte quadam excitabat Laborem seu Dolorem. Hoc autem loco non ita determinat futurum abscessum, sed sedem primariam morbi expectandam, priusquam morbi materia est in corpore. Ergo hoc signum non desumitur ex latente materia, uti in duobus prioribus, sed vitio ipsius partis, quæ in se habet talem dispositionem, ut in se facilius quam quavis parte alia corporis sedes fiat morbi. Signum hujus est Dolor seu Labor alicujus partis, priusquam morbus ingruit. Ex designata causa itaque eruendum, quamobrem facilius morbi cujuscumque materiem recipiat. Si totum corpus sit ceteroquin sanum, dum corripitur morbo generali, tunc facere solet depositionem materiæ morbi ad emunctoria: atque si quid alienum sit in corpore, id semper ab interioribus ad exteriora truditur & tandem eliditur, ut experimur in quibuscumque alienis in corpore hærentibus. Hujus nullam novimus rationem, quam quod Deus tali modo creaverit nostrum corpus vivens, ut ejus actio vitæ in interioribus sit validior quam in exterioribus, ut ita se posset ab alienis liberare: nam quovis in morbo si vires debilitentur, id alienum non truditur ad exteriora, sed vel in corporis meditullio relinquitur, vel

si

si in ambitu corporis propulsum fuerit, viribus interim debilitatis, se ad interiora recipit, quando interiora a morbi materia obsessa & suppressa non raro mortem inferunt, quemadmodum hoc in variolis, morbillis, podagra & pluribus aliis experimur. Vis ergo vitæ est ea causa movens, quæ ad corporis ambitum trudit aliena, & expellit, qua debilitata, se liberare nequit. Veteres existimant, materiem morbi interiora petere per attractionem, sed si causa depellens debilior est, ut semper observamus in tali oppensione, non erit opus attractionem fingere. Ex eodem principio clarus quoque formatur hujus Aphorismi sensus: nam si quævis pars ante morbum Dolet vel Laborat, hoc ipsum declarat, eam partem esse debiliorem: nam si non sit ex sua natura præ ceteris debilior, colligens in se morbi materiem, per ipsam affectionem debilitatur, quum omnis pars ex morbo laborans sibi debilitatem conciliat. Hoc ergo constat, tali in corpore aliquam partem esse ceteris debiliorem, si nunc in corpore eo generetur morbus generalis, quia pars illa debilior se non potest ita, ut partes reliquæ, a morbo liberare, successive tandem major & major in ea parte colligitur morbi materia. Hoc etiam constanter observamus in praxi, si enim quis quandam partem debiliorem habeat, quoties opprimitur aliquo morbo, statim quoque pars ea magis patietur, quam partes reliquæ. Si ergo scimus in quodam homine aliquam partem esse debiliorem, dum corripitur morbo generali, statim auxilia ita sunt dirigenda, si pars debilis ad vitam sustentandam multum faciat, ut ea pars roboretur: sed si emunctorium sit debilius, sæpe ad curationem faciliorem conducit, quum facilius in se recipiens morbi materiem, reliquum corpus liberet.

LIB. IV. APH. xxxiv.

144. **S**I a febre detento, tumore in faucibus non existente, suffocatio ex improvise superveniat, lethale.

I.

Causa suffocationis ex improvise.

Quid Medici per suffocationem intelligant, & quomodo generetur, supra (*Aph* 68) exposuimus; hic autem additur *ex Improvise*, quod notat causam Suffocationem inducentem non sensim sed subito nasci, eamque non induci per tumorem sensim incrementem, neque per causam aliquam externam, quum ex textu constet, eum hominem ex febre laborare, & ita non expositum esse causis externis suffocationem inducentibus. Invenimus talem suffocationem induci subito in Hysteris aliisque morbis convulsivis, si subito constringitur Larynx a spasmis illorum musculorum, aut in febribus continuis, si morbi materia metastasin ad Laryngem faciat. Ut autem Auctor excludat convulsivam suffocationem, addit *a febre detento*, qua phrasi indicat fieri debere in homine, qui febre continua laborat, ut hæc suffocatio sit symptoma febris. Nam si fieret suffocatio ex Inflammatione vel Erysipelate, tunc primo oriretur suffocatio & dein accenderetur febris; sed quoniam supervenit, hæc Suffocatio est febris symptoma.

Angina Cynanche ex metastasi febris.

II. Phænomenon hoc ad Anginæ speciem refertur, quæ vocatur *Cynanche*, quoniam causa impediens respirationem hæret in faucibus sine tumore aliquo externe visibili. Nam si ex hac causa impedita esset deglutitio sine tumore visibili vel externo vel interno, vocaretur a Veteribus *Synanche*: sed si simul appareret tumor, ab ipsis diceretur *Paracynanche* vel *Parasynanche*. Ergo Hipp: indicare vult in

in hoc loco Cynanchen natam ex metastasi febris, & pronunciat Lethalem esse. Equidem omnis metastasis ad aliquam partem semper censetur mala, utpote indicans vim vitæ tam debilem esse, quæ non valet ad emunctoria ducere morbi materiem, ut eam eliminet; sed tunc præprimis, si talis fiat ad partem, cujus functione carere non possumus, ut est Larynx, & tam exiguum, quæ non valet omnem in se recipere materiem. Nam si externe simul appareret tumor, forsan locus pro receptione sufficeret, & quædam restaret spes, sed cum externe nullus appareat tumor, scimus interiora laryngis omnem materiem recipere, & ita certe opprimere & suffocare hominem. In tam periculosissimo statu non solum a medico exigitur prognosis mortis instantis, sed etiam auxilium, quod mortem instantem averteret. Quoniam brevi instat mors, omnis cunctatio mala est, quare summa remedia protinus sunt adhibenda, ut tentemus diversionem metastasis ad quamcumque aliam partem, & quoniam inter fauces alvum & pedes maximus est consensus, statim larga est instituenda venæ sectio; alvus ducenda clymate injecto, quia deglutitio non conceditur; ad plantas pedum epispasticum validum applicandum; hæc si non levant brevi tempore mors erit expectanda.

LIB. IV. A P H. xxxv.

145. **S**I a febre detento collum derepente inversum fuerit, & vix deglutire possit, tumore non existente, lethale.

I.

QUæ in superiore recensuimus de metastasi febris continuæ ad fauces, hoc loco etiam sunt intelligenda, nisi quod hæc metastasis fiat in Pharyngem, quoniam Angina Synanche ex metastasi lethalis.

niam non facit mentionem suffocationis, sed difficultatis Deglutionis, quæ deglutitio impeditur, si Pharynx simili modo afficitur, ut notavimus affici Laryngem in suffocatione. Quoniam neque in faucibus, neque externe ullus appareat tumor, hic morbus secundum mentem veterum vocari debet *Synanche*. Signa sunt communia in hoc & in præcedente Aph: idem quoque præsagium; sed in hoc additur Deglutitio difficilis, & Colli inversio.

Deglutitio
difficilis in
Synanche.

II. Ut Deglutitio fiat, necesse est Pharyngem dilatari partim per bolum deglutiendum, partim per proprios suos musculos, si vero febris materia in Pharyngem deponitur, ut hæc membrana non solum tumeat, sed & etiam doleat & siccetur, uti fit in parte inflammata vel erysipelate affecta, illa membrana irritata ab actu boli non solum statim contrahitur, sed & etiam propter suam siccitam superficiem ingressum bolum non transmittit: unde non solum impossibilis deglutitio, verum etiam admodum dolorosa & suffocativa. Non est opus, ut externe conspiciatur tumor, nam Pharynx & Oesophagus pone Laryngem & Tracheam hærens licet aliquomodo tumeat, neque externe tumorem præbet, neque in faucibus, quia tumor & rubor profundius hæreere possunt, quam ut per os apertum videri possint.

Colli inversio.

III. Multa commentantur de Colli inversione in angina *Synanche*, quasi proveniret a spinæ luxatione, sed quia Luxatio subito fieri nequit ab interna causa, omnia quæ de ea luxatione dicuntur, inania sunt. Sed quoties in musculis Collum flectentibus vel torquentibus fiat inflammatio, non solum collum ex suis musculis inflammatis invertitur, sed & etiam alia membra, quorum muscoli inflammantur, ultra modum flectuntur vel torquentur; quamobrem sufficit in hoc loco notare musculos torquentes collum esse inflammatos & ita contractos. Mirum equidem est non in omni angina tale quid fieri, quum hi musculi pharyngi adjaceant, nisi quando tam parva sit inflammatio pharyngis, quæ se ad proximas partes non extendit. Unde concludere possumus, Hippocratem indicare voluisse
tam

tam magnam circa Pharyngem inflammationem, quæ etiam musculos adjacentes afficiat, ut iis constrictis invertatur collum.

IV. Quoniam in præcedente *Aph* : demonstravimus, propterea Cynanchem esse lethalem, quia intercipit Respirationem, qua carere non possumus, videtur inferri posse in synanche tale periculum non instare, quia per aliquot dies sine deglutitione vivere potest homo. At vero si deglutire non potest, non possumus etiam ulla dare auxilia interna & æger destituitur omni potu, qui maximam partem curationis in acutis implet. Dein si œsophagus, qui posteriori parti trachææ continuus est, inflammetur tam valide, rarum foret, si non simul eam in consensum traheret; aut tumens œsophagus comprimeret adjacentia vasa cruenta, ut intercipiatur circulatio. Quare æque fere est periculosa synanche, quam Cynanche ex metastasi febrili nata, atque eadem prompta auxilia exigit.

Cur Synanche lethalis?

L I B. IV. A P H. xxxvi.

146. *S*Udores febricitantibus si inceperint, boni sunt die tertiâ, & quintâ, & septimâ, & nonâ, & undecima, & quartâ decimâ, & septimâ decimâ, & vigesimâ primâ, & vigesimâ septimâ, & trigesimâ primâ, & trigesimâ quartâ. Hi enim sudores morbos judicant. Qui vero ita non fiunt, laborem significant, & morbi longitudinem, & recidivas.

I.

*M*Ercurialis, qui in omni aphorismo tentat investigare nexum Aphorismi cum præcedente, in hoc quod miror, vix aliquem nexum invenit, qui mihi tamen videtur planus: nam in duobus præcedentibus periculum

Connexio.

prædixit ex morbi materia, si metastasim faciat ad col-
lum; in hoc aphorismo nunc præbet regulam generalem,
ut sciamus quo tempore possumus ejusdem materiæ ex-
spectare evacuationem criticam per sudorem, quo tem-
pore si non fiat sudor criticus, prædicere possumus la-
borem, aut longitudinem, aut recidivam. Quare versatur
in eodem genere morbi, scilicet in homine a febre de-
tento, cujus materia non facit metastasin, sed molitur
evacuationem per sudorem.

Quo tem-
pore sudor
criticus.

II. Quoniam de Diebus Criticis & eorum causis supe-
rius egimus (*Aph.* 49) eadem non sunt repetenda. Hoc
autem notandum in *Aph.* hoc, Hippocratem aliquomodo
recedere in enumeratione dierum a consueto ordine,
numerat enim tertium & quintum diem, omittens quar-
tum, atque pro vigesimo tradit vigesimum primum, addit
trigesimum primum & trigesimum quartum & ad qua-
dragesimum non venit. Qui Criticorum dierum observa-
tionem conantur defendere, fundamentum sed labile po-
nunt in dierum numero: quia vero observatio hæc non ex
dierum numero dependeat, sed ex natura materiæ morbi
(*Aph.* 49. vi.) observatione practica detecta, solummodo
scrutandum, quid natura faciat, hocque solum pro funda-
mento ponendum, tanquam esset lex condita. Qui autem
irrident Criticorum dierum observationem, hunc non solum
adducunt aphorismum, ut demonstrent incertum in enu-
meratione criticorum dierum, verum etiam adducunt ex
variis locis nostri Auctoris, criticos fuisse sudores die
sexto, octavo & aliis diebus. Hæc omnia mihi videntur
magis comparata ad destruendam quam excolendam sci-
entiam, quum in mutationibus morborum non sit statu-
endus terminus dierum tam fixus, quin possit ab eo ali-
quomodo recedere per tempestatem, regionem, diætam,
& variam medendi methodum (*Aph.* 49, iv). Quare in
annumeratione dierum hoc solummodo adstruitur, quod
frequentissime fiat, non vero quod semper. Atque ex
his pronunciamus, sudores istis temporibus in praxi obser-
vari utiles. Noster Auctor in hoc Aphorismo non atten-
dit

dit ad sudoris quantitatem vel qualitatem, de his enim inferius erit agendum, ut ex istis quoque feratur iudicium.

III. Ex posito fundamento sudores optimos fieri solere dictis diebus, ulterius deducendum non constanter fieri Laborem, Longitudinem & Recidivam, si sudores alieno tempore fiunt, sed etiam sæpe. Id enim quod a consueto ordine naturæ recedit, raro perfectam evacuationem præstat, unde cum nobis constet ex ordine dierum turbato omnem materiem morbi non fuisse evacuatam, id quod retinetur, inferet *Laborem* (Aph. 26, 1.) Et quoniam perfecte non tollitur morbi materia ulterius viribus vitæ subigenda, portendit *Longitudinem*. Interdum vero ita subacta fuit morbi acuti materia, ut non amplius febrem continuare faciat, sed si simul omnis non fuit expulsa, ut sæpe fit, si alieno tempore moventur sudores, ea recrudescentes non raro recrudescente seu *Recidivare* facit febrem.

Cur sudor
alio tempo-
re præfagit
Laborem,
Longitudi-
nem & reci-
divam?

IV. Etiam si ex generali regula constare videtur, quo natura vergat eo ducenda, optimum tempus esse exhibendi sudoriferum, quando natura molitur evacuationem per sudorem: non tamen desunt, qui injiciunt, scrupulum inferentes, nos tunc nescire eo tempore, num materia sit præparata ad expulsionem, & propterea, nos tunc posse eo tempore etiam extrudere crudum: atque eo tempore, quia a natura si fiat evacuatio, & simul a sudorifero, nos per sudoriferum datum nimis magnam copiam sudoris evacuare. Verum hic scrupulus inanis est timor: nam nullum est tempus, in quo majore jure expectare possumus materiem coctam quam tempore naturali, cum natura isto tempore soleat indicia præbere coctionis. Et quamvis materia fuit cocta, non tamen suo legitimo tempore, propter vires per præcedentem coctionem debilitatas, excretionem conficit: Quare hoc tempore fere semper optimo successu propinari potest sudoriferum. Neque ita timenda est nimia evacuatio, quum hoc tempore natura non faciat evacuationem per vim instigatam, sed quia materia est apta ad evacuandum: quod si tunc addatur sudoriferum, omne
coctum

An tempora
critica de-
terminant
exhibitio-
nem sudo-
riferorum?

coctum expellitur, cujus portio aliter retineri potuisset. Quam ob rem pro generali regula accipi potest, optimum tempus exhibendi sudoriferum esse, quando ipsa natura per sudorem crisin facit. Hoc etiam experimur in variolis, nam optimo cum levamine tunc in variolis dantur sudorifera, quæ in morbi principio alias inferunt damnum.

LIB. IV. APH. XXXVII.

147. **S**Udores frigidi, cum acuta quidem febre evenientes, mortem: cum mitiore vero, morbi longitudinem significant.

I.

Hanc sententiam veram esse, facile colligi potest ex multis Hippocratis locis H. a. 443, 451, & 579. ubi eandem repetit; nam quæ observata in praxi sunt constantia, ea solet noster Auctor utplurimum aliquoties repetere, atque nos quoque in Praxi quotidiana idem experimur, quare hæc sententia tam universalis est in praxi, ut raro fallat.

Sudores frigidi qui dicantur.

II. Si ex cute ad attactum frigidiorē emanat sudor, qui cuti adhæret, & non facile evanescit, sed sæpe tam copiose effluat, ut guttatim supra cutim colligatur & interdum destillet, hujusmodi sudor a medicis vocatur frigidus. Intelligunt etiam in morbis acutis calidis non absolute majorem cutis frigiditatem, quam qualis observatur in hominibus sanis, sed frigiditatem comparativam ad illum morbum, etiamsi esset calor major, quam in sanis hominibus.

Sudoris frigidi causa.

III. Nisi constet, quam ex causa interna generetur sudor frigidus, semper incerta manet ex sudore frigido prognosis, nam ipse sudor frigidus tanquam causa non infert sequentia bona vel mala, sed quoniam designat, interne latita-

latitare causam, quæ sequentia producere potest. Si unica esset sudoris frigidi causa, semper quoque ex eo apparen- te eadem prædictio potuisset formari; sed quoniam ex multiplici & sæpe concurrentibus causis generatur frigidus sudor, ex eo apparen- te varia præfagia formari possunt. Veteres ex extincto Calore innato deducen- tes sudorem frigidum, per suam alienam hypothesin non raro a veri- tate aberrarunt, vel per suam adjunctam theoriam ob- scuriorem fecerunt doctrinam. Ex sudore frigido hoc sem- per constat motum vitalem in ambitu corporis, quo in no- bis generatur calor naturalis, atque in acutis instigato, ma- jorem, in sudore frigido esse minutum, ut ita corpus in- star aliarum rerum mortuarum frigescat. Sed quoniam cum minuto motu vitali etiam minuitur impetus ad cutim, hæc causa nequit inferre sudorem; quamobrem alia acce- dere debet causa, quæ cum minori impetu facit, ut sudor effluat. Talis causa est resolutio humorum in humorem tenuem, qui antea propter crassitudinem non facile me- re potuit per poros cutaneos, nunc sola contractilitate fi- brarum exprimitur: atque fit a pororum relaxatione, qua oscula magis patent. Quoties actio vitæ minuitur, minuitur quo- que constrictio pororum, & minuitur impetus, seu fit par- tium frigus, uti experimur etiam in sanis, si incidant in syncopen. Sed quoniam resolutio vario modo fit, inde in omnibus morbis ex sudore frigido non formatur idem præ- sagium. Perscrutemur causas solas, quæ in febre acuta Mortem præfagiunt, & in febre mitiori Longitudinem.

IV. Febres acutæ & sudores frigidi sunt veluti duo op- posita, quoniam in acuta febre semper habetur calor u- rens, & in sudore frigido cutis frigiditas; febris acuta hu- mores compingit in lentorem, unde cutis generatur sicci- tas, dum in sudore hoc habetur humidi abundantia. Ergo valde magna debet esse causa, quæ potest facere, ut natu- ra febris acutæ ita invertatur, ut inde fiat frigus & hu- miditas. Si perpendimus causam, facile inveniemus frigus tunc in acutis generari, si impediatur seu extinguatur mo- tus vitalis caloris causa, ut, etiamsi stimulus febris acutæ

Sudores fri-
gidi in Acu-
ta febre,
mortem.

maneat, tamen defectu spirituum influentium ex stimulo non sequatur motus major, qualis status habetur in mortem proximis. Altera causa est humiditas, quæ tunc fit si compactus sanguis dimittitur; hoc si fiat ex bona causa, uti in resolutione inflammationis & febris ardentis, tunc invenitur diminutio simul ardoris, sed tamen remanet calor temperatus, & exit sudor roridus, verum si dimittitur compactus, ut humor abeat in ichorem, quemadmodum in sphacelo, generatur frigiditas cum humidi expressione. Quare ex sudore frigido in acuta febre constat, dispositionem inflammatoriam abiisse in sphacelum. Sed si sphacelus corripit generalem massam, nemo aufugere potest. Hinc Auctor noster recte statuit, Sudores frigidos in febre acuta præfagire mortem.

Sudores frigidi cum mitiore febre, Longitudinem.

V. In mitiori autem febre, uti in hecticis, cacochymicis & scorbuticis febribus, sæpe observantur sudores frigidi sine morte subsequente: in his enim tantus non est calor, ut inde argumentari possimus, validam esse debere causam, quæ talem frigiditatem inducit. Neque in hujusmodi febribus tantus est humorum compactus, ut liquecere debeant ad sudorem producendum, cum hi homines simul nimia humorum tenuitate laborent. Quare ex levissima causa in his generantur Sudores frigidi. Hi autem apparentes morbi Longitudinem portendunt, quia proveniunt ex putredine spontanea, quæ non ita per tempora critica definit, uti fit in febre inflammatoria, sed putredo sensim procedens tandem hominem longa macie confectum interficit.

LIB. IV. A P H. XXXVIII.

148. **E**^T qua corporis parte inest sudor, ibi morbum esse indicat.

I.

SUdor in præcedente præbuit prognosin Mortis & Longitudinis, in hoc autem exhibet signum latentis mali: quare indicat & designat interdum sumitur in præsentis tempore, interdum in futuro. In hoc loco non determinat sudoris qualitatem & quantitatem, sed tantum locum, ex quo erumpit sudor. Locus est vel generalis vel particularis, de quibus observavit causam morbi latere in eo loco, uti in morbis generalibus, sudor erumpit per totum corpus, sed in partium morbis solummodo ea in parte erumpit Sudor. Non est opus examinare sudoris eruptionem in morbis partium externarum, cum ipse æger eam partem indicare potest; sed quando in visceribus morbus hæret, utile est ex apparente sudore iudicium ferre, quodnam viscus latens sit affectum. Quidam hunc Aphorismum ita late accipiunt, ut observationibus practicis in syncope & aliis morbis detectis, falsitatis arguant. Verum ita ut signum profertur ab Auctore, quod serè semper indicat internam partem læsam. Versatur enim auctor in morbis, qui conjunctam febrem habent, quare hæc observatio non pertinet ad tumores scirrhusos, strumosos, ganglia, vel alios tumores chronicos, sed si pars interna corripitur Inflammatione, Abscessu, vel Erysipelate. Hi tunc morbi intus latentes solent supra locum affectum in cute facere sudorem. Nam hi morbi facientes, vel potius habentes motum vitalem instigatum majorem in parte ea, quam per reliquum corpus, ex motu illo majore faciunt simul, ut in parte adjacente fiat major humorum directio & expulsio, quæ sudorem exhibet.

Morbus latens detegitur ex partis sudore.

LIB. IV. A P H. XXXIX.

149. **E***T* qua corporis parte inest calor, aut frigus, ibi morbus est.

I.

Calor partis, morbi signum.

Tantus est inter hunc & præcedentem Aphorismum nexus, ut potuisset facile in eadem sententia proferri: pertinet etiam ad detegendam partem affectam, quæ febrem simul concitat. Quare, quemadmodum in præcedente demonstravimus, irritatione partis circumquaque extrudi sudorem, hoc etiam est concipiendum de Calore. Est utique in nostro corpore generalis lex, ut quævis pars stimulata se magis moveat, & ita motu illo calorem in ea parte concitet, ex cujus consensu tandem quoque corpus reliquum incalescit, sed excellentior tamen manet in parte vellicata Calor, uti experimur in omni locali Inflammatione & Erysipelate: Quare partis Calor inter signa certissima recensendus, quando morbus Inflammatorius vel Erysipelatosus interne latet.

Frigus partis, morbi signum.

II. Si vero quadam in corporis parte nimium sentiatur frigus in acutis febribus, istud notat, inchoatam Inflammationem vel Erysipelas abiisse in sphacelum seu mortificationem; nam motu vitali conservatur naturalis in parte calor, quo motu extincto in parte ea percipitur frigus. Sæpe autem in acutis extrema frigent, dum tamen in istis non lateat morbi causa, sed quoniam ita fuere debilitatæ vires, ut motus vitalis debilior non valeat in extremis conservare naturalem calorem. Quare in Acutis pessimum est signum, si post ardorem internum quædam pars interna refrigeretur, vel si partes externæ frigeant cum ardore interno.

LIB. IV. APH. XL.

150. **E**T ubi in toto corpore mutationes, & si corpus perfrigeretur, aut rursus calefiat, aut color alius ex alio fiat, morbi longitudinem significat.

I.

Quidam morbi ex sua natura sunt longi, alii autem natura breves, quadam accedente causa fiunt longi, ut monuimus (*Aph.* 12, III). Hoc loco intelliguntur morbi breves seu Acuti, qui dicuntur longi futuri ex vicissitudine caloris & frigoris: an non etiam major longitudo promittatur in Chronicis, videbimus. Hæ Mutationes dicuntur fieri in toto corpore, id est in hac vel illa parte corporis; nam si voluisset intelligere totum corpus, dixisset Mutationes totius corporis. Observatio est de mutatione frequenti & inconstanti Caloris & Frigoris in quavis corporis parte, eam præfagire Longitudinem: nam si semel refrigeretur corpus in Acutis, notat recidivam: si vero periodicus fiat calor & frigus, indicium est febris intermittens. Ergo investiganda est causa diu durans, quæ simul inducit mutationes frigoris & caloris inordinatas. Hujusmodi inordinatæ mutationes contingunt in acutis, quando Inflammatio abit in *Suppurationem*, pus simul non evacuantem, quemadmodum fit, si abit pleuritis in *Empyema*. Sed tum præcipue, si morbus inflammatorius transit in *putrilaginem*, in qua frequens mutatio caloris & frigoris observatur. Utræque hæ causæ diu persistunt, quare signa externa has causas indicantia Longitudinem portendunt. Ex his non solum petere possumus prædictionem Longitudinis, sed etiam curatio ad morbum purulentum vel putridum dirigi potest.

II. Coloris observatio præprimis in facie detegitur, de ea mutatione frequente quoque, ut alius ex alio fiat, dicit eam morbi longitudinem promittere. Causa ergo mutatio-

Morbi longitudo ex mutatione Caloris & frigoris.

Ex mutatione Coloris.

nis in colore debet pendere a causa, quæ difficulter actione vitæ superari potest, & tamen non cito abit in mortem. Coloris quidem mutatio habetur, si morbus inflammatorius transit in Suppurationem, sed semel tantum hæc mutatio inducitur, ut color ruber abeat in pallorem: sed quando purulentus morbus est factus, & pus abit in putrilaginem, uti in phthisicis, frequentes fiunt & inconstantes faciei phlogoses, qui color igitur ex indicata causa semper longum morbum facit. Atque transitus morbi acuti in morbum chronicum putridum varios quoque infert colores. Quare coloris mutationes recte ab Auctore statuuntur morbi longitudinem præfagire.

L I B. IV. A P H. XL1.

151. **S**Udor multus a somno citra causam manifestam factus, corpus uberiori alimento uti significat. Si vero cibum non capienti hoc fiat, evacuatione indigere significat.

I.

IN hoc Aphorismo docet Auctor, sudorem multum a somno fieri, vel ex alimento copiosiore, vel sine alimentis copiosioribus; sed non monet, quid sit agendum in casu primo, verum in posteriore casu monet evacuandum esse. Utrumque casum rimabimur cum adjuncta cautela curatoria. In his semper supponimus, plures posse esse causas sudorem copiosorem producentes a somno, quas supponimus cum Autore non fuisse allatas; ut non habeatur major aëris caliditas, neque æger vel sanus assumserit sudoriferum, aut alimentum, quod sudorem movet; sed si sudor multus fiat a somno citra manifestam causam.

Unde sudor
multus a
somnia.

II. Multi disputant, cur a somno fiat copiosior sudor, quam in vigilantibus, veritatem experiuntur, sed ut detegant causam

causam, multum laborant. Veteres existimarunt, calorem innatum in somno concentrari, & ita magis valere ad expellendas humiditates. Neoterici contendunt in somno majorem fieri circulationem in dormientibus, quam in quiete vigilantium. Sed quoniam in Exercitatione nostra de Somno & Vigiliis demonstravimus, tardio rem fieri in somno circulationem; & quia caloris concentratio merum est figmentum, alia omnino est assignanda causa. Hoc constat omnibus, in somno totum corpus laxari, membra esse laxa & flaccida; atque ex pulsus exploratione constat, pulsum fieri tardio rem & molliorem: quibus omnibus concludere possumus, humores in somno minus compingi quam in vigilantibus, minoremque fieri insensibilem perspirationem, ut nos docuit fellæ usus. Itaque in somno, quæ compacta fuere, dimittuntur & liquecunt, pori cutanei laxiores, cum minori perspiratione, faciunt, ut id tenue transeat per cutis poros, sed quia humor non satis volatilis est factus, cuti adhæret & copiosiore sudorem exhibet: inde etiam somnifera quoque sunt sudorifera.

III. Sudor ut aliæ evacuationes componitur ex duplici specie humorum, materia nempe propria, & materia generali aquosa, quæ per reliqua etiam emunctoria eliminari potest. Hoc autem speciale est in Sudore, materiem specialem nunquam esse naturalem, ut est in alvi excrementis, urina & perspirabili, quoniam in homine sano sudoris evacuatio non requiritur, ut maneat sanitas, quod de reliquis dici non potest. Sed quando materia morbosa est in corpore, illa non raro sub sudoris forma exit, quæ tunc non facile per aliud emunctorium emitti potest. Ergo sudor multus formari potest, si multum de communi materia suppeditatur per alimentum copiosius; vel si magna copia materiæ morbi adest, quæ per cutim est evacuada. Si alimentum copiosius copiosum sudorem facit, melius erit, quam si non fiat copiosus sudor, sed præstantius esset alimentis non abuti: inde si intelligimus hominem a somno multum sudare, simulque ingerere multum alimenti, illa largior ingestio est minuenda, ne corpus tan-

Sudor multus ab uberiore alimento.

dem

dem crudis onustum succumbat: aut si relicta fuit caco-chylia, illa potest alvi ductione tolli.

Sudor multus sine uberiore alimento, an evacuatione eget?

IV. Si autem aliquis parcius vivens etiam a somno multum sudat, de eo scimus eum sudorem non generari ex materiâ per alimenta copiosiora suppeditatâ, sed quoniam abundat humor in corpore, qui sub sudoris forma exit. De tali sudore dicit, si fiat citra manifestam causam, eum egere evacuatione. Sed quam egeat, non addit. Hoc certum est, quod si ea materia maneat in corpore, plus damni fieri per alienam suam qualitatem, quam facit largiore evacuatione, ergo eget evacuatione ea: sed an illa evacuatio sudoriferis sit promovenda, an vero derivanda sit ad alvum, vehementer dubito, quamvis multi in ea sunt sententia. Fieri enim debet ille sudor citra manifestam causam, ergo non est criticus morborum acutorum, nam tunc ejus causa est manifesta; sed est sudor chronicus omni nocte a somno apparens in valetudinariis, in quibus nullum manifestum morbum detegimus, qui tantam copiam sudoris expellere posset. At vero talem sudorem colliquativum nocturnum hodie invenimus in ea specie phthisis, quam vocant nervosam, seu in emaciatione chronica colliquativa: Quod si in hujusmodi sudoribus propinemus sudorifera aut purgantia, ægri marasmo consumti pereunt. Sed si cohibeatur colliquatio illa spontanea per antiseptica roborantia, sensim minuitur sudor nocturnus, & æger lente sanitatem recuperat.

LIB. IV. APH. XLII.

152. **S**udor multus, frigidus aut calidus, semper fluens, frigidus quidem majorem, calidus vero minorem morbum significat.

I.

QUum sudor non sit naturalis evacuatio, sed semper vel arguit violentam causam exprimentem, vel abundantiam humoris morborum sub sudoris forma exeuntis, decernendum est num causa violens possit facere sudorem copiosum assiduo fluentem, an vero talis prodeat ex morborum humoris abundantia. Verum si causa violens hoc faceret, non fieret Sudor semper fluens, nam tandem deficiente humiditate compactis reliquis humoribus, subsisteret sudor: ergo semper fluens copiosus sudor indicat, humores bonos in humorem tenuem liquefcere, estque ergo certum indicium morbi putridi, qui permittit, ut corpus privetur omni humiditate, & ut privetur humoribus etiam bonis liquefactis; qualis morbus non solum est curatu difficilis, verum etiam sæpe transit in mortem, cum vix habeamus medicamina, quibus coarcere valeamus illam spontaneam putredinem, qua liquefcunt humores. Quod si cohibeamus per actu frigida effluentem sudorem, is alienus humor retentus eo magis inficit sanos remanentes, ut superius notavimus. Sive ergo copiosus sudor in Acutis vel Chronicis assiduo fluat, semper est malum indicium.

Sudor multus semper fluens, malum.

II. Si vero copiosus ille Sudor semper fluens simul sit frigidus, majorem morbum declarat, id est, ille tunc morbus multo difficilius curationem admittit, quod ex causa frigidum simul humorem generante est deducendum. Sive calidus sit sudor, sive frigidus, semper arguit putredinem, & deliquationem humorum: sed si frigidus simul sit, illa

Multus semper fluens frigidus majorem morbum indicat.

frigidity denotat motum vitalem tam debilem esse, qui non valet humores a spontanea corruptela coarcere. Igitur ut curetur ille morbus, antiseptica roborantia sunt adhibenda, quæ vitæ vires restaurant. Sed in cordialibus his hæret summa difficultas, possidemus quidem stimulantia & calefacientia, quæ videntur erigere vires, verum aperte fateri cogimur, nos nulla habere vera Cardica, quæ vires addunt: nam quæ stimulando id videntur facere, veras vires vitæ non suggerunt. Propterea hujusmodi sudores sunt periculosissimi, uti sæpe in Phthisi nervosa, seu Colliquativa chronica expertus sum.

Calidus autem minor morbum indicat.

III. Calidus autem assiduo fluens copiosus sudor minorem morbum declarat, non tamen sine periculo, sed comparative ad sudorem frigidum, quia arguit motum vitalem validius agentem, corrumpit humores & copiosorem sudorem extrudit. Igitur curatoria indicatio est in tali sudore cohibere putredinem & temperare nimium illum motum. At vero minuere nimium motum per refrigerantia multo facilius fieri potest, & ad hoc præstandum multa habemus auxilia. Quare hic morbus multo melius auscultat. Imo pergente morbo, dum sensim debilitantur vires, ille præternaturalis calor sponte minuitur. Si vero æque esset in nostra potestate susceptam putredinem cohibere & emendare, hic morbus curatu foret facilis; sed quoniam hoc difficile fieri potest; manet tamen sudor copiosus, calidus semper fluens morbus periculosus.

LIB. IV. APH. XLIII.

153. **F**ebres, quæcumque non intermittentes, tertio die vehementiores fiunt, magis periculosæ: quocumque autem modo intermittant, quod sine periculo sint, significat.

I.

Etiam si novus non incipit Aphorismorum Liber, novam tamen rem hic aggreditur Auctor, quum jam proponere incipiat multa observanda in febribus; quare antequam ea nostris commentariis illustremus, necessarium duxi brevem præmittere Definitionem & Divisionem febrium, ut in sequentibus constet, quid semper velimus per febrem intelligere. Nullus est in medicina morbus, de quo plures definitiones sunt traditæ, minusque inter Medicos constat, quid sit per febrem intelligendum. Maxima fuit nata difficultas, quum multæ sint febrium species, in quibus tamen omnibus collecta phænomena esse debent, ex quorum præsentia febrem adesse judicamus. Altera & non minor est difficultas, quod non omnia phænomena eodem tempore conspiciantur, dum tamen in Definitione videtur requiri, ut omne simul in eadem sententia proferatur. Verum apud Medicos manet Definitionis nomen, licet successu temporis quædam notiones inseparabiles proferendæ sunt; sed si plura alia adjiciuntur, quæ adesse & abesse possunt, tunc quoque vocant Descriptionem. Febris legitima, sive uno sive pluribus paroxysmis absolvitur, ille dicitur Morbus, qui incipit cum horrore, frigore & pulsu debili, pergit cum calore manente ægritudine, cum pulsu frequentiore & duriore, desinit in sudorem cum pulsu molliore & calore temperatiore, cum quo tandem desinit, si homo superstes manet. Conferri possunt, quæ diximus in *Comp. nostro* Tr. 52. II.

Febris definitio.

Febris Di-
visio.

II. Hujusmodi febres aliæ sunt Legitimæ, aliæ autem Symptomaticæ, quæ sunt solummodo symptomata aliorum morborum, in quibus non ita attendimus ad febris curationem, quam ad morbi febrem producentis naturam investigandam. In utrisque fit distinctio ex invasionis modo, ut sit febris Continua, Intermittens vel Remittens (Conf. *Aph.* 100, II). Ex conjunctione harum non parvus committitur error, dum Medicus judicet, omnem febrem, quæ eundem ordinem temporis servat, eandem esse febrem, dum ex Legitimis intermittentibus prolongatis sæpe fiant febres Continuæ & Remittentes; atque ex febribus symptomaticis itidem Remittentes & Continuæ fiant, imo interdum videantur veræ Intermittentes. Quare in sequentibus observaturi sumus, qualisnam febris an legitima an vero symptomatica sit intelligenda, si ratio sit reddenda alicujus phænomeni.

Febris
non inter-
mittens ter-
tio die ve-
hementior,
periculosa.

III. Ex exacerbationibus tertio die vehementioribus constat, Hippocratem hic non intelligere febrem Continuam, neque intelligendam esse Intermittentem, cum dicat *non Intermittens*. Ergo si febris hæc ad suum genus referenda sit, pertineret ad febres Remittentes, quæ Syneches dicuntur seu Continentes; & quoniam tertio die fiunt exacerbationes, ea est species, quæ vocatur *Tritæophyes*. Hoc autem non sufficit ad prædictionem formandam, quum *Tritæophyes* febris generetur ex febre Intermittente tertiana, atque ex morbo aliquo latente, cujus febris hæc est symptomata. Observamus in praxi Putredinem humorum, & Pus in corruptelam conversum hujusmodi febrem generare, quando raro ægri emergunt, quare periculosa est *Tritæophyes*, quoniam designat ex valida putredine oriri, quæ ita facit Exacerbationes febriles alterno die, ut tempus intermedium non habeat Apyrexiam. Generatur etiam *Tritæophyes* ex febre intermittente Tertiana ita prolongata, ut sequens paroxysmus incipiat, priusquam prior desit. Sed omnes febres intermittentes in remittentes convertere, quoniam magnum augmentum causæ arguunt cum virium defectu, etiam periculum portendunt. Hoc autem discrimen
admo-

admodum observandum in curatione, quum Tritæophyes ex putredine antisepticiis sit curanda, sed ex intermittentibus prolongatis optime auscultet antidotis.

IV. Quotiescumque autem Tertianæ febris veram Apyrexiam habeat, ex ea Apyrexia cognoscimus, illam intermittentem non formari ex putredine vel pure corrupto; ergo de hac febre judicandum, ut de omnibus legitimis intermittentibus, quæ rarissime interficiunt hominem, nisi ita fuerint prolongatæ, ut nullam apyrexiam habeant, omni periculo carere. Atque inde deducere possumus, istos non recte agere, qui in intermittentibus tam diu expectant, donec corpus sit ex ægritudine debile, priusquam antidotum propinant. Atque ex eadem observatione manifestum est, quasdam febres continuas & remittentes antidotis auscultare, quum interdum ex intermittentibus prolongatis fiant remittentes & continuæ febres.

Tertianæ
Intermittentes
periculo
vacant.

LIB. IV. APH. XLIV.

154. **Q**uibus febres longæ, his tubercula ad articulos, aut dolores fiunt.

I.

Quam Auctor dicat febres, noluit solummodo intelligere febres præcedentes tertianas remittentes, sed & reliquas omnes tam continuas quam intermittentes. In his præcipit Tubercula ad articulos aut Labores seu Dolores: sed quia hæc observatio non est constans in praxi, operæ pretium erit rimari causas Longitudinem inferentes, ut ex cognita causa possimus iudicium ferre, quid sit ex febrium longitudine præfagiendum. Febrium omnium causa nobis est res aliena, quæ actione vitæ est subigenda & expellenda. Quoties ergo (1) tanta est ejus materiæ copia, ut vi vitæ integre subigi non possit, febris protrahitur. (2) Aut si materiæ non est abundantia, sed

Febris longæ
& causa.

in corpore habetur debili, cuius vires languidiore non valent modicam subigere materiæ copiam. (3) Vel si materiæ indoles est pertinacissima, quemadmodum in intermittentibus febris quartana, & in remittentibus & continuis febris putrida, vel continua inflammatoria, quæ pus confectum critrice non evacuat. Si attendimus ergo ad retentam materiem in febre longa, illa erit vel cruda febrilis, vel purulenta vel putrida, quæ humoribus circulantibus mista febrem continuare facit.

Quando
articulorum
Tubercula
vel dolores
facit.

II. Si vero ex febris longitudine constet, materiem oberrare in corpore, non certe scimus, circa articulos futura esse tubercula, dolores vel labores; sed inde præfagire possumus omnia mala, quæ ex materia retenta oboriri solent: uti morbi augmentum, recidivam, metastasin, & commutationem in alium morbum, nisi dicta mala præveniantur critica evacuatione. Quare non debemus otiosi esse expectantes articulorum tubercula vel dolores, sed omni ope tentare materiæ coctionem & coctæ determinationem ad emunctoria, ut corpus liberetur ab hoste, qui multa mala minatur.

LIB. IV. APH. XLV.

155. **Q**uibus tubercula ad articulos, aut dolores ex febris longis fiunt, hi pluribus utuntur cibis.

I.

IN præcedente Aph. observavimus tres diversos humores a febre relinqui, qui finito morbo priore, novum alium morbum faciunt; imo interdum tam diu non expectare, sed etiam nondum finito priore, novum formare vel prioris recidivam facere. Tunc simul notavimus, incertam esse prædictionem Tuberculorum aut Dolorum ad articulos, quum plures exitus hujus materiæ retentæ fieri possunt.

Hoc

Hoc etiam ab Auctore nostro fuisse observatum, nullus dubito, quum hunc Aphorismum statim subnectat, dicens Tubercula vel Dolores aut Labores articulorum fieri post febres longas, quando ægri hi utuntur cibis copiosioribus. Ex his verbis intelligi potest, cibum copiosorem in corpore debilitato a febre longa facere hæc Tubercula vel Labores articulorum. Quæ sententia non ita est repudianda, dum crudum ex abundanti cibo in corpore debilitato natum facile possit ad articulos deponi. Sed quoniam ægri non utuntur cibis copiosioribus a febre longa, nisi simul in his restituatur appetitus, ex fame igitur redeunte post febrem longam videndum est, qualis materia continuavit tamdiu febrem, aut quæ relicta fuerit febre finita sine bona crisi. Si perpendamus triplicem materiem a febre relictam, facile erit invenire, materiem Crudam fuisse relictam, & dein cibo copiosiore magis accumulata: nam si remaneat vel Pus corruptum, vel Putrefactus humor, nunquam finita febre redibit appetentia, cum omne corruptum & putrefactum famem extinguat. Ergo constat, si finita febre redeat appetentia, cum imperfecta sanitate, quando æger valetudinarius manet, in tali corpore relictum fuisse crudum, quod naturalem sensum famis ex defectu nutrimenti natum non extinguit. Cavendum ergo est in hujusmodi valetudinariis corpus onerare alimentis, si velimus evitare Tubercula vel Labores ad articulos, sed parca diæta est instituenda tamdiu, donec omnis cacoehylia sit superata vel expulsa, & corpus naturalem vigorem recuperaverit.

LIB. IV. APH. XLVI.

156. **S**I rigor incidat feбри non intermittenti, debili jam existenti ægro, Lethale.

I.

Rigoris
definitio.

Rigor Græc: ῥίγος est morbus ex duobus conjunctis phænomenis nominatus, scilicet ex frigore corporis & constrictione quadam forti & utcumque tremente in motu animali: nam si refrigeratio habetur cum levi tremore & quasi cito decurrente per corpus, *Horror* vocatur. Unde non immerito dixit Hipp: Horror est levis Rigor, & propterea a practicis unum pro altero ponitur sæpe, quum hic duo sic dicti morbi tantum magnitudine differant, sed Horror leviolem, Rigor autem graviolem & diutius durantem causam habeat. Facile erit ex his Rigorem distinguere a suis congeneribus morbis, Spasmo, Convulsione, Tremore & Frigore. Nam in Spasmo constans est musculorum constrictio & in Convulsione alterna involuntaria valida constrictio sed sine frigoris sensu. In Tremore laxa est membrorum concussio, quæ tensiva est in Rigore. Frigus autem corporis non habet constrictionem musculorum.

Rigoris
Causæ.

II. Rigoris causæ multæ sunt, quæ hoc loco omnes non possunt recitari. Sed si istas percurramus omnes, detegimus cunctas indicare, noxium aliquid applicari nervis motui & sensui dicatis. Nam id noxium subito inducit musculis motus animalis quandam constrictionem involuntariam, & minuit vitalem motum, ut inde generetur frigoris sensus, atque ita minatur actionis vitalis interitus. Illa causa tam in morbis chronicis quam acutis observatur, in chronicis autem, quia raro tam valida est causa, frequentius fiunt Horrores, quam Rigores. Qui Rigores fiunt in invasione febrium intermittentium, non ita periculosi sunt; sed

sed in Continuis vel sunt Critici, futuram evacuationem præfagientes, vel Symptomatici, qui semper mali. Sed quia Rigores agnoscunt magnam causam, inde observavit auctor noster H. a. 551. *Rigor una cum judicatione aliquatenus horrendus.*

III. Superius observavimus, febres Remittentes fieri vel ex pure corrupto, vel putredine, vel intermittente prolongata: in his si tam valida sit causa, quæ Rigorem inducere potest, certe non caret periculo, quod etiam Hipp: a. 524 observavit: *Rigores, inquit, velut in febre tertiana si in media inordinata febre exacerbentur, valde maligni sunt.* In his enim febribus fiunt Rigores, si morbus commutatur in sphacelum.

IV. Quod si æger jam ex febre non intermittente fuerit debilitatus, corripitur Rigore, nulla spes esse potest curationis vel commotionis criticæ: nam si designat morbi vel paroxysmi principium, ut indicare consuevit, hoc principium lethale erit, quum æger jam ex præcedente febre fuerit debilitatus, ferre non poterit sequentem paroxysmum validum, qui cum Rigore tanquam signo paroxysmi validi inchoat. Si vero Rigor proveniat ex commutatione in sphacelum, nil melius prædici potest, quum sphacelus humorum in corpore debili mortem certissimam infert.

LIB. IV. APH. XLVII.

157. **E**Xscreationes in febribus non intermittentibus lividæ, & cruentæ, & graveolentes, & biliosæ, & omnes malæ sunt. At probe secedentes, bonæ. Et eadem ratio est quoad alvi egestionem, & quoad urinas. Si vero nihil ex conducentibus excernatur per hæc loca, malum.

I.

Sensus.

QUum sensus hujus Aphorismi non admodum planus sit, quædam præmittenda esse judicavi, ut constaret, quæ res in hoc aphorismo sunt exponendæ. Omnium primum constat, Auctorem signa bona & mala voluisse tradere in febribus non intermittentibus. Ex istis selegit Evacuationes, quæ in Remittentibus deteguntur, per Exscreationem, per Alvum & Urinam. Ex istis pro specimine eligit Sputum, cujus malas notiones citat, ut sit lividum, cruentum, foetens, & biliosum, de his omnibus dicit malum portendere: atque similes evacuationes per alvum & urinam quoque malas esse, adstruit. Dein observat sputum bonum, ut & reliquas evacuationes conducentes ægrum liberare posse a febre Remittente. Sed si in febre Remittente nihil de materia bonæ indolis evacuetur, hoc etiam damnat. Ergo mala materia in Remittentibus evacuata nocet, bona vero conducit, & nihil evacuari, quoque malum est.

Qualia
sputa mala
in remittentibus.

II. Remittentes febres esse symptomaticas ex Putredine vel Pure corrupto natas sæpe observavimus, si pus vel putredo illa latitat in pulmonibus: quæ exscreando rejiciuntur, declarant naturam materiæ retentæ; Sputa ergo livida, cruenta, foetentia, vel flavescientia, biliosa dicta, demonstrant, talem humorem in pulmonibus colligi, qualia corrupta si ex ulcere quovis ejiciuntur, non permittunt ulceris consolidari.

solidationem, & eo minus, si ulcus habeatur in pulmonibus cum febre remittente, quæ declarat, totam massam simili corrupto humore infectam esse. Quare talia sputa mali sunt ominis.

III. Sed si Purulentum febrem remittentem faciens sensim minus corruptum exit, id valde bonum, quemadmodum in omnibus ulceribus, si bonum pus, satis copiosum, & tamen non nimis abundans emittitur, spes consolidationis elucescit. Inde in febre remittente si emittantur sputa alba, æqualia, inodora, libere exeuntia, quæ levant symptomata, modica copia ejecta, sanitatem promittunt: ita enim spes est, totum purulentum ejici posse & ulcus pulmonis consolidari.

Qualia
sputa bona
in Remittentibus.

IV. Sive sputa illa bona sive mala antea prodierint, sed deinceps supprimantur, mors imminet. Nam si sputa corrupta ejiciebantur, adhuc potuit morbus protrahi, utpote continuo liberabatur corpus a corrupto humore, dum id corruptum insuper retinetur, mortem accelerabit. Immo sputum bonum retentum, quod evacuatum promittebat sanitatem, diuturniore mora convertetur in putrilaginem, quæ ut alii humores corrupti totam massam inficiet, & ita jugulabit vel sua copia majore, vel aliena indole, ægrum.

Sputum
nullum in
remittentibus malum.

V. Tandem ex speciali observatione sputi condit generalem regulam evacuationis urinæ & alvi egestionis. De quibus idem est concipiendum, quod alvi excrementa vel urina corruptionem in Remittentibus indicantia, malum præsagium præbeant: sed bona exeuntia sanitatem. Si vero nihil per hæc emunctoria exit in morbis, qui per talia emunctoria solent eliminare suos humores, tunc semper erit malum omen. Quæ autem bona & mala dicantur alvi excrementa, & qualis urina profit vel noceat, aliis in locis traditur.

Urina &
alvi egestio
bona & mala in Remittentibus.

LIB. IV. A P H. XLVIII.

158. **I**N non intermittentibus febribus, si externa quidem frigida sint, interna vero urantur, & sitim habeant, lethale.

I.

Nonnulli existimarunt, hanc febrem non Intermittentem denotare febrem Continuum, quoniam alibi auctor noster eandem sententiam profert de febre continua. Ea autem conclusio mihi non videtur satis valida, quum eadem phænomena fieri possint a diversis causis, & quia versatur in prognosi formanda febrium non Intermittentium, quas demonstravimus hodie vocari vel Remittentes vel Continentes. Has oriri demonstravimus vel ex putrefactis humoribus, vel ex Pure corrupto. Si igitur ex his deduci possit frigus partium externarum cum ardore interno atque siti, videndum tunc ulterius erit, quid boni aut mali dicta phænomena portendant.

Ardor internarum
in remittentibus unde?

II. Internæ partes dicuntur illæ omnes, quæ nec oculo patent, neque externo tactu explorari possunt a medico; adeoque viscera ventris & pectoris: in quibus si habeatur vel calor vel frigus, a medico cognosci nequit, sed ab ægro indicari debet. In his partibus per varias causas generari potest Ardor, sed causæ hæc diversæ non faciunt reliqua phænomena similia, unde ex conjunctis phænomenis colligere debemus causam latentem ardorem inferentem, ut videamus, quænam causa latens non solum ardorem inferre potest, sed etiam reliqua phænomena. Adest febris Remittens, unde possumus concludere, neque Inflammationem neque Erysipelas eum Ardorem inducere, quia his morbis conjuncta est febris continua. Hinc Ardor internarum partium cum febre Remittente denotat, interna viscera agitari a materia corrupta motum vitalem instigante. Ea autem materia est vel biliosa, vel pinguedinosa, vel purulenta corrupta,

rupta, quoniam reliquorum humorum corruptiones non inferunt vellicando tantum ardorem. Quoniam omnes morbi putridi sunt periculosi, illi excellunt, qui putrefactum habent in visceribus internis, unde evacuari nequit, & quarum partium functiones depravatæ vel extinctæ mortem inferre possunt. Hinc etiam si nullum præterea adesset malum signum, nisi febris Remittens cum Ardore partium internarum, hoc solum sufficeret ad prælagendum periculum.

III. Per partes externas hoc loco intelliguntur tota cutis, facies, membraque externa. In his si simul habeatur frigus, lethale pronuntiatur in Remittentibus. Multi negant, tale quid observari posse in febribus, quia Calor & Frigus simul constare nequeunt. Nos autem in periculose decumbentibus sæpe hæc duo simul observavimus, quod ægri conquerebantur de incendio interno, quasi viscera urebantur, dum tamen partes externæ vel erant tepidæ vel etiam algidæ. Veteres multum laborarunt ex sua hypothese de Calido innato, & Neoterici ex ebullitione, aut fermentatione hæc opposita phænomena explicare, sed semper occurrebant trices, quæ plenam sententiam repudiabant: neque feliciorem theoriam posuerunt, hæc ex obstructione qui deducere conati sunt, quum sæpe integrum viscus post mortem inveniatur obstructum sine ullo ardore interno prægresso. Sed si attendamus ad legem generalem corporis viventis, quamcumque partem stimulatam se magis movere, & illum motum vitalem esse causam naturalem caloris, facile intelligitur, si acre rodens hæreat in visceribus internis, eam partem admodum calere, & si vehementior sit rosio, partem videre comburi, ut experimur in cute, si applicatum hæret phœnigium. Sed tunc tamen ea videtur restare difficultas, quomodo inde fiat frigus partium externarum, quum ex lege stimulantium & calefacientium applicatorum vel assumptorum totum corpus concalescat. Hoc utique semper verum est, modo vires vitæ tantum valeant, ut ex parte stimolata per totum corpus motus vitalis major fieri possit: sed si simul habetur summa spirituum penuria, & virium defectus, pars quidem stimolata ardet, sed in reliquo corpore defectu virium non propagatur ille motus major,

Frigus Ex-
ternarum in
remittenti-
bus unde?

sed ex motu languidiore in partibus externis generatur frigus. Propterea pejus est, si partes externæ simul frigent, dum interna videntur uri, quoniam in tali febre non solum designatur Corruptela, sed etiam summa Debilitas.

Sitis in
Remittente
unde?

IV. Sitim non solum generari ex tenuis aquosi penuria aut oris siccitate, verum etiam ex putrefacto bilioso & pingui, in nostra Exercitatione de Siti demonstravimus. Hoc etiam fieri in hac febre Remittente, luce meridiana clarius patet; tantus enim calor aut siccitas non habetur in ore, ut inde nimiam sitim conjicere possimus: dum hi ægri non raro cum ore frigido & humido admodum siticulosi sint: tunc nempe si id putrefactum simul feratur ad os, quod sua qualitate sitim infert, quæ multo potu non placatur, ut sit in siti ex siccitate. Hoc signum licet non adfuisset, morbus tamen per se, ut ex iis, quæ superius exposuimus, fuisset periculosissimus, nunc vero accedente siti, quæ declarat putredinis dispersionem per corpus, aggravatur præsagium malum.

L I B. IV. A P H. XLIX.

159. **I**N febre non intermittente, si labium, aut supercilium, aut oculus, aut nasus pervertatur, si non videat, si non audiat, corpore jam debili existente, quidquid horum fiat, in propinquo mors est.

I.

PErgit Auctor noster in Remittentibus ex phænomenis formare prædictiones, quæ fundatæ sunt in meris observationibus, constanter in ægris detectis: quamvis igitur hæc solæ haberentur sine causarum expositione, sufficerent in praxi ad formandas prædictiones. Sed quoniam harum apparitionum investigatio apud omnes medicos laudabilis habetur, atque conducit ad alias res obscuras elucidandas, hæc phænomena ex suis causis eruere conabimur, ut eo firmiorem habeamus cognitionem. Casus est febris
Remit-

Remittens cum summa debilitate: si in tali statu vel inordinatus fit motus animalis in musculis faciei, vel si sensus auditus vel visus extinguuntur, tunc observavit, mortem in propinquo esse.

II. Ut vires corporis valeant, requiritur spirituum bonorum liber & satis copiosus influxus, quare vel ex intercepto fluxu vel spirituum defectu aut alienata indole debilior generatur actio movens. Verum interceptum transitum, aut paucitatem spirituum non possumus in febre remittente accusare: nam ex spirituum defectu oritur quidem debilior motus, sed sine febre; atque spirituum fluxus interceptus particularem paralyin parit, minime vero debilitatem universalem cum febre. Quare Debilitas magna in Remittentibus arguit, naturam spirituum ita esse inversam, ut inepti sint ad motum in nostro corpore præstandum. Inde admodum valens est corruptio, quæ etiam invertit istos humores, quorum efficacia boni præparandi erant humores. Quo igitur in febribus Debilitas est major, eo majus imminet periculum.

Debilitas
in remittente
quid notat.

III. Satis constat in febribus remittentibus cum summa debilitate, nasum, supercilium, oculum, vel labrum non converti per convulsionem ex spirituum abundantia, aut majore motu, quum deficiat in corpore causa movens: sed quoniam muscoli omnes harum partium nervos habent ex medulla oblongata cerebri provenientes indicium est, id acre quod febrem remittentem facit, translatum esse ad interiora encephali, cujus irritatione hi motus inordinati in partibus faciei fiunt. Vel inde provenire potest, quod muscoli antagonistæ resolvantur subsistente spirituum influxu. Sive hoc, sive istud fiat, utrumque mortem instare, declarat: nam materia morbi ad interiora encephali translata, omnem cerebri actionem invertet.

Faciei
motus tunc
mutatus
mortem
prælagit.

IV. Non solum visus & auditus extinctio in Remittentibus, corpore jam debili existente, instantem mortem prælagit, sed etiam aliorum sensuum extinctio hoc etiam promittit: ut si quis antea siticulosus, sine bona causa non amplius sitiat; aut si pars dolens non amplius dolorem exhibeat: cuncta hæc arguunt ita inversos aut extinctos esse spiritus, ut isti sensus non amplius exerceri possint. Adeoque in

In his vi-
sus & audi-
tus extinctio
mortem
prælagit.

organis

organis sensuum jam inchoata mors est, quæ brevi post quoque reliquas actiones vitales exstinguet.

LIB. IV. APH. L.

160. **U** *Bi in febre non intermittente difficultas spirandi & delirium fit, lethale.*

I.

Pergit Autor noster in eadem morbi specie ex supervenientibus symptomatibus formare prognosin: in præcedente tradidit symptomata sensus & motus animalis, quæ propterea mortem præsagebant, quoniam indicabant materiam corruptam vel putridam in encephalo colligi, vel versus eam fecisse metastasim. Nunc dicit Difficultatem spirandi & Delirium, lethale esse. Non sine ratione hæc duo symptomata junguntur ad designandum, unicum locum affectum esse, ex cujus oppressione vel agitatione utraque hæc symptomata superveniunt: nam si solummodo dixerat Difficultatem Respirandi, forsan materia febris non quiescentis, ut vocat Celsus, occupasset pulmones, sed quoniam addit Delirium, inde concludere possumus, eam partem esse affectam, in qua spiritus conficiuntur, pro Ratiocinio & motu Respiratorio. Quemadmodum in Encephalo conficiuntur ad motum musculorum in facie, & auditum & visum exercendum: ita in eodem etiam loco conficiuntur, quibus utimur ad bene ratiocinandum, & respirandum. Si ergo in febre Remittente duæ actiones simul afficiuntur, quæ utræque ex Encephalo accipiunt spiritus, etiamsi altera harum in pectore exerceatur, admodum verisimile est, causam hæerere ad locum communem. Potest tamen esse, ut duæ partes simul afficiantur, sed in hoc Aph: crediderim, causam latitare in encephalo, versus quod febris remittens fecit metastasim, quæ turbavit æquabilem motum ad judicandum & respirandum requisitum. Quamobrem tamen non æque in hoc, quam in præcedente dixerit, mor-

mortem instare, meretur observari. Locus quidem in utrisque est communis, & actio respiratoria extincta periculosior, quam si extinguatur Visus vel Auditus: verum in præcedente adjecerat signa summæ debilitatis, ex quibus colligere potuimus, functiones jam incipere extinguui; verum in hoc Aph: solummodo notat perturbatam actionem, nam homo non Delirat ex deficiente actione sed turbata, ita etiam Difficile respirat, quod si non respiraret, signum esset extinctæ actionis. Igitur, quia extincta actio mortem instare declarat, sed turbata actio periculum promittit, in hoc aphorismo duntaxat posuit Lethale.

LIB. IV. A P H. LI.

161. **I**N febribus abscessus, qui non solvunt ad primas judicationes, morbi longitudinem significant.

I.

Interpretes multum laborant, num *Solvunt* active vel *Solvuntur* passive intelligi debeat, nos autem magis attendentes ad illustrandam scientiam medicam, quam extollendam Hippocratis sententiam, hanc interpretationem Criticis relinquimus, solummodo notantes, si intelligi debeat solvuntur, uti videtur ex Textu græco, sensus hujus Aphorismi non esset Praxi conveniens, nam Abscessus nunquam ad primas judicationes solvuntur, sed sensim evacuato pure, sanantur: verum Abscessus solvunt febres vel statim vel tarde, & tunc Aphorismus hic egregiam regulam prognosticam præbet in medicina.

II. Ut febris per Abscessum in quadam parte natum tollatur, necesse est, ut sit febris, cujus materia in pus commutari potest. Verum præcedentes febres Remittentes nunquam formant pus, sed putrilaginem, quare in hoc loco sapienter non posuit febres non intermittentes, sed absolute in febribus, acsi indicare vellet, se in hoc loco non agere

Qualis febris abscessu finitur.

de Remittentibus, sed de febribus Continuis, quæ materiem purulentam formant, quæ quoque in Intermittentibus rarissime formatur. Quamobrem in hoc loco intelligenda est febris Continua, quæ potest per criticam evacuationem desinere vel per Abscessum.

Longitudi-
nis prædicti-
o ex absces-
su in febrili-
bus.

III. Omnes febres, quæ desinunt per Abscessum, longiores sunt iis, quæ per criticam evacuationem terminantur: nam nunquam tam perfecte tollitur febris materia in formato abscessu, quam per aliquod emunctorium, cum nunquam natura Abscessum formet, si satis valeat materiem eliminare per emunctorium; illa igitur debilitas causa est, cur non satis perfecta fiat materiæ separatio. Atque ipsa separatio a communi massa non liberat ægrum a toto morbo, cum fiat materiæ depositio in quadam corporis parte, ubi novum morbum format. At vero scopus Auctoris non est docere longitudinem ex febre quæ desinit per abscessum, sed febrem longiorem futuram, si statim ac apparet abscessus non quiescit. Ut enim perfecte desinat morbus præcedens per Abscessum, necesse est, ut omnis morbi materia ab eo abscessu recipiatur. Quod cognoscimus, si statim quoque desinit febris: sed si perfecte non quiescit febris, signum est totam febris materiem in abscessu non esse depositam, quod residuum, ut signum debilitatis virium, morbum prolongabit.

LIB. IV. APH. LII.

162. **Q**Uicumque in febribus, aut in aliis infirmitatibus, ex proposito (id est ob causam) lachrymantur, nihil inconueniens. Qui vero non ex proposito, magis inconueniens.

I.

Scopus.

Continuat Auctor formare prognosin ex phænomenis, quæ febribus superveniunt, sed ut generaliore doctrinam faceret, adjecit alias infirmitates sine febre, in

in quibus omnibus dicit, inconueniens magis, vel absurdius esse, si non ex proposito vel involuntariæ copiosæ lachrymæ fundantur. Etiam si Lachrymæ egregiam partem Phænomenologiæ constituerent, a paucis autem medicis ita exponuntur lachrymæ ex suis causis, ut ex lachrymis apparentibus aliquid certi constituere valeamus. Copiosius in hoc Aphorismo proponit Auctor Lachrymarum stillicidium, ut inde ferat iudicium in morbis. (1) Quæ lachrymæ copiosiores fluunt ex cognita causa. (2) Quæ producuntur ex causa latente. De utrisque seorsim acturi sumus.

II. Ex glandula lachrymali innominata dicta, supra oculi bulbum in fovea ossea hærente stillat assiduo liquor pellucidus, tenuis instar aquæ, qui irrigat oculi partem anteriorem, ut maneat humida & pellucida, atque depurata, si forsan aliquid ei adhæreret, dein absoluto munere recipitur punctis lachrymalibus, ducitur in saccum lachrymale & dein cava narium, ubi evanescit: Si autem maiore copia secernatur, quam ut ita recipi possit a punctis lachrymalibus, vel si illa via sit interclusa, supra palpebram inferiorem adscendunt lachrymæ & exstillant. Hoc stillicidium frequentissime generatur ex animi pathematibus, oculi vel narium irritatione, vel quia, ut diximus, via est interclusa, sed si ex his causis fiat, nullum indicium præbent boni vel mali in morbis totius corporis, quum tales fiant ex vitio organi, & inde solummodo particulare, minime autem generale vitium declarant: & inde in morbis generalibus non censentur inter signa.

Lachrymæ copiosæ ex manifesta causa nil boni aut mali præsagiunt.

III. Etiam si febris esset præsens, si lachrymæ copiosæ fluant, inde etiam nullum fieret iudicium; sed si dictæ causæ absint, atque ex indole febris copiosæ funduntur lachrymæ, tunc indicium est, sanguinem ferri maiori impetu ad caput, atque tunc ea mala expectamus, quæ ex hoc maiori impetu deduci solent. Eam prædictionem rotundis verbis exposuit noster Auctor H. a. 667. *Quibus in febribus acutis, magis ardentibus, lachrymæ invita defluunt, his sanguinis a naribus eruptionem expectare oportet, si etiam alia perniciose non habent: nam his qui male habent, non sanguinis eruptionem, sed mor-*

Ex latente causa in febre quid notant.

tem significant. His constat, cur dixerit *magis Inconveniens*, quoniam interdum mortis instantis signum est.

In aliis in
firmitati-
bus quid
morant.

IV. Simili quoque modo ratiocinandum est in quibusdam aliis morbis cum & sine febre. Nam in *Apoplecticis* & *an- ginosis*, si lachrymæ voluntariæ fluant, vel ex dictis irritatio- nibus nihil boni vel mali præfagiunt: Sed si fiant ex impe- dito reditu sanguinis per venam jugularem, pessimum indici- um præbent, cum sanguis in encephalo collectus cerebrum & cerebellum ita comprimet, ut omnis circulatio spirituum supprimatur.

LIB. IV. A P H. LIII.

163. **Q**uibus in febre ad dentes viscosa circumnascun-
tur, his febres fiunt vehementiores.

I.

Viscidita-
tis dentium
causa.

Visoso vel lento humore dentes obsidi, sæpe observa-
mus in praxi tam in morbo acuto quam chronico:
hujus originem ex variis causis deducunt; quidam
putant, ex dentium substantia exhalantes humores condensa-
ri; alii vapores ex ventriculo vel pulmonibus exhalantes,
frigidityte dentium condensatos accusant; denique quidam
contendunt, glutinosa esse alimenta. Sed si rimamur expe-
rimenta, quæ probant dentium solidam substantiam crassos
non transmittere humores; œsophagum nihil nisi in ructi-
bus & vomitu emittere, atque tracheam solum humorem
integre volatilem exhalare; atque glutinosum hoc nasci post
oris collutionem, sine cibo deinceps sumto generari, facile
persuademur omnes istas allegatas causas inanes esse con-
jecturas. Quare causa quærenda in humoribus, qui in ore
ipso secernuntur, sive sit mucus naturalis, sive saliva in os
deposita. Hi humores vitio morbofo lentiores nati in os de-
positi, magis dentibus quam partibus reliquis adhærent:
quum partes reliquæ ex sua substantia emittentes humidita-
tem

tem id tenax depellunt; Dentes autem humidum non emittentes, adhæſioni favent. Inde etiam tenacia unguibus applicata diutius & tenacius adhærent, quam cuti. Signum igitur est, quoties sorditate vel glutinoso obſeſſi inveniuntur dentes, quod in humoribus in os depositis prædominet potentia concreſcendi. Quod ſi ſolummodo in his humoribus hoc vitium haberetur, nihil mali inde præſagiri poſſet. Sed quoniam iſtud glutinoſum raro in ſolo humore ſalivoſo prædominat; inde tanquam ſignum generale totius maſſæ accipiendum eſt.

II. Omnis circumnata dentibus viſciditas non eſt ſignum febris vehementioris, quum ſæpe in chronicis admodum fordeſcant dentes, ſine ullo febris indicio: ſed quando hæ ſorditates dentibus adhærentes conſpiciuntur in febribus, tunc ſemper vehementem febrem indicant. Nunquam enim humores motu circulatorio aucto convertuntur in glutinoſum corruptum, niſi motus ſit validiſſimus, qui gelatinam compingit in denſum & corruptum lentorem. Quæ ergo conſpecta phænomena, ut eſt viſcoſitas dentibus circumnata, ſunt effecta vehementioris circulationis, eadem quoque probant, aſſeſſe febrem vehementem. Quare hoc ſignum probat, aſſeſſe febrem vehementem ſed non futuram: verum febrem periculoſam futuram; quoniam humores ita compacti difficulter per bonam criſim evacuari poſſunt; & eſt quoque ſignum Longitudinis, cum lentus humor longo tempore eget ad ſolutionem. Utiliſſimum itaque eſt inſpicere os in febribus, non ut duntaxat formemus prædictionem ex phænomenis inventis, ſed ut etiam inde habeatur curatoria indicatio: nam quoties inveniuntur dentes viſcoſo obſeſſi, eam febrem curare debemus ut vehementem febrem. Et ut levetur hoc ſymptoma, os eſt colluendum abſtergente antiphlogiſtico.

Cur den-
tium viſci-
ditas cir-
cumnata,
ſignum fe-
bris vehe-
mentioris.

LIB. IV. APH. LIV.

164. **Q**uibus diu tusses siccae, paulum irritantes, in febribus ardentibus, non admodum siticulosi sunt.

I.

Sitis con-
stans symp-
toma in ar-
dentibus.

Tria primaria signa numerant practici ad definiendam febrem ardentem, Calorem urentem, Siccitatem magnam, & Sitim vix ferendam. Cur autem sitis fiat in ardentibus, hoc loco exponendum est. Sitis est sensus species in nobis, qua instigamur ad hauriendum potum. Hic sensus nobis a Deo est concessus, ut cognosceremus, quando in nobis est defectus, qui ingestione potionis est supplendus, ut famis ad petenda alimenta, & tactus ad evitanda mala applicata. Quoties itaque in nobis est humidi defectus, naturale est, ut percipiamus Sitim. Ergo solummodo esset demonstrandum, in ardentibus defectum humiditatis esse, quæ res tam plane constat, ut nulla egeat expositione, quum motu circulatorio aucto omne humidum expellatur, & quod expelli non potest, compingatur in lentorem. Hanc siccitatem seu defectum humiditatis in ore & faucibus sensum Sitis producere, in *Exercitatione Medica de Siti* Exposuimus.

Tusses siccae
paululum
irritantes in
ardentibus,
unde fiant.

II. Tussis dicitur sicca, si tussiendo nihil humidi vel phlegmatis ejicitur; hujus Tussis siccae inveniuntur multæ causæ, ut exposuimus *In Exercitatione de Tussi*. Ex istis illæ causæ eligendæ, quæ in febre ardente fieri possunt, & quæ causæ paululum irritando tussim inferunt, adeoque causa levis esse debet, quæ tussiendo facile lenitur, sed & cito redit. Magis convenientem causam non invenio talem Tussim inferentem, quam internæ membranæ laryngis siccitatem, quæ quamdiu est præsens, stimulo tussim infert: sed quoniam tussiendo major copia humidi fertur ad has partes,

partes , tussiendo ea membrana humectatur & ita cessat tussiendo irritamentum : sed ea cessante brevi post exsiccatur , unde iterum redit Tussis , qua nihil ejicitur , sed sæpe redit. Tussiendo huc versus allici humores etiam in sanis , si aliquid in tracheam inciderit , probari potest , nam tussiendo ex mechanica causa multum muci tamen ejicitur. Inde optime hujusmodi Tussim in acutis lenire potui hauriendo vaporem ebullientis aquæ , quo latera sicca tracheæ irrigabantur.

III. Tusses illæ siccae in ardentibus non solent cessare , quamdiu durat febris ardens , ut observavimus in praxi , quia tolli nequit siccitas hujus tussis causa manente febre ardente. Quod autem minus siticulosi sint in ardentibus , quando talis tussis adest , ex iis quæ exposuimus deduci potest : nam quia tussiendo plus humidi ducitur ad fauces , quo lenitur tussis , id quoque adductum minuit sitim , quia siccitas utriusque est causa , nempe sitis & tussis , & inde adductione humidi utraque phænomena mitigantur. Non debemus ex hoc Aphorismo colligere , ut quidam perperam fecerunt , talem ægrum in febre ardente non sitire , sed solummodo minus sitit , quia tussiendo plus humidi fertur ad fauces , ut ita mitescat sitis. Ita videmus interdum characteristicum symptoma morbi minui per aliud superveniens , ut in hoc casu , minuitur sitis in ardentibus , & in cerebri oppressione minuitur febris ardentis calor. Quare sedulo perscrutanda phænomena in morbis , an non propter aliud superveniens minuantur vel exstinguantur.

Tusses siccae in ardentibus minuant sitim.

LIB. IV. APH. LV.

165. **I**N Bubonibus febres, omnes malæ, præter ephemeræ.

I.

Bubonis
significatio.

BUbo seu βῦβων quia non est vox semper eandem rem significans in scientia medica, primum constare debet, quid Hippocrates in hoc loco per Bubonem intelligat, antequam scire possimus, quænam febris mala sit in Bubonibus, & quæ minus mala, vel bona. In Arte Medica vel notat partem vel morbum. Pars illa Latinis dicitur Inguen. Sed si designat morbum, tunc est tumor proprie in Inguine. Verum non omnes tumores inguinis dicuntur Bubones, uti patet in herniis hujus loci, ex quibus species invenitur, quæ vocatur Bubonocèle, seu Hernia inguinis, quæ tamen nunquam absolute dicitur Bubo. Sed si alius tumor Inflammatorius seu purulentus, ut & glandulosus, ut est Phygethlon, in Inguine detegitur, talis tumor dicitur Bubo. In hac significatione non acquiescunt, sed ex tumoris similitudine sub alis & pone aures, etiam in aliis locis hujusmodi tubercula Bubones vocant. Si sequimur interpretationem Galeni, hoc loco per Bubones intelligendi tumores seu Tubercula inflammatoria vel purulenta non solum in Inguinibus, sed & etiam sub alis & pone aures, quæ sententia quoque mihi videtur verissima, ut infra constabit.

Ephemeræ
quæ dicatur.

II. Febris Diaria seu ἐφήμερος ex febribus continuis levissima est species & brevissima, etiamsi a quibusdam referatur ad Intermittentes, sed quoniam unico paroxysmo absolvitur, species est febrium continuarum. Dicitur Ephemera, quia paroxysmus ille ultra viginti quatuor horas non extenditur. Si autem diutius continuatur paroxysmus, dicitur Synochus simplex vel & Ephemera plurium dierum.

Causa

Causa ergo Ephemeræ talis esse debet, quæ motu febrili intra viginti quatuor horas tota potest subigi & expelli, aut in aliquam partem deponi, ubi novum paroxysmum facere non potest. Ea frequentissime observatur, si in Diæta commissus est error, vel prohibita fuit insensibilis perspiratio, ut & in tuberculis inflammatoriis, si transeunt in suppurationem. Sufficit in curatione itaque Ephemeræ potandam dare potionem antiphlogisticam diaphoreticam. Hujusmodi febrem post aliquot septimanas recurrentem inordinate observavi in cacochymicis, catarrhosis, & acrimonia cruda laborantibus, qua febre finita cum sudore corpus liberabatur a crudo illo & alieno humore.

III. Si conferamus ea, quæ superius exposuimus, dicti veritas constabit, omnes febres malas esse præter Ephemeræ in Bubonibus. Bubones enim Pestilenciales, aut qui omnem materiem in se non recipiunt, vel qui fiunt in morbis putridis, non excitant Ephemeram, sed vel febrem continuam per multos dies durantem, vel remittentem, aut hæcticam, quæ omnes febres, quoniam imperfectam crisin designant, malæ censentur. Ephemera autem nata ex commutatione materiæ in pus, quæ tunc simul cessat brevi tempore, designans totum reliquum corpus liberatum esse a morbosa materia, bonum ergo prælagium præbet.

Cur omnes febres malæ in bubonibus præter ephemeræ?

LIB. IV. A P H. LVI.

166. **F**ebriticanti sudor superveniens, febre non deficiente, malum. Prærogatur enim morbus, & multam significat humiditatem.

I.

Naturale est in omni specie febrium, ut circa finem paroxysmi evacuetur sudor, & in omni febre tam acuta, quam Remittente & Intermittente legitima, cum sudoris eruptione febris quoque quiescat. Multi inde exist.

Unde sudor in febribus.

existimarunt, sudorem formari ex febris materia: verum maxima pars sudoris ex bonis humoribus corporis depro-mitur, sudor enim erumpere potest, etiamsi nulla sit febris materia in corpore. Quare idem de sudore statuendum, quod observant Practici in urina, tota enim urinæ massa non statuitur componi ex morbi materia, sed statuendum est cum urina simul evacuari materiem morbi, unde habetur urina Cocta, quæ indicia præbet evacuationis materiæ morbi, sed Cruda, quæ sine materia hac excernitur. Hoc etiam sentiendum est de Sudoris evacuatione, sed quoniam sudoris materia ita non potest examinari, uti in urina, alia criteria sunt adhibenda, quibus cognoscimus, num sudor sit criticus vel symptomaticus. Quando igitur motu febrili corpus valide fuit agitatum, atque humores soluti, accedente relaxatione pororum, id quod solutum fuit, Sudoris forma exit, partim constans humoribus bonis detritis, partim ex materia febrili subacta.

Febricitanti
sudor super-
veniens, fe-
bre non de-
ficiante ma-
lum.

II. Ut Sudor adferat levamen, necesse est, simul aliquid de febrili materia auferat: verum hoc si faciat, febris si- mul vel remittit, vel minuitur, vel quiescit, detracta enim materia irritante febrili minuitur motus ab eo stimulo in- stigatus: sed non est opus, ut omnino febris absit, sed ut minus sæviat. Si vero febris cum tali erumpente sudore non minuitur aut quiescit, certum indicium est, materiem fe- bris cum sudore eo non fuisse ablatam. Eam retentionem admodum malam esse, non eget explicatione.

Talis sudor
præfagit
longitudi-
nem.

III. Sudorem non auferentem febris materiem præfagire Longitudinem, superius *Aph.* 12, XII. demonstravimus, qua- re ad probandam instantem longitudinem ex sudoribus e- rumpentibus, non quiescente febre, hoc duntaxat esset adstruendum, cum sudorem non tollere materiem morbi, sed quoniam hoc a nobis in hoc loco satis fuit demonstra- tum, non erit opus repetere.

Et designat
multam
humidita-
tem.

IV. Hunc sudorem erumpentem in febre non quiescente deducit Auctor ex multa humiditate, quare multi practici, ut curent talem febrem, præcipiunt danda esse Sudorifera, Diuretica & Purgantia, ut corpus liberent a nimia illa humi-

humiditate. Auctori nostro consentio, eum sudorem indicare multam humiditatem; sed istis, qui propterea contendunt illam humiditatem esse evacuandam, consentire nequeo. Quod si rimamur originem hujus humiditatis multæ, facile isti Practici mecum ibunt in eandem sententiam. Febris illa si commutatur in putrilaginem, liquati humores sub sudoris forma exeunt, & inde non tollunt febrem, sed eam prolongant, uti observatur in omnibus febribus putridis & colliquativis. Si tunc quis satageret colliquatos humores eliminare per urinam vel alvum, potius interficeret hominem, quam ut tolleretur febrem ex tali putredine natam. Quamobrem in sudoribus erumpentibus non quiescente febre monemur, nos debere per antiseptica ulteriorem colliquationem prævenire, sed neutiquam per evacuationem conari evacuationem.

LIB. IV. APH. LVII.

167. **A** *Spasmo aut tetano detento, febris superveniens solvit morbum.*

I.

QUum Veteres ex phænomenis imposuerunt morbis nomina, non raro duo phænomena ab eadem causâ venientia diversa nomina accepere; alii vero morbi, causâ admodum diversi, non raro idem retinent nomen, quod in prognosi formanda & curatione tradenda magnam difficultatem parit. Hoc patet in Tetani descriptione, ex eo enim morbo tres quasi distinctos morbos faciunt *Tetanium*, *Emprosthotonum* & *Opisthotonum*. Multi Spasmodum & Tetanum eundem morbum faciunt; alii vero dicunt, morbos esse distinctos. Ita etiam Convulsio, Rigor, Distentio nervorum, Epilepsia quibusdam sunt synonyma, aliis autem morbi differentes, quare sæpe dubii hæremus, qualisnam morbus intelligatur. Quidam ex Neotericis non si-

Spasmi &
Tetani dif-
ferentia.

ne ratione Convulsionem distinguunt in duas species, unam vocant *Convulsionem Tonicam*, cui respondere potest *Tetanus* atque *Rigor* Celsi, nam *Rigor* hodie in medicina aliam significationem obtinuit (*Aph.* 156, 1). Alteram vocant *Convulsionem Clonicam*, cui respondere potest *Spasmus*, cujus species est *Epilepsia*, *hysterica* & *hyponchondriaca* passio. Dum scilicet muscoli voluntati subiecti a causa morbofa interna, etiam reluctante voluntate, valide constringuntur, & ita constricti manent, illum motum morbosum vocant *Convulsionem Tonicam*. Sed si hi muscoli alterne constringuntur & dimittuntur, ut inde fiat motus inordinatus involuntarius validus, ille motus vocatur *Convulsio Clonica*. Quoniam superius demonstravimus (*Aph.* 51, v.) quali modo & quando febris superveniens solvit *Convulsionem*, non erit opus eadem repetere.

LIB. IV. APH. LVIII.

168. **A** *Febre ardente detento, rigore superveniente, solutio fit.*

I.

Quid sit febris ardens.

OMnem febrem Continuum non esse Ardentem, ex superius dictis (*Aph.* 100, 11) colligi potest. Quare in quadam febre Continua quædam apparere debent notiones, quibus detectis omnes medici concludunt, eam febrem continuam vocari febrem Ardentem. Semper adesse debet in hac febre continua Calor urens ad attactum, cum cutis Siccitate summa, laboriosa Respiratione, Pulsu duro & frequenti, oris siccitate, & Siti vix extinguibili. Si cuncta hæc rimemur, & quæ deinceps in febre ardente observantur, probant ea, dictam febrem ardentem esse veram inflammationem per totum corpus.

Quando rigor superveniens solvit.

II. Quid sit *Rigor* & ex qua causa generatur, exposuimus (*Aph.* 156.) Ex quibus deduci potest, si materia irritando

ritando febrem Ardentem inducens commutetur in aliam naturam, tunc fieri Rigorem. Si hæc commutatio sit facta in materiem purulentam, sæpe subsequitur critica evacuatio, qua liberatur æger a febre ardente: vel eadem purulentia deponitur ad aliquam partem, ubi format abscessum per metastasin. Rigor etiam generatur in Ardentibus, si commutatio fiat in Putrilaginem vel Sphacelum. Adeoque nisi simul perpendantur reliqua symptomata, non potest iudicium ferri, num Rigor in Ardentibus portendat malum vel bonum. Solvitur quidem febris ardens semper a Rigore superveniente, qui designat materiæ mutationem, sed non semper bonam solutionem promittit. Si vero post Rigorem illum temperatior fiat calor, lenior sitis, humiditas corporis, pulsus mollior, cum evacuatione critica, præprimis per sudorem, urinam, vel sputum, raro autem per alvum, hæc collecta signa demonstrabunt, materiem febris ardentis abiisse in materiem purulentam, quæ simul evacuat. Qualis tunc Rigor est optimum præsagium, & non solet redire: sed si hæc non adsunt, verum sæpius redeat Rigor, indicio est, materiem abiisse in putrilaginem. Si vero post Rigorem corpus nimis refrigeretur, vires cadunt, & exprimitur sudor frigidus, foetens, notat talis Rigor mutationem in mortificationem.

L I B. IV. A P H. LIX.

169 **T**ertiana exquisita in septem ad summum circuitibus judicatur.

I.

OMnium primum sciendum est, qualem febrem Hipp: hoc loco intelligat. Citat Tertianam exquisitam, unde satis constat, alias præterea inveniri Tertianarum species. Hoc in genere constat per Tertianam intelligi febrem, quæ Paroxysmos seu Periodos facit alternis diebus

Quæ dicatur Tertiana exquisita.

O o o 3

diebus. Sed inveniunt duas tales species, una refertur ad febres Remittentes (*Aph.* 153): Altera ad febres Intermittentes. Quæ autem ad Remittentes referuntur, dicuntur *Tritæophyes*. Sed Tritæos uti in Textu, est Tertianæ intermittens. Verum Auctor non videtur contentus solam nominare Tertianam, quum addit Exquisitam: quare non intelligit omnem Tertianam intermittentem, sed eam, quæ exquisitè talis est. Nos præluceat in hac re Galenus, cum dicat in Tertianæ paroxysmum non debere ultra duodecim horas extendi, eam fieri debere in æstate, regione & temperamento calido & sicco; paroxysmum incipere cum Rigore, desinere cum sudore, vel dejectione materiæ biliosæ. Addere possumus, si non pervertatur naturalis ordo venæ sectione, purgante, calefacientibus aut nimis refrigerantibus, vel alio errore in diætâ. Talis tunc febris vocatur Tertianæ exquisita.

Septem ad
summum
periodis ju-
dicatur.

II. De tali nunc Tertianæ exquisita præcipit, eam ad summum septem paroxysmis judicari, id est definit quarto, quinto, sexto vel ad summum septimo paroxysmo: quæ observatio practica quoque hodie vera invenitur, modo sibi relinquatur febris Tertianæ. Quare in febre Intermittente non habetur criticorum dierum annumeratio, uti in febribus Continuis, per dies successivos, sed per numerum paroxysmorum, ut unusquisque paroxysmus habeatur pro die in febre Continua. Hoc quoque tentarunt perscrutari in febre quartana, in qua detexerunt, si singuli paroxysmi durent sex horas, totum tempus febris non ultra terminum febris acutæ extendi. Sed quoniam febris intermittens & continuæ materia non est eadem, non erit quoque necesse, ut utraque materia eodem temporis spatio subigatur: si autem observetur tale fieri, id non ex convenientia communi febrium dependet, sed quia ex lege specifica cujusque febris hoc ita eveniat: nam potuisset quoque temporis magna esse differentia, quum harum febrium non sit eadem causa.

LIB. IV. APH. LX.

170. **Q**uibus in febris aures obsurduerint, his sanguis e naribus effluens, aut alvus exturbata, morbum solvit.

I.

Duo hic simul ponuntur morbi, quorum alter alteri ^{Surditatis causa in febribus.} supervenit, Febris nempe & Surditas. Hoc loco intelligenda est Febris Continua vel Remittens, quia Intermittentibus hæc observatio non quadrat, atque ab Hippocrate passim non accipiuntur Intermittentes generali nomine febris. Continuæ & Remittentes nomen distinctum non habent apud Auctorem nostrum, nisi quod Remittentes, ut retro observavimus, interdum dicantur febres non intermittentes. Surditas in hoc loco non designat, ægrum non audire posse sonum quemcumque graviorem, sed non audire vocem vel sonum alloquentium, id est, ut obscurius audiat, quam antea solebat. Talis Surditas tunc debebat generari, quando æger febricitabat, quod arguit, eam non oriri ex vitio prægresso in organo auditorio; nam inde nata surditas nullum hujus rei præsagium præbet. Sed nasci debet ex febre ipsa, vel causa eadem, quæ febrem antea produxit, aures enim obsurdescent in febribus, id est, postquam aliquamdiu adfuit febris, oborta fuit Surditas. Duæ in febribus præcipuæ sunt causæ Surditatem inferentes, impetus nempe sanguinis major ad caput, & materia biliosa ad caput magis quam alias partes tendens. Sanguis igitur vel materia biliosa ad caput delata implendo arterias prope nervum auditorium in Encephalo, vel quæ organo auditus insunt, ita opprimunt nervum auditorium, vel implent auditus organum, ut fiat impeditus aëris sonori transitus, vel nervi auditorii stupor. Ergo surditas in febribus nasci-

nascitur ex accumulato sanguine vel materia biliosa circa auditus organum.

Hæmorrhagia quando solvit febrem.

II. Si in febribus sanguis feratur majori impetu ad caput, quod cognoscimus ex oculis rubentibus, truncibus, facie tumente, pulsationibus in capitis arteriis, cum surditate vel aurium sonitu, timor est, ne motu illo majore æquabilis cerebri motus turbetur & æger deliret: compescitur autem nimius illè motus, si evacuetur ex naribus sanguis, tunc enim minus distenta vasa, minus quoque urgent. Quamobrem per hæmorrhagiam supervenientem ex impetu majore non solum cessant dicta phænomena, inter quæ est Surditas, ex majori motu ad encephalum nata, verum etiam præveniuntur instantia mala, Delirium, Phrenitis & Convulsio. Imo tantum valet in ea causa hæmorrhagia narium, ut ipsam febrem compescat. Ex quibus colligere possumus in praxi talem hæmorrhagiam, nisi modum excedat, non esse supprimendam, ut multi ex inscitia hujus observationis fecerunt. Atque inde patet, sanguinis missionem in tali surditate præcipuum esse auxilium, quum arte id præstemus, quod natura demonstrat adferre levamen. Et quoniam incerti sumus, num certo fiet hæmorrhagia, qua non apparente, imminerent recensita mala, prudentis Medici est non expectare hanc hæmorrhagiam, sed surditate cum aliis signis majoris impetus ad caput apparentibus, protinus secare venam, & si prima vice inde non compescatur motus ille major, eandem sanguinis evacuationem repetere.

Alvus exturbata quando solvit febrem.

III. Sed si materia biliosa ad caput delata cum febre inducit surditatem, non ita levat hæmorrhagia, & minus conducit sanguinis missio, sed si alvus exturbatur, præcipue si egerit feces biliosas, non solum discutitur Surditas, sed & ipsa febris solvitur: nam materia biliosa per alvum exturbata non amplius cerebrum petere potest, atque derivatio facta ad alvum temperat impetum ad caput tendentem. Ita egregia formatur curativa indicatio in febribus biliosis, si surditas oboritur, nam quoniam levamen fit & solutio febris per egestionem biliosam, manu veluti ducimur ad alvum

vum ducentia, quæ materiem biliosam exturbant & simul minuunt impetum, qualia sunt Cholagoga refrigerantia.

LIB. IV. APH. LXI.

171. **F**abricitanti, nisi diebus imparibus febris dimiserit, reverti solet.

I.

Quid sit intelligendum per Recidivam, superius (Aph. 37, II) exposuimus: eamque sæpissime fieri in omni specie febris, constans est observatio. Sed tunc febris Recidivam facit, si febris materia viribus vitæ vel virtute medicamenti non fuit extincta & dein expulsa, verum aliquomodo mitigata, ut aliquo temporis spatio non valeat ita turbare corporis actiones, ex quibus mutatis cognoscimus materiem febrilem latitare, dein malignitate increscens, ut prius actiones vitæ irritans, iterum phænomena febris exhibeat. Ipsam enim causam febris nemo videre potest, sed si illa applicetur ad organa vitalia, tunc nascuntur in corpore phænomena, quæ declarant, febrilem materiem esse in corpore, quare febris causa esse potest in corpore sine ullo indicio, uti aliæ etiam causæ morbosæ, quemadmodum Variolarum, Luis venereæ, Hydrophobiæ, antequam inducunt actiones vitæ perturbatas. Ut igitur conjiciamus sine phænomenis, num febris materia in corpore lateat, consulenda sunt observata practica, quæ comprobant, materiem febrilem adesse, etiamsi nulla phænomena inveniantur. Hæc observata multis modis eruuntur: ut si post febrem sanatam remaneat inappetentia; si fugata febre remaneat valetudo adversa; si excrementa & actiones multum recedant ab ordine consueto; si abiit febris sine signis coctionis; si febris non desinit die critico, quum ad legitimam curationem non solum natura expellat materiem quantitate & qualitate respondentem, sed & servare soleat

certum aliquod tempus, ut monuimus in Diebus Criticis (Aph. 49). An vero illi Dies Critici sint dies impares, quam maxime disputant, ita ut Galenus non dubitaverit asserere, se non credere hunc Aphorismum ab Hippocrate esse traditum. At vero Auctor noster dicit *reverti solet*: ergo non contendit semper sed aliquando reverti febrem, si dimittit die pari. Non ignoro, decimum quartum, vigesimum & quadragesimum diem pares esse dies; verum decimus quartus ex duobus septenariis, vigesimus ex tribus componitur, & ita quadragesimus ex sex septenariis, ut 20 habeatur pro 21, & 40 pro 42. Tali modo si accipiantur dies impares, sententia in hoc Aphorismo prolata non recedit a generali doctrina Dierum Criticorum (Aph. 49.)

LIB. IV. APH. LXII.

172. **Q**uibus in febre morbus regius supervenit ante septimum diem, malum est. (*Nisi confluxus humorum per alvum fiat.*)

I.

Icteri definitio.

IN prædictionibus formandis non majores invenio difficultates pluresque tricas, quam si in morbo, uti in febre, qui ex variis nascitur causis & ex phænomenis accepit nomen, aliud veniat symptoma, quod itidem ex phænomeno nomen accepit, uti est Icterus: potest enim Icterus in variis febrium speciebus venire, & ita pro natura febris bonum & malum signum esse: atque Icterus ex causa varia potest in quadam febris specie etiam bonum & malum indicium præbere. Ut igitur ex Ictero febre superveniente certum prognosticum habeatur, determinanda est febris & Icteri species. Hoc quoniam non satis exacte a Practicis fuit factum, non mirum est, quod tot dissidia & variæ sententiæ de hoc Aphorismo a Commentatoribus sint prolatae, ut quidam non dubitarint nostrum Auctorem falsitatis

sitatis arguere, quum invenerunt Icterus ante septimum diem supervenisse cum bono exitu. Ut igitur aliquid certi in hac prognosi statuamus, definienda est ea species Icteri, quæ in hoc Aphorismo est intelligenda. Omnis morbus, qui cutim totam suffundit intensa flavedine, nam si ad virorem vel nigredinem vergit, vocatur Icterus niger, ita ut oculi quoque album manifestam illam flavedinem exhibeat, & reddatur urina intense flavescens, quæ immersum lin-teum ita inficit colore flavo, ut facile elui non possit, vo-catur Icterus, morbus Regius, morbus Arquatus, Aurigo. Et ut hunc morbum distinguant a consimili colore Cache-cticorum, adjiciunt, eum colorem flavum oriri a bile flava diffusa per totum corpus. Ad detectionem ergo hujus mor-bi sola requiritur accurata coloris mutati observatio, sed non profert causam, nisi solam materiale, hunc colorem inferentem: propterea ex varia causa oriens icterus potest bonam & malam præbere prognosin in febribus.

II. Paucae sunt Icteri species, quæ quocumque tempore veniant, bonum præsagium præbent, dum tamen in hoc Aphorismo implicite patet, Icterus septimo die venien-tem, bonum præsagium præbere; nam qui Icterus ex He-patis obstructione, Inflammatione, infarctione ductus Cho-ledochi, vel vesicæ felleæ oritur, aut qui venit ex putre-dine, omni tempore etiam septimo die febris veniens ma-lum exhibet præsagium. Igitur in hoc loco intelligenda est ea Icteri species, quæ ex febris perturbatione critica nasci-tur, quum ea tanquam signum criticum septimo die bonam prognosin præbere possit. Si autem ante septimum diem veniat Morbus Regius, malum est, nisi confluxus humo-rum per alvum fiat, uti in quibusdam exemplaribus habe-tur. Scilicet si febris biliosa ante istud tempus commotio-nem faciat, qua bilis suffunditur per totum corpus, talis præmatura commotio bilis corruptæ abundantiam designat, quæ bilis si simul non deponatur per alvum, sed in corpo-re retenta, sensim fit acrior, & sua saponacea acrimonia omnes humores in tenuem putrilaginem convertit, quod admodum malum est. Ex dictis his clarissime exponi po-

Quæ species
Icteri ante
septimum
diem in fe-
bribus veni-
ens ma-
lum.

test Auctoris sententia in Libro de victu acutorum. H. b. 313. *In febre biliosa ante septimum diem cum rigore morbus regius accedens, solvit febrem. Verum sine rigore si accedat, extra temporis occasiones, perniciosus est.* Quoniam rigores accedentes indicant perturbationem aliquam criticam, post quam si sequatur materiæ depositio per alvum, æger liberatur a bile corrupta: nam si talis rigor præcesserat sine subsequente evacuatione bilis, malum etiam esset indicium. Quod etiam nobis reliquit Auctor noster in Epidemicis H. a. 663. agens de febrium ardentium affectionibus. *Quibusdam, inquit, morbus Regius accidit sexta die. Verum his purgatio per vesicam, aut alvus exturbata profuit aut larga sanguinis eruptio. Et paulo infra. Senioribus vero ad Morbum Regium res devenit, aut alvi ipsis turbata sunt, aut dysenterici facti sunt.* Ex quibus colligi potest, si Icterus ante septimum diem ex perturbatione febrili fiat sine subsequente bilis evacuatione malum præsagium exhibere. Atque constat, hic eam speciem Icteri intelligi, quæ fit ex febris commotione, non vero omnem speciem.

LIB. IV. A P H. LXIII.

173. **Q**uibus, in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres solvuntur.

I.

Quid sint Rigores, & quibus causis generentur, supra (Aph. 156) exposuimus, eorumque causas multas esse, eodem etiam loco demonstravimus. Plura de Rigoribus in febribus memoriæ tradidit Auctor in Libro Coacarum Prænotionum circa principium. Verum omnes hi Rigores non fiunt quotidie, seu certo die non repetunt. De his igitur solis argumentatur in febribus, & de iis observavit tunc quoque febres quotidie solvi, id est non plane finitur febris, nam si Rigores finirent febrem, non pos-
sent

lent esse Rigores quotidiani. Invenimus tria genera februm, Continuas, Continentes, & Intermittentes. In febribus Continuis Rigor semel fit in initio, & quando transit in alium morbum: In continentibus seu remittentibus febribus fiunt Rigores inordinati. Quamobrem Rigores quotidiani duntaxat fiunt in febribus Intermittentibus, si novus exoritur paroxysmus. Interdum vero accidit, ut febris Intermittens typum febris continuæ vel remittentis induat, ut observavi in quadam constitutione autumnali, ita ut in principio constitutionis existimarem, febrem esse continuam, pergente vero constitutione omnes illæ febres in legitimas febres intermittentes commutabantur. Dum illæ febres continuæ sensim incipiebant commutari in febres intermittentes, quotidie febres quoque illæ facere incipiebant Apyrexiam. Ex observatione hac luculentissime patet, etiam Hippocratis tempore hujusmodi febres regnasse & sedulum nostrum Observatorem inculcare voluisse hoc Aphorismo, quod si febris quoad conspectum continua regulares quotidie faciat Rigores, eam non esse veram febrem Continuam, sed intermittentem larvatam,

LIB. IV. A P H. LXIV.

174. **Q**uibus in febre, septimâ, aut nonâ, aut undecimâ, aut decimâ quartâ, morbus regius supervenit, bonum est: nisi dextrum hypochondrium durum sit: alioqui non bonum.

I.

Præcedentem Aph. 172 huic conjunxit Hipp: in Coacis præn. H. a. 531. Morbus regius, inquit, ante septimum diem accedens, malum. Septimo vero ac 9. & 11, & 14, judicatorius est, si non præcordia induret. Sin minus, ambigua res est. Ex quibus patet, præcedentem aphorismum in

hoc libro interpositum fuisse, atque hunc aphorismum esse partem prioris. Sententia Auctoris est in hoc *Aph.* demonstrare, Icterus die critico venientem salutarem esse, sed tamen non ita absolute, quin alia possint simul adesse signa, quæ ambiguum prognosin præbent, nam si bona & mala signa simul apparent, ambiguus est exitus.

Icterus die
critico in
febre, bo-
num.

II. Supra (*Aph.* 172, II) demonstravimus implicite indicari, Icterus septimo die venientem bonum præsagium præbere, quoniam eo die optimæ fiunt perturbationes criticæ: nunc vero plures dies criticos, nempe nonum, undecimum & quartum decimum citat, ut demonstret, non solum septimo, sed & aliis diebus criticis (*Conf.* *Aph.* 49) Icterus criticum esse posse. Verum non ultra decimum quartum adscendit, quod tamen fecit in annumeratione dierum pro sudore critico (*Aph.* 146) quoniam post decimum quartum diem raro per icterum fit crisis. Si igitur Color icteritius, qui alias semper malum est signum, in febre oriatur diebus istis, cum reliquis signis criticis, inter signa critica recenseri potest. Si vero color icteritius appareat in quovis alio morbo, semper est signum malum. Quare quædam mala signa, modo denotent perturbationem criticam in febribus bonum indicium exhibere possunt.

Icterus ex
febre cum
hypochon-
driis duris
non bo-
num.

III. Hypochondriorum durities ut causa & ut signum prognosin ambiguum facit: nam non sufficit, ut Icterus septimo vel alio die critico in febre veniat, ipsa bilis per totam massam diffusa evacuari debebat, & relinqui debent viscera sana. Si vero Tumor durus hypochondria tenet, signum est, materiem biliosam circa hepar colligi, istudque viscus infarcire, unde, quamvis æger liberaretur a febre præcedente, laborare deinceps potest hepatis infarctione, & ita ad perfectam sanitatem non venit, nisi simul reseratur hepar obstructum. Aut in febribus potest etiam istis diebus criticis oriri hepatis obstructio, quæ Icterus generat, ut superveniens Icterus non sit signum criticum, sed signum obstructionis vel inflammationis hepatis. Quare patet, Hypochondriorum duritiem ambiguum prognosin facere.

L. I. D.

LIB. IV. APH. LXV.

175. **I**N febribus circa ventrem æstus vehemens, & oris ventriculi dolor, malum.

I.

Pergit Auctor annumerare symptomata in febribus, ut ex istis medicus possit iudicium ferre, quid sit præfagiendum. Quæ ergo symptomata hic citantur, non præfagiunt idem, si observantur in corpore non febricitante. Propterea ut ex dictis eliciatur causa, hæc symptomata inferens, talis erit assignanda causa, quæ febrem, æstum vehementem, & Cardilogmum simul producere potest: & dein ex ea inventa formanda est prædictio; seu per practicam observationem constare debet, qualesnam effectus boni vel mali ex tali causa soleant provenire.

II. Potest generari febris ex causa, quæ ventris ardorem induxit, & vicissim eadem causa, quæ prius concitavit febrem, deinceps potest ventris vehementem æstum inducere. Hoc autem est intelligendum hoc loco; nam si illud intelligeretur, dixisset Auctor in ardoribus vehementibus si oriatur febris, & ita esset febris symptoma ardoris vehementis, dum tamen hic prius ponatur febris ut morbus. Ex simplici hac observatione patet, num accusanda sit Inflammatio, aut Erysipelas, aut Bilis corrupta acris calida tanquam ardoris causa, quoniam in his Ardor inseparabile est symptoma, quod fere omnes statuunt Commentatores. Non inficior, istis in morbis particularibus, si ventriculum vel alia viscera ventris obsident, ardorem generari atque febrem; sed tunc febris posterius venit, & medici febrem ut symptoma istius morbi particularis habent. Ut si quis pleuritide corripitur, & reticemus istud nomen, volentes verbis phænomena exprimere, non dicimus, in febribus si veniat lateris vel pectoris dolor, nam tunc esset

Ventris Ardor in febribus unde oriatur,

esset pleuritis symptomata febrilis: sed dicimus in Lateris dolore si habetur vehemens febris. Ergo constat, ventris ardorem non esse veram Inflammationem aut Erysipelas, sed febris symptoma. Quoniam febris inseparabile est symptoma æstus, quamdiu corporis vires valeant, & æstus magnitudo vehementiam etiam febris declarat, pro certo accipi potest, causam febrilem sensim copiosius colligi circa ventris viscera, ut istis in partibus majorem febrilem faciat agitationem, quam per totum reliquum corpus.

In febribus
Cardiog-
mos.

III. Quam maxime laborant Interpretes, num Cordis vel superioris ventriculi morsus hoc loco sit intelligendus. Maxima pars contendit, ventriculi orificium hic esse intelligendum, quoniam Hipp: dicit malum: nam, inquiunt, si Cor intelligeretur, dixisset Auctor pessimum. Ego vero puto, si Cor magis a febre afficeretur, quam orificium superius ventriculi, non sentiri Dolorem aut morsum, sed Anxietatem, quum Cordis affectiones nunquam dolorem sed semper Anxietatem inferant, dum ventriculi superius orificium affectum fere semper Dolorem moveat. Materia ergo febrilis copiosius circa orificium superius ventriculi collecta non solum insert Ardorem, verum etiam Dolorem, quod frequens est febribus, si quandam partem nervosam præceteris aggrediatur: nam etiam capitis Ardores ex febre solent conjunctos habere Dolores: adeo ut quoties materia febrilis occupet aliquam partem, ea pars simul doleat & caleat, sed raro vel Dolor vel Calor solus habeatur, ut febris symptoma in quadam parte nervosa.

Circa ventrem æstus
vehemens
& Cardiog-
mos in fe-
bribus ma-
lum.

IV. Constat ex iis, quæ adduximus, Æstum vehementem circa ventrem & Cardiogmum indicare, materiem febrilem has partes magis, quam reliquum corpus agitare: atque per sedulam observationem practicam nostrum Auctorem didicisse malum sæpe habuisse exitum, sed qualem faciat exitum, non docet. Verum serior ætas hoc detexit, nam febris hanc partem afficiens omnem destruxit appetentiam, sensim quoque induxit anxietatem, inquietudinem, & vigilias pertinaces, atque agitatione hac non solum perturbatur materiæ febrilis concoctio, sed & maxime inhibetur e-
jus

jus critica evacuatio, quum irritatio interna inhibeat directionem ad cutim: imo hac agitatione non parum turbatur bilis in hepate confectio, unde multa mala, quæ non oriuntur ex eadem febre, si hanc partem præ ceteris non afficeret. Sed quoniam illa agitatio non semper istas partes corrumpit, atque febre quiescente non raro manent sanæ, dixit malum: nam si semper sequeretur corruptio, dixisset Lethale.

LIB. IV. APH. LXVI.

176. **I**N febribus acutis, convulsiones, & circa viscera dolores vehementes, malum.

I.

QUænam dicantur febres Acutæ, superius (Aph. 108, iv) exposuimus; in his præcipit duo conjuncta symptomata venientia, Convulsiones scilicet & circa viscera dolores vehementes, malum esse; ergo non statuit, dictam Convulsionem & dolorem vehementem circa viscera ventris tanquam morbos malum præsagire, sed si veniant ex febre. Concipiendum itaque est, vel febrem circa hanc partem præcipuam agere tragædiam, vel ad eas partes facere metastasin. Rationem dedimus, febrem convulsioni supervenire melius esse, quam convulsionem febri. (Aph. 51). Solas autem Convulsiones in principio acutorum venientes præprimis in pueris observavi non periculosas esse, sed in adultioribus plus periculi adferre (Conf. H, a, 470). Imo noster Auctor, H, a, 534, bonum præsagium ex Convulsione protulit; nam *Convulsio*, inquit, *in febre oborients & eadem die desinens, bona est. Convulsio in febre oborients, sedat febrem eadem die, aut postera, aut tertia. Si vero tempus, in quo incepit, transgrediatur, & non desinat, malum.* Ex quibus facile colligere possumus, ex sola Con-

vulsione superveniente incertam fieri prognosin, quoniam ipsa Convulsio est phænomenon diversarum causarum, quarum quædam admodum malæ, aliæ autem vix quidquam periculi portendunt. Ut igitur magis determinata habeatur causa, aliud addendum est symptoma, ut fecit Auctor, dicens & circa viscera dolores vehementes, malum. Iste quoque Dolor etiam nasci debet ex febris commotione, nam supervenire debet. Propterea si Convulsio fieret ex perturbatione critica, potuisset bonum præsagium præbere, uti patuit in allegatis locis, & quemadmodum Icterus quoque die critico (Aph. 174, II) bonum præsagium præbere potest, etiamsi absolute veniens semper malum sit indicium. Verum Convulsio in febre veniens cum diris ventris doloribus, etiamsi veniat die critico, bonam crism promittere non potest, nam vexatio doloris faceret derivationem materiæ ad interiora. Si vero dolor ille nascatur ex febre, qui dolor dein sua vehementia concitat Convulsionem, eo pejus est, quum hujusmodi accessus Convulsionis perturbationem summam ex consensu declarat, quæ semper in pejus tendit: nunquam enim ex ventris vehementi dolore salutares observatæ sunt Convulsiones.

LIB. IV. APH. LXVII.

177. **I**N febribus, ex somnis pavores, aut convulsion-
nes, malum.

I.

Quid som-
nus facere
debeat in
febribus.

OBdormit homo in febribus vel ex naturali vel ex mor-
bosa causa: medicus & æger nescit, quænam harum
latent, quum videat febricitantem dormire. Ve-
rum si inveniat pulsum frequentiore & duriores, atque
videat ægrum inquiete decumbere, nimisque calere toto
corpore, conjicit medicus, eum ægrum ex morbosa causa
obdor-

obdormire. Sed omnia placide si inveniatur, sentit somnum esse naturalem, in quo nulla exercetur actio animalis, tota compages carnosae laxior, respiratio æquabilior, pulsus languidior & mollior, unde spiritus minus consumuntur, & coctiones, quæ solo motu vitali sunt absolvendæ, fiunt perfectiores & æquabiliores, qui humores antea majore motu fuere compacti, nunc dimittuntur, ad expulsionem disponuntur, atque sæpe etiam expelluntur cocti. Quare somnus naturalis in febribus, ut monuimus etiam in Acutis (Aph. 26, v), est utilissimus.

II. Verum si somnus fiat seu potius sopor ex causa morboſa, ea recensita bona non possunt expectari, quoniam talis non inducitur corpori dispositio, qualis in naturali somno adesse debebat: imo indicatur talem latitare morboſam causam, quæ opprimendo cerebrum soporem inferre potest. Dum vero ex naturali somno omnes actiones quiescebant præter actionem vitalem: hoc non semper obtinet in somno morboſo, quum morboſa causa, siue sit materia obsidens cerebrum, siue cerebrum consentiat ex quacumque alia parte affecta, non ita quietas relinquat reliquas actiones sensus & motus animalis, quin irritando istas sæpe perturbet; quare somnus inquietus tam malus censetur in morbis. Hæc causa morboſa inordinatum motum dormienti inducens, quo agitur ex improvise cerebrum, hominem eodem modo evigilare facit, ac si aliquis dormiens inopinante vellicaretur, unde evigilans pavet, nesciens quid sit factum. Hujusmodi ergo Pavores seu Terrores quoniam latitantem indicant malam causam, atque simul arguunt, coctiones fieri non posse, uti in somno naturali, revera sunt timendi. Si vero tales Pavores sæpe fiant, ut dicit Auctor in somnis, non in somno, certum est, illam causam morboſam constantem esse, quoniam toties post somnos repetit Pavores, & inde eo majus malum portendit.

In febribus
ex somnis
pavores,
malum.

III. Quemadmodum statim demonstravimus, ab irritato cerebro per causam morboſam generari Pavores malum præſagientes, idem quoque sentiendum de Convulsionibus. Nam nullus musculus motus animalis movetur in sanis abs-

In febribus
ex somnis
Convulsio-
nes, ma-
lum.

que voluntate nostra; si vero contra voluntatem moveatur, vocatur Convulsio, quæ arguit semper adesse morbosam causam irritantem. Hoc autem observamus in Oeconomia animali, quasdam causas turbando motum encephali inducere mentis alienationem, alias autem motum animale perturbatum, ut interdum convellantur corpora cum mente constante, & quidam delirent corpore quiescente. Propterea Auctor recte posuit Pavores aut Convulsiones, & non conjunxit hæc duo symptomata, ut fecit in præcedentibus aphorismis, quia non necesse erat ad eruendam causam latentem, ut utraque symptomata conjuncta habeantur in febribus, quemadmodum in præcedentibus fieri debuit, quum unum ex his sufficeret ad formandam prognosin malam.

LIB. IV. APH. LXVIII.

178. **I**N febribus spiritus offendens, malum. Convulsionem enim significat.

I.

Respiratio-
nis observa-
tio in mor-
bis.

HOMINES & fere omnia animalia vix per momentum sine respiratione vivere posse, omnia suffragantur experimenta: an vero ad continuandam circulationem per pulmones, an ad refrigerandum sanguinem, an vero ut animal fruatur aëris præsentia, sit data, non consentiunt auctores, neque est hujus loci agitare. Sufficiet indicare hominem natum, nisi alterne attrahat & emittat aërem purum, non diu manere superstitem, si enim maneat in eodem aëre diu non renovato, vel in aëre infecto, etiam si alterne eum aërem attrahat & emittat, moritur tamen, quare non sufficit ad continuandam vitam in homine nato, ut alterne dilatet & coarctet pulmones, puro etiam eget aëre: neque manet superstes in aëre aperto puro,

ro, si ejus trachea clausa aëris ingressum intercipiat: aut quando pulmones constricti vel impleti alternam receptionem aëris denegant. Sed ut maneat vita, requiritur alterna pectoris ampliatio, pulmones obsequiosi, ingressus & egressus aëris puri. Tolle unam ex his, breve peribit homo & omne animal perfectum. Hæc ergo actio vitæ tam necessaria sedulo est perscrutanda in morbis ad cognitionem & prædictionem, quæ tamen hodie a multis turpiter negligitur, in solo pulsu quærentes indicia, vel ut alii, qui in sola uromantia conquiescunt. Noster autem Auctor tam sedulus fuit in rimanda Respiratione, ut nullus post eum; omnes enim minimas in ea mutationes notavit & posteritati reliquit, uti Galenus fecit in Pulsibus. Sed quoniam sparsim disserit de Respiratione in morbis, normam Auctoris sequemur, exponendo, quid sit sentiendum de quavis mutatione in Respiratione, donec tandem ex specialibus his possimus generalem formare doctrinam. In genere præmittendum est ex physiologicis, inveniri Respirationem animaleam seu voluntariam, quam exercemus in flando, cantando, loquendo & suctione, musculis voluntati obtemperantibus, eamque actionem esse satis validam: atque vitalem seu involuntariam, æquabilem, sed & minus valentem, quæ etiam in dormientibus & de respiratione nihil cogitantibus exercetur, quam multis modis possumus per animaleam respirationem augere, minuere, & mutare: denique in pulmonibus etiam vacuis interdum tantum invenitur impedimentum, ut etiam si per animaleam respirationem conemur haurire aërem, non valeamus, quod sæpissime experiuntur Asthmatici, aut si aër pulmones ingrediens fumo sulphuris, vel alio toxico fuerit infectus, quo videntur pulmonis fibræ ita constringi, ut ne quidem per animaleam respirationem relaxari & extendi possint.

II. Quod hodie vocatur Respiratio interrupta, olim ab Hippocrate dicebatur spiritus offendens, τὸ πνεῦμα προσκόπτον. Dum scilicet neque inspiratio neque expiratio unica actione absolvitur, sed in media veluti inspiratione vel expiratione subsistit, ut debeat æger renovare actionem ad integram inspirationem

In febribus
Respiratio
interrupta a
malum.

rationem vel expirationem absolvendam. Hoc symptoma non patitur æger ex mutata aëris indole, neque in actione respiratoria animali : sed in actione respiratoria vitali, vel quoniam inter respirandum intercludatur toties larynx, ut ita non concedatur liber introitus & exitus aëris, per causam quæ subito adesse & abesse possit. Si vero esset constans causa, ut virium defectus, vel tumor tracheæ aut faucium, vel impletio pulmonis, non haberetur interrupta respiratio, sed intercepta & difficilis. Num ergo actionis vitalis defectus, quæ non permittit unico actu absolvi inspirationem & expirationem, sit hujus phænomeni causa, num vero spasmodica Laryngis vel fibrarum pulmonis constrictio, discernendum est. Debilior autem actio faceret tardiores, debiliorem, & molestiores respirationem, uti observamus in summa infirmitate. Quare videtur affectio singultui simillima, qua inter respirandum constringuntur tracheæ & pulmonum fibræ, sed quæ constrictio subito etiam dimittit, uti in singultu. Pars affecta propterea nequit esse organum animalis aut vitalis respirationis, sed organum id speciale in pulmonibus, quo particularis motus pulmonis & tracheæ absolvitur, quod organum movens convulsione corripitur. In febribus nunc talis interrupta respiratio, est malum, quoniam sine febre in plorantibus est frequens & non diu durans: verum in febribus notat, motum particularem pulmonum in consensum trahi, quod magnitudinem morbi declarat, & nullum auxilium inferre potest.

In febribus
respiratio
interrupta
Convulsio-
nem signi-
ficat.

III. Non est contentus hoc in Aph. Auctor, uti sæpe facit, pronunciare malum esse, sed ex observatione practica, quia didicit sæpe deinceps natam fuisse Convulsionem, adjecit Convulsionem significare. Hoc autem *significat*, duplici sensu accipitur, ut præsens tanquam phænomeni causa, vel futurum. Utrumque admitti potest: nam demonstravimus, hanc respirationem interruptam a spasmodica fibrarum constrictione oriri, quod forsan etiam scivit Auctor noster. Atque in quibusdam fibris si inceperit Convulsio, non est infrequens, tandem quoque Convulsio-
nem

nem fieri in fibris aliorum organorum. Hoc boni comparamus ex ea observatione, quod si videamus ægrum febre laborantem corripitur interrupta respiratione, nos non solum medicamenta febrifuga præscribere debere, verum etiam antispasmodica, de quibus alias non fuisset cogitatum.

LIB. IV. APH. LXIX.

179. **Q**uibus non sine febre urinæ sunt crassæ, grumosæ, & paucæ, si ab his tenues & copiosæ mejantur, prosunt. Maxime vero tales redduntur, in quibus statim ab initio, vel non ita multo post, sedimentum apparuerit.

I.

Hucusque annumeravit symptomata in febribus, & inde formavit prædictiones; sed in hoc Aph: aliquomodo mutat sermonem; nam non format prognosin ex urina in febribus, cum dicat in morbis non sine febre: quare non vult hoc loco intelligere febrem essentialem, sed affectionem aliquam, quæ sæpe aliquam levem febrem conjunctam habet, quæ ergo affectio sæpe levem diuturnam febrem adjunctam habet, quæ interdum quodam tempore incipit inchoare febrem, quæ etiam interdum reddit urinam crassam, paucam, & grumosam. Nam dicit, quibus statim ab initio vel non multo post sedimentum apparuerit. Quibus verbis indicat, talem urinam crassam huic speciei febris communem esse, & eam febrem diu posse durare, si post talem urinam in hac specie febris sequatur tenuis & copiosa, prodest. Cuncta hæc si perpendimus, ne ovum ovo similis invenimus, quam hæc est descriptio febris Cacochymicæ. Illam nempe febrem intelligo, quæ generatur ex materia cruda deficiente actione corporis nata, sensim in corruptionem tendente, ex qua dein corruptela
nata

Febris Caco-
chymica

nata formatur febris quædam lenta, quæ hodie vocatur Cacochymica.

Urina crassa
grumosa
pauca quid
notat in fe-
bre caco-
chymica.

II. Dum deficiente corporis actione, neque assumpta alimenta satis subigantur, sed retinent utcumque indolem propriam, quam dum assumebantur, habebant; neque humores actione corporis inutiles facti satis subiguntur, ut naturalem colorem, odorem & consistentiam excernendis humoribus præbeant, id quod emittitur, utpote minus subactum seu coctum, ut Veteres loquuntur, crudum est & crassius, & constat duplici materia cruda, nempe ex ingestis alimentis & inutilibus humoribus. Ingesta alimenta sua natura leviora vix concrecibilia si antea fuere mista saponaceis humoribus primarum viarum, si cum urina reliqua emittuntur, crassam & utcumque turbidam faciunt urinam, dum partes alimentosæ deficiente actione non satis fuere attenuatæ, ut pellucidæ fiant. Sed humores utiles magis concrecibiles in excrementitios conversi, eodem deficiente motu non satis exuunt suam concrecibilem indolem, qua faciunt, ut partes turbulentiam vel sedimentum in urina facientes, colligantur in grumos. Quamdiu talis manet in corpore dispositio, ægri nulla febre vexantur & reddunt talem urinam copiosorem. Verum si morbus ille diutius durat, id quod fuit crudum & mite, per insitam in ipsis humoribus naturalem mutationem convertitur in corruptelam: quod enim humores in corpore vivente spontaneam non subeant corruptelam, quam subeunt extra corpus vivens in loco calido, id actioni viventis corporis est adscribendum, quæ si languidior, contenti humores isti crudi in aliquam corruptelam secedunt. Hæc corruptela corpori noxia concitat febrem, qua promovetur perspiratio & sudor, quibus quod tenue est, extruditur, ita minuens urinæ quantitatem, sed relinquens crassamentum. Unde tunc in febre Cacochymica generantur Urinæ crassæ, grumosæ, paucæ.

Urinæ copiosæ & tenuiores in febre cacochymica bonæ.

III. Corruptum hoc in corpore vivente accendens febrem, facit, ut actio vitæ validior fiat ad id, quod damnum & irritamentum infert, subigendum & expellendum. Corpo-

Corporis etiam calor accenditur, pulsus fit plenior & citatior, respiratio frequentior & plenior, quibus patet, vires vitæ magis agitatae esse. Hæc actio major sola est in corpore causa, quæ alienum morbosum invertere, & subigere potest, atque expulsiõni adaptare. Unde febris sibi ipsi non raro medicina est. Hoc quoniam observaverunt practici, vituperarunt Corticem Peruvianum febrem extinguentem, sed laudarunt amara calefacientia febrifuga, quibus multo certius tollere potuere febrem. Quob ab omnibus est amplectendum, si æger ex tali febre cacochymica decumbat, quum saponacitate & calefaciente virtute solutio hujus materiæ crudæ promoveatur. Quum corpus tale febre exagitur, quæ cruda magis exagitat & destruit, partemque attenuatam ad emunctoria trudit, urina non amplius continere potest materiem crassam & minus pellucidam, sed ejus loco redditur urina tenuior, & quoniam aucto motu vitæ major copia humorum ducitur ad renes, generatur simul urina copiosa. Ex quibus signis apparentibus patet, materiem crudam subigi & expelli. Si enim talis a febre non reddatur urina, indicio est, hunc motum majorem non valere subigere & expellere materiem crudam, quod pejus est.

IV. Majus arcanum nobis revelat Auctor dicendo, tales maxime reddi, quibus ab initio vel non multo post sedimentum inest. Nam si materia illa cruda lique scat in putrilaginem, saponacitate & intima solutione putredinis in humore, tanta fit exacta permixtio inter partes crudas & reliquam urinæ massam, ut urina nullum deponat sedimentum, quod in morbis putridis sæpe observavi. Putrefactum autem, quantum per praxin detegere potui, vix aut non vix emendari potest actione vitæ aucta; sed si crudum aliquam accepit acrimoniam, qua febrem concitat, id acre frequentissime motu febrili majore subigitur. Quando igitur ex sedimento in urina tali cruda constat, commutationem non fuisse factam in putrilaginem, certiores habemus prognosin curationis instantis, si urina crassa, grumosa pauca per motum febrilem majorem commutatur in copiosio-

Cur præcipue si tales redduntur, quibus ab initio vel non multo post sedimentum inest.

piofiolem & tenuiolem: fecus vero, fi adfuerit putredo, quæ generationem fedimenti impediabat.

LIB. IV. APH. LXX.

180. **Q**uibus autem in febre urinæ conturbatæ, qualis jumentorum, his capitis dolores aut adfunt aut aderunt.

I.

Urina conturbata qualis jumentorum quæ dicatur.

IN hominibus fanis calens & frigefacta urina eft pellucida habens levamentum aliquod circa fundum, quod non perfecte pellucidum eft: ea autem urina dicitur turbida, quæ habet particulas non pellucas per totam urinæ maffam difperfâs. Verum talis fit urina (1) fi reddatur pellucida quam diu calet, fed fi aliquamdiu in frigore quievit, amittit fuam pelluciditatem, & tali circiter modo fit, ac fi aliquis habuiffet urinam cum multo fedimento, quam conquaffaverat. (2) Vel redditur ita turbata dum calet, fed fi in frigore aliquamdiu quievit, deponit fedimentum, poft cujus defcenfum fuperior pars redditur pellucida. (3) Denique redditur urina turbida & ita etiam perfiftit in frigore & quiete. Hæ tres fpecies in morbis acutis non oriuntur ab eadem latente cauâ, & inde diverfam prognofin præbent. Necelfe igitur erat, ut Auctor adderet diftinctionem, dicens qualis jumentorum, vel quales veterini generis, in quibus animalibus redduntur urinæ ita turbidæ & tales perfiftentes in frigore cum quiete.

Quomodo urina jumentofa generatur.

II. Quæ materia urinam turbat, non eft materia fana in corpore noftro, recessum enim a fanitate indicat: ea vero emittitur cum fana urina, & huic tam tenace cohæret, ut ne quidem in quiete & frigore reliquam maffam fanam relinquat, vel ab ea fecedat. Id quod emittitur, nihil mali facit corpori, fed exhibet fignum maturæ materiæ morbofæ

boſæ in corpore adhuc latentis, cujus portio nunc cum urina exiit. Quoniam autem turbida illa urina declarat, morboſam materiem intime & tenaciſſime unitam eſſe humoribus, non poſſumus aliquam ſpem ſuſcipere, corporis vires ſe facile liberare poſſe a morbi materia. Itaque ex tali urina conſtat, morbum futurum pertinacem, & ea mala oritura, quæ a remanente materia in corpore ſunt exſpectanda.

III. Neque talis unio firmior in quovis morbo idem præſagium præbet, talis enim frequens obſervatur in morbis pectoris, ictero, cruditate humorum, in quibus diverſa præſagia præbet: propterea adjecit Auctor in febribus, & quantum ex ipſo Auctore conſpicere potui, intellexit febrem continuam vehementem (H, a, 873 & 874.). Quando nempe compactus lentor febrium continuarum, qui optime ſecedit in pus, per continuatam febrem convertitur in putrilaginem, quæ omnem ſeparationem a reliqua maſſa bona renuit. Obſervavit enim noſter Auctor dicto loco urinas ſubſidentes, denſas, conturbatas, continuata febre mutatas fuiſſe in urinam rubicundam conturbatam, velut jumenti, poſt quam mente motus eſt phrenitico modo, & mortuus eſt in vehementibus convuſionibus. Ex qua obſervatione hanc deduxit regulam. *Nam urina denſa ac conturbata, certum ſignum ſunt doloris capitis & convuſionis, & mortis.* Quare huiusmodi urina eſt corruptionis acris calidæ ſignum in febribus.

Urina jugalis in febribus.

IV. Tandem ex iis, quæ hucusque diſputavimus, adſtrui facile poteſt, talem Urinam conturbatam non ſolum fieri in Capitis doloribus, vel & iſtos ſolos præſagire, verum etiam multa alia capitis mala. Nam quoniam transitus materiæ morboſæ factus fuit in humorem acrem corruptum, qui intime unitus eſt toti maſſæ, id corruptum, ex communi ratione ad omnes corporis partes poteſt ferri, ut ibi ſuam tragaediam agat. Quod autem præcipue petat caput, hoc ex obſervatione practica habemus, & niſi illa hoc adſtrueret a priori, illa determinatio non potuiſſet defini. Sed ex obſervatione hac id boni habemus in exer-

Quibus urina jugalis in febre his capitis dolores vel adſunt vel aderunt.

citatione practica, quod sciamus, quid sit in tali malo faciendum, dum expectamus mala capitis ex tali urina: ut scilicet demus alvum ducens, quod ad aliam viam magis ducit materiem caput spectituram. Ex hac ratione saepe de-
di Purgans in hujusmodi aegris optimo cum successu.

LIB. IV. A P H. LXXI.

181. **Q**uibus morbi septima die judicantur, iis nubeculam rubram urina die quarta continet, & alia secundum rationem.

I.

Nubecula
in urina
quid sit.

ANtequam aliquid certi formare possumus ex proposito phaenomeno in urina, constare debet, quid sit in urina nubecula, & ex quibus causis & materia illa formetur. Materia visibilis a reliquo urinæ liquore visu distinguenda, tria diversa loca occupare potest. Vel hæret in urinæ superficie, quando supernatans dicitur; vel hæret ad fundum, quando sedimenti nomine venit; vel denique medium inter has partes occupat magis minusque elevata, quæ materia in medio suspensa Nubeculam format, ex nubium similitudine & loco in aëre, quæ etiam magis minusve elevatae feruntur per aëra: quamvis differentia statuitur inter nubeculam & nebulam, ea in urinæ inspectione tam parvam exhibet differentiam, ut non mereatur distinctionem. Quoniam nubecula seu nebula se præbet visui in medio urinæ, quamvis nebula ex partibus tenuioribus videtur congregata, ejus materia distincta esse debet a reliqua materia liquoris urinæ. In hominis perfecte sani urina quædam semper nubecula invenitur, quæ videtur confecta ex portione alimentorum non satis subacta, atque ex materia detrita, per vitæ actionem in humorem excrementitium: unde in heluonibus & quibus vitæ actio est debilior tanta
hujus

hujus copia in urina colligitur, ut vel totam urinæ massam turbet, vel copiosum sedimentum turbidum faciat. In morbis autem cum majore motu circulatorio vix aliquid de dicta materia nubeculam formans inveniri potest, quum validiore actione vitæ ea materia ita subtilifetur, ut sui nullum indicium præbeat, quare tunc tota urina redditur pellucida sine nubecula & sine sedimento: quod autem in morbis acutis tandem formetur nubecula, id non arguit superius dictam materiem evacuari, sed omnino aliam, scilicet morbi materiem aliquomodo subactam, vel partem detritam per actionem vitæ validiorem. Quum in hujusmodi morbis talis semper formatur materia, signum est, quando urina in febribus acutis reddatur, perfecte pellucida, eam materiem vel aliis humoribus intricari, ut separari non possit; vel retineri in corpore: quare debito tempore in acutis nubecula conspecta bonum signum, nempe exitum materiæ morbi, exhibet.

II. Nubecula quidem denotat exire morbi materiem, sed color nubeculæ etiam naturam materiæ exprimit. *Nubecula in urinis alba quidem & inferne commoda sunt, rubicunda vero & nigra, ac livida difficiles sunt. H. a. 580. Nubecula qua feruntur in urinis, alba quidem bona sunt: nigra vero mala. H. a. 475.* Non est hujus loci omnes nubecularum colores ex suis deducere causas, duntaxat notandum venit, ex qua causa formetur nubecula rubra. Dum in morbis acutis & febribus materia morbi paulo majore motu agitur, quam est motus vitalis in sanitate, præbet in urina materiem visibilem albicantem: sed in motu validissimo id quod prodit vel in nubecula vel in sedimento rubrum colorem habet, imo ipse liquor urinæ ruber est, quod etiam observatur in motu musculari validiore: reliqui autem colores flavi, nigri &c: a diversis humoribus una exeuntibus dependent. Quoties igitur in urina formetur nubecula rubra, signum est, tali in corpore validissimum motum adesse atque febrem vehementem. Si ergo comparatio fiat inter nubeculam albam & rubram, dici potest, nubeculam albam salutarem esse, sed nubeculam rubram majus periculum portendere.

Nubecula
rubra quid
significet.

Nubecula
rubra quar-
to die appa-
rens cur no-
tat Crisim
septimo die
futuram?

III. Motus morbi acuti febrilis tam vehemens, qui valet materiem rubram pro nubecula formare, diutius quam per septem dies a corpore sustentari nequit sine corporis interitu, quamobrem recte observavit Galenus, se nunquam post quartum diem vidisse nubeculam rubram in urina praesagientem futuram crisim septimo die. Hæc etiam observatio firmat criticorum dierum doctrinam, quod quartus dies sit index septimi, quoniam in morbis acutis tantum tempus a morbi principio infumitur usque ad acmen, quantum in morbi declinatione, quoniam dies quartus est medius inter principium & septimum diem. Inde etiam si præludia coctionis observantur die septimo, morbus plerumque durat ad decimum quartum; & quæ conspiciuntur undecimo, illa morbum ad vigesimum diem prolongare solent. Hoc tamen observatur in diebus criticis, quod brevius tempus accuratius servet ordinem, quam tempus longius. Dum igitur quarto die ex nubecula rubra constet, febrem esse vehementem, cujus tamen materia incipit quarto die evacuari, spes est perfectam futuram esse coctionem die septimo. Verum saepissime evenit, quod in tali febre vehemente vires vitae superentur, & ut ita morbus abeat vel in corruptionem vel sphacelum, hoc signum criticum minus securum est, quam si apparuisset Nubecula alba, denotans vires vitae praevalere. Necesse igitur erat, ut Auctor adjiceret, *& alia secundum rationem*. Nam si modo unum alterumve adesset signum, vires vitae superari a magnitudine morbi, cum homo talis ita versetur in ancipiti statu, & quasi in puncto interitus, hoc signum solum non sufficeret ad crisim septimo die praesagiendam.

LIB. IV. APH. LXXII.

182. **Q**uibus urinae pellucidae, albae, mae. Maxime autem in phreniticis observantur.

I.

Quoties urinae liquor omni in puncto sibi similis est, atque per suam totam substantiam transmittit lucis radios, quemcumque etiam habeat colorem album, flavum vel rubrum, talis tamen dicitur urina pellucida. Talis ergo privata est omni materia sedimentosa, & quae format nubeculam; neque habet admistam materiem, quae turbidam facere potest urinam. Inde tamen non inferri potest, morbi materiem huic urinae non esse mistam, ita enim sales solvuntur aqua, & tamen ejus non turbant pelluciditatem: atque multae tincturae inveniuntur pellucidae virtute medicamenti saturae. Sed quando talis invenitur urina, quae etiam morbi materiem mistam habet, significat, perfectam esse unionem inter morbi materiem & reliquam massam urinae. Ita durissima & opacissima etiam metalla in suo menstruo soluta pellucidissimum liquorem praebent. Quare urina pellucida vel indicat in morbis materiem non evacuari, vel reliquo liquori urinae intime mistam esse.

Urina pellucida quae dicitur,

II. Materia autem morbosa magnâ copiâ urinae intime mista non turbat ejus liquorem, sed tamen mutat ejus colorem, unde habetur urina alba pellucida aquosa diaphana, vel pellucida & colorata: hæc semper indicat, nihil de materia morbi vel materia detrita vitali actione corporis urinae liquori esse mistum: illa autem, quo color magis est saturus, eo majorem copiam materiae detritae vel morbosae admistionem arguit. Ex urina itaque pellucida alba scimus, neque materiem detritam neque morbosam evacuari.

Alba pellucida mae la,

cuari. In febribus autem talis urina evacuari nequit, quin designet materiæ utriusque retentionem, quum sola actio vitæ vehementior, etiamsi nulla fieret materiæ morbi subactio, tinctam faciat urinam, uti in sanis etiam experimur, quorum corpora sana exercitiis validioribus fuere agitata. In Chronicis autem sæpe evenit, talem reddi urinam, quum circulatio validior non multum deterit: sed si tamen maneat pellucida longo tempore, significat, materiem crudam, quæ generatur in Chronicis, retineri. Ergo tam in Acutis quam Chronicis alba pellucida urina est mala, tanquam signum retentionis materiæ.

Alba pellucida cur maxime phreniticis?

III. Non consentiunt Interpretes, num talis urina præfagiat magnum malum in Phreniticis, num vero talis in Phrenitide sæpius, quam aliis morbis observetur. Ego autem puto, utramque sententiam esse admittendam. Nam dum Æger laborat Phrenitide (*Aph.* 109, vii) & inde corripiatur febre, sæpe reddit urinam albam pellucidam, cum morbi materia collecta in encephalo, non potest tincturam aliquam præbere urinae: atque urina talis, quoniam indicat, non solum retineri materiem morbi, verum etiam materiem detritam per validam vitæ actionem, quæ in Phreniticis solet esse vehemens, certissimum indicium præbet, utramque hanc materiem in encephalo colligi, quo signo nihil pejus inveniri potest. Si unquam Purgans datum vel Epilpasticum pedibus applicatum ad derivationem faciendam, est adhibendum, talis urina summo est indicio, nam nisi derivetur materia, mors certissima est expectanda.

LIB. IV. APH. LXXIII.

183. **Q**uibus hypochondria elevata murmurant, dolore lumborum superveniente, his alvi humectantur, nisi flatus eruperint, aut urinæ copia prodierit. In febribus autem hæc.

I.

Antequam certa potest tradi prognosis de alvi humectatione, flatuum eruptione, vel copia urinæ, determinandus est status corporis, in quo observantur hypochondria elevata murmurantia, post quæ venit lumborum dolor, unum ex his tribus præfagiens. Auctor dicit in febribus, quoniam illa observavit fieri in febricitantibus; sed propterea non excludit, sine febre quoque fieri non posse, verum quia veritatem expertus est in febribus. Recte monet Galenus, Hippocratem, si absolute ponit febrem, intelligere febrem essentialem & non symptomaticam, adeoque in febre continua vel remittente, quoniam intermittentes raro generali nomine febris citantur. Si ergo aliquis laborans generali incalescentia febrili, sine locali inflammatione, erysipelate aut suppuratione, incidat in Hypochondria inflata murmurantia, quæritur, unde tunc veniant illa murmura seu borborygmi cum hypochondriorum inflatione. Dum materia febrilis per totam massam sanguinis dispersa sensim ad aliquod organum incipit colligi, ut vergat ad eliminationem vel metastasin, tali in parte quædam concitat phænomena functioni istius partis propria: nunc autem febris facit Hypochondria elevata murmurantia, quæ notant augmentum quantitatis aëris in hoc loco, unde illa inflatio; atque inordinatum in his partibus motum, unde Borborygmi. Omnia experimenta in viventibus animalibus docent, quod quoties intestina in motu suo peristaltico turbentur, intus in

Unde in febribus Hypochondria murmurantia?

se generare aërem artificialem, ac si motus ille aërem ab humoribus in cavo intestinorum hærentibus intricatum separaret, quemadmodum motus ordinatus eum aërem jungit. Hinc constat ex ventris inflatione cum borborygmis, quod febris illa deponat materiem suam ad mesenterium & intestina, in quibus tamen partibus non facit obstructionem aut infarctionem, nam tunc non generaretur inflatio murmurans, sed tumor aliquis hypochondriorum durus.

Lumborum
dolor præ-
sagiens alvi
humectati-
onem.

II. Ex lumborum dolore in non febricitantibus (*Aph.* 130, iv.) demonstravimus indicari purgans per alvum, quoniam tunc significavit ille dolor cacochyliam. Hoc autem loco materia febrilis se pro maxima parte hic deposuit & quærit exitum per intestina. Sed nisi sit materia biliosa febrem excitans aut materia chylosa cruda corrupta, raro febres per hanc viam moluntur exitum. Sed potius per cutim vel urinam, unde non sine ratione adjecit Auctor, nisi flatus eruperint, indicantes materiem potius determinatam esse ad cutim, vel prodierit urinæ copia, quæ secum fert materiem febris. Inde non incongruum erit, si lumbi ex febre doleant cum ventris murmuribus & inflatione, atque signis cacochyliæ vel bilis corruptæ, propinare alvum ducens, quod illam evacuationem magis determinat.

Dolor lum-
borum præ-
sagiens uri-
næ copiam.

III. Quia vero lumbis quoque accumbunt renes, vix distinguere possumus, num ex renibus vel nexu mesenterico lumbi doleant: sæpe enim evenit, ut calculosi, de quibus certe scimus, causam latitare in lumbis, colicis doloribus, ventris murmuribus & inflationibus tententur, quum tantus sit inter illarum partium nervos consensus, ut affecto nervo renum, mesenterium & intestina inordinate moveantur. Quod si vero febris materia magis feratur ad renes excitans tamen ex consensu intestinorum & mesenterii symptomata, non est mirandum, in hujusmodi febre fieri posse materiæ evacuationem per urinam copiosorem.

LIB. IV. APH. LXXIV.

184. **Q**uibus spes est abscessum fore ad articulos, eos liberat ab abscessu urina multa & crassa, & alba prodiens, qualis in febribus laboriosis quarto die quibusdam fieri incipit. Si vero etiam ex naribus sanguis eruperit, brevi admodum solvitur.

I.

Qualem statum in febribus Hipp: intelligat, non est opus anxie quærere, nam (*Aph.* 141.) exposuit ad articulos & circa maxillas abscessus expectandos esse in lassatis per febres: restat ergo videre, qualis urina talem liberationem portendit; illa autem debet esse multa, crassa & alba. Talis urina si veniat in febribus, indicat lentorem febris continuæ incipere solvi & commutari in materiem purulentam, quæ dicitur cocta in morbis inflammatoriis: nam si talis urina die indice, ut est dies quartus, apparet, exhibens rudimenta coctionis, die judicatorio perfectam crissim expectamus; nempe urinam cum sedimento albo & copioso, quæ omnem materiem coctam e corpore evacuat. Nam ipsa urina multa crassa, & alba, tanquam signum imperfectæ coctionis hominem non liberat, sed est signum perfectæ coctionis instantis, uti flores præfagiunt fructus. Hujusmodi urina alba crassa & copiosa quibusdam fieri incipit in febre laboriosa (*Aph.* 26, 1) die quarto, sed etiam aliis diebus indicantibus, septimo, undecimo, imo serius apparere potest, quoniam est signum principii coctionis in febre laboriosa, nam in febribus laboriosis præfagiuntur etiam abscessus, sed non ita in aliis febribus: quippe nisi febris tam valida sit, ut labores faciat, non expectamus abscessum. Igitur inutile foret dicere, urina crassa, alba, copiosa prævenit abscessum, si tali febre laboraret æ-

Qualis urina liberat ab instanti abscessu ad articulos?

ger, ex qua nullum abscessum expectamus. Igitur admodum conveniens est in febribus laboriosis, si videamus urinam albam, crassam, copiosam, ut signum futuræ crisis, hunc non turbare naturæ ordinem per aliquam artificialem evacuationem.

Quando
sanguinis
eruptio
prævenit
abscessum?

II. Particula *Etiam* multis dedit dubitandi ansam, aliis autem errandi occasionem, ac si significaret, sanguinis eruptionem prævenire abscessum brevi, si tunc oriretur, quando in febre laboriosa ex urina alba crassa & copiosa constaret, futuram esse solutionem per urinam. Unde etiam magni nominis viri non dubitarunt hoc tempore imperare venæ sectionem, ut eo citius æger liberaretur. Hi autem non revocarunt in memoriam monitum nostri auctoris (*Aph.* 20.) quæ judicantur & judicata sunt perfecta, neque movere oportet, neque innovare, sed sinere. Nam si in febre laboriosa ex febris vehementia expectabamus abscessum ad articulos, sed tunc incipiebat prodire urina copiosa, crassa & alba, ut signum crisis per urinam, hoc tempore vel per hæmorrhagiam supervenientem, vel per institutam venæ sectionem turbaretur coctionis ordo, & fieret innovatio. Imo omnis evacuatio sanguinis mala est, si Lentor incipit mutari in purulentiam. Restat igitur illa difficultas, quomodo illa particula *Etiam* sit accipienda, ut sensus respondeat experientiæ. Ego puto, Hippocratis sententiam esse veram & ita cum studio summo traditam. Scopus ejus est demonstrare in febribus, quæ per suam vehementiam demonstrant, expectandum esse Abscessum, si in tali febre urina alba, crassa, copiosa prodit, quæ præbet signa futuræ coctionis & evacuationis, spem affulgere, eam febrem non abituram in abscessum, sed liberatum iri per urinam coctam. Sed ne judicarem, per solam talem crism præveniri posse abscessum, addit *Etiam* liberationem fieri posse per hæmorrhagiam, sed tunc citius seu breviori tempore liberari: Nam ut sanguinis fluxus liberet hominem a febre (*Aph.* 170, II) fieri debet in morbi principio, antequam suppurationis signa apparent, qualia sunt urina alba, crassa, copiosa. Unde hæmorrhagiæ & sanguinis missiones in morbo-

rum principiis sunt salutare minueno nimium febris impetum, sed tempore suppurationis si fiant, semper damnum inferunt inhibendo puris concoctionem ulterionem, vel exhibent signum corruptionis. Si ergo ex febris natura & vehementia conjicere possumus, expectandum esse abscessum, expedit, si sponte non fiat hæmorrhagia, largam instituere venæ sectionem, quæ his temporibus prævenit pleuritidis, peripneumonix & aliorum morborum inflammatoriorum transitum in suppurationem.

LIB. IV. APH. LXXV.

185. **S**I quis sanguinem, aut pus mejat, renum, aut vesicæ exulceratio significatur.

I.

Partim hic Aph: cohæret præcedenti, quatenus agitur de signis ex urina: partim vero non cohæret, quoniam non pertractat signa ex urina in febribus. Vult enim in hoc loco demonstrare ex sanguinis & puris exitu per vias urinæ in utroque sexu, qualisnam pars sit læsa. Antequam designamus partem læsam, certo constare debet de phænomeno, ex quo partem læsam conjicimus, nempe quid significat & quali modo cognoscitur sanguinis vel puris evacuatio per vias urinæ, seu ex urethra tam feminæ quam viri. Si sanguis purus vel urinæ mistus per urethram evacuetur, hodie vocatur *Mictus cruentus*. Nihil planius videtur in morbis observari posse, dum tamen a quibusdam urina ruberrima pro sanguinis evacuatione fuerit habita: neque tam manifeste patet non satis attendenti, num ex renibus vel vesica profluat, cum topica medicamenta diversis locis sint applicanda: igitur operæ pretium erit ad significanda loca affecta, ut reliqua criteria hujus sanguinis evacuationis perpendamus. Sanguis & urina sunt duo humores specifica gravitate differentes. Sanguis enim est urinâ gra-

Mictus cruentus quam partem affectam designat?

vior, unde hi humores unà emissi non diu manent permisti, sed sanguis etiam in urina calente breve petit fundum, si non statim aliquomodo coagulatus evacuatur sanguis, quando facillime distinguitur. Urina autem ruberrima ut plurimum subsistit aliquamdiu, priusquam deponit rubedinem, & si subsidentia fuerit a reliqua massa separata, notabilis & in liquore ipso & in sedimento erit differentia. Nam in mixtu cruento superstans urina in colore vix differt ab urina sana, atque sedimentum erit tanquam sanguis grumofus, & corporis color non erit admodum accensus. Urina autem ruberrima ardorem corporis adjunctum habet, & si sedimentum fuit depositum, superstans urina intensum colorem rubrum servat. Postquam medico constat, rubedinem fieri a sanguine admisto, observandus est locus, ex quo ille sanguis manat, ut topica medicamenta parti læsæ adhiberi possint. Si ex Urethra profluit, continuo exstillat sanguis & sine conatu mingendi emittitur, quum sphincteris constrictionem non debeat superare, vel sine urina emittitur, vel ante urinam exit. Sæpe etiam dolor partem læsam declarat. Si vero ex vesica venit, imperfecte mistus erit sanguis urinæ, non raro sub grumi forma prodit: atque pudendorum molestiam sæpe & dolorem parit. Altius vero si ex renibus vel ureteribus profluit, perfecta est sanguinis cum urina mixtio, cum affectione lumborum. Raro fit, quod arteriæ renales dilatatæ transmitterent sanguinem, quando urinæ secessus non fieret a sanguine, quia tunc in renibus non conficitur urina.

Unde Pus
in urina.

II. Alter humor, qui aquâ purâ gravior est, vocatur Pus, unde istud urinæ mistum, quæ aquâ est levior prompte ante refrigerationem fundum petit, ut inde pateat, non esse urinæ album sedimentum, quod tandem in refrigerata urina fundum petit. Hoc Pus ex omnibus locis, ex quibus sanguis profluere potest, etiam effluit vel ex ulcere, in his locis hærente, vel quia sanguis antea fluens reliquerit ulcusculum. Interdum vero observatur in morbis inflammatoriis in suppurationem converfis, atque in morbis purulentis, uti Empyemate & Phthisi, ut materia purulenta reddatur per renes cum levamine. Ex quibus patet, non esse

esse certissimum criterium, si quis sanguinem aut pus mingat, vesicam aut renes ulcere affectos esse. Hanc autem sententiam colligunt ex hoc aphorismo: sed Auctor observavit in praxi, ex ulceratis his partibus Sanguinem & Pus profluxisse; propterea non concludit, nullo alio modo pus reddi posse.

L I B. IV. A P H. LXXVI.

186. **Q**uibus cum urina crassa exiguae carunculæ, aut veluti pili exeunt, a renibus excernuntur.

I.

Versatur Auctor in expositione signorum, quæ demonstrant, Renes affectos esse, horum ulcera & vasorum cruentorum ruptionem manifestam fecit ex urina, quæ continebat sanguinem aut pus: nunc vero ulterius ex Carunculis & Pilis in urina inventis demonstrat, renes quodam morbo affectos esse, cujus nomen non addit. Detexit in urina crassa carunculas, unde concludit, renes quodam labe affectos esse. Practici non negant, se invenisse carunculas concretas in urina, sed putant esse glandulas a renum substantia separatas, & quia renes existimant esse glandulosos, non dubitant amplecti hujus observationis veritatem, sed pilos excerni posse, qui morbus vocatur Trichiasis, cum Galeno vel negant, vel maxime in dubium vocant. Ego vero maxime dubito, hujusmodi carunculas indicare glandulas renales separatas & cum urina emissas, sed caruncularum evacuationem aliquoties observavi; nam renum papillæ, quæ ab istis pro glandulis habentur, ad summum sunt duodecim in quovis rene, quarum papillarum separatio tantam copiam Caruncularum in urina exhibere nequit. Eodem quoque modo multi ratiocinantur de glandulis Pulmonum per sputum ejectis, si in sputo de-

Quid no-
tant carun-
culæ in uri-
na?

tegant

tegant hujusmodi corpuscula concreta, quæ carunculas referunt, dum tamen glandulæ pulmonum non in cavitate tracheæ vel bronchiorum hæreant, sed ad externam bronchiorum superficiem, & ita per sputum reddi nequeant. Error ille natus fuit ex præoccupata opinione, qua putant inter partes firmas cohærentes & liquores maximam intercedere differentiam: qui modo attendit ad sanguinem ex pleuritico emissum, juraret, pellem tegentem illum sanguinem refrigeratum portionem esse cutis vel membranæ, cum non minor tenacitas in cuticula illa phlogistica detegatur, quam in quadam vera membrana. Fieri ergo potest in nobis, ut quidam humor fluidus stagnando concrescat in corpus densum firmum & compactum, quod habet figuram loculi, in quo congregatum fuit. Hæc massula sensim accedente nova materia concrescibili, augetur mole & ita formatur sæpe corpusculum albicans, quod loculum distendendo tandem ita implet, ut loculi vascula cruenta dilatata evomant sanguinem, qui striis rubris externe interdum obducit moleculam illam. Tandem loculus irritatus tamdiu retentam massam concretam & compactam, nunc striis rubris sanguineis externe ornatam, eructat, quæ massula in communi via ampliore veniens cum profluente urina progreditur per ureteres ad vesicam, & tandem per urethram emittitur, quemadmodum hujusmodi etiam carunculæ ex lacunis bronchiorum cum sputo non raro ejiciuntur. Ergo exitus hujusmodi caruncularum demonstrat mucum, quo intus obtegitur renum pelvis contra urinæ rosionem, nimis tenacem fieri in suis loculis, & tandem extrudi, atque ita relinquere loculos apertos mucagine privatos, qua tunc loculorum cavitate ab urina acriori tacta dolores inferuntur: atque ita significatur renes laborare. Et quoniam sensim in dictis loculis novus congeritur mucus concrescibilis, sæpe possunt quoque tales reddi carunculæ sine amissione substantiæ renum, sed non sine dolore vel renum vitio. Non solum ego hujusmodi carunculas a renibus affectis prodire observavi, verum etiam massam aliquam similem concretam oblongam instar vermis aliquot ulnarum, quæ massa etiam
externe

externe sanguineis striis ornata prodibat. Addit cum *urina crassa*. Id est cum urina, quæ per totam suam massam non est pellucida, qualis urina sana esse solet, sed habens materiem non integre pellucidam dispersam etiam per reliquam massam. Hoc adjunctum esse debet signum, ut cognoscatur, num carunculæ illæ in lacunis renum sint formatæ vel etiam in vesica urinaria, quæ etiam hujusmodi lacunis scatet, mucum fundentibus, quo interna velicæ superficies contra urinæ rosionem obducitur. Nam si ille mucus vesicæ in suis lacunis format carunculas, non fit tanta mucæ reliqui unio cum urina, ut inde fieret reliqua urina turbida, uti fit, si formatio fit in renibus, quare hoc scitu est necessarium ad designandum locum, si carunculæ in urina appareant, num formentur hæ carunculæ in renibus vel vesica. Neque hæc observatio recedit ab aliis de origine mictus cruenti, nam si sanguis manat ex vasculis renum, multo accuratior miscela sanguinis habetur cum urina, quam si manat ex vasculo rupto in vesica urinaria.

II. Quoties in urina conspiciuntur corpuscula oblonga teretia instar tenuium filamentorum, illa dicuntur Pili. Num hujusmodi inveniantur in urina, admodum disputant, quoniam contendunt in renibus generari non posse, quum præoccupati sunt quadam opinione, pilos hos esse renum tenuia vascula, quæ quum a renum substantia secedere non possunt, negant totum hoc phænomenon: tantum sæpe valet præpostera opinio, ut quæ a multis per certam autopsiam sunt manifesta, tamen repudientur, quia phænomeni ratio non potest reddi, vel quod nobis sit hujus causa ignota. Sed si omnia phænomena in morbis inventa sunt abroganda, quorum causa inveniri nequit, certe ne tertia pars signorum in Medicina restaret. At mittamus eorum præposteram theoriam, qua putant esse vascula renalia, & consulamus practicos non ratiocinantes ex causis, sed sola phænomena tradentes, ut facit Auctor noster, num viderint Pilos in urina; uno ore confitentur omnes, se sæpe vidisse, quemadmodum ego istos observavi in urina ægrotantium. Ergo apparitio illa negari nequit, sed negari potest, esse vas-

Pili in urina crassa quid significant?

cula, nam si in tubulis uriniferis, per quos transit secreta urina stillanda in renum pelvim, formatur materia concreta ex naturali ibidem secreto muco, corpuscula illa æmulantur figuram vasculorum seu tubulorum, in quibus formata sunt: & quoniam cavitas horum tubulorum exigua est & oblonga, necesse est, ut corpuscula in hujusmodi cavitatibus formata pilorum figuram habeant. Hæc dein formata exeuntia cum urina facile præbere possunt conspicienti figuram pilorum. Et quoniam in toto tractu viarum urinæ non habentur hujusmodi tubuli exiles, non erit mirum, si in urina conspiciantur, tales pilos indicare, Renes esse affectos.

LIB. IV. A P H. LXXVII.

187. **Q**uibus in urina crassa existente, furfuracea simul minguntur, iis vesica scabie laborat.

L

Cur furfuracea in urina vesicæ scabiem significant?

Pelliculæ tenues, planæ, figuræ inordinatæ, instar furfuris tritici, concretæ, per urinæ substantiam dispersæ in hoc loco intelliguntur: de his dicit Auctor, tales si observantur in urina, indicare vesicam scabie laborare. Hujusmodi furfuracea sunt corpuscula concreta majora, quam quæ ire potuissent per minima renum vasa, & propterea nata in urina post secretionem, vel admista ei. In Coacis (H. a. 581) mentionem facit de sedimento furfuraceo, *Lethalis, inquit, in pleuriticis brevi prasina, nigram subsidentiam habens aut furfuraceam*, quoniam designat, morbi materiem ita exeuntem tenacissimam esse & promptissimam ad concretionem, in quo casu nullum adest vesicæ vitium. Sed talis redditur urina cum morbo vehementissimo inflammatorio. Hoc autem loco nullam mentionem febris facit, quare concipiendum, Auctorem hic indicare voluisse, si vehemens non adsit febris. Quippe si signa ex urinis capienda vult

vult observare in febribus, nomen febris addit, quod plane constat ex superiori Aphorismo 183. Igitur furfuracea hic fuere admista in itinere, neque est ~~sedimentum~~ fufura-ceum, quale in superiore allegato loco indicatur, sed quando per urinam crassam non sub forma sedimenti furfuracea sunt dispersa, quæ statim etiam in calente urina conspiciuntur; & dein quandoque per urinam dispersa manent, interdum uroscopii fundum petunt, prout diversa proportionata gravitas locum his fursuribus parat. Hujusmodi fursures ergo urinæ admiscuntur, quando vesica urinaria scabie laborat, id est, quando ex interna vesicæ superficie transudat humor, qui non facile omnis permiscetur urinæ, sed lateribus vesicæ adhærens format crustulas, & dein separantur, ut observamus fieri in porrigine & herpete in cute, humores enim lentescientes ex cute transudantes concreti hujusmodi squamulas vel fursures formant. Quid ni ergo simile quid fieri potuisset in vesicæ interna superficie, quod mucus naturalis intus obducens vesicam in sua natura degeneratus, uti humor transeuns per cutim, concreveret in fursures, qui dein una cum urina exeunt: nihil equidem obstat. Sed quod non significetur pars quævis alia, facile concipitur, quia nullibi talis in viis restat locus, in quo hi fursures generari possunt. Quamobrem etiam affectus cutaneus fursures emittens scabies vocari debet. Addit in urina crassa existente, quoniam non omnis transudans humor in fursures concrevit, sed reliqua pars urinæ mista præbet aliquam urinæ crassitudinem.

LIB. IV. A P H. LXXVIII.

188. **Q**ui spontè sanguinem mingunt, bis a renibus venæ
ruptionem significat.

I.

Sanguinem
sponte min-
gere, quid
significat?

Quam maxime laborant Interpretes in expositione hu-
jus evacuationis sanguinis ex urethra, quum dicat
Hippocrates ἀπὸ ταυτοματίας, quod hic vertitur *sponte*,
Galenus vero *Inopinanter*, alii autem forte fortuna vel casu.
Ego puto intelligendum esse talem sanguinis evacuationem,
quam non possumus conjicere provenire ex vulnere, ulce-
re, vel corrosione aliqua in viis urinæ, sed quod æger in-
cipiat reddere sanguinem loco urinæ, dum non cogitabat
tale quid futurum esse, quoniam in viis urinæ nullam mo-
lestiam aut dolorem percipiat, ex quibus conjicere potest
æger vel Medicus, evacuationem sanguinis generari
posse.

Qui sponte
sanguinem
mingunt an
ex ruptis ve-
nis in reni-
bus?

II. Quamnam partem affectam mictus cruentus significet,
superius (Aph. 185, I.) exposuimus. Hoc loco duo sunt
observanda, (1) quæ significantur per mictum cruentum, qui
sponte seu inopinanter fit: (2) sanguinem eum manare ex ve-
nis, atque ex venis Renum. Veteres, etiamsi ex arteriis stillabat
Sanguis, tamen accusarunt venas, quoniam fabrica arteria-
rum & circulatio sanguinis erat ignota ipsis. Neoterici me-
lius edocti statuerunt, omnem hæmorrhagiam fieri ex arte-
riis, quoniam venæ valvulis instructæ non permittunt regur-
gitare sanguinem, at eum fundunt ex suis sic dictis anastomo-
sibus. Quamobrem quoque in hac sanguinis evacuatione
statuunt, ex ruptis extremitatibus arteriarum sanguinem pro-
fluere: quod putant satis convenire doctrinæ veterum, qui
omnem hæmorrhagiam adscribunt venis, etiamsi fiat ex ar-
teriis. Hæc autem nova theoria tanti mihi non videtur

pon-

ponderis, ut totam doctrinam de ruptione venarum omnino repudiarem, quasi nunquam ex venis sponte potuisset erumpere sanguis. Clare enim nobis constat in hæmorrhoidibus & in aliis partibus corporis ex varicibus ruptis profluxisse magnam sanguinis copiam: atque in venis organorum, quæ semper carent valvulis, æque potest refluxus fieri a trunco versus ramos, quam in arteriis, uti hoc satis patet in venis mesentericis, & uterinis valvulis carentibus. Constat ergo tam ex principiis venarum quam finibus arteriarum dilatatis fluere posse sanguinem: atque ex varice & aneurysmate rupto ingens etiam generari potest sanguinis fluxus. Nunc autem conspiciendum est, num evacuatio sanguinis ἀπὸ τῆς τομῆς, fiat ex vena rupta, vel arteria rupta vel dilatata, ut multi putant. Multo frequentior generatur in venis varix, quam in arteriis aneurysma; atque varices tolerantur sine perceptione ut plurimum ægri, atque generantur sponte sine causa evidente, sed aneurysma ut plurimum generat pulsationem tali in parte, & raro sine valida causa, quæ quidem ab ægro perciperetur, producit. Denique sanguis ex arteria effusus magis concrefcit, & difficilius intime miscetur urinæ, quam qui manat ex varice diffracta. Quamobrem mihi non absurdum videtur cum Auctore statuere, si antea in vena fuerit nata varix, ex ea rupta effundi posse sanguinem urinæ miscibilem, sponte seu inopinanter, cum urina accurate mistum: nam si supponatur arteriarum dilatatio, illa potest esse duplex; nempe a majori interno impetu, sed is tantum calorem & pulsationem prius faceret, quæ ab ægro facile perciperetur; si vero nimia supponatur extremitatum dilatatio in arteriis, evacuetur quidem urina chylosa crassa, sed vix credendum est, per extremitates arteriarum in renibus dilatatis merum profluere sanguinem. Unde non ita a veritate est alienum statuere, ut fecit Hipp., indicare venam esse ruptam. Quod autem judicaverit, eum sanguinem profluere ex Renibus & non ex aliis viis urinæ, nempe ureteribus vel vesica, non est sine ratione, etiamsi ex loco dolente non potuerit Auctor dignoscere, num ve-

fica vel renes sint læsi, quia dicit inopinanter fieri, quod notat ex dolore vel affectione aliqua dejudicari non posse, futurum esse sanguinis fluxum: nam omnes venæ & arteriæ in renibus non adferunt sanguinem ad generalem renum nutritionem, sed & venæ & arteriæ renales functioni, scilicet secretioni urinæ famulantur, in quibus tunc venis non inveniuntur valvulæ, quæ tamen in venis vesicæ adfunt, ut alibi in corpore, ubi non peragitur specialis functio. Atque vasa in vesica non solum propriis suis tunicis fulciuntur, sed insuper tunicis vesicæ, quod non ita fit in vasis cruentis alicujus organi, ubi ex allato sanguine specialis est facienda secretio. De tali mictu cruento idem est sentiendum, quod observatur in hæmorrhoidalium fluxu, raro aliquid damni inferre, nisi nimis copiosa fiat aut diuturnior evacuatio: quamobrem non tam anxii esse debemus in curatione hujus, quam si fiat in calculosis a calculo rumpente vas, atque eandem quoque non sequitur curationem, sed talis interna est facienda, qualis instituitur in hæmorrhoidibus.

LIB. IV. APH. LXXIX.

189. **Q**uibus in urina arenosa subsident, illis vesica calculo laborat.

I.

Unde Arenulæ in urina?

IN multis hominibus præcipue scorbuticis, arthriticis & podagricis invenimus, si sæpius urinam reddant in eadem matula, quæ toties non repurgatur, illi matulæ circumquaque accrescere tandem crustam lapideam seu calculosam, uti tartarus lateribus dolii accrescit, in quo servatur vinum. Imo vidi homines, in quorum urina, modo per aliquot horas stagnabat, usque ad superficiem ejus, formabatur crusta calculosa ad latera uroscopii, quæ crusta vix abstergi potuit; quod etiam mulierculis notum est, qui-

quibus depurandi matulas officium est mandatum. Certo ergo & iterato experimento constat, urinam stagnantem ad latera vasis formare posse crustam calculosam. Sed quod magis est, observationes testantur, corpus durum immissum fuisse in vesicam urinariam, istud dum postea eximebatur, crusta calculosa erat obductum; quare etiam corpora quaecumque solida, si ab urina alluuntur, circumducuntur materia calculosa. Quamobrem generatio Calculi, arenularum vel sabuli facile & apposite comparari potest crystallisationi salium, quum sales libere fluctuantes in liquore stagnante, si modo nanciscantur corpus firmum, statim ad istud suas figunt crystallos: ita etiam frequentissime ad dentes copiosus lapis accrescit in multis hominibus, non quod ex dentibus excreseat Lithodontis, sed ad dentes colligatur, & non ita ad reliquas partes oris molliores. Non est igitur opus quærere tam anxie humorem glutinantem partes terrestres, dum ipsa urina sine addito illo glutine calculosum formet ad latera matulae. Si igitur parva crystallus lapidea vel ad latus vesicae vel renum pelvis concreverit, & statim inde depellatur, hoc concretum variis in locis natum, depulsum & collectum, arenularum vel sabuli formam exhibet. Quare in ceteroquin sanis hominibus arenularum & sabuli generatio potest fieri in urina.

II. Facile fieri posse in urina alicubi stagnante, vel fluente perpetuo supra aliquam partem, arenularum vel sabuli generationem, demonstravimus, quæ corpuscula concreta dein separata facile cum urina exeuntia in fundo uroscopii extubere possunt sabulum vel arenulas. Ne autem talia inventa illudant inspectorem, sedulo observandum est, num talia corpuscula statim appareant in emissâ adhuc calente urina, an vero dein in sola stagnante urina refrigerata inveniuntur; nam si statim non appareant arenosa vel sabulosa in calente urina, certum est signum, horum generationem non fuisse factam in corpore ægrotantis, sed nata fuisse crystallizando in uroscopio, in quo stagnavit urina: hæc crystallisatio quoniam magis minusve cohærentes potuit producere arenulas, incertum omnino est iudicium, quod
practici.

An arenosa
subsidentia
in urina no-
tent vesicæ
calculum.

practici petunt ex arenularum duritie, num in corpore vel extra istud arenulæ fuerint natæ. Recte propterea præcipit Auctor, Arenosa subsidere, nam si in matulis habetur concretio calculosi, illa arenosa magis adhærent lateribus vasis, quam quod subsideant. Hæc nunc arenosa subsidentia in calida urina denotant certissime formationem fuisse peractam, sed an fuerit facta in vesica vel renibus, incertum est. Hoc quidem verum est, evacuari non posse arenulas, nisi fuerint in vesica, sed propterea non est indicium, originem mali latitare in vesica urinaria: imo his temporibus ex lumborum conjunctis doloribus frequentior origo esset quærenda in renibus, quam vesica eorum, qui sabulosa vel arenosa cum urina reddunt. Quod autem illi, qui tandem in refrigerata urina multum sabuli habent, frequentissime etiam in morbos renum & vesicæ incidant, res est notissima. Quippe quoties his in partibus locus est muco non satis defensus, ad quem stagnans urina potest formare crystallos, urina ita prona ad calculi formationem, etiam in corpore calculum sæpe facit: adeo ut non requiratur, ut semper primordia calculi formentur in renibus, qui tandem magis incrustati majorem calculum in vesica urinaria formant: potest enim talis locus esse tam in vesica ipsa, quam in pelvi renum. Unde non consentirem Auctori statuenti, sabulum vel arenulas indicare vesicæ calculum, nisi intelligat, evacuationem sabuli fieri non posse, nisi calculus prius fuerit in vesica.

LIB. IV. APH. LXXX.

190. **S**I quis sanguinem mingat, & grumos, & stranguriam habeat, & dolor incidat ad imum ventrem, & perinæum, partes circa vesicam laborant.

I.

OMnes fere Commentatores auctoritatem secuti credunt, Hippocratem in hoc Aphorismo voluisse indicare ægrotationem vel laborem circa vesicam, non vero ipsam vesicam laborare: ego vero malo, hæc signa indicare, ipsam vesicam affectam esse, si cuncta hæc signa collecta inveniantur in eodem ægro, uti ex expositione sequenti constabit. Partes circa vesicam possunt esse in utroque sexu urethra & prostatae, perinæum in viris, quod vocatur in feminis distinctionis ergo interfemineum, intestinum rectum in utroque sexu, sed tamen magis in viris, in feminis autem uteri vagina, vel accipi potest etiam pinguedo copiosa circa has partes hærens. Ex affecto intestino recto, uti patet in Tenesmo & Dysenteria & in Hæmorrhoidibus, non raro generatur stranguria, dolor ad imum ventrem, & perinæum, quoniam in hoc loco etiam intestinum hæret, cujus affectione partibus adjacentibus præcipue in viris, per consensum dolor & stranguria inferuntur atque in feminis si vagina tentetur dolore, dictæ partes adjacentes consentire solent. Quare hæc signa seorsim ponderata incertum indicium præbent, num vesica, intestinum rectum, vel vaginæ pars præcipue affecta sit. Idem quoque sentiendum est de sanguinis mictu, qui non solum ex vesica, verum etiam ex læsis renibus oriri potest (*Aph.* 188). Sed quando illa duo genera signorum, unum quod indicat locum infernum esse læsum, alterum quod declarat organum urinæ esse affectum, concurrunt, tunc certum formatur

Partium
circa vesi-
cam labo-
rantium si-
gna.

514 MEDICINA HIPPOCRATICA *Aph.* 190.
matur indicium, vesicam esse affectam. Quippe ex nulla parte circa perinæum & hypogastrium affecta evacuari potest sanguis, nisi ex vesica læsa. Ille tunc sanguis, si statim ac effusus in vesica, reddatur per urethram, vel si sanguis non admodum sit concrescibilis, fluidus potest reddi, sed si majori potentia coagulandi sit præditus, vel aliquamdiu stagnavit in vesica, grumofus reddi potest. Inde talis homo sanguinem mingit & grumos, ut recte præcipit auctor noster.

LIB. IV. APH. LXXXI.

191. **S**I quis sanguinem & pus mingat, & squamas, & odor gravis sit, vesicæ exulcerationem significat.

I.

Vesicæ exulcerationis signa.

UNum phænomenon raro sufficere ad detegendum latentem causam, ex hoc etiam Aphorismo constat: vult enim per signa externa detegere Auctor vesicæ latentis exulcerationem, propterea tot congerit signa simul collecta, quæ omnia ex nulla alia causa oriuntur. Nam ex solo sanguinis mictu (*Aph.* 188) indicavit, venas renum esse ruptas. Ex sanguinis & puris mictu judicavit renum aut vesicæ exulcerationem (*Aph.* 185.) Ex furfuraceis in urina deduxit vesicæ scabiem (*Aph.* 187). Neque urinae foetor certum est signum vesicæ exulcerationis. Verum si cuncta hæc junguntur, ut quædam demonstrent ulceris præsentiam & reliqua significant, vesicam solam talia emittere posse, tunc certum erit, id ulcus occupare vesicam. Multa sunt signa, quæ ulceris præsentiam declarant in viis renum, uti evacuatio sanguinis & puris: nam si pus solum evacuetur, forsan talis fieret evacuatio per metastasin, sed tunc nunquam redditur sanguis & dein pus, vel hæc duo simul.

Verum

Verum squamulæ, quoniam solummodo in vesica formari possunt ex pure ibidem concrecente, harum evacuatio certum criterium præbet, puris generationem fieri in vesicæ ulcere.

L I B. IV. A P H. LXXXII.

192. **Q**uibuscumque in urethra tuberculum nascitur, his suppurato eo & perrupto, solutio fit.

I.

Propter nimiam brevitatem magna generatur in hoc Aphorismo obscuritas, nam non constat, quodnam genus tuberculi in urethra intelligitur, neque constat, quidnam solvitur eo Tuberculo perrupto: si enim quis in medicina practica non satis expertus talem legeret sententiam, judicaret, per solutionem intelligi debere finem morbi, quasi sufficeret ad curationem hujus Tuberculi, si modo perruptum esset, sed in praxi contrarium inveniret, nam si abscessus vel tuberculum sit ruptum, statim non est ille morbus sanatus. Propterea solutio respicere debet ad aliquid aliud, quod per Tuberculum generatur, & quod solvitur Tuberculo rupto. Recte monuit in hoc Aphorismo Mercurialis, propterea Hippocratem hunc Aphorismum adjecisse, ut demonstraret, omnem puris evacuationem cum urina non esse malam, neque semper pus evacuari ex vesica, verum etiam ex meatu urinario, ut ita sedulo inculcet, pus cum urina missum ex variis locis provenire posse.

II. Varia sunt genera Tuberculorum in nostro corpore, quæ exhibuimus in Chirurgia nostra repurgata, ex his sunt Tubercula inflammatoria, quæ tendunt in suppurationem, quare in hoc loco hujusmodi Tubercula sunt intelligenda, quoniam dicit Auctor, eo suppurato & perrupto, solutio fit, nam reliquæ species tuberculorum, quæ non perve-

Urethræ
Tubercu-
lum quid
faciat.

niunt ad suppurationem, in hoc loco intelligi non possunt. Tubercula autem inflammatoria & reliqua si nascuntur in meatu urinario, duo præcipue mala inferunt, Dolorem scilicet & Urinæ suppressionem. Quamdiu Tuberculum inflammatorium non abiit in suppurationem, neque minuitur Dolor, neque referatur urinæ suppressio, sed quando in suppurationem abiit, minuitur quidem Dolor, sed quoniam non est diminutus tumor, manet tamen urina suppressa: verum si maturum hoc Tuberculum rumpatur & ejus contentum pus evacuat, simul quoque minuitur Tuberculi moles, unde non amplius tam arcte obstipata est urethra a tumore Tuberculo quam antea, quando sæpe simul reddi potest urina per urethram nunc minus obstructam, præprimis si simul redditur pus, indicium præbens, urethram esse apertam.

*Solutio fit,
quid significet.*

III. Facile nunc erit solvere illum modum, quomodo Hippocrates dicere potuerit *solutio fit*, quod multis Commentatoribus magnam difficultatem præbuit. Solutio enim in hoc loco significat, instans periculum ex doloris vehementia & urinæ suppressione, averti, quoniam ex pure prodeunte constat, Tuberculum non amplius lævire, & urinæ viam esse apertam. Hanc esse veram Auctoris sententiam, colligere possumus ex aliis locis nostri Auctoris, uti in Coacis, ubi dicit, hujusmodi Tubercula inducere urinæ difficultatem & suppressionem; & in Aphorismis (*Sect. 7. Aph. 17.*) aperte dicit *Solvitur Dolor*.

LIB. IV. APH. LXXXIII.

193. **M**ictio noctu multa contingens, parvam dejectionem significat.

I.

Tria generalia invenimus in viventibus emunctoria, quibus eliminatur abundans, & id quod inutile est factum, nempe Alvum, Urinæ vias, & Cutim: reliquæ evacuationes humorum in corpore non fiunt in sanitate, ita invenitur vomitus, sputum, humoris effluxus ex ulceribus, hæmorrhagiæ, sed evacuationes hæc non sunt naturales in hominibus sanis. Hæc tria emunctoria evacuant quendam humorem aquosum generalem, & egerunt specialia sua, quæ per alia emunctoria eliminari non possunt. Ea enim, quæ in intestinis indigesta relinquuntur, omnia debent evacuari per alvum. Idem est quidam specialis humor in nobis, qui duntaxat per Renes separari potest, quum constanti observatione compërimur, neminem vivere posse, nisi interdum reddat urinam, quamvis aucta alvi evacuatione tanta quidem copia humidi evacuari potuisset, quæ defectum evacuationis urinæ suppleret. Hoc etiam verum est de Insensibili perspiratione, materia propria per hanc viam eliminanda non patitur per urinæ vias vel alvum omnino duci. Ob particularem hanc materiem cuicumque organo excretorio est, quod requirantur semper illa organa emunctoria aperta, quæ specialem humorem excrementitium segregant a communi sanguine transeunte per istud organum secretorium, eodem modo uti fit in secretionem humorum, ducitur enim per quævis organa secretoria generalis massa sanguinis, sed propter differentem structuram & motum istius organi a transfluente sanguine varius secernitur humor, qui nullibi in alio organo a communi massa segregari potuit.

potuit. Ita etiam constitutum est cum humoribus excrementitiis, ille specialis humor, qui verbi gratia exit per urinam, nullibi per aliquod organum a communi massa potuit separari: quare ab urinæ suppressione homo moritur, retenta urinæ materia, etiamsi alvus vel sudor majorem copiam humorum evacuat. Sed præter specialem illum humorem invenimus quoque alium, qui sine discrimine per tria illa naturalia emunctoria evacuari potest, ut si augeatur sudor vel perspiratio, minuitur urinæ quantitas & alvus redditur siccior. Illa materia seu humor communis videtur non multum distare ab aqua tanquam communi vehiculo, quoniam aquosa copiosius assumpta evacuari possunt per cutim & renes, minus vero per alvum, cujus hæc videtur ratio, quod intestina non sint organa emunctoria, quæ ex communi massa segregant humorem excrementitium, sed potius humorem secretorium, destinatum ad aliquam functionem peragendam in intestinorum cavitate.

Mictio noctu multa quid significet.

II. Si ergo quis noctu magnam copiam urinæ emittat, non quia præcedente die multum potavit, sed quum solitam potionis copiam assumpsit, talis copiosior evacuatio denotat, fere omnem humiditatem generalem hac via evacuari, vix quidquam de communi hoc liquore evacuari per duo reliqua emunctoria. Unde certo constat, non solum alvum fieri debere siccior, sed etiam in hoc homine parcior, esse insensibilem perspirationem. Non sine ratione adjecit *noctu*, ut indicaret istud tempus, in quo corpora quiescere & dormire solent, ut nempe illa aucta urinæ evacuatio non producat aliqua actione musculari vel animi pathemate, quibus interdum hæc vel illa excretio potest augeri vel minui, sed ut notaret tempus, in quo excretiones illæ absolvuntur sola actione vitali. Parva tunc regulariter debet fieri Alvi egestio, quia solummodo id, quod ex intestinis absorberi non potest, deponendum est. In morbis autem colliquativis interdum observatur mictio noctu multa cum alvo profusa, sed hæc duo juncta malum signum exhibent, quoniam nunquam observamus duas evacuationes copiosas, nisi humores per putredinem ita sint soluti,

soluti, ut per omnia emunctoria effluant: qualis status periculosissimus est. Qui ceteroquin sanus noctu multum mingit, conveniens est, ut huic alvus non solum sit siccior, sed & insensibilis perspiratio parcior; nam in tali mictu copiosiore, qui fit in corporis quiete, & non post potum copiosiore, denotat omnem materiem generalem evacuari per renes. Sed si tantum id speciale, quod per alvum & per cutim est educendum, evacuatur, alvus necessario debet esse siccior, & perspiratio parcior, quum id speciale parvam quantitatem exhibeat.

III. Qui ignorant, perspiratione maximam copiam humorum absumi, semper contenti sunt videre urinam copiosius evacuari, quum inde putant, corpus liberari ab inutili humore, atque extollunt quoque alvum liquidiorum. Verum si consideremus hominem ceteroquin sanum, salubrius censendum alvum modice siccam habere, & urinam parciorum. Nam invenimus, quod si vires valeant, naturam tunc illam massam liquidam communem pellere per insensibilem perspirationem. In corporibus autem debilioribus illa communis massa magis evacuatur per renes. Ergo in hoc casu urina parcior significat vires corporis valentes, & urina copiosior vires debiliores. In morbis autem hæc regula generalis non semper locum habet; quoniam in morbis, quorum materia solummodo per renes a communi massa sanguinis segregari potest, admodum conducit copiosiore reddere urinam. Si enim aliquis materiem purulentam habet in sanguine, frustra expectaret hujus evacuationem per sudorem: imo sudor copiosior in hujusmodi morbis damnatur, quum sit indicium colliquationis. Exemplum habemus in empyematicis & phthisicis, in quibus sudor copiosior semper habetur inter mala signa, sed urina copiosior cum laudabili sedimento non raro liberat ab Empyemate. Sed morbi inflammatorii antequam in purulentiam abierunt, soliti sunt solutam illam materiem per sudorem eliminare, sed minus per urinam. Status valetudinarius ut plurimum præbet urinam copiosiore noctu, quum vires vitæ debiliores in hujusmodi hominibus non valent satis largam face-

An Sanitati
conducatur
mictio noctu
multa.

re perspirationem insensibilem. Quare concludere possumus mictionem noctu multam, non ita indicare morbum, sed vires debiliores: unde melius est ad designandam vim vitæ validam, ut noctu mictio sit parcius.



M E D I C I N A H I P P O C R A T I C A ,

E X P O N E N S

A P H O R I S M O R U M

H I P P O C R A T I S

L I B R U M Q U I N T U M .

A P H . I .

194. **C**onvulsio ex Elleboro, lethale.

I.

Inchoat Auctor hunc librum a morbo, qui nomen habet ex phænomeno in motu animali, qui motus in sanis hominibus solummodo fit ad nutum voluntatis, sed qui nunc fit ex causa morbosa: quoniam in sequentibus aphorismis repetit hunc morbum, qui Græcis vocatur *σπασμὸς*, nullibi convenientior est locus ad exponendum huius morbi naturam, quam in hoc loco, quamobrem primo videbimus, quale sit istud phænomenon; dein quomodo ab Elleboro generari possit; & denique cur pronunciatur lethale, si ab Elleboro Convulsio generetur.

II. Musculi motus animalis seu voluntarii non moventur in perfecte sanis, nisi voluntate nostra (Conf. Aph. 51, iii.) eum motum fieri influxu spirituum per nervos, ex

Convulsio
quid sit.

X x x

phy-

physiologicis assumendum, quod nimis longum foret in hoc loco demonstrare. Ille fluxus spirituum per nervos in quiescentibus corporibus tantus non est, ut inde contrahatur musculus, sed si accedat voluntas mentis ducens majorem copiam spirituum, & majori impetu ad aliquos musculos, illi tunc contrahuntur, atque proportionate majore & minore potentia, ut est spirituum influxus. Quoniam videmus, tale quid fieri in sanis hominibus, non miramur videre, dum tamen mihi sit summum arcanum, mentem nostram posse concitare fluxum spirituum; miramur vero, partem aliquam convelli, quod intellectu est facilius, quoniam morbosa causa est materialis, quæ ad intellectum facilius concipitur, eam posse producere motum auctum spirituum per nervos. Si autem ex morbosa interna causa talis motus producat in musculo motus voluntarii, qualis in sanis fit per voluntatem nostram, idem ille motus vocatur Convulsio. Quare nullum aliud phænomenon in hoc morbo habemus, nisi talem motum, qualem observamus in sanis hominibus, qui ex voluntate movent musculum, quoniam causa interna morbosa nostris sensibus non est patens. Interdum vero ille motus est violentior, quam qui ex voluntate fit, in quo casu judicamus, illum tunc motum ex morbosa causa fieri. Motus voluntarius in sanis est vel alternus vel constans per aliquod tempus durans, talis quoque habetur motus morbosus, qui vocatur *σπασμὸς*. Si autem ex morbosa causa fiat, istum motum distinguunt in Spasmodum & Tetanum (*Aph.* 167. 1). Ergo phænomenon satis se manifestat, dum nempe sine vel contra voluntatem Musculi motus animalis vehementer trahuntur, istud phænomenon nomen morbi accipiens vocatur Spasmus & Latinis Convulsio.

Quomodo
Helleborus
generat
convulsio-
nem?

III. Hippocratem in hoc Aphorismo intelligere Helleborum album (*Aph.* 123, 1.) minime dubium est, quoniam veteribus erat in frequentissimo usu, non solum in morbis, sed etiam in sanis, si judicabant, ventriculum esse exonerandum: propterea multas adjecit cautelas: & quoniam vehemens istud Medicamentum sæpe multa damna intulit, de eo plu-
res

res cautelas adjecit, quam de quovis alio: denique Helleborus si absolute scribitur, veteres semper intellexerunt Helleborum seu Veratrum album; sed si voluerunt alterum Helleborum, qui purgat, intelligere, semper scripserunt Helleborum vel Veratrum nigrum. Hoc nunc Veratrum quali modo inducit Convulsionem, quia supra (Aph. 126., III.) exposuimus, non erit opus repetere.

IV. Ex iis, quæ hucusque & locis allegatis exposita sunt, facile colligitur, quare Convulsio ab Helleboro censeatur lethalis, id est admodum periculosa, ut non raro post convulsionem talem homo moriatur. Nam constat, motum animale non pati convulsionem, nisi ex magna causa, ut in pueris, quorum motus animalis multo facilius turbatur. Verum Helleborus ingestus, vel primo sua rosione & irritatione tantum perturbat ventriculi motum vermicularem, ut etiam totus motus animalis in consensum trahatur, quod nunquam fit nisi a magna causa: & quoniam omnia signa causæ magnæ sunt signa periculosissima, inde etiam Convulsio post Helleborum assumptum periculum portendit; præprimis quoniam vehemens ille motus non tollat irritantem causam, nam convulsio non ejicit ex ventriculo Elleborum. Vel virulentia Ellebori venis absorpta & delata ad nervos, tandem motus voluntarii Convulsionem inducit in mortem desinentem; nam id acre neque actione cerebri subigi potest neque inde pelli. Quamobrem recte observavit Hippocrates, Convulsiones ab hac causa lethales esse. Quod observatum hic fuit de Helleboro, id etiam applicari potest ad alia vomitoria vehementia & venena assumpta, ut inde fiat regula practica generalis.

Cur convulsio ex elleboro, lethale?

LIB. V. APH. II.

195. **V** *Ulneri convulsio superveniens, lethale.*

I.

Quemadmodum in præcedente aphorismo dixerat lethale, eodem modo hic intelligendum θανάσιμον, non quod semper inferat mortem, sed frequentissime, id est perniciosum, exitiosum est, & propterea monet, Convulsionem in vulneribus non esse flocci pendendam, sed ex superveniente Convulsione summum periculum præfagendum, & omnia statim pertentanda, quæ auxilium adferre possunt. Vulneris nomen hic late accipiendum, ut non solum indicet solutam unitatem in parte molli factam per instrumentum durum secans, verum etiam Contusionem validam & Puncturam, nam in omnibus his casibus Convulsio lethalis est. In præcedente Aphorismo notavi, Helleborum inducere Convulsionem per consensum vel delationem virulentiae ad nervos motus voluntarii, utrumque hoc in vulneribus admitti nequit, nam causa vulnerans vel pars læsa semper manet in eodem loco: ergo Convulsio talis semper generatur per consensum. Quomodo autem vulnera Convulsionem inferant, non omnes idem sentiunt. Constat observatione Chirurgica, statim ab inflicto vulnere vel punctura in membris exterioribus non produci Convulsiones, sed post aliquod tempus, aut si acre fuerit vulnere applicatum, quemadmodum observavi in punctura tendinis in genu sub patella, ab indita turunda dura unguento basilico obducta hominem fuisse convulsam & periisse, sed in vulneribus vel contusionibus cranii cum meningum læsione ut plurimum statim totus homo convellitur. Maxima pars medicorum in ea est sententia, quod quædam fibræ nervosæ fa-

faciant, ut reliquæ fibræ nervosæ ejusdem nervi integræ manentes, nimis tensæ, primo dolorem dein Convulsionem inferant. Sed quoniam vulnus latius plures fibras abscindit & pauciores relinquit integras, quæ propterea magis tenderentur, vulnus tale majorem dolorem & vehementiorem convulsionem ex ratione inferre deberet, quam levis nervi punctura. Sed si consulimus experientiam, contrarium inveniemus semper, nam vulnera lata raro convulsiones inferunt, puncturæ autem sæpius. Quare convulsione causa non facile deduci potest ab inæquali tractione fibrarum, quæ relinquuntur integræ, sed a simili causa, quæ valet irritando meninges prompte convulsionem inducere: & quoniam capsulæ nervorum Meningibus similes sunt & forsitan eadem, inde ab irritamento capsularum, quibus motis contenti canaliculi nervosi valide agitantur, videtur generari Convulsio, qualis irritatio frequentior est in punctura, quam vulnere. Quod autem irritatio meningum prompte inducat Convulsionem, & irritatio capsulæ nervorum post aliquod tempus, inde oriri videtur, quod si meninges agitantur, statim propelluntur spiritus ex encephalo ad omnes musculos motus voluntarii, sed si capsula nervi irritatur, prius consentire debent meninges, antequam universalis Convulsio generari potest, qualis propagatio non ita statim fit post factam puncturam. Si autem illa punctura universalem Convulsionem fecit, signum est, causam esse magnam, quæ potuit totum stamen nervosum in consensum trahere, & quia Convulsio non tollit causam irritantem, inde recte pronuntiatur, lethale esse signum. Quod diximus de nervis, id etiam verum est de tendine vel membrana, vel alia parte nervosa sauciata.

LIB. V. APH. III.

196. **S**anguine multo effuso, convulsio, aut singultus superveniens, malum.

I.

Quoniam in superiore egerat Auctor de Convulsione ex Vulnere, ne aliquis judicaret, omnem Convulsionem generari ex Vulnere, quæ post vulnus oritur, hunc Aphorismum subnectere voluit, ut constaret, Hæmorrhagiam a vulnere natam sæpe causam esse Convulsionis: quare post vulnus si oriatur Convulsio, perpendendum est, num ea nascatur ex Vulnere, an vero ex hæmorrhagia copiosiore, quoniam præservatoria curatio & ipsa prognosis differunt. Nam si ex vulnere inducatur Convulsio, ad nervum vel tendinem fauciatum applicanda erant balsamica, & resinosa, & in graviore malo urendus vel abscindendus esset nervus: verum si hæmorrhagia inducat Convulsionem, ea est compescenda, & incassum esset priori modo moliri curationem Convulsionis, atque ipsa prognosis differt, quæ enim Convulsio fit ex Vulnere, dicitur Lethalis, sed ex sanguine multo effuso tantum habetur mala, id est minus periculosa, quoniam non tam sæpe ex sanguine multo effuso moriuntur homines Convulsi, quam vulnerati & Convulsi. Quamvis hanc dicendi occasionem arripuit, non tamen hæc observatio ita est specialis, ut solummodo complectatur sanguinis fluxum per vulnus inductum, quoniam hæc observatio est generalis de omni sanguinis evacuatione copiosiore per quamcumque causam nata. Antequam dici potest, Convulsionem post largiorem sanguinis fluxum malam esse, videndum est, quali modo talis hæmorrhagia Convulsionem inducat. Hac de re multæ & variæ proferruntur sententiæ, nemo vero negat, Convulsionem fieri posse

posse post profusionem sanguinis, sed de modo, quo generatur, disceptant. Ne autem hæreamus in aliorum sententiis refutandis, nostram duntaxat proferemus. Ut motus vitalis Cordis & Arteriarum peragatur, non solum requiritur actio contrahens alterne, verum etiam alia dilatans, nempe liquor seu sanguis in cavis cordis & arteriarum, qui vasa implet & distendit, ut iterum contrahi possint. Major autem moles humorum movendorum, & eorum defectus ergo destruit æquilibrium, quod constitutum est inter causam moventem & quantitatem liquoris. Ex hoc destructo æquilibrio turbatur motus ille circulatorius, qui perturbatus quandoque motum animale in consensum trahit & turbat, seu generat Syncopen vel Convulsionem, qui Morbi fiunt ex extincto motu animali vel nimis agente. Ita ex solo defectu & non semper ex mutata qualitate humorum, in qua fere omnes auctores quærunt Convulsionis causas, generatur Convulsio & Singultus. Quippe Singultus etiam est species Convulsionis, quæ præcipue aggreditur Diaphragma, & inde per eandem causam generari potest singultus, qua producitur Convulsio generalis. Cur autem de hac Convulsione tantum dicatur *malum*, dum tamen in prioribus dictum fuerit Lethalis, meretur attentionem. Si vero rimamur rationes datas, facile liquebit hæc differentia. In præcedentibus diximus, lethale esse, quoniam Convulsio non potuerit tollere irritamentum seu causam, vel eam expellere: verum Convulsionis ex destructo æquilibrio in actionem vitalem & quantitatem humorum, per sanguinem profusum, tollitur causa, nam si vasa circulatoria fuere inanita sanguinis profusione, eadem vasa iterum implentur ex cellulis, vasisque lymphaticis, & ita sensim cessat causa Convulsionem inducens: hinc solummodo dicitur malum, nam si tantum suppeditari nequit, quod tamen raro fit, moritur homo; unde quoque non possumus dicere, eam Convulsionem carere omni periculo.

LIB. V. APH. IV.

197. **P**urgationi immodicæ convulsio, aut singultus superveniens, malum.

I.

Multi Commentatores in ea sunt sententia, hunc Aphorismum intelligi posse ex iis, quæ dicta sunt de Helleboro. Ego vero puto, Hippocratem magis in hoc loco respexisse ad alvi evacuationem, quam ad specificam qualitatem medicamenti; quum in superioribus latis egerat de Convulsione ex Elleboro (*Aph.* 194,) non erat opus statim illam rem repetere, & si idem sentiret in his duobus locis, non dixisset in priori *Lethale*, & in hoc *Aph.* *Malum*. Videtur in his duobus aphorismis simili modo agere, uti egit in Convulsione ex vulnere (*Aph.* 195.) & ex multo sanguine effuso (*Aph.* 196.) Alia enim erat ratio in Convulsione ex vulnere, alia vero ex sanguinis profusione per vulnus. Idem etiam sentiendum de Purgantis acrimonia inducente Convulsionem, aliud iterum per evacuationem purgante inductam si generetur Convulsio. Quare hoc loco videndum, quomodo Convulsio generetur ex Hypercatharsi, nullo habito respectu virulentiae purgantis. Quædam videtur differentia in alvi & sanguinis evacuatione, hæc enim evacuat bonum humorem, illa vero excrementa, ut putant: sed si rem penitus perpendamus, non tam magna erit differentia: quoniam in utrisque magna demitur quantitas, & ita defectu humorum si destruitur æquilibrium, convulsio generari potest. Qui vero putant, in copiosiore alvi egestionem evacuari sola excrementa, a veritate longe absunt, quoniam in tali evacuatione simul deponuntur illi boni humores, qui naturaliter in intestinorum cavitatem confluunt ad alimentorum ingestorum

rum præparationem. Quare concludere possumus, ex alvi egestionem tam per evacuationem generalem, quam boni humoris, generari posse Convulsionem. Talis autem evacuatio faciens Convulsionem, dicitur *mala* & non lethalis ex eadem ratione, quam dedimus de sanguine multo effuso. Nam virulentia purgantis inferens Convulsionem, dicitur lethale, sed per evacuationem copiosam nata Convulsio dicitur mala, quoniam ille defectus sæpe suppletur.

LIB. V. APH. V.

198. **S**I quis ebrius ex improvise mutus fiat, convulsus moritur, nisi febris corripuerit, aut ubi ad horam, qua crapulae solvuntur, pervenit, locutus fuerit.

I.

CAusæ & signa Ebrietatis etiamsi cuivis notissima sint, nonnulli tamen existimarunt, eam corporis & animæ mutationem soli vino esse adscribendam: sed si consulimus experientiam, omnia principia in vino non habent inebriandi potentiam, sed solum spirituosum inflammabile hanc virtutem possidet: vinum enim destillando privatum spiritu non inebriat, sed Spiritus ita separatus ingestus ebrietatem inducit. Si examinemus chemice vini generationem, quod nimis longum foret in hoc loco experimentis adstruere, comperimur, oleum vegetabile attenuatum fermentatione, ut inde fiat liquor totus volatilis & flammam alens, hunc esse spiritum inebriantem, qui aliis vini adhuc principiis mistus, per novam fermentationem in acetum conversus, priorem omnem naturam exuit, & non amplius inebriat, neque flammam alit, neque tunc destillando a ceteris principiis vini separari potest ut prius. Hoc oleum vegetabile fermentatione solutum, mutatum & volatile factum, majore copia ingestum perturbat hominis motum anima-

Ex qua causa ebrius de repente mutus fiat.

nimalem, sensum internum & externum, quæ mutatio si modum excedat, vocatur Ebrietas. Omnis ergo spiritus fermentatus majore copia ingestus est ebrietatis causa. Quoniam succus uvarum frequentissime fermentando convertitur in vinum, multi putarunt, inebriandi virtutem in solo vino latitare: verum uti uvarum succus, ita etiam reliquorum fructuum succulentorum succi fermentati præbent similem spiritum. Et quod multi magis mirantur, saccharum & mel aqua dilutum & dein fermentatum tale vinum quoque præbet: ut & decocta ex frumentaceis seminibus, atque farinæ dilutæ aqua fermentando in fere similem speciem vini convertuntur, quod hodie vocatur Cerevisia, nam ex his omnibus destillando comparatur spiritus ardens. Quare multi decepti, nescientes, cuncta hæc fermentando præbere spiritum inebriantem, mirantur inebriari posse sine vini potu. Sed in his omnibus oleum vegetabile fermentatione mutatum in spiritum inflammabilem, si assumitur, producit ebrietatem. Parva autem hujus vini vel spiritus quantitas non infert Ebrietatem, sed corporis incalescentiam, sed si major ejus ingeritur copia. Nisi constanti observatione compertum esset, nimio usu hujus spirituosi vacillare motum animale, sensum & ratiocinium perturbari, nemo ex cognita natura spiritus fermentati valeret talem effectum præfagire. Hinc post inventionem hanc multi rimati sunt modum, quo spiritus fermentati inferant ebrietatem; quidam hoc deducunt ex levitate, qua caput petunt; alii ex contractione fibrillarum nervosarum; alii iterum ex coagulatione spirituum. Sed sive hoc sive illo modo operentur, effectus tamen est certus, & paucissimi sunt, qui multitudine spiritus fermentati tandem non obruuntur. Plus facit ad cognitionem medicam observare, hunc spiritum in excrementis hominum non inveniri, qui satis copiose bibunt: quare constat, hoc spirituosum subigi actione vitæ, & ita extinguui, ut ne vestigium sui relinquat; quod etiam compe-
rimur, si convertatur vinum in acetum, nam spirituosum non exhalat, sed commutatur. Hæc observatio docet, hominem vino obrutum tunc liberari ab ebrietate, si a-
ctione

ctione vitæ extinctum fuerit spirituosum; sed si spirituosorum copia est tanta, ut obruat actiones vitæ, perit homo plerumque apoplecticus. Quum vero actiones vitæ vocem formantes opprimuntur, ut ebrius reddatur ex improvise Mutus, talis status non multum distat ab apoplexia: nam spiritus ardens exstinguens fluxum spirituum animalium per nervos in musculos laryngis & linguæ, aphoniam facit; sed eadem causa major inducit apoplexiam.

II. Si ratiocinando præfagirem mortem ex Aphonia in ebrio, nunquam judicarem, talem ægrum dein Convulsione periturum, quoniam aphonia magis convenit apoplexiæ, quam convulsioni: sed quoniam in Græcia admodum valuit bibendi consuetudo, noster Auctor hanc sententiam non posuit sine multiplici experientia. Quia vero Aphonia æque generari potest a convulsis musculis laryngis, quam ab eorum paralyti, verisimile mihi videtur, derepente natam aphoniam provenisse ex convulsione horum musculorum, cujus causa si augetur, generatur perfecta Convulsio. Quæ persistens, simul impedit motum circulatorium atque ita interficit. Non est opus, ut statim subsequatur post aphoniam in ebrio Convulsio, nam in fine hujus habetur etiam, quod Convulsio non sit expectanda, eo tempore, quo solet solvi Crapula, ergo si quis post tam longum tempus non loquatur, tunc tandem convulsus moritur.

Quando
talis con-
vulsus mo-
ritur.

III. Monuimus, actione vitæ tandem exstingui & discuti spiritum fermentatum, si ergo vis vitæ langueat, diu durare debet, antequam ille spiritus sit subactus: sed vires vitæ infligatæ multo citius exstinguunt fermentatos spiritus: ex hac ratione observatur, quod qui refrigerantur ex vini potu, multo magis periclitantur, quam quorum corpora incalescunt, quoniam frigus indicat, vires vitæ succumbere, sed calor notat infligatas esse vires, quare in his multo major est spes subigi posse spirituosum. Febris in hoc loco indicat calorem majorem cum pulsu aucto, & sudore rorido in corpore, est ergo indicium spirituosum fermentatum in corpore magis subigi, quam si corpus maneret frigidum & tepidum. In tali autem corpore ebrio, quod ex improvise

Febris sol-
vit aphoni-
am ex e-
brietate na-
tam.

corripiebatur aphonia, tanta erat spirituum inebriantium abundantia, ut superaretur actio musculorum voci famulantium: nisi ergo accedens motus vitalis reddatur major hunc spiritum subigens & depellens, non caret illa oppressio periculo, nam si paulo magis augetur causa opprimens, æger convulsus morietur. Hæc observatio actionis naturæ egregiam regulam curationis suggerit: monemur enim in hoc casu, nos debere calefacere istud corpus per actu calida & aromatica calefacientia, minime spirituo-
sa, vel vinosa, sed quæ calefaciunt sine inebriandi vir-
tute.

Loquela
tempore
crapulæ sol-
vit aphoni-
am ex ebri-
etate.

IV. Quamdiu igitur durat aphonia sine febre in ebrio, versamur in ancipiti, num manebit talis homo superstes, num vero exstinguetur superveniente convulsione: scimus enim in tali corpore adesse spirituosum calefaciens in magna copia, quod sua virtute, modo valeant vires vitæ, faciet stimulando majorem calorem seu febrem, verum eam febrem non invenio, ergo mihi indicium est, vires vitæ obrutas esse multitudine vini. Si ergo exspectamus per duodecim horas vel viginti quatuor, quo tempore crapula solvi solet, & tamen vires vitæ non facere majorem motum, & permanere aphoniam, periculum est, ne ex tam diu persistente causa tandem obruatur ebrius: sed si tunc demum ebrius loqui incipiat, ipsa loquela etiamsi nihil faciat ad subigendum vinosum, periculum detrahet, non ut causa, sed ut signum; quoniam loquela redeuns notat, opprimentem causam esse minutam, & inde valentibus sensim magis corporis viribus totum vinosum subigetur. Etiamsi talis homo maneat superstes, non semper redibit ad perfectam sanitatem, non raro invenimus ex tali vesana & abominabili potatione relinqui alicujus partis paralyfin vel delirium diu durans, ita enim cerebrum spiritu fermentato obrutum, mutatur sæpe in sua functione, ut ablato vel subactō spiri-
tuofo ad officium suum redire nequeat. Hoc si quis perpendeat, is nunquam Bacchum delirantem & furentem tot
laudibus celebraret.

LIB. V. APH. VI.

199. **Q**ui a tetano corripuntur, in quatuor diebus pereunt. Si vero hos effugerint, sani sunt.

I.

SI omnibus medicis constaret, quænam phænomena conjuncta facerent Tetanum, non esset opus hunc morbum circumscribere: sed multi Tetanum faciunt Convulsionis speciem, & inde generari potuisset confusio in morbi cognitione. Noster Auctor in Libro de Internis Affectionibus H. b. 266. tres species Tetani proponit, primam speciem ita graphice depingit. *Maxillæ conglutinantur, & rigent, & os aperire non potest: & oculi lachrymantur, & contrahuntur, & dorsum conglutinatum riget, & crura flectere nequit, neque manus, neque spinam. Quum autem lethalis fuerit, potum & cibos, quos prius accepit, aliquando per nares reddit.* Ex quibus apparitionibus concludendum est, omnes musculos motus voluntarii valide contractos esse & in tali contractione diu persistere, & inde a reliquis convulsionibus (*Aph. 167, 1*) facile distinguitur hic morbus, qui a Celso vocatur Rigor, quoniam totum corpus riget, ita ut neque ab ægro neque ab alio facile flecti possit.

Tetanus
qualis mor-
bus.

II. Omnes muscoli motus voluntarii si laxi sunt vel alterne moventur, permittunt sanguinis fluxum ex arteriis istis in venas, quæ per istum musculum decurrunt: sed si validissime contractus est musculus, minus libere continuari potest illa circulatio: atque in validissime contracto musculo omnino sistitur, quoniam arteriæ & venæ in ventre musculi decurrentes tam valide comprimuntur a contracto & indurato musculo, ut dilatari non possint per implentem causam. Quo igitur validius est contractus musculus, eo magis sistitur sanguinis transfluxus. Si ergo in Tetano omnes muscoli motus voluntarii valide & constanter ma-

An Tetano
corrupti in
quatuor die-
bus pere-
unt?

ment constricti, magna pars circulationis est intercepta, & solummodo peragi potest per vasa, quæ non decurrunt per corpora musculorum. Atque ut maneat illa perpetua constrictio, ex causa morbosa perpetuo ducendi sunt spiritus motus animalis ad istos omnes motus voluntarii musculos; unde magna generatur spirituum consumptio, ut patet in iis, qui ex voluntate aliquem muscolum diu retinent constrictum, sentiunt enim muscolum illum maxime esse fatigatum & debilitatum. Hi bini effectus diu persistere nequeunt, ut permaneat illa impedita per omnes partes circulatio, atque magna consumptio spirituum, quin extinguatur vita. Quare pronunciare possumus Tetanum validum brevi tempore mortem inferre. Si autem minus valide constricti sint muscoli, non omnino sistitur circulatio sanguinis per musculos istos, & non fit tanta spirituum consumptio, quare idem morbus sed specie levior, ad plures dies continuari potest, ut a nobis & aliis practicis observatum fuit, hominem ultra quatuor dies laborantem Tetano tamen fuisse servatum. Verisimile ergo mihi videtur, Hippocratem observasse hos homines plerumque ante quartum diem periisse & inde hanc observationem nimis generalem nobis reliquisse.

An Tetanici
quantum
diem effu-
gientes ser-
vantur?

III. Ex iis, quæ supra disputavimus, colligi potest, quod Tetanus ultra quatuor dies persistens non sit gravissima species: sed an propterea æger post quartum diem sit incolumis, valde dubito, nam omnis causa Tetanum inducens quarto die non finitur, & experientia etiam constat, homines tales etiam post septimum diem periisse, quod si Tetanus esset morbus semper ex eadem causa dependens, terminus temporis facilius potuisset limitari, sed quoniam est morbus ex varia causa natus, aliquid certi de tempore limitari nequit.

LIB. V. APH. VII.

200. **Q**uibus Epilepsiæ ante pubertatem contingunt, mutationem habent. Quibus vero accidunt viginti quinque annos natis, his plerumque commoriuntur.

I.

Totus hic Aphorismus ex superiore explicatione (Aph. 70) intelligi potest, quare non opus est eandem rem repetere.

LIB. V. APH. VIII.

201. **Q**ui pleuritici facti, non repurgantur superne in quatuordecim diebus, his in empyema convertitur.

I.

Hoc in loco intelligi Pleuritidem veram superius a nobis descriptam (Aph. 109, IV) non est opus probare, nam si sine discrimine omnis species Pleuritidis intelligeretur, certus temporis terminus non posset defini: neque omnes species etiamsi diutius quam quatuordecim dies durarent, non producerent Empyema, ut sæpe observavimus in pleuritide ex materia tenui acri catarrhosa: quare in hoc loco intelligenda est vera Inflammatoria Pleuritis. Hæc Pleuritis varios habet exitus, quoniam sequitur naturalem generalis Inflammationis mutationem (1) In resolutionem. (2) Evacuationem criticam per sputum vel urinam. (3) Mutationem in purulentiam, quod pus confectum vel colligitur in sacco formato in pleura, vel funditur.

Pleuritis
mutatio.

funditur in pectoris cavum, vel traditur sanguini circulanti, aut id demum deponitur ad partem aliquam, ut fiat metastasis. (4) Abit in putrilaginem vel tenacem vel tenuem ichorosam. (5) Denique transit in sphacelum. (6) Auctores addunt commutationem in scirrhum vel cancerum, quam fateor mutationem non licuit mihi videre in tota praxi, an alii viderint, vehementer dubito.

Empyema
quid significet?

II. His temporibus per Empyema semper intelligitur puris collectio in cavo pectoris, sed apud Hippocratem passim indicat suppurationem, seu puris generationem in quocunque loco vel viscere: hoc autem in loco mallem frequentissimam significationem admittere, nempe puris collectionem in cavo pectoris; vel in sinu facto a membrana pleura aliquomodo recedente a costis; seu in parte cellulosa pleuræ.

Quæ pleuritides & quando convertuntur in Empyema?

III. Ut Pleuritis transeat in Empyema seu purulentiam, necesse est, ut Lateris dolor, unde derivatur nomen, proveniat a morbo tali, qui in purulentiam commutari potest: inter causas dolorem pectoris inferentes Inflammatio est, quæ commutatur in suppurationem. Hæc autem Inflammatio non semper convertitur in purulentiam, ut supra indicavimus: ergo adesse debent signa suppurationem indicantia. Sufficiens signum est, si inflammatio duravit per quatuordecim dies, nam non novimus, inflammationem diutius perstitisse sine conversione in purulentiam, & plerumque quarto vel septimo die incipit formare pus. Si ergo Pleuritidis inflammatoriæ signa permaneant ad quatuordecim dies, certi sumus, pus esse confectum. Si vero interea temporis commutata materia inflammatoria in materiem purulentam conversa non repurgatur, necesse est, ut maneat in corpore, quoniam materia purulenta nunquam invisibiliter exit. An vero in hoc loco sola repurgatio superne, id est per sputum, intelligatur, ut multi contendunt, non ita plane constat, quoniam pleuritici non raro liberantur per urinam sedimentosam. Neque Hippocratis sententia probari potest, hic intelligi purgationem per sputum, quoniam *ἀνακαταίρει* generaliter notat expurgo, & perpurgo, sed

sed interdum sumitur pro purgo sursum. Sed quando ex constantia inflammationis apparet, Inflammationis mutationem fuisse factam in purulentiam, & non deteximus intra quatuordecim dies, vel in urina vel sputo, materiem purulentam fuisse evacuata, certi esse possumus, hoc in corpore collectum esse pus, seu empyema. Et quoniam post inflammationem pleuræ pus istud confectum frequentissime deponitur in cavum pectoris, non erit sine ratione ex tali perdurante pleuritide præfagire Empyema pectoris, quamvis quoque alia inde potuisset fieri suppuratio, ut in sequentibus locis data occasione sumus demonstraturi.

LIB. V. AP H. IX.

202. **T** Abes maxime fit ætatibus ab anno octavo decimo usque ad quintum trigesimum.

I.

Post prædictionem Empyematis statim subjungit prædictionem Phthisis, quasi innuere vellet, si quis laboravit pleuritide & non expurgatur intra quatuordecim dies, is sæpe incidet in Phthisin; & ita intelligit Phthisin purulentam (Aph. 89, III). Sed ut sententiam magis universalem faciat, phthisin ponit absolutam purulentam, sive fiat ex pleuritide, peripneumonia vel sanguinis sputo natam, atque observavit, eam phthisis speciem accidere frequentius intra XVIII & XXXV Ætatis annum. Hoc tempus subdividitur in tempus Adolescentiæ (Aph. 106, I), quod hic limitari potest intra XVIII & XXV. Tempus autem ætatis intra XXV & XXXVIII, tempus Juventutis (Aph. 64, I & Aph. 108, I) appellari potest. Hoc nunc tempore ætatis nempe Adolescentiæ & Juventutis observavit frequentius fieri Phthisim, quam in ætatibus reliquis, quod etiam his temporibus constante observatione practica

Quanam
ætate fit
phthisis?

confirmatur. Qualisnam vera sit constitutio in hac ætate, quæ disponit ad phthisim producendam, non consentiunt Auctores, magna pars derivat hunc morbum ex intemperantia, quæ in hac ætate præprimis viget; sed etiam in temperate viventibus juvenibus non raro oritur Phthisis frequentior quam in quavis alia ætate; unde in juvenili corpore quædam naturalis esse debeat causa corpus disponens ad suscipiendam phthisin. Eam dispositionem cuique satis patere potest, si modo rimatur naturalem mutationem incrementi corporis, & augmentum virium. Quamdiu enim increscunt corpora mole, ejus quoque increscunt virtutes agentes & magis, quam increscit moles; nam vires juvenum habito respectu corporis sunt majores quam in pueris: ut si juvenis non acquirat molem corporis majorem quam alter puer, corporis tamen vires præcellent. Si ergo corpus nostrum ita tam in mole quam in viribus increvit, circa xviii ætatis annum non amplius multum increscit corporis moles, sed tamen ulterius augentur vires. Inde ita augentur corporis vires, ut potentia cohærendi in partibus mollioribus vix sufficiat hanc sustentare actionem: in puellis tunc sanguine menstruo effuso, hæ vires refrenantur; sed in juvenibus increscientes a levissima causa incidunt in inflammationes, febres ardentes, hæmorrhagias varias, atque sanguinis sputum. Hi morbi in juvenibus nati non raro terminantur in purulentiam, quæ sæpe afficit pulmones, quoniam pulmo etiamsi non fuerit affectus, a pure tamen transmissio facile ulcus contrahere potest, quod phthisin inducit, & quoniam hæmoptysis juvenibus est morbus frequentissimus, quæ plerumque terminatur in pulmonis ulcus, non est mirum, quod hac in ætate frequentior quam in quavis alia producat phthisis. Si nunc his causis naturalibus accedat intemperantia, spirituosorum abusus, in quo juvenes magnam sibi quærunt gloriam, se plus quam adultos bibere posse & pergræcari, eo frequentior fit in hujusmodi juvenibus Phthisis. Etiamsi quotidiana exempla sint obvia, vix tamen Adolescentes & Juvenes persuaderi possunt, ut temperate vivant, sed moniti non raro

raro avidissime hunc morbum sibi accersunt. Ex hac observatione etiam intelligitur, quamobrem Phthisin in ea ætate multo periculosiorem pronunciant, cum natura prona ad morbum producendum semper curatu difficiliorem morbum producat. Observavi etiam in praxi, adultiores phthisi pulmonali purulento laborantes me facilius curare posse, sed in juvenibus raro curationem obtinere potui.

LIB. V. APH. X.

203. **Q**ui anginam effugiunt, iis in pulmonem vertitur, & intra dies septem intereunt, quos si evaserint, suppurati fiunt.

I.

Statuit in hoc Aph. Auctor, fieri posse translationem materiæ morbi ex faucibus ad pulmones, quæ translatio si fiat, observavit, tales ægros ut plurimum periisse intra septem dies; quod si vero intra istud tempus non perierunt, incidebant deinceps in Empyema. Sensus.

II. Duæ sunt species anginæ faucibus infestæ, una quæ præcipue corripit Laryngem, quam vocant Cynanchen, altera quæ afficit Pharyngem, hanc vocant Synanchen: sed si etiam signa inflammationis appareant externe in collo, vocatur vel Paracynanche vel Parasynanche, prout simul Larynx, vel Pharynx sit affecta, seu prout Respiratio vel Deglutitio magis sit impedita. In textu est κυνάγχη, ergo intelligit Auctor eam anginæ speciem, quæ Laryngi est infesta & suffocatam respirationem inducit, & quoniam illa species non præbet signa externa, scimus internam Laryngis membranam affectam esse. Illa membrana jam inflammatione tumens raro ad septimum diem extenditur, quin ita faciat angustum transitum, ut æger suffocatus pereat, Ex angina peripneumonia quomodo?

vidi, hujusmodi homines periisse intra duos tresve dies. Quia vero inflammatio ad septimum usque diem incrementum accipere solet & dein commutari in suppurationem, inde plerumque inflammatio internæ membranæ Laryngis suffocationem induxit, antequam ad suppurationem deducta sit. Si autem levior fuit inflammatio & minor tumor, quam qui potuit inducere suffocationem, illa post istud tempus formabit pus, quod sua gravitate deorsum descendens implet Tracheam arteriam & Bronchia, ubi stagnando collectum generat pulmonis suppurationem. Sed si inchoata angina talis sensim etiam pergit continuatam membranam Trachæ & Bronchiorum inflammare, inducit peripneumoniam, quæ interimit.

Quinam ex
Angina post
septimum
diem fiunt
suppurati?

III. Suppurati ἐμπνοὶ sunt homines, qui vel in pulmonibus vel in cavo pectoris colligunt pus: tales suppurationes præfagiuntur ex Angina prægressa, quæ abiit sine ratione, id est sine critica evacuatione; nam quæ angina emittit sputa copiosa cocta, non transfertur in peripneumoniam, sed quæ evanescit sine evacuatione hac, & tamen ægri manserunt ultra septem dies superstites cum signis, materiem translata esse ad pulmones. Hoc tam evidens est in praxi, quam quidquid certissimum: constitit enim, in Larynge adfuisse Inflammationem, eam suam materiem purulentam confectam non evacuasse, accesserunt signa, hanc materiem fuisse depositam per tracheam in pulmones, nam successit peripneumonia hoc declarans; nunc est præterlapsum tempus inflammationis post septimum diem, ergo facile conjici potest, eam materiem jam esse collectam in bronchiis, vesiculis pulmonalibus, vel in cavo pectoris. Ita habemus egregiam prognosin instantis suppurationis seu Empyematis, ne decipiamur judicantes, ægrum esse sanatum, quia effugiit anginam. Præstantius autem foret hoc instans malum evitare per optimam medendi methodum. Si vocamur in tali periculosa angina, omni ope tentanda est Inflammationis resolutio per repetitam venæ sectionem, si unicæ non auscultat, alvus ducenda antiphlogisticis, collum fovendum cataplasmate, fauces colluendæ diluentibus cum adjecto

adjecto nitro; & vapores aquosi sæpe hauriendi, qui usque in pulmones penetrant. Sed si his omnibus ante septimum diem non auscultat malum, reliquum tempus morbi ut peripneumonia suppuratoria vel Empyema pertractandum, ut pus confectum per expectorationem ejiciatur.

LIB. V. A P H. xi.

204. **I**N tabe vexatis, si sputum, quod tussi rejiciunt, carbonibus infusum gravem odorem emittat, & capilli e capite defluant, lethale est.

I.

Postquam ex angina erat natum Empyema, pus in pulmone collectum sæpe contrahit pulmonis ulcus, ex quo tandem formatur Tabes: voluit nunc Auctor duo recitare signa in tali Tabe, quæ periculosissimum statum declarant, nempe profert sputum carbonibus injectum olens, & capillorum defluvium. Sed ne aliquis judicaret, hæc signa duntaxat præfigire malum in tabe post recensitam anginam nata, omisit textum priorem & ita nobis reliquit generalem prognosin in omni vera tabe purulenta ex ulcere pulmonis.

Nexus.

II. Sputa duobus præprimis ex locis proveniunt. Primo ex tota membrana pituitaria & faucibus, hæc exscreatu solent reddi, tali enim actione sputum seu mucus tenax adhærens his partibus avellitur & ita rejicitur. Vel veniunt sputa ex Larynge, trachea arteria & pulmonibus, hæc ejiciuntur iterata tussi, qua hæ partes agitantur & aër cum impetu emittitur, qui simul educit sputum lateribus harum partium adhærens. Quoniam Auctor addit *quod tussi rejiciunt*, hoc in loco intelligi debet Sputum, quod ex pulmonibus venit. De hoc Sputo dicit, si gravem odorem emittat carbonibus infusum. Ergo non est opus, ut sputa sint fæ-

Quid notat
sputum car-
bonibus in-
fusum, o-
lens?

tentia, nisi injecta carbonibus seu prunis candentibus, ut multi existimarunt, qui ad hæc verba exponunt sputa foetentia. Verum nostri Auctoris sententia est, elicere indicia ex sputo non foetente, quod prunis injectum foetorem spirat. Multa commentati sunt de hoc signo, quæ non merentur recenferi. Simplex hoc experimentum magni est usus, si modo sciamus, quinam humores nostri inodores prunis injecti foetorem spirant, & qui inodores manent. Invenimus humores ex pituitaria membrana & trachea secretos in ignem projectos nullum spirare foetorem, sed si sanguis, humor nutritivus & pus infunditur prunis, tunc semper exhalat foetor, etiamsi aliter sint humores inodores. Ergo ex hoc experimento constat, vel humorem bonum circulatorium, vel pus tussiendo ejici. Quod experimentum non multum distat ab eo, quod cum sputo in aqua dejecto instituitur: nam excrementitii humores aquâ sunt leviores & inde supernant: humores autem circulatorii & pus aquâ sunt graviores & fundum petunt.

Capillorum
defluvium
quid notat?

III. Capillos ex suis bulbulis, in vel sub cute in tunica cellulosa hærentibus excrecere, res notissima est Anatomicis, atque pilos formari ex humore concrecente, ut Bombyx format sericum, Physiologi demonstrant. Sic nati capilli ex cute cranii sensim magis excrecunt, & glutinositate humorum cutis poris infixi hærent. Si vero hi humores glutinosi exarescunt, uti in multis morbis cutaneis, capilli extenuati defluunt; aut humores hi glutinosi putredine soluti non amplius infixos retinent capillos. Inde in morbis putridis fere semper capilli decidunt, postea renascendi. Adeo ut capillorum defluvii causa quærenda sit vel in ipsa cute, vel in generali humorum massa, quæ aliquam contraxit putredinem.

Cur sputum
olens & ca-
pillorum
defluvium
tabidis, le-
thale?

IV. Hoc in loco intelligi Phthisin veram purulentam (*Aph.* 89, III.) nemo dubitare potest, quoniam ponitur sequi post anginam inflammatoriam in empyema conversam. Sed Phthisis illa debet esse confirmata, quoniam dicit in Phthisi vexatis, quæ phrasis apud Hipp: semper significat morbum aliquamdiu durasse. In tali Phthisi confirmata si-
sputum

sputum carbonibus infusum gravem odorem spirat, scimus pulmones consumi ulcere: hoc unum signum non sufficit ad pronunciandum signum lethale, nam si reliqui humores manent sani, non raro evadunt: propterea aliud signum adesse debebat, indicans circulatorios humores quoque infectos esse. Inter ea signa ab Auctore recensetur Capillorum defluvium, quod in phthisicis non oritur ex vitio cutis cranii, sed ex corrupto humore totius corporis. Inde post morbos quoque graviores toties capilli defluunt e capite. Hoc autem signum solum non sufficit ad lethalityatem pronunciandam, sed si jungitur cum signo certo corrupti pulmonis, tunc utraque hæc juncta lethalityatem inferunt.

LIB. V. APH. XII.

205. **Q**uibus tabe laborantibus capilli de capite defluunt, hi alvi fluxu superveniente, moriuntur.

I.

IN præcedente Aph: lethale pronunciavit signum in Phthisi vexatis ex sputo & capillorum defluvio, ita ut talis tamen homo aliquamdiu vivere potuisset: nunc vero vult mortem magis instantem præagire in phthisicis ex Alvi fluxu superveniente, id est non concitato aliquo medicamento, nam tunc non est signum latentis mali, verum malum inductum evacuatione sola. Notavimus in præcedente, Capillorum defluvium in phthisicis indicare, materiem corruptam dispersam esse per totam massam, & ita corruptam esse materiem nutritivam, atque extinctam naturalem humorum glutinositatem, ut exarescentes capilli excidant. His nunc si superveniat Alvi fluxus, moriuntur tales ægri brevi tempore. Quod fit vel ex designata causa, vel quia alvi fluxus tantum mali inducat, vel ab utrisque simul, quod crederem. Sponte si veniat Alvi fluxus in humo-

humorum defectu, semper est mali ominis, talis enim nunquam fit in tali casu, nisi ex humorum colliquatione, seu nimia solutione morbosâ, cum summa debilitate virium, qua humores non amplius in corpore contineri queunt: **Diarrhœa** autem in abundantia, ab irritata natura concitata, sæpe multum levaminis adfert. Ergo solummodo demonstrandum esset, in Phthisi confirmata humorum esse defectum, quod puto tam clare constare, ut nullus dubitare possit; phthysicorum enim corpora ita sunt emaciata & humoribus privata, ut nullus sit morbus, in quo ante mortem minor invenitur humiditas, quam in Tabidis. Ergo in his signum est summæ corruptionis, & eliquationis: verum tali in statu aliquamdiu persistere posset, si non accederet copiosa evacuatio, quæ quod restat brevi tempore tollit, uti est **Diarrhœa**. Hæc enim brevi tempore residuum in corpore humorem brevi tempore tollit, suppressit sputa excreanda, corruptum purulentum ducit ad alvum, novum nutrimentum detrahit; propterea brevi tempore mortem inducit. Ex hac observatione satis constat, quam perverse multi dant medicamenta purgantia in Phthysicis, quum ipsa natura doceat, alvi evacuationem, ut signum & causam nocere: experti enim sunt practici, a purgante dato suppressi sputum, & si alvum reseraveris, non esse in medici potestate eam iterum suppressere posse.

LIB. V. APH. XIII.

206. **Q**ui sanguinem spumosum exspuunt, his ex pulmone talis rejectio fit.

I.

Quid notet
sanguinem
exspuere.

Non constat inter Commentatores, quale sit id phænomenon, quod vocamus sanguinem exspuere, & propterea certum signum esse nequit alicujus latentis mali, vel partis læsæ: scopus enim auctoris nostri est docere

docere per phænomenon sanguinem provenire ex pulmonibus, si ergo non constat inter Commentatores, quale istud phænomenon sit, incertus quoque manet locus. Possumus exipueri sanguinem confluentem ex tota membrana pituitaria in fauces; vel qui manat ex ipsis faucibus & oris cavitate; vel qui in ventriculum confluxit & vomitu redditur; vel denique qui stillat in tracheam arteriam & bronchia, atque dein tussiendo sursum elicitur, & ita expuitur. Ad ambiguitatem evitandam si diceretur pro Exspuere, Extussire, quod quoque alii observarunt, firmior esset sententia, & minus obscura. Hippocratem in hoc loco intellexisse sanguinis rejectionem tussiendo emissi, nullus dubito. Nam si excreatum vel vomitum intelligeret, talis tunc rejectio non significaret, eum sanguinem provenire ex pulmonibus: verum quidquid tussiendo ejicitur, sive sit sanguis, sive pus, sive sputum, id omne ex pulmonibus venit; quum vomitus sit actio exonerans ventriculum, scretus purgans fauces; sed Tussis liberans pulmones ab inhaerente humore.

II. Ut magis certum esset signum, rejectum sanguinem venire ex pulmonibus, adjecit *Spumofum*. Hoc quoque his temporibus invenitur verum, si quis tussiendo reddat sanguinem spumofum, ille ex pulmonibus sanguinem rejicit. Quæ autem sit ratio, admodum disceptant: multi sunt stantes, ebullientem sanguinem proflire, alii autem ipsum sanguinem effervesce in pulmonum vasis. Sed si consulamus experimenta in animalibus viventibus, quæ demonstrant, nihil spumosi aërei contineri in sanguine arteriæ & venæ pulmonalis, evincimur credere, spumam eam non esse in sanguine vasis suis contento, verum postea sanguinem in pulmones & bronchia effusum, spumofum fieri. Quod autem ille sanguis magis quam quivis alius spumescat, non defunt rationes seu causæ. Pulmo enim est istud primum in nobis organum, quod actione sua conciliat sanguini concrescibilem naturam, quare tota massa sanguinis, quæ transiit per pulmones, magis concrescibilis est, quam quæ per venam cavam adducitur. Lien e contra videtur

Sanguis spumofus cur ex pulmonibus?

hanc potentiam concrefcendi in fanguine exftinguere, ne tardo illo motu in vena portarum concrefceret, & quia forfan talis natura fanguinis requiritur, ut aptus fit ad bilis fecretionem. Illa major tenacitas in fanguine pulmonis facit etiam, ut fi bulla aëris in eo recepta fit, non tam facile feperari poffit, quemadmodum invenimus puram aquam conquaffatam vix per momentum continere bullulas aëris, fed fi fapo aut glutinofum aquæ adjunctum fit, bullulæ diutiffime remanent. Hoc etiam in urina ægrotantium obfervatur verum, quo plus faponacei vel glutinofi, eo diutius confervat ex conquaffatione factas bullulas. Altera quæ accedit caufa majoris eft momenti, nempe continuus introitus & exitus aëris fingulis refpirationibus, qua actione aër trajectus toties per exftillantem fanguinem, totam illam fanguinis maffam in fpumam fere convertit. Quoniam hæ binæ caufæ ita coöperantes non inveniuntur ita alibi agere, ubi exftillat fanguis, talis fpumans fanguis poteft effe certiffimum criterium, eum ex pulmonibus venire. Hoc egregium eft ad prædictionem formandam ex fanguinis fputo, qui ex faucibus profluit, quum amplitudo faucium non faciat ita fieri fanguinem fpumofum, & quoniam ille fanguis non venit ex arteria vel vena pulmonali, fed ex vena cava vel arteria aërta, ut alibi in corpore.

LIB. V. APH. XIV.

7. **A** *Tabæ detento alvi profluvium fuperveniens, lethale.*

I.

Qui putant, Hippocratem confcripffiffe ex rationibus Aphorifmos, a veritate longe recedunt, nam quæ in Aphorifmis traduntur, funt obfervationes practicæ, quæ ab Hippocrate ipfo, vel ab ejus antecelforibus fuere detectæ.

detectæ. Inde vix alicubi adjicit, quam ex ratione hoc vel istud contigit; sed simpliciter ponit hoc vel istud expectandum esse, quoniam observavit tale quid constanter vel sæpe fuisse subsecutum. Hoc etiam verum est in Tabidis, si veniat alvi fluxus; observavit enim Auctor nunquam ab alvi fluxu levamen allatum fuisse, sed ægrum magis aggravari, debilitari & sputum suppressi, propterea in præsentem statum, si oboritur alvi fluxus, tale quid facile prælagire potuit, ut ex floribus conspectis prælagiuntur fructus: si talis fluxus alvi veniat in Phthisi, dum capilli de capite defluunt, mortem instare significabat (*Aph.* 205) verum in quavis specie Tabis & sine prægresso capillorum defluvio, lethale est signum, quoniam ut signum notat humores colliquescere, & non observamus in praxi, morbos pectoris per alvum facere crism salubrem; & ut causa quoque nocet alvi fluxus, quoniam ejicit nutritivum, & derivat purulentum aut ichorosum ex pectore ad alvum, atque ita suppressit sputi ejectionem, quod admodum malum est in phthificis. Ex hac observatione ut ex præcedente (*Aph.* 205) certe constat, quam male multi agunt, qui non dubitant phthificis dare medicamenta purgantia.

LIB. V. APH. XV.

208. **Q**ui ex pleuritide suppurati sunt, si intra quadraginta dies, ex quo ruptio fuerit facta, repurgentur superne, liberantur: si vero minus, ad tabem transeunt.

I.

Quid sit Pleuritis (*Aph.* 109, IV.), ejus mutationes (*Aph.* 201, I) & exitus in Empyema (*Aph.* 201, III) explicata sunt, ergo in hoc loco videndum est, quando debemus ex tali nato Empyemate expectare sanitatem,

tatem, vel commutationem in Phthisin. Tempus determinat Auctor intra quadraginta dies, & solutionem petit ex sputi rejectione.

Empyema
ex pleuriti-
de intra
quod tem-
pus expur-
gari debet?

II. Intra quatuordecim dies solet Pleuritis inflammatoria commutari in suppurationem, sed propterea statim non generatur Empyema seu puris collectio in cavo pectoris, quum sæpe pus colligatur in tunica cellulosa pleuræ, ubi quandoque diu hæret, antequam rupto illo sacco pus funditur in cavum pectoris: quamdiu pus in eo sacco hæret, supputatio non est facienda expurgationis, sed tunc demum, si pus in pectoris cavitate colligitur. Quoniam Hipp: dicit *intra quadraginta dies, ex quo ruptio fuerit facta*, plane constat, numerationem eorum dierum non debere inchoari a principio pleuritidis, vel a die decimo quarto, sed a tempore eo, in quo abscessus ille ruptus effudit pus. Si ergo non formetur abscessus in sacco pleuræ, dies numerari possunt a die decimo quarto, sed si saccus formatus fuit, tam diu est expectandum, donec ruptus fuerit ille abscessus. Hæ ruptiones non fiunt semper eodem temporis termino, quædam citius, quædam serius. *Siquidem dolor in principiis fiat, & spirandi difficultas, & tussis, & sputatio perseverans, ad vigesimum diem pertingat, eruptionem tunc expectare oportet, aut etiam prius. Si vero quietior fuerit dolor, & alia omnia pro huius ratione, eruptio posterius expectanda est. Necessè vero est accedere & dolorem, & spirandi difficultatem, & sputationem, ante puris eruptionem: Hipp: a. 461 & 462.* Ut hoc tempus, a quo initium dierum est supputandum, juniori medico constet, paulo planius tradenda sunt signa. Siquidem ex signis constet, ægrum laborasse pleuritide inflammatoria, eam pleuritidem durasse ultra quatuordecim dies sine resolutione & sine puris evacuatione per sputum vel urinam, dum tamen ex ceteris signis constet, pleuritidem abiisse in purulentiam, tunc judicandum est, pleuritidem formasse abscessum in sacco dilatato pleuræ, nam si pus fuisset effusum statim in cava pectoris, aliquid redderetur per sputum. Ille saccus sensim fiet major, unde febris suppuratoria fit cum respirationis difficultate & tussi inani,

inani, quia pus in hoc sacco contentum evacuari nequit per sputum: sic sensim pergit morbus, donec saccus ille rumpatur & pus effundatur in cavum pectoris. Facta hac ruptione æger judicabit se liberatum esse a morbo, liberius enim respirabit, minus tussiet & dolebit, nam pus in cavum pectoris effusum minus premit pulmones, & pleura rupta minus tensa lenimen doloris faciet. Ab hoc tempore numerandi sunt dies Empyematis, quod initium temporis non habetur eodem tempore ab invasione pleuritidis in omnibus hominibus. In robustis enim fit citior ruptio, ut & in validiore inflammatione, at in debilioribus, senioribus ægris & mitiori morbo, serius rumpitur ille abscessus. Post ruptionem hanc observavit Hipp: si æger non expurgetur superne, id est per sputi rejectionem, intra quadraginta dies, incidet in Tabem. Quando istud pus ita in cavum pectoris effusum est, propterea non semper sequitur Tabes, nam si pus istud rejicitur per sputum intra quadraginta dies ab dicta ruptione, ægri hi non incidunt in Tabem, sed liberantur ab Empyemate.

III. Quam maxime disputant physiologi, num pus ex pectoris cavo ingredi possit pulmones, ut reddatur per sputum, & urinam. Practici autem hanc viam admittunt, etiam si contendunt physiologi tales non inveniri vias, pus nimis crassum esse, quam ut posset intrare, quum inveniunt in ægris, ut quoque in hoc loco notavit Auctor, pus fuisse evacuatum ex pectoris cavo, & per sputum, & per urinam. Vidi ego etiam in quodam viro, cujus pectus ita plenum erat pure post pleuritidem, ut meditaremur paracentesin, quod omne istud pus fuerit evacuatum per sputum & urinam, & homo perfecte curatus: sive ergo dicant physiologi, nullas esse vias, sive vias concedant, observationes autem hæ frequentes probant, pus evacuari posse. Si vero sedulo perpendimus, quæ fiunt in viventibus, injecto acri humore in cavum pectoris, qui tussire facit, liquorem etiam injectum evanescere; inflatos pulmones transmittere aërem, & multa alia experimenta comparamus huic

Quomodo
Empyema
curari possit
per sputum.

observationi practicæ, admittere debemus non unicam sed binas vias pro exitu puris ex pectoris cavo, nempe in vesiculas pulmonales aërem etiam transmittentes in pulmonibus inflatis, atque in vasa venosa absorbentia, quæ receptum pus, miscent sanguini. Per primam viam, quæ facillima est, fit puris receptio ex cavo pectoris & rejectio per os, sed per alteram viam potius suppeditatur istud pus, quod cum urina redditur. Inde fieri potest, ut pus ex cavo pectoris omne reddatur per os, vel per renes; sed quoniam via in vesiculas pulmonales est patentior, quum transmittat aërem, per sputum facilius quam per urinam reddi potest pus.

Cur tabes,
si Empyema
non repur-
gatur intra
quadraginta
dies?

IV. Quum vero Pus collectum hæreat in pectore, & non rejiciatur superne, vel via est clausa, vel pus est tenacius, vel deficit actio, quæ absorptionem facit. Igitur Pus hic manens similem subit mutationem, qualem observamus in abscessu purulento, scilicet stagnando corrumpitur. Hoc Pus corruptum semper hærens ad pulmonis superficiem, ejus externam membranam corrodit & ita pulmones exulcerat, in principio leviter, sensim vero profundius, ita ut post quadraginta dies sic habeatur exulceratus pulmo, qui sanationem respuit, atque inducit Phthisin pulmonalem. Si quis rogat, cur post quadraginta tandem dies hoc fiat & non prius? illa nimis astuta est interrogatio eo scopo excogitata, ut quidquid certi habeatur in Praxi reddatur ridiculum, nam invaluit opinio, quod qui non potest reddere rationem alicujus rei, illa res censetur incerta aut nullius momenti: quum igitur nihil certi de termino hoc temporis possit proferri, quibusdam videtur, hoc tempus ex mente Hippocratis fuisse excogitatum. Verum ego omnino aliter sentio, nempe Hippocratem uti & nos & alios praticos observasse, pus in cavo pectoris effusum si maneat ultra quadraginta dies, produxisse Tabem, sed si ante istud tempus reddatur per sputum, raro intulisse Tabem. Hæc constans observatio non est opus ratione probetur, & qui hoc temporis stadium ratione conantur probare, inane impendunt operam, nam si quis vellet ex natura examina-

minata

minata radices bulbosæ plantarum definire florendi tempus, ridiculam navaret operam, quoniam tempora hæc solis observationibus sunt detecta.

LIB. V. AP H. xvi.

209. **C**alidum, eo frequenter utentibus, has affert noxas; carnis effæminationem, nervorum impotentiam, mentis torporem, sanguinis eruptionem, animi deliquium: hæc, quibus mors.

I.

Antequam per experimenta fuit investigatum in corporibus quid sit Calidum, admodum disputarunt Medici & Physici, ut satis constare potest ex Veteribus, qui de Calido innato integros libros conscripserunt: postquam vero Physici experimentis rimati fuere naturam Caloris, detexerunt esse aliquam corporis proprietatem, quæ adesse & abesse potest, augeri & minui in corporibus, cujus præsentia detegitur thermometro & sensibus nostris. Thermometrum expansione sua tamen multo perfectius quantitatem caloris demonstrat, quam possit sensibus nostris inveniri: an vero pari gradu augmentum caloris faciat expansionem corporum, quam detegimus thermometro, adhuc inquirunt: neque satis constat, an augeatur Calor collectis particulis igneis, vel quovis alio modo. Nobis in hoc Aphorismo sufficit scire Thermon, seu Calidum eam in corporibus vocari qualitatem, quæ facit elevationem thermometri & in nobis concitat talem sensum, quem Calorem appellare solemus.

Calidum
quid notet.

II. Talis Calor in nobis generatur duobus modis, nempe sponte, sine causa externa, quæ aliis in corporibus concitaret Calorem majorem, vel ab extenre applicatis. Quia vero agit de istis Calidis, quibus uti possumus, satis patet, Hippocratem petere

Quæ species
Calidi intelligatur,

petere indicia ex iis rebus calefacientibus, quæ sunt extra corpus nostrum, in quibus frequentior & rarior conceditur usus. Si has res Calefacientes examinamus, inveniemus quoddam corpus non solum nostrum vivens, sed etiam alia corpora mortua calefacere, quæ res continent Calorem Actualem, qui ambientibus communicari potest. Aliæ autem res corpori viventi ingestæ vel applicatæ augebunt quidem istius corporis calorem, sed corpora mortua non calefaciunt. Talia ingesta vel applicata dicuntur Calefacientia vel Calida Potentialia. Hæc per se non calefaciunt, at applicata vel ingesta eam causam magis instigant in viventibus, quæ calorem naturalem corporis viventis producit, id est motum vitalem. Præter duo hæc inveniuntur quoque alia, quæ fermentando, putrescendo, effervescono Calorem generant: sed quoniam nostri humores sani has operationes non subeunt, inde per Calidum in hoc loco intelligendum Calidum Actuale & Potentiale.

Calidi frequentior usus quales noxas affert?

III. Calor actualis corpori nostro variis modis applicatur. Ita est Aër calidus, sive per solem, ignem, vel vaporem exhalantem corpori applicatur; vel aqua calida in modum vaporis, balnei, cataplasmatidis, aut fomenti applicata; vel corpora sicca calentia adhibentur, ut vel pars quædam corporis vel totum nostrum corpus concalescat. Hi modi diversi varios quoque sortiuntur effectus, & sunt Medicis in frequentissimo usu ad multos curandos morbos: ne autem quis iudicet, horum omnium usum frequentiore non posse inferre noxas, Auctor quasdam noxas citat, quæ ex tali abusu proveniunt, nullo habito respectu ad humiditatem vel siccitatem adjunctam; nam si hæc simul adsunt, compositi etiam effectus proveniunt. Idem etiam sentiendum de Calefacientibus spirituosiss & aromaticis. Quare in hoc loco non omnes noxæ Calidi & Calefacientis recensentur, sed quædam, quæ ex simplici calore majore frequenter adhibito proveniunt. Frequentior usus hic proponitur, quia si semel aut bis vel raro aliquis uteretur istis, non deberet expectare recensenda mala.

IV. Carnis effœminatio notat talem statum in partibus mollioribus seu fibris carneis nostri corporis, in quo sentitur ad attactum major mollitudo, & detegitur minor contractilitas, quam in hominibus sanis esse debet, qualis status morbosus in fibris hodie vocaretur Atonia vel Laxitas, & quoniam in fœminarum carne talis dispositio magis invenitur, quam in corporibus virorum, inde ille status seu dispositio corporis non inepte vocatur Effœminatio. Actu Calida talem inferre Laxitatem, exposuimus in *Comp: nostro* T. 6. atque experimentis quotidianis comprobari potest, modo calor tantus non concilietur, qui comburere potest. Quod autem Potentia Calida uti Spirituosa carnis effœminationem inferant, paradoxum videtur, quia hæc stimulando videntur roborare & firmare solida: sed si intuemur corpora potatorum, veritas observationis nostri Auctoris abunde constat, talia enim bene pota corpora laxa, enervata, frigida, tumida & tremula inveniuntur, & tam debilia, ut sine stimulo illo vix valeant se movere. Cavendum omnino, ne quæramus auxilia nostra ad firmandas vires in frequentiori spirituosorum potu, nam si sit mulas spirituosorum evanuerit, corpus istud magis effœminatum erit, quam ante horum usum. Neque balneum, fomentum, cataplasma actuali calore omni noxa carent; sæpe enim observavi in praxi, horum frequentiori usu membra amississe potentiam movendi; & qui semper bibunt aquam calidam magna copia, ut hodie moris est, in tantam ventriculi atoniam incidunt, ut vix valeant digerere alimenta, atque pedes & reliquum corpus tumeant propter effœminationem tumore oedematoso & aquoso frigido.

Producit
Carnis effœminatio-
nem.

V. Duplex in fibris valet actio, una fit ex contractilitate, quæ debilitatur, uti in præcedente. §. monuimus; altera fit ex motu vel animali vel vitali, vel particulari, quæ in solis viventibus observatur. Hæc actio a Veteribus tribuitur nervis, unde nervorum Impotentia hodie designat debiliorem actionem moventem in fibris muscularibus cujuscunque motus recensiti. Calidorum frequentiore usum omnem illum motum debilitare, nunc demonstrandum est.

Nervorum
Impotentia.

Actu calida statim minuunt contractilitatem, & in maiorem fluorem redigunt humores: inde potentia accurtandi ex voluntate & actione vitæ debilior, quia ad motum illum requiritur non solum spirituum influxus, verum etiam debita contractilitas in fibris, qua minuta, idem spirituum influxus minus validum motum inducere potest: si ergo talis causa fiat frequens, totus fere tonus fibrarum exstinguitur, spiritus debiliori actione vitæ minus præparantur, & propter fluiditatem humorum, & largiorem exhalationem, magis minuuntur, unde spiritus minus puri, & pauciores simul, faciunt Nervorum impotentiam. In tali Nervorum impotentia calore frequentiore & nimio inducta, observavi, frigore, seu potius aura frigidiuscula, & potu egelido vires recuperatas fuisse, imo aspersione aquæ frigidæ homo leipothymia oppressus ad se rediit. Cavendum autem in his, ne nimis subito & magnum frigus admittatur. Potentiâ Calida nervorum impotentiam producere, abunde probatum invenimus in spirituosorum amatoribus, hi enim, nisi vasa spiritu fermentata fuerint impleta, tremunt, horrent, frigent, & toto corpore languent; tandem vero frequentiore spirituosorum usu, paresi, imo apoplexia ex virium defectu moriuntur. Si quis talem Nervorum impotentiam curare aggreditur, quærens auxilium in spirituofo stimulo, infidelem præstabit curationem, dum inveniet virium augmentum, quod evanescet cum exhalante spiritu fermentato, relinquens maiorem debilitatem, si omittat spirituosâ, corpus stimulo ita assuetum omnino languet: Quare ad curationem fidelem nihil aliud valet, quam sensim minuere spirituofo ingesti quantitatem.

Mentis
torporem.

VI. Acumen ingenii sensim fieri hebetius seu torpidius frequentiore usu calidorum & calefacientium, ut olim observavit Auctor noster, ita etiam his temporibus comperimus, magis autem abusu spirituosorum, quam actu calidorum, ita ut quidam spirituosorum abusu deperditi, omnino stolidi fiant, omni fere iudicio privati: ita enim spiritus nostri corporis frequentiore usu a naturali crasi degenerant, ut mentis actionibus peragendis fiant inepti: horum multa,
tam

tam in viris quam in fœminis, non defunt exempla, qui per reliquam vitam quasi semper ebrii, mentis torpore correpti, manserunt.

VII. Non est opus ut actu vel potentiâ Calida in frequentiore usu adhibeantur, sæpe etiam prima vice hæmorrhagiam inferre possunt: actu enim calida solvendo sanguinem, & laxando solida faciliorem vasculorum ruptionem & osculorum dilatationem permittunt; & sanguis tenuitate acquisita, facilius exit. Potentia calida quoniam stimulando faciunt, ut sanguis ruat majori impetu in latera arteriarum, & earum oscula, sæpe minima vascula disrumpit vel dilatat, ut ita exeat retinendus sanguis. Quod si frequentiore horum usu vascula sunt laxiora facta, & sanguis tenuior, eo facilius fiet ista sanguinis evacuatio. Inde juvenes, qui spirituosius abutuntur vel delectantur aromaticis, aliisve calefacientibus, toties incidunt in narium hæmorrhagiam & hæmoptysin. Inde etiam æstate & aliis locis calidioribus frequentior hæmorrhagia, quam hyeme & regionibus frigidis.

Sanguinis
eruptiones.

VIII. Quid sit Leipothymia, ejusque causa, supra (Aph. 66.) exposuimus, ex quibus colligi potest, a calidorum frequentiore usu, quo exhauriuntur spiritus, & partes firmæ laxantur, facile fieri posse animi deliquium, quod toties fit, ac spiritus non amplius fluunt ab encephalo ad organa motoria. Si ab usu Calidorum tantus sit defectus spirituum natus, ut inde fiat vel Leipothymia, vel syncope, verendum est, ne subsistens maneat ille motus, & homo tandem ex improvviso moriatur.

Animi de-
liquia.

IX. Late disputant, qualis sit lectio & sensus hujus partis ultimæ, quia etiam Galeni tempore varia habebatur lectio, ut *His mors succedit. Ad quæ mors. Hac quibus mors. Hac ad mortem ferunt.* Qualis autem lectio sit servanda & sequenda, relinquo Criticis, & iis, qui verba sectantur rem intactam relinquentes. Quod si aliquis sensus sit obscurus, vel lectio varia, id nullam mutationem scientiæ medicæ inducit. Quod si scientia nostra nitebatur auctoritate Hippocratis, severo examine illa loca essent perspicienda &

Hæc, qui-
bus mors.

cum aliis conferenda. Sed quoniam medicina nititur experimentis, non vero auctoritate, si occurrit sensus obscurus vel lectio varia, recurrendum est ad experientiam. Hanc si consulimus, facile erit hanc ultimam partem explicare. Hujus aphorismi scopus est demonstrare, calidorum frequentiore usum multas noxas inferre posse, & inde quasdam noxas recitat, plures annumerare potuisset: dein dicit, *Hæc quibus mors*, vel utitur reliquis lectionibus, quæ omnes notant, post noxas has non raro homines mori. Quod experientia confirmatur; nam si frequentior Calidorum usus tantum defectum virium potuit inducere, qualis cognoscitur in recensitis morbis, illa causa ulterius continuata mortem inferet. Quare sententia non est istas noxas inferre mortem, sed mortem tandem fieri per continuatam illam causam. Et inde recensita mala non sunt flocci pendenda, sed protinus minuendus est Calidorum & Calefacientium frequentior usus, & sensim transeundum ad Diætam magis frigidam & refrigerantem, nam si subito talis induceretur mutatio, citius fieret mors, ut experiuntur spirituosorum amantes, si ex aliquo morbo coguntur mutare vitæ genus.

LIB. V. A P H. XVII.

210. **F** *Rigidum autem convulsiones, tetanos, nigrores, & rigores febriles.*

I.

Frigidum
quid sit &
quæ mala
facit.

UT duo sunt genera Calidi actu & potentia, totidem etiam sunt genera frigidi, quæ dicuntur frigida & frigefacientia. Summus autem gradus frigoris vocatur gelu, ut major gradus caloris urit: propterea in hoc loco non inquirendum, quid faciat Gelu, sed gradus gelu proximus quid faciat. Calor & frigus comparative sumun-
tur

tur ad eum caloris gradum, qui temperatus potest dici ad corpus nostrum. Ab eo gradu usque ad gelu videndum est, quas noxas infert frigus. In genere monendum, quo frigoris gradus propius accedat, eo magis illa mala sunt expectanda. Contrarias causas non semper contrarios effectus producere, ex allegandis morbis constare potest, nam tunc deberet frigus corpus roborare, nervos firmare, mentem acuere &c: verum a frigore æque quam a calore producuntur morbi. Inde constat in hoc Aph: intelligi frigus majus, quam quod potest a corpore sano tolerari sine damno. Iste autem frigoris gradus non omnibus hominibus illa damna inferet, sed quibusdam: experimur enim in his locis septentrionalibus, corpora nostra ab acri & urente gelu roborari, & inveniuntur homines ita robusti & frigori assueti, ut ab intensissimo frigore non afficiantur: alii vero a leviori frigoris gradu in multos morbos incidunt; quod inde est deducendum, quod cujus corporis actio vitæ est debilis, talis homo a frigore majore amittit vel totum illum motum vitalem, in nobis naturalis caloris causam, vel tantum minuitur, ut partes firmæ priventur suo motu, & humores subsistant, & ita concrecant. An vero in hoc Aph: sint intelligenda Refrigerantia, uti in præcedente Calefacientia, ambigo, quum Refrigerantia non operantur per oppositam causam, quæ in Calefacientibus est assignata. Stimulus enim erat causa, ejus oppositum non habemus, & stimuli ablatio non est frigiditatis causa in corpore sano, quod non eget stimulo, ut exerceat suum motum: sed si calor major ex stimulo fuit suscitatus, stimuli ablatio refrigerat, id est redigit nimium calorem in naturalem teporem. Inveniuntur autem Refrigerantia, quæ assumpta vel applicata naturalem calorem minuunt; illa autem recensita damna non inferunt. Propterea in hoc loco accipienda sunt frigida actualia; an vero humida vel sicca sint accipienda, longe disputant Commentatores, sed quoniam Auctor noster nullam hujus faciat mentionem, duntaxat videbimus, quid faciat frigus actuale in partes firmas, humores & actiones, ex quibus generalibus recitati morbi facile deduci possunt.

A frigido
spasmus &
tetanos.

II. Quod supra monuimus (*Aph.* 167) Spasmodum & Tetanum diversum esse morbum, ex hoc Aphorismo satis constare potest, numerat enim Auctor noster morbos ex frigido nascendos; incongruum equidem foret in hoc loco duo proferre nomina eandem rem significantia: igitur per Spasmodum in hoc loco intelligimus alternam violentam contra voluntatem, musculorum constrictionem per totum fere corpus: sed per Tetanum constrictionem constantem, ut musculus interim se non dimittat. Quomodo vero hi duo morbi a frigore inducantur, allucinantur multi. Tales tamen fieri motus involuntarios, tam in motu animali, quam vitali & particulari, per frigus applicatum, aliquoties experimur: ita haustu gelidæ aquæ homines fuere suffocati contractis fibris respirationi servientibus: applicato frigido ad pedes, ventrem, vel alias partes colicus dolor ex contractis fibris intestinorum vel & mesenterii inductus fuit: qui vel instrumento vel liquore frigido tangit in ulcere vel fistula nervum nudum, æger ut plurimum in motu animali convelletur. Ergo experimentis satis constat, frigido applicato vel ingesto generari sæpe Spasmodum & Tetanum. Hoc quidem sufficeret ad cognitionem practicam, nos propterea non imprudenter debere ingerere vel applicare frigida. Sed quando ad originem usque adscendere possumus, non solum major accedet fides, sed etiam egregium ornamentum scientiæ. Quænam sit mea sententia, paucis exposituri sumus. Constat, omnem motum in nobis fieri influxu spirituum, & omnem causam morbosam propellentem hos spiritus, producere vel Spasmodum vel Tetanum. (*Conf. Aph.* 126, III, 194, II, 195, I.) prout constantem vel interruptam propulsionem faciant. Igitur in hoc loco adstruendum, offendens frigus talem propulsionem facere posse. Observavimus, fibras molles nostri corporis a frigore accurtari, atque experimur, excedens frigus applicatum instar stimuli agere: si ergo frigus applicatum ad nervi capsulam ratione contractilitatis vel ratione stimuli faciat, ut nervi capsula contracta urgeat contentos canaliculos spiritibus plenos, hi spiritus tanto impetu propulsi ad partem aliquam

aliquam, faciunt, ut muscoli istius partis vel spasmo, vel tetano corripantur, & quoniam nervorum capsulæ sunt continuæ, totum corpus consentiens convellitur.

III. Postquam experimentis detectum fuit, sanguinem rubrum in quadam parte collectum nigrum præbere colorem, nullum amplius mysterium est quærendum, ut multi ex veteribus, cur frigus inferat nigrores. Frigus enim extinguens in vasculis minimis motum circulatorium, dum tamen arteria major adducit sanguinem, facit, ut tali in parte motu privata accumuletur sanguis: & idem frigus coagulando sanguinem facit, ut ille collectus sanguis in thrombum concreascit. Ergo sanguis ruber collectus & ita coagulatus præprimis in parte, quæ tangitur a frigore, illos nigrores inducit. Nigrores.

IV. Quid sint Rigores, antea (Aph. 156, 1) definivimus, eorumque differentiam ad consimiles morbos exposuimus; quibus satis patet, Tetanum & Rigorem non eundem esse morbum. Quomodo autem Horrores febriles, id est tales horrores, quales in febribus observantur, a frigido applicato vel ingesto concitentur, paucis videndum. Dum frigus applicatur parti nervosæ, illa ratione noxii stimuli se inordinate movere incipit, quæ est lex particularis corporibus viventibus, nam in corporibus mortuis non observatur; ille motus inordinatus a nobis perceptus & observatus vocatur Rigor, cujus multas causas exposuimus. (Aph. 156, II.) Rigores febriles.

LIB. V. A P H. XVIII.

211. **F** Rigidum inimicum ossibus, dentibus, nervis, cerebro, spinali medullæ: calidum vero utile.

I.

E Tiamsi regulariter idem morbus diversis in partibus corporis, idem videatur exigere curationis & medicamenti genus, quum generetur ex eadem causa, Curatio variat pro parte variis, constat.

constat tamen in praxi, nos sæpe debere mutare curationis indicationem & medicamentum pro parte affecta, quod Medico & Chirurgo magnam difficultatem parit: qui enim novit, quid sit agendum in hoc vel illo morbo, decipietur interdum, si ille morbus specialem partem aggreditur: itidem qui cognoscit medelam alicui parti propriam, summo pere peccaret, si omnes morbos istius partis eodem modo curare vellet. Exemplum aliquod in hoc Aphorismo proponit Auctor, demonstrans quædam generalia curationis, ut est Frigidum & Calidum prodesse & nocere posse pro diversitate partis. Inimicum πολέμιον hic significat adversum, noxium, hostile, infestum. Utile ωφέλιμον notat adjumentum, emolumentum adferens, commodum, amicum, profuturum. Igitur differentia hæc non est quærenda in re applicata, sed in natura partis. Hipp: in hoc loco novit omnes partes nostri corporis recensere, in quibus hæc differentia observatur, nam multo plures hujusmodi partes inveniuntur, sed quasdam, ut moneat, nos non solum in applicatione attendere debere ad morbum, verum etiam ad partem variam.

Frigidum
noxium of-
fibus, denti-
bus, nervis,
cerebro,
spinali me-
dulla.

II. Detegimus in nostro corpore vivente aliquam actionem, quæ a nobis vocatur motus vitalis, de quo integram Exercitationem conscripsimus, quæ actio nostri corporis viventis est naturalis caloris causa, ita ut cum validiore hoc motu etiam intendatur calor, & cum motu minuto corpus refrigeretur: ille calor sanguini transfluenti communicatus, etiam aliquomodo transfert illum calorem ad partem aliam, uti fit in translatione caloris actualis. Nam si aqua calida duceretur per vasa alicujus partis, ea pars concalesceret: quare Veteres existimarunt, corporis viventis calorem pendere ab influxu sanguinis calidi, quasi sanguis in se faceret & foveret causam calefacientem. Nos vero, quod alibi latius disputavimus (Comp. T. XLIX.) posuimus calefacientem causam in partibus firmis, motu vitali se invicem terentibus, qua actione vitali transfluens sanguis calorem concipit, quem calorem deinceps aliis partibus minori motu vitali donatis, vel frigori externo magis expositis

fitis communicat. Omnibus autem in partibus non est æque valens ille motus vitalis calefaciens, validissimus mihi videtur in pulmonibus, hi quoniam per totam substantiam in singula respiratione perfunduntur aëre frigido, tamen manent calidi. Aliæ autem partes, quæ paucas arterias habent, & per quas parum sanguinis calefacti fluit, minus calent, quum causa calefaciens sit motus vitalis, non vero particularis, qui requiritur ad specialem confectionem vel secretionem humorum. Si igitur his diversis partibus majore & minore motu vitali calefaciente præditis frigus applicatur, facile erit in parte debiliori motu vitali donata, totum extinguere motum. Solummodo itaque demonstrandum est, recensitas partes, Ossa, Dentes, Nervos, id est Ligamenta, membranas, omnesque partes albicantes, Cerebrum & spinalem medullam, exiguum habere motum vitalem, & parum sanguinis calefacti transmittere. Hoc unicuique constat, quoniam istis in partibus vix conspiciantur arteriæ cruentæ motu vitali donatæ: illud autem con-jicimus ex actione particulari tali in parte, quæ non est simul causa calefaciens, ut est actio vitalis. Igitur pro regula generali, loco recensitionis partium accipi potest, omnibus partibus, quibus est debilis motus vitalis, & parvus transfluxus sanguinis, frigidum applicatum est infestum. Inde quoque hoc bonum habemus, quod in hominibus diversis frigidum etiam infestum esse possit, dum vero aliis sit utile, nempe hominibus, quibus motus vitalis est debilior, quum frigidum sistens motum vitalem in tali corpore debili, totam vitam facile extinguit.

III. Hippocratem hoc in loco non intelligere excessum Caloris, facile ex antecedentibus (*Aph.* 209) colligi potest; neque hic accipiendum Calefaciens nomine Calidi, sed solummodo actu Calidum. De eo dicit utile esse recensitis partibus, quibus infestum erat frigus, & hoc ex eodem principio: nam quibus in partibus, & quibus in hominibus debilior est actio vitæ, conveniens est, ut per actualem calorem conservemus fluorem in humoribus, & ita nullum imponimus impedimentum motui vitali. Ex qua observa-
Calidum
quibus par-
tibus utile?

tione generali hoc commodum habemus in imperanda diætâ, & facienda curatione, ne omnibus partibus, omnibusque hominibus æque frigida & calida adhibeamus, sed semper perpendeamus vires vitæ tali in homine & parte.

LIB. V. A P H. XIX.

212. **Q**uæ perfrigerata sunt, excalefacere oportet, præter ea, quæ sanguinem profundunt, aut sunt profusura.

I.

Refrigerata
excalefacere
oportet.

Contraria contrariis mederi, generalis est regula, quæ ergo suggerit, nos debere partem refrigeratam calefacere: ne tamen aliquis judicaret hanc regulam tam universalem, ut non pateretur exceptionem, hunc conscripsit aphorismum experientia confirmatum, hanc nempe curationem omittendam esse, si pars illa sanguinem fundit vel profusura est. Antequam dare possumus rationem hujus cautelæ, præmonendum erit, quali modo calefacere oportet partem refrigeratam. Pars aliqua corporis hominis viventis refrigeratur vel defectu motus vitalis vel applicato actuali frigore. In utroque casu tardius transit sanguis ceterique humores per sua vasa, & ipsi sunt simul refrigerati. Humores autem nostri corporis stagnantes concreescunt, & eo magis si sint frigidiores, quum frigus concreescendi potentiam augeat. In parte igitur refrigerata humores vel sunt concreti, vel ad minimum spissiores & ita inepti ad fluendum per sua vasa determinata. Si quis in tali disposito sanguine partem subito calefaciat vel per actuale vel potentialem calorem, quo simul magnus concitatur motus, sanguis ille circulationi ineptus, tanta vi propulsus, vasa infarcit, distendit & tandem etiam rumpit, ut sæpe experiuntur illi, qui partes externas frigore suffocatas admovent.

vent igni nimis subito. Propterea expedit partem refrigeratam lente tepefacere & dein excalefacere, sic sensim liquefcet concretus sanguis & fiet circulationi aptus.

II. In morbis autem, qui contra habent indicantia signa, perpendendum est, num prior indicatio sit implenda vel negligenda propter alteram adjunctam indicationem. In tali ancipiti casu eligenda est causa potior & magis valens, ut ea tollatur, ne corpus per curationem levioris mali, quæ obesset simul graviori, detrimentum patiatur. Hujus regulæ egregium habetur exemplum in hoc aphorismo, nam indicatio generalis est, pars refrigerata est excalefacienda, etiamsi illa calefactio fiat secundum recensitas cautelas, quando pars talis vel fundit sanguinem, vel profusura est, recte monet, eam partem non esse excalefaciendam. Hic non intelligitur hæmorrhagia salutæ, vel tam parva, quæ nihil damni inferre posset, sed major & periculosa. Quoniam Auctor dicit, partem talem non esse calefaciendam, duo simul supponit. (1) Hæmorrhagiam periculosiorem esse frigiditate partis. (2) Calefacientia tali in parte revocare sanguinis fluxum. Hoc paucis est exponendum. Pars refrigerata aliquamdiu sine corruptione potest manere superstes, & si demum recalescat prudentissimo auxilio, sana erit ut antea, ergo permitti potest aliquamdiu pars refrigerata sine periculo: sed si sanguis nimia copia profusus fuerit, non tam facile restaurari potest bonus sanguis; imo ex nimia sanguinis profusione tandem periret totus homo, sed si pars per continuatum frigus tandem amitteret vitam, duntaxat periisset pars, non vero totus homo, ergo hæmorrhagia periculosius est symptoma, quam frigus aliqujus partis. Alterum quoque plane constat, nam in parte refrigerata sanguis est densior vel concretus & motus vitalis propellens est languidior: si talis pars calefaciendo agitetur, sanguis in fluorem redactus, & motus vitalis instigatus, renovabit hæmorrhagiam.

Pars refrigerata non calefacienda, quæ sanguinem fundit vel profusura est.

LIB. V. APH. XX.

213. **U**lceribus frigidum quidem mordax, cutem obdurat, dolorem insuppurabilem facit, nigrores, rigores febriles, convulsiones & tetanos.

I.

Frigidum
quid faciat
ulceribus.

Quid sit frigidum, superius notavimus (Aph. 210, 1). Atque Ulceris definitio ex Chirurgia nostra repurgata N. 1293. desumi potest. De hoc frigido ulceribus applicato multa observavit Auctor noster damna, inter quæ inveniuntur quædam generalia superius (Aph. 210) recensita, uti Nigrores, Rigores febriles, Convulsiones, & Tetanos. Hi morbi magis fiunt a frigido ulceribus applicato, quam si frigidum cuti integræ applicaretur, quoniam actuale istud frigus immediate tangit partem nudam & ita validius operatur.

Ulceribus
mordax.

II. Non solum ulceribus est *Mordax* id est ulceribus dolorem, ac si pars morderetur, infert, sed & etiam partibus reliquis, hoc sæpe nos observamus in regionibus septentrionalibus habitantes, quod frigus intentum vix tolerabilem mordacem dolorem pariat, antequam gelu pars integre sit concreta. Si enim per majus frigus sensim contrahantur fibræ nervolæ & ita impediatur spirituum transfluxus, tam diu augebitur dolor, donec omnino omnis spirituum fluxus per eam partem sit interceptus. In frigidissima autem tempestate, dum thermometrum sub signis descendebat, inveni partes congelatas quibusdam hominibus sine prægresso dolore, quod intensissimum istud frigus non sensim impediabat spirituum fluxum, & ita faciebat dolorem, sed unico momento omnem fluxum supprimebat, quemadmodum etiam in morbis malignis, partem sphacelescere sine prægresso dolore. Hanc Morfionem magis inferri Ulceribus, quam parti-

partibus integris a frigido applicato, facile intelligitur, quia omnes partes nudæ ad omnem attactum magis doleant, quam partes integræ & sanæ: inde frigidum; quod a parte sana facile potuisset tolerari sine dolore, ulceri applicatum, sive sit Aqua sive Aer frigidior, dolorem mordacem infert. Propterea in deligatione Ulcerum cavendum est, ne frigidum applicetur, vel ulcus exponatur aëri frigido.

III. Experimenta docent, partes firmas cum augmento frigoris sensim magis contrahi & fieri rigidiores, atque liquores sensim fieri magis cohærentes: quare partes nostri corporis ex his binis constantes, non tam facile cedunt ad attactum, ut antea, si a frigido applicato refrigerantur, sed molles partes fiunt duræ. Inde tempore hyemali toties in hac regione inveniuntur tubercula dura in partibus aeri frigido expositis. Propterea a frigido applicato non solum cutis seu potius margo ulceris indurescit, sed etiam ipsa cutis, etiamsi ulcus non habeat.

Ulceribus
cutim ob-
durat.

IV. Quoniam humores concreti actione vitæ convertuntur in pus, inde sæpe per mordacia applicata promovetur suppuratio: verum non omnia mordacia eodem modo operantur; infertur enim dolor ab applicato medicamento, quod instigando motum vitalem dolorem & morsionem infert; tale applicatum in ulceribus sordidis & frigidis promovet suppurationem. Frigus etiam infert morsionem ulceribus, sed contrario modo, extinguendo nempe illum motum; quare frigidum simul extinguendo causam suppurationem facientem, impedit ulceris suppurationem. Hoc evidentissime coniperimus in pernionibus hyemali tempore, qui relinquunt ulcera sordida sine puris generatione tam diu, donec calor accedens suppurationem promoveat.

Dolorem
insuppu-
rabilem facit.

LIB. V. APH. XXI.

214. **E**st vero, ubi in tetano sine ulcere, juveni bene carnosio, æstate media, frigida multæ affusio caloris revocationem facit. Calor autem hæc solvit.

I.

Sensus.

Superius (Aph. 210.) dixerat, frigidum inducere Tetanos, nunc vero aliquam specialem adferre voluit observationem practicam, Tetani speciem esse, quæ refrigerat corpus, tamen affusione multæ frigida recuperare calorem: & ut hanc sententiam non faciat generalem, dicit *Est vero*, quod ab aliis dicitur *quandoque* vel interdum. Id est, rara exstant exempla, quod corporibus tetano correptis per affusionem aquæ frigida revocetur Calor. Ne igitur in quovis Tetano hoc tentaret auxilium, tres adjecit cautelas. (1) Ut Tetanus fiat sine ulcere. (2) In juvene eufarco. (3) Media æstate. Quoniam expertus fuit tali in casu affusionem aquæ frigida revocasse calorem. Contra hanc curationem multi se opposuerunt medici, quoniam in praxi viderunt, potius generari quam curari Tetanum affusione frigida. Sic semper multæ lites moventur in morborum curationibus, si morbus ex phænomeno appellatus non distinguatur in suas causas diversas. Existimarunt veteres & adhuc multi, Tetanum unicum esse morbum, & propterea constantem habere & semper sibi similem curationem: sed quoniam est phænomenon causæ latentis, ejus curatio sibi mutuo contraria esse potest. Propterea videndum erit, an non valeamus ex adjunctis rimari, qualisnam sit latens causa Tetanum inducens, quæ minuitur affusione multæ frigida.

Tetanus
ex impetu
& calore
majore.

II. Tetanum & Convulsionem ex majore sanguinis impetu ad encephalum fieri posse, nobis fidem faciunt morbi acuti

acuti ardentes, in quibus semper veremur Convulsionem, Tetanum vel Delirium, si signa docent, sanguinem ferri majore impetu ad caput: ille impetus major si producat Tetanum, quo in toto corpore per constrictos musculos sistitur circulatio, vel ita simul comprimitur cerebellum, ut spiritus vitales fluere nequeant: talis impetus major propter suffocatam circulationem & impeditum spirituum vitalium fluxum, facit corporis refrigerationem. Hæc refrigeratio seu caloris nativi extinctio, & talis Tetanus curandus est minuendo motum vitalem propellentem. Quod egregie fieri potest, si corpus affusione multæ aquæ frigidæ perfundatur, dum actuale frigus augeret constrictionem contractilitatis, sed minuat contractionem ex motu vitali. Ita per minutam actionem vitalem dimittitur cerebellum compressum, & resoluta tetano permittitur circulatio per vasa, unde iterum redit calor naturalis, remotis causis impredientibus. Quantum juvet distinctio inter contractionem automaticam & vitalem, ex hoc mirabili morbi signo & curationis modo elucescit, quum a frigore augeatur contractio automatica, & e contra minuat contractio vitalis. Videndum nunc est ex phænomenis ab Hippocrate unitatis, num hic recensitus Tetanus a majore impetu vitali dependeat. Excipit *Ulcus*, ut indicet, se non intelligere Tetanum ab applicato frigido ad ulcus, quod in præcedente Aphorismo notaverat. Sed quamvis ulcus adesset, potuisset tamen generari Tetanus ex impetu majore & exigere frigidæ affusionem; at vero ulcus sive adsit sive absit nihil determinat. Dein addit, *Juveni bene carnosio εὐσάρκῳ*, id est robusto, valido, nec macilento nec obeso, cujus corpus est sanum & robustum. Tali in corpore maxime vigere motum vitalem, nemo dubitare potest; quamobrem omnes morbi juvenum (Aph. 108.) ex hoc majore impetu deducuntur. In hujusmodi corporibus si Tetanus fiat, magis ex impetu majore quam ab acrimonia cruda stimulante is erit deducendus. Et ut aliquam simul assignaret stimulantem causam, quæ majore impetu ducit sanguinem ad caput, adjecit *Æstatem medianam*. Quo tempore præcipue fiunt

unt febres continuæ ardentes (*Aph.* 100 , II.) Si igitur aliquod phænomenon, nempe Tetanus, conspicitur, quod ex majore impetu & calore generari potest, cum adjuncta ætate & causa his producendis prona, verisimile est, hoc phænomenon ab illa causa provenire. Quia vero ex causa raro oriatur Tetanus, adjecit *Est vero*, quod notat, ut monui, interdum, quandoque, non semper occurrens. Et inde scimus, nos non temere hac methodo medendi uti debere, & non, nisi nobis constet, ab hoc impetu & calore majore nasci Tetanum. Si autem aliquis plura signa hujus majoris impetus desiderat, ut firmiorem habeat praxin, adire potest (*Comp. nostrum.* T. 46. XI.)

LIB. V. A P H. XXII.

215. **C**alidum suppuratorium, non in omni ulcere magnum signum ad securitatem: cutem emollit, attenuat, dolores sedat, rigores, convulsiones, tetanos mitigat: capitis vero gravitatem solvit: plurimum autem confert ossium fracturis: maxime vero denudatis: ex his quidem maxime, qui in capite ulcera habent: & quæ a frigore moriuntur, aut exulcerantur: & herpetibus exedentibus sedi, pudendo, utero, vesicæ. His calidum quidem amicum, & decretorium: frigidum vero inimicum & occidens.

I.

Calidum
actuale ap-
plicatum
quid faciat.

Propter rerum copiam & lectionem variam Commentatoribus hic Aphorismus maximam difficultatem præbuit. Duntaxat rimabimur rem ipsam, variam lectionem relicturi criticis & literatoribus: neque ubique usuri Hippocratis auctoritate, quum ille vir, quidquid habet, ex observationibus, quemadmodum nos omnes, haurire debuit.

Scopus

Scopus noster erit cum Auctore perspicere quid faciat θερμὸν (*Aph.* 209, II.) quod in hoc loco indicabit Calorem moderatum, ut est in corpore sano, & paulo majorem, minime vero adurentem, qui concitatur ab actu calidis applicatis. Nam si simul adducerentur ea, quæ potentiâ calefaciunt, sensus ubique fieret obscurus: Ita enim exponuntur effectus unius simplicis causæ, sed si simul adderentur effectus calefacientium, non constaret eadem sententia, quum effectus actu & potentia calidorum inter se multis in casibus differant. Istud Calidum applicatum vel est simul siccum vel humidum, & hac ratione etiam differunt effectus, quod simul in expositione effectuum erit recensendum. Quid autem sit Calidum & quotuplex hoc superius indicavi (*Aph.* 209, I.)

II. Istud vocatur suppuratorium ἐκπυητικόν, quod humores concretos tenaces vel in ulcere cavo sordiditatis nomine, vel in marginibus impactos hærentes, convertit in humorem albicantem, subpinguem, satis consistentem, aqua gravio-rem. Ex qua materia formetur pus, quomodo generatur, & per quamnam actionem, indicavimus (*Aph.* 72.) Ex quibus constabat ad puris confectionem paulo majorem calorem requiri, quam est calor naturalis nostri corporis: inde itaque actu calida applicata, quoniam istud requisitum faciant, juvant puris generationem. Propterea experimur in tumoribus inflammatoriis, qui non facile suppurantur, quod cataplasmata calide applicata promoveant suppurationem, quam suppurationem non potuimus obtinere ullis emplastris. In tumoribus vero frigidioribus & ulceribus sordidis simulque frigidis, nisi simul applicentur calefacientia, id sordidum in pus converti nequit & diutissime permanet, atque margines manent indurati. Hinc quæ parantur ex terebinthina, alöe, myrrha & similibus dicuntur digestiva, id est suppurationem promoventia. Ne autem aliquis judicaret se posse actuali calore promovere suppurationem, adjecit *non in omni ulcere*. Nam non omnis materia in ulcere apta est ut inde conficiatur pus. (*Conf. Aph.* 72, III.) Neque humores qui inchoaverunt putredinem vel corruptionem, per calorem in Pus possunt commutari, uti recenset

Calidum
suppurato-
rium, non
in omni
ulcere, ma-
gnum sig-
num ad se-
curitatem.

Galenus Dysepulotica, Cancrofa, Chironia, Telephia, & Phagedænica, quæ omnia dicuntur Anecpyetica. Nam putrefactum converti nequit in pus, & quod fuit majore corporis calore corruptum, per calidum applicatum non convertitur in pus, sed in majorem corruptelam & acrimoniam. Utinam hoc semper assequeretur a Medicis in variolarum curatione! toties non periissent ægri variolis in putrilaginem conversis: unice enim multi contendunt calidis applicatis, & calefacientibus exhibitis promovere variolarum suppurationem, etiamsi experiantur pustulas variolosas abire in putrilaginem. Quod si animo attente hanc generalem perpenderent, non semper calefacientibus tentarent variolarum curationem. Dein addit *Magnum signum ad securitatem*. Quibus verbis indicat, quod si calidis applicatis experimur promoveri suppurationem, hæc observatio erit signum securitatis, quoniam ex hoc conspecto scimus materiem illam sordidam non esse corruptam, & humores in ulcere hærentes aptos esse, ut inde præparetur pus. Hoc experimur semper, quod qui humores morbosos permittunt conversionem in pus, isti semper sunt blandi & benigni, qui vero in pus non sunt commutabiles, hi sunt corrupti, rebelles & acres, ex quibus nihil boni expectari potest: præterea ipsa conversio in purulentiam est quoad vires corporis bonum signum, nam nisi vires vitæ valeant, nunquam ullus humor in pus convertitur. Quamobrem pustulæ variolosæ si non suppurantur, sed convertuntur in hydatides vel putrilaginem, mortem instare indicant; si vero suppurantur & coctum pus præbent, salutem & securitatem pollicentur.

Calidum
cutem e-
mollit, at-
tenuat.

III. Per Calidum applicatum partem molliri, quotidiana docet observatio, nam calidum laxat partes firmas & contentos humores in faciliorem fluorem redigit, quare pars ad contactum redditur mollior. Hoc etiam verum est in tumoribus morbosis, quare ad emollienda indurata semper Chirurghi adhibent actu calida. Quæ autem sua efficacia calefaciunt, quosdam tumores emolliunt, alios vero magis indurare faciunt: qui enim ad partem inflammata[m] applica-

ret

ret Calefaciens, majorem indurationem faceret, quoniam his in tumoribus per motum majorem est nata durities, qui motus per Calefacientia adaugetur. *Attenuare* seu potius *Extenuare* ἰσχυαίνει, notat partem tumefactam corporis seu partis sanæ molem minuere: sive enim ex impetu majore, ut in tumoribus inflammatoriis, pars tumeat, sive ex humore crasso & lento impleatur tunica cellulosa, ut ita partem tumere faciat, in utroque casu actu calida talem partem extenuant; cum actu calidis & humidis, qualia hic præprimis intelliguntur, temperetur nimius motus vitalis tali in parte, qui partem distendebat; atque humor lentus & concretus pituitosus a Calore in fluorem redactus, priorem locum relinquens, sæpe partem extenuat. Sic norunt Chirurghi pedes oedematosos tumentes fovendo omni vespere extenuare, cum Calore pituita attenuata eo tempore, dum horizontalis dein conceditur situs pedibus, pedem relinquat. Hoc etiam observavi membra arthritica sæpe fota, ita fuisse emaciata, ut viderentur aridura correpta.

IV. Promptissimum est auxilium fere omnibus hominibus, si ubicunque sentiatur Dolor, statim applicare corpus aliquod calefactum, sic testæ calentes ad ventris dolorem appositæ fabrefactæ inveniuntur, quæ nomen ex colico dolore traxerunt: alii arenam calefactam sacculo receptam applicant: Chirurghi propterea fomenta & cataplasmata calida adhibent ad leniendos dolores. Hæc autem constanti experientia comprobata sunt magnum solamen attulisse, nam perpendamus theoriam, horum usus admodum esset incertus, cum ex concepta opinione fere omnes existiment cunctos dolores a frigore oriri, dum tamen maxima pars omnino aliam causam agnoscat. Qui vero perspicit omnem fere dolorem leniri per ea, quæ laxant fibræ nervosam, & humorem concretum atque ita obstruentem resolvunt, facile concipiet, calidum fere semper anodynum esse, quum utramque faciat.

V. Quum supra exposuimus, quid sit Rigor. (Aph. 156, 1.) Convulsio & Tetanus (Aph. 167, 1.) simulque exhibuimus hos morbos validam facere tensionem in fibris, so-

Dolores
sedat.

Rigores
Convulsio-
nes, tetanos
mitigat.

lum restat hoc loco videre, quomodo actu calida applicata hos morbos mitigent. Experientia ipsa loquitur nos non citius compescere posse Rigorem quam actu calidis applicatis, quibus prompte superatur sensus frigoris, qui simul in Rigore habetur. Tensio autem reliqua in Rigore & ceteris citatis morbis, quoniam calida laxent, necessario quoque minuitur, & ita dimittitur pars constricta. Inde in Doloribus ventris & aliarum partium a spasmodicis constrictionibus tanto cum successu adhibentur corpora calefacta.

Capitis gravitatem solvit.

VI. Caput nobis videtur grave, vel dum majore humorum pituitosorum copia oppletum est, vel si potentia movens est debilior: sæpe hoc observatur in valitudinariis & morbis chronicis. Tali in casu Auctor & etiam nos observavimus Calida capiti applicata levamen attulisse. Dum scilicet pituitosus humor aggravans caput, non potens ob debilitatum motum vitalem inde expelli, a Calore actuali resolutus, inde depellitur, & ita minuit Capitis gravitatem. Ipsa quoque potentia calida hoc præstant, exagitando partes languentes: propterea ad Capitis gravitatem levandam, capiti affricantur spirituosa & olea aromatica ceteraque calefacientia.

Confert plurimum ossium fracturis.

VII. Ossa frangi nequeunt, quin vasa per os currentia diffringantur simul, & medullæ ex ossis cavo liber concedatur exitus in partes circumjacentes, atque humores vasculis antea coarctati effundantur: rarum esset solum os ita frangi sine contusione vel læsione partium mollium ambientium. Pars ita disposita effusos habens humores, multaque diffracta vasa, si tractetur frigore, faceret validissimam accurtationem fibrarum, quæ sunt laceratæ, & fieret effusorum humorum coagulatio, quæ deinceps solvi non potuisset: propterea optimum est actuali calore adhibito temperare nimiam contractionem fibrarum, & prævenire coagulationem humorum, ut ita humores fluxiles servati reduci potuissent per venas, ne stagnando corrumperentur. Quam perverse igitur multi agunt Chirurgi applicantes ad ossium fracturas frigida, ex his dictis facile colligi potest.

VIII. Ossa

VIII. Ossa omnia nostri corporis, si excipiantur dentes, sunt ubique tecta partibus mollioribus, in quibus demonstravimus (Aph. 211, 11) validiorem esse motum vitalem concitantem naturalem calorem, qui quoque communicatur ossi incluso, ut corpora calefacta inter se calorem communicant. Talia ossa si fiant nuda, ob duplicem rationem ferre non possunt frigus, sed juvantur actuali calore. Nam privantur non solum suo integumento calefaciente, verum etiam multa vasa os intrantia, quorum munus est conservare motum vitalem in osse, abrumpuntur, ita privantur actione sua, ut tale nudatum os semimortuum haberi possit, præcipue si simul suo periosteo privetur. Ne igitur debilis restans in nudato osse motus vitalis frigore extinguatur, & ne humores atque medulla concreascant, expedit actuali calore moderato istud os fovere. Hæc observatio magni est usus in omnium ossium morbis, ne unquam ad ossa nuda applicemus actu frigida, neque nimis diu in renovatione deligationis moremur & exponamus os aëri frigido: si vero diu os nudum est tenendum, uti in terebratione cranii, prudentissimi Chirurghi semper curant, ut ambiens aër arte incalescat.

Maxime
convenit
denudatis
ossibus.

IX. Ex textu satis constat omnibus ulceribus conducere calida, sed inter ea maxime conveniunt Calida ulceribus capitis. Quod ulcera amant calida, ex iis, quæ diximus, facile deduci potest, quum pars ulcerata multa vasa habeat diffracta, & debiliorem motum vitalem, atque humores effluentes per calorem in fluore sint conservandi. Quamobrem autem id magis ulceribus capitis, quam aliarum partium conveniat, ex alio fonte est petendum. Non novimus loca exulcerata, quæ ossibus propiora, quam ulcera in cranio, si his adhibentur frigida, facile inde pericranium & subiectum os potuisset lædi, quod minus verendum est in aliis partibus; propterea in deligatione ulcerum capitis magis debemus evitare frigidi aëris contactum, quam in deligatione ulcerum aliarum partium.

Capitis
ulceribus

X. Duplicem speciem morbi ex frigore nati proponit, in qua laudat Calidum, nempe mortificationem, & exulcerationem

Et quæ ex
frigore mori-
untur,
aut exulce-
rantur.

ex frigore. Hujusmodi morbi in nostris regionibus sunt frequentissimi hyemali tempore. In facie enim, manibus & pedibus præcipue puerorum tubercula dura nascuntur, quæ Perniones vocant, aut generantur livida sordida & frigida ulcera, non recedentia nisi accedente solis æstivi calore. Quæcunque laudantur ad hos præveniendos & curandos morbos, nisi simul adferant Calorem actuale vel potentialem, nullius sunt momenti, quum frigus externum exstinguens motum vitalem in tali parte nuda, mortificationis & exulcerationis sit causa. Propterea medicamentum quodvis, modo simul adhibeatur artificialis calor, hujusmodi morbos sanat, & eo magis si applicatum medicamentum lenem simul calefacientem virtutem habeat. Si vero nimis concilietur parti calor, ægri ferre vix possunt dolorem, & pars profundius mortificatur, quam si sensim adhibeatur. Quid autem sit agendum in parte congelata exposuimus in *Chirurgia repurgata nostra*. N°. 1283.

Calidum
convenit
herpetibus
exedenti-
bus, sedi,
pudendo, u-
tero, vesicæ.

XI. Qualem morbum intellexerunt Veteres per Herpetem exedentem exposuimus in *Chirurgia Repurgata* N°. 1374. Ex quibus constat partem eam Herpete tentatam sensim latius corrodi & exulcerari per humorem acrem corrodentem. Qui si retinetur, stagnando sensim redditur acrior. Sed notatu est dignum, quod non absolute recenscat Herpetem quemcumque, sed qui exedit sedem, pudenda &c: Unde concludere possumus partes has magis exigere Calidum quam morbus ipse. Hoc etiam quotidie experimur in praxi omnibus morbis pudendorum utriusque sexus & ani admodum conducere Calida. Ut si quis vellet uteri hæmorrhagiam vel mensium profluvium suppressere applicatis frigidis ad pudenda, ut consuevimus facere ad aliam hæmorrhagiam compescendam, summum inde damnum esset expectandum. Eo itaque magis si ipse morbus harum partium, ut est Herpes exedens, vetat actu frigida.

Quibus par-
tibus cali-
dum ami-
cum & de-
cretorium.

XII. Post recensionem partium, quæ afficiuntur Herpete exedente, uno verbo voluit indicare applicata Calida non ita conducere morbo recensito, sed præcipue his partibus, ut constaret medicos & chirurgos ad omnes morbos harum partium

partium semper debere applicare actu Calida, quum Calidum sit Amicum & Decretorium, id est hæ partes jucundo sensu afficiuntur per Calida applicata, & commodum sentiunt, & si aliquis morbus in his partibus sit curandus, vix curari potest, nisi actu Calida simul applicentur.

XIII. Quibus partibus frigidum sit inimicum & noxium superius (Aph. 211, II) recensuimus; sed his addi possunt anus, pudenda, uterus, vesica, ex eadem ratione, quod partes hæ debili motu vitali donatæ sint. Verum insuper nullus est locus in toto corpore, ad quem tanta est humorum excretoriorum colluvies, quorum effluxus si cohibeatur per frigidum applicatum, facile potest omnem illarum partium actionem suffocare.

Quibus
partibus
frigidum
inimicum
& occidens;

LIB. V. A P H. XXIII.

216. **I**N his autem frigido uti oportet, unde sanguis erumpit, aut erupturus est: non super ipsa, sed circa hæc, unde influit. Et quæcunque inflammationes, aut flammei ardores ad rubrum & sanguineum colorem vergentes novo sanguine, super ipsos: nam inveteratos nigrefacit: erysipelas etiam non exulceratum juvat, quoniam exulceratum lædit.

I.

NE autem aliquis judicaret frigidorum usum ita noxium esse, ut non potuisset adhiberi frigidum ad ullum morbum curandum, hunc Aphorismum scripsit Auctor, in quo tres proponit morbos, quibus frigida sunt adhibenda, & quidem cum tanto judicio, ut mirari possimus, tunc temporis solis experimentis practicis eo usque pervenire potuisse scientiam medicam.

II. Gene-

Frigidum
quomodo
adhiben-
dum in san-
guinis e-
ruptione.

II. Generalem regulam exhibet de frigidorum applicatio-
ne ad sanguinis fluxum cohibendum, quia per frigus mi-
nuitur motus vitalis propellens sanguinem & ipsum sangui-
nem coagulat, quibus junctis, sisti debet ille effluxus. Prop-
terea si damnum sit verendum ex sanguinis fluxu, generali-
ter frigida sunt adhibenda, quæ effluxum sistunt. In hac
autem regula curationis generali duo sunt observanda.
Ne pars ipsa vetet frigidi applicationem, & ut applicetur
ad locum convenientem. Primum ex præcedente aphorismo
colligi potest, nam partes circa anum & pudenda frigidi
applicationem vetant, unde in mensium & lochiorum pro-
fluvio atque in hæmorrhoidum fluxu nimio nunquam per
frigida conamur sistere fluxum, sive actu fiat sive instet.
Alterum est, ut non immediate applicetur ad partem, quæ
sanguinem fundit, sed circa eam nude influit. Si enim
parti sanguinem fundenti applicetur frigidum, id quidem
effluxum sanguinem coagulabit, sed non inhibebit affluxum
novi sanguinis, unde tali in loco sæpe ingens sanguinis co-
pia colligitur: quod si vero frigidum applicetur ad arteriam
ducentem sanguinem ad locum apertum, ut valeat tempe-
rare sanguinis impetum, & ad extremitatem istius arteriæ
coagulare, secure sistetur sanguinis fluxus, quia nihil novi
adduci potest, unde in narium hæmorrhagiis fronti adhi-
bentur frigida, non vero ipsis naribus.

Quali in-
flammatio-
ni seu epi-
phlogisma-
ti frigida
applicanda.

III. Quam difficile sit ex phænomeno conspecto aptum
adhibere auxilium, illi norunt, qui cum studio diu exercue-
runt praxin, nascuntur enim sæpe similia phænomena ex
oppositis causis, ut inde idem phænomenon diversam exi-
gat medelam. Ita in hoc aphorismo laudat frigidi applica-
tionem ad Inflammationem, dum tamen experientia doceat
per frigida applicata inflammatam partem vel abire in
sphacelum vel indurationem. Inde per circumlocutionem
Auctor indicare voluit, se non intelligere veram Inflamma-
tionem, quæ incipit cum Calore, Ardore, Dolore & Tu-
more, sed aliam speciem, quam vocat Epiphlogisma, seu
incendiosa ad rubrum & subcruentum ex recenti sanguine
ver-

vergentia. Ex qua circumscriptione colligere debemus cutis rubedinem cum ardore subito natam sine tumore, & sine dolore, quæ in Inflammatione adsunt. Neque hæc conjuncta phænomena sufficiunt, quoniam in phthilicis, empyematicis, & scorbuticis sæpissime observemus hujusmodi fugaces rubedines & ardores præprimis in facie, quæ non sunt curandæ applicatione frigidi, quum id acre irritans, quod rubedinem & incalescentiam facit, simul a motu illo majore subigatur, & nunquam abeat in suppurationem. Epiphlogisma autem morbus est constantior & si perduret motus major non raro transit in veram inflammationem, sed si per actu frigida motus & calor ille major compescatur nihil periculi est expectandum. Si vero tam diu duravit Epiphlogisma donec fecerit tumorem, dolorem, & in sanguine ibidem retento lentorem, tunc frigida applicata concreescere faciunt sanguinem, ex quo concreto & collecto pars fit nigra & dein corrupta. In tali Epiphlogismate monet frigidum applicandum esse ad partem ipsam, quod in sanguinis profluvio vetaverat, quia motus major in hoc non erat in parte ipsa sed in adjacentibus; in illo autem pars ipsa motum majorem habet, ad quem temperandum adhibentur frigida.

IV. Quid sit Erysipelas in *Chirurgia repurgata* N°. 1418. exposuimus. Istud autem per signa externa ab Epiphlogismate difficile decernitur, habetur enim in utrisque rubedo & ardor, sed Erysipelati aliquis adest dolor; & rubedo ad flavedinem vergens. Humor Erysipelas producens a veteribus dicitur biliosus, id est tenuis, saponaceus, subpinguis. Tali in morbo monet tam diu adhibenda esse frigida donec sit exulceratum Erysipelas. Hoc etiam hodie experimur in praxi & non caret ratione, quum humor talis per frigus applicatum minus agitatedum, & magis in crassatum, multum amittat de sua acredine: non tamen nimis diu debemus refrigerare, sed continuare donec naturalis calor & color redeat parti. Si vero destructa sint vasa format speciem Herpetis (Aph. 215, xi) in quo frigida sunt noxia, uti omnibus ulceribus (Aph. 213, ii.)

Frigida
quando E-
rysipelati
adhibenda.

LIB. V. APH. XXIV.

217. **F**rigida, velut nix, glacies, pectori inimica, tusses movent, sanguinis eruptiones, ac catarrhos inducunt.

I.

Frigida, velut nix, glacies, pectori inimica.

Versatur auctor in exponendo usu & damno calidi & frigidi applicati, & in præcedente tradidit usum frigidi applicati; nunc agere vult de summo frigore & propterea exemplum ponit in Nive & glacie, quia hæ paulo majore calore liquefcunt primo in aquam frigidissimam. Hodie constat experimentis thermometrorum majorem gradum frigoris esse in nive & glacie, quam in quavis aqua fluente. Propterea in hoc Aphorismo solummodo perpendendum quid faciat frigoris gradus major, quam qui reperitur in aqua frigidissima. De tanto gradu frigoris dicit eum inimicum esse pectori. Quoniam nos in septentrionalibus regionibus inhabitantes frequentia habemus nivis & glaciei experimenta facile judicare possumus, quid sit sentiendum de veritate hujus sententiæ. Non observamus degentes in locis nive tectis vel gelu constrictis frequentius corripì pectoris morbis quam reliquis temporibus, imo in rigidissima tempestate Anni 1740, paucissimi morbis pectoris correpti fuere: quam ob rem posita ab auctore sententia non satis videtur veritati convenire. Sed si rem penitus inspiciamus veritas clarissime constabit. Auctor enim in hoc loco agit de usu & damno frigidi & calidi applicati, & nunc pro exemplo adducit nivem & glaciem pectori applicatam, & tali in casu pronunciat ea pectori inimica esse. Hoc autem nostris in regionibus raro instituitur experimentum, sed in calidioribus regionibus, ubi Hippocrates habitavit erat in frequentiori usu ad temperandum.

randum nimium calorem. Inde hoc modo concipienda est sententia, si quis excalesfactus fuerit & tunc pectori applicat nivem vel glaciem ad temperandum calorem, id omnino damnosum est. Quare monet medicos istorum locorum ne imitentur illam malam consuetudinem. Aut si faciant expectare debent tussim, sanguinis ruptionem & catarrhos.

II. Ut nos Auctoris nostri scripta legentes intelligeremus qualia genera malorum pectoris observaverat Hipp: ab applicata nive vel glacie producta, citavit Tussim, Sanguinis eruptiones & Catarrhos. Quali modo hi morbi ex tali causa nasci possint paucis videbimus. Tantum frigus pectori applicatum ut est in Nive & Glacie facile potest mucum in cryptis tracheæ & bronchiorum hærentem constringere, ut maneat inhærens suis lacunis: hoc quoties fiat, quia tunc aliquid durum est in trachea, quod irritat, id debet proritare Tussim. Sed quoniam tenacissime ille mucus concretus adhæret lateribus tracheæ tussiendo difficile separari potest, & propterea manebit tussis pertinax, quæ iterata concussione violente tandem rumpere facit vas cruentum in pulmonibus, quo generatur sanguinis eruptio seu hæmoptysis. Idem frigus cohibendo naturalem ex pulmonibus exhalationem facit, ut in vasculis & nervis exhalantibus humor stagnans acrior factus membranam bronchiorum & Laryngis impleat humore tenui & frigido, qui morbus vocatur catarrhus (*Conf. Aph. 110, III.*) Hinc toties non solum a nive vel glacie pectori applicata oritur Catarrhus, sed fere semper ab omni aëre frigidioris accepto in corpore calido. Ita quidem nobis constat dictos morbos generari ab applicatione frigidi ad pectus, sed si simul inde deduci posset methodus medendi præstantior esset observatio. Si quis Tussi vel Catarrho laborat protinus confugiunt ad eclegmata: sed si perpendamus in hoc casu causam fuisse nimium frigus concrevens humores in organo respiratorio, & forsan etiam sanguinem in extremis arteriarum, facile concipere possumus nihil præstantius esse quam fovere istas partes vapore humido & calido. Quapropter

Cur frigida
pectori ap-
plicata in-
ducant tuf-
sim, san-
guinis erup-
tiones &
Catarrhos.

ter egregium erit auxilium ad Tussim & Catarrhum talem curandum, haurire ore aperto vaporem bullientis aquæ, & bibere potum pectoralem quantum ferri potest fervidum.

LIB. V. APH. xxv.

218. **T**umores autem in articulis & dolores absque ulcere, & podagricos, & convulsiones, magna ex parte, frigida multa affusa & levat & extenuat, & dolorem solvit. Torpor enim modicus doloris solvendi vim habet.

I.

Quinam tumores & dolores articulorum levantur frigida multa affusa.

Contra consuetudinem nostram non possum hac in re Auctori consentire, ut in praxi ad articulorum dolores & tumores, & contra dolores podagricos & spasmodica affunderem multam aquam frigidam, vel adhiberem frigida stupefacientia ad sopiendos dolores, quum mihi experientia constet, talia attulisse præsens levamen, sed semper veritus humores in tumore stagnantes ab actuali frigida concretum iri, vel repelli ad nobiliora viscera: atque experientia didici a quodam agyrto applicatum fuisse frigidum ad leniendum dolorem podagricum, eo effectum, ut in posterum articulus non potuerit moveri. Quam ob rem Auctor esse nolo, suadens juniorem Medicum, ut imitetur hanc curationem ad leniendos dolores. Scio quidem cum Hipp. actu frigidis applicatis minui dolorem, sed scio simul inde sæpe magnum periculum fuisse natum. Nam si quis membrum ex combustionem dolens dimergat in frigida aqua statim sentiet doloris levamen, verum quam primum recalescere incipit multo acrior erit dolor & profundior eschara, quam si tale quid non fecisset.

LIB. V. A P H. XXVI.

219. **A**qua, quæ cito calefit, & cito refrigeratur, levissima est.

I.

Non est Hippocratis scopus in Aphorismis omnia criteria alicujus rei simul congerere, ut facit ut solent Systematici scriptores, sed unam alteramve sententiam absolute proferre, etiamsi aliis in circumstantiis omnino contraria inveniatur: quare non semper integra doctrina alicujus rei in Aphorismis invenimus, sed plerumque partem duntaxat aliquam absolute positam. Ita in hoc loco rimatur aquæ levitatem, ex eo quod cito calefiat & refrigeretur, sed propterea non negat aliis etiam modis aquæ levitatem inveniri non posse, per stateram vel reliqua statica experimenta; neque propterea infert eam aquam magis minusve salubrem esse, uti quidam contendunt. Quare experimentis hæc observatio physica est comprobanda vel refutanda. Illa docent corpora calefacta refrigerari communicando calorem ambientibus; itidem frigida inclescere si ambientia sunt calidiora. Quo superficies tangens ceteris paribus est major eo promptior communicatio. Constat ergo quod ea corpora, quæ majorem habent superficiem cum eodem pondere, citius calorem & frigus immutent & tradant ambientibus, quam quorum superficies est minor. Ergo ad probandam levitatem sufficit, citior communicatio caloris & frigoris, quum inde constet idem pondus in duobus diversis corporibus non habere eandem superficiem, & cujus superficies est major istud corpus dicitur levius. Ad usum medicum laudatur aquæ levitas, non quod talis aqua semper sit saluberrima, sed ut plurimum, quoniam aqua semel vel bis destillata est levissima & tamen insalubris, & possunt putrefactæ exhalationes aquæ mistæ esse,

Quanam aqua sit levissima.

quæ tamen non augent aquæ pondus specificum: sed quando aqua specificè redditur gravior ut plurimum continet sales vel partes metallicas solutas, quæ aquam usui humano insalubrem faciunt.

LIB. V. APH. XXVII.

220. **Q**uibus autem bibendi appetentia noctu, iis valde sitientibus, si obdormiverint, bonum.

I.

Unde sitis
nocturna.

Multi homines noctu sitiunt ex mala consuetudine; alii vero quia largiore coena, præprimis alimentorum salitorum vel aromaticorum, usi fuere, aut largius biberunt, quod Græcis erat in frequenti usu; denique quidam ex quodam latente morbo aliquo chronico, omni noctu sitiunt: nam si quis morbo acuto laborat non solum noctu sed etiam de die sitit. Ex his speciebus conicio Auctorem solummodo eam intelligere, quæ oritur ex quodam morbo chronico latente, nam si aliquis morbo manifesto laborasset, eum simul morbum nominasset. Neque perfectam sanitatem intelligit, quoniam isti noctu non sitiunt nisi ex errore commisso in diæta, quæ sitis nec bonum nec malum indicat, quum noctibus sequentibus non continetur. Operæ pretium ergo erit rimari morbum, qui sitim nocturnam facit. Hodie observamus homines cruditate humorum laborantes ex defectu virium, quæ materia cruda aliquo modo vergit in corruptelam, noctu sitire, quando nempe id corruptum ad os delatum sensum sitis infert, quæ tamen sitis non est placanda largiore potu, ut fieri debet si quis sitiat ex humidi defectu.

Quando sitis per somnum optime sedatur.

II. Si quis concipit præcedentem morbum, in quo vix videntur ægrotare, intellectu facilis est hujus Aphorismi sensus. Nam qui noctu valde sitiunt ex hac causa signum est, tunc maxime prædominare corruptum crudum ex defectu

fectu virium natum. Quod si tunc illi multum bibunt noctu, magis onerabunt corpus inutili copia aquæ, & ita morbi causam potius augent opprimendo vires. Si autem superdormierint bonum est, quia tunc non oneratur corpus multitudine ingesti, & vires recuperantur per somnum. Interim continuata coctione in somno subigitur & emendatur id crudum, disponiturque ad insensibilem perspirationem, qua dein diffatur. Hæc ergo observatio utilissima est valetudinariis noctu multum sitientibus, ut se, quantum ferre possint, abstineant a potatione nocturna. Hanc malam consuetudinem, non ignoro, multos alios abrogare ex omnino alio principio, quod judicarent ab ingesto novo potu turbari coctionem, sed quoniam ea sententia passim a nobis est refutata, coctionem in nobis non fieri ut in lebece ab igne supposito, non erit opus hanc rem repetere.

. LIB. V. APH. XXVIII.

221. **S**uffitus aromatum muliebria ducit. Sæpius autem ad alia utilis esset, nisi capitis gravitates induceret.

I.

Quod ex rebus exhalat, aëri permiscetur & ita applicatur naribus aliisque partibus corporis, id vocatur suffitus: quædam ex his sponte talem suffitum præbent, ut omnia odora & olentia; alia autem igni injecta tantum suffitum præbent, vel gratum vel foetidum, uti mastix, succinum, myrrham &c. Hodie vero adjecto sale volatili, vel quædam cum alcohole destillata, quæ aliter vix essent odora, pro suffitu inserviunt. Quia autem Hipp: mentionem facit de suffitu aromatum videtur intelligere omnia aromata, quæ tunc temporis erant in usu, quorum in loco surrogari possunt hodierna quoque omnia
Aroma-

Suffitus aromatum muliebria ducit.

Aromata, quæ collecta inveniuntur in Libro filii nostri *Davidis de Gorter de Materia Medica*. Quæ vel sponte, vel igni injecta fumum exhalant aromaticum. Ita Caryophyllus, Cinamomum, Rosmarinus, Majorana sponte vel aquæ ebullienti injecta, suffitum præbent. Alia vero prunis ardentibus injecta uti myrrha, mastix, succinum, olibanum, benzoin & multa alia exhalant fumum aromaticum. Hæc nunc Muliebria ducunt, id est menses vel lochia suppressa provocant, & quæ in utero continentur ejiciunt. Quidam dubitant num naribus vel pudendis adhibenda sint. Litem de his non movebo, ego sentio hoc in loco intelligi debere suffitum applicatum pudendis, vel directione infundibili in pudenda immissum. De omnibus aromaticis constat corpori nostro applicatis facere calorem & motum majorem oromata tali in parte. Quod si itaque ope suffitus applicantur aromata pudendis mulierum, his quoque majorem motum facere. Quoties vero in fibris uteri motus major generatur, uterus quæcumque in se continet ejicit. Propterea sanguis in uteri cavo conclusus vel & alia aliena in utero contenta ejiciuntur. Si vero menstruus sanguis in uteri vasis contentus, propter languidiorem in utero motum subsistat, quod sæpe fit in menstruis suppressis, hoc suffitu commotis fibris uteri, ille sanguis expelletur. Ex eadem ratione Veteres toties indiderunt pessaria acria aromatica ad provocandos menses. Quoniam ille Suffitus vel potest esse ficcus vel humidus, cum judicio hoc vel istud est eligendum: nam si pudenda in muliebribus contentis simul calecant & sicca sunt, eligendus est suffitus humidus & tunc melius erit vaporem mollem & humidum applicare quam aromaticum. Si vero pudenda sunt frigidiora & humidiora, quod sæpe fit in mensibus suppressis, magis conducit suffitum ficcum & aromaticum applicare. Quoniam hi Suffitus sine discrimine omnia muliebria ducunt, cavendus est ejus usus in gravidis, ob periculum abortus.

Et ad alia
sapientius est u-
tilis, nisi
capitis gra-
vitates in-
duceret.

II. Ut ampliorem usum hujus Suffitus aromatum traderet, addit ad alia quoque utilem esse, cum hac cautela interdum simul inducere Capitis gravitatem. Ex qua adjuncta

Et cautela patet Auctorem hic velle innuere vaporem vel fumum aromaticum exhalantem interdum hauriri naribus, ad multos morbos capitis, sed in usu horum debet selectus fieri aromatum, & etiam idiosyncrasia ægri vel ægræ est observanda, quoniam quidam suffitus aromatici simul inferant capitis gravitates: atque quibusdam in hominibus unum aroma infert capiti molestiam, quod alteri adfert levamen, quod discrimen non ita observatur si suffitus adhibetur pudendis. Quippe suffitus membranæ pituitariæ applicatus, suo stimulo allicit humores & encephalum in consensum trahit, sed humores hic alliciti non ita possunt per hanc viam evacuari, quemadmodum ex utero, cujus orificium aperiri potest: unde interdum fit, ob allicitos humores versus encephalum, non potentes evacuari, quod caput ita multitudine humorum onustum, aggravetur. Hodie vero loco horum frequentius adhibentur sales volatiles & aromata in spirituosiss soluta.

LIB. V. APH. XXIX.

222. **P**Rægnantes purgandæ, si turgeat materia, quadrimestres, & usque ad septimum mensem: hæc vero minus. Juniores autem & seniores fœtus, caute vitare oportet.

I.

Idem aphorismus habetur (Aph. III.) Sed ibi adducebatur scopo purgandi, hic vero, quia Auctoris scopus est agere de morbis & curatione gravidarum, hæc repetitio ejusdem sententiæ tolerari potest. Sed propterea non erit opus repetere expositionem nostram allegato loco traditam.

LIB. V. APH. xxx.

223. **M**ulierem in utero gerentem ab acuto aliquo morbo corripi, lethale.

I.

Cur lethale
gravidam
acuto mor-
bo corripi.

Quænam dicantur prægnantes seu in utero gerentes, superius exposuimus (*Aph. III, II.*) Et definitionem morbi Acuti dedimus (in *Comp. T. 53. XLVII.*) ubi præprimis intelleximus Morbos acutos febriles periculosos & minus periculosos. Galenus autem & alii ad hunc titulum etiam conferunt morbos sine febre, uti Apoplexiam, Epilepsiam, Convulsionem. Inde variæ species morborum acutorum sunt, uti vehementes, febriles, essentielles & symptomatice, quæ ex Inflammatione vel Erysipellate particulari nascuntur; hæ omnes in hoc loco intelliguntur. Febres autem mitiores ut ephemera & quædam ex intermittentibus, ad hanc prognosin referri nequeunt, quoniam satis commode sæpe a gravidis tolerantur. At Acuti Morbi sine febre, qui nimiam constrictionem faciunt, uti Epilepsia & Convulsio, vel cum motus extinctione, uti Apoplexia & Animi deliquium, nisi sint vehementes, non lethales sunt pronunciandi. Hæc prognosis, ut sit certa & perspicua, exigit causarum expositionem, quæ vel matri vel foetui sunt exitiales. Febres acutæ essentielles & symptomatice validissimam habent circulationem per omnes arterias, & etiam per arterias uteri, quæ sanguinem tradunt principiis venarum in placenta. Hæ autem venæ duntaxat arteriis uteri sunt contiguæ, & non cum iis concretæ, unde facile fieri possit per eam vehementem circulationem, ut placenta venæ a contactu eo depellantur, post quarum separationem foetus a matre nihil amplius accipere potest; ita foetus privatus communione cum matre necessario moritur. Quasi hæc assignata causa non sufficeret, alia simul nascitur foetum

fœtum exstinguens, nempe tanta fit humorum & sanguinis matris inversio per motum febrilem, ut sæpe ineptus redatur ad nutriendum fœtum. Inde rarum est, si gravida femina corripiatur febre acuta, ut non tandem abortiat. Ceteræ species etiam non carent periculo, nam vehemens musculorum & etiam partium internarum convulsio ita interdum constringit ventrem vel forsan ipsum uterum, ut vel fœtus vi excludatur, vel placenta separetur ab utero, & dein sequatur abortus. Si vero in apoplexia vel syncope omnis motus exstinguatur, dimitti potest placentæ cohæsiō, quæ restitui nequit, dum femina ad se redit. Hæc autem species minus est lethalis, quam morbus acutus febrilis, quum observetur in praxi, feminas gravidas sæpe pati animi deliquia & tamen fœtum sanum legitimo tempore parere.

LIB. V. APH. XXXI.

224. **M**ulier in utero gerens sectâ venâ abortit: & magis si major fuerit fœtus.

I.

NOs non solum in vestitu sed etiam in methodo mendendi alias gentes imitamur, non attendentes num sit ex ratione, vel malum vel bonum sortiatur effectum; nam postquam in Gallia invaluerat mittendi sanguinis consuetudo in gravidis ad præveniendum abortum, nos quoque in regione frigidiorē degentes, earum gentium mores secuti sumus, adeo quidem, ut vix habeatur mulier gravida, quin curet sibi bis terve venam tundi, quo prædicant faciliorem futurum partum, & multa alia bona. Quædam autem prudentiores suum consulunt Medicum domesticum vel Chirurgum vel Pharmacopolam. Hi prout magis minusque addicti sunt phlebotomiæ, vel suadent vel dissuadent sine ullo discrimine in quavis femina gravida venam esse secandam: ut ad hoc usque tempus admodum fluctuet

Cur gravida
abortit a ve-
næ sectio-
ne.

quid sit agendum. Qui imperant venam secandam esse, dicunt sanguinem menstruum gestationis tempore retentum venæ sectione minuendum esse ne officiat. Alii autem contendunt foetus nutrimentum detrahi & ita necari. Et ita incerta redditur praxis. Si consulamus nostrum Auctorem satis patet, eum omnem venæ sectionem interdicare. Antequam autem ejus sententiam perpendamus, præmonendum est, veteres ad heminam seu uncias decem duxisse sanguinem. Si ergo quis rogaret an foeminæ gravidæ vena est secanda, tunc omnino vetarem omnem sanguinis missionem. Sed si quæritur an non conduceret sanguinem mittere ad quatuor vel quinque uncias ut hodie fit, absolute non potest negari vel concedi. Nam si femina non gravida copiosos solet evacuare menses, dum gravida fit, quoniam foetus tenellus tantam copiam in incrementum sui non possit convertere, ex abundantia relicta fieri potest abortus depulsa placenta: sed quæ parcius purgantur, quoniam nullus est abundantiae timor, his per venæ sectionem generatur defectus, & ita penuria alimenti abortit. Propterea priusquam prudens Medicus concedat Phlebotomiam, ipsi constare debet tali in femina tantam esse sanguinis abundantiam, quæ placentam ab utero depellere potuisset. Sed in his non acquiescunt sciscitantes, si vena secetur, quærent, num venæ superiores vel inferiores sint secandæ. Neque in hoc consentiunt Auctores, maxima tamen pars suadebit sectionem superiorum venarum, quam contendunt abortum impedire. Alii autem dicunt post factam venæ sectionem æqualiter totam massam esse minutam, & propterea sine discrimine quamcumque venam aperiri posse. Contra hos autem inferre possumus, quia tempore venæ sectionis aliquod est discrimen, satius erit eam eligere venam, quæ hoc tempore omnium minimam mutationem inducit, id est si fieri debet sanguinis missio, melius erit superiores quam inferiores venas aperire.

Cur magis
abortit si
grandior e-
rit foetus.

II. Sanguinis missionis ratio erat, minuere sanguinis quantitatem, ne abundantia depelleret placentam. Si igitur tenellus foetus, qui parum nutrimenti capiebat, valuit persistere,

stere, sane nullus timor amplius superest foetum grandio-
rem, qui plus nutrimenti capit, depulsum iri ab utero per
sanguinis abundantiam. Satis itaque mirari nequeo quam-
obrem ita illa mala consuetudo invaluerit mittendi sanguinem
instante partu, quum in partu ipso per lochia fluentia satis
copiosa sit expectanda sanguinis evacuatio. Si ullum sit
tempus, in quo esset sanguinis missio vitanda, sane istud erit
in quo inevitabilis sanguinis evacuatio sit expectanda, ut sit
in partu. Inde his temporibus summa observatur puerperarum
debilitas & pallor. Contendunt tamen sanguinis missione
faciliorem fieri partum. Sed si in praxi perpendo discrimen
inter istas, quibus vena est secta, & in quibus omissa, fa-
teor me observasse feminas, quarum vena non fuit secta,
regulariter facilius paruisse, quam quæ passæ fuere sanguinis
missionem.

LIB. V. APH. XXXII.

225. **M**ulieris sanguinem evomenti, menstruis erumpen-
tibus, solutio fit.

I.

Feminis ætate maturis, nec lactantibus, nec gravidis, singulis mensibus per pudenda evacuatur quædam san-
guinis quantitas, qua evacuatione restituitur æquilibri-
um inter sanguinis copiam & actiones moventes, unde e-
vacuatio hæc vocatur menstruatio, menses, & catamenia,
quæ est ergo evacuatio naturalis (Aph. 3, v.) Si vero
præter solitum istud tempus hac via non emittitur in re-
censita femina sanguis, talis mensium suppressione laborat:
& quando deinceps sponte emittitur sanguis, mensium erup-
tio proprie vocatur. Quare mensium eruptio designat ante-
cessisse Catameniorum suppressionem ex morbosa causa. Quan-
do igitur accumulata fuit in corpore abundantia, quæ ad a-
liquam partem ferebatur majore impetu, his erumpentibus
tollitur abundantia & reducitur impetus ad partem aliam.

Mensium e-
ruptio quid
notet.

Quid notet
vomitum
cruentum.

II. Non omnis sanguinis rejectio per os Vomitus Cruentus vocari debet, quum in prognosi & curatione multum differat, num sanguis veniat ex faucibus, pulmonibus, & ipso ventriculo. Qui sanguis in cavo ventriculi collectus fuit, nauseam creans & dein vomitum, proprie Vomitus Cruentus appellari meretur, isque sanguis sæpe est grumofus, quum ante ejectionem concrefcere potuit in ventriculo, & habet permista reliqua ventriculi contenta, ut ita a congeneribus facile distinguatur.

Cur mulie-
ri sanguini
vo nenti,
menstruis
erumpenti-
bus, solutio
fit.

III. Ex præmissis his, facile erit concludere hanc observationem practicam ratione fundatam esse, atque interdum naturam aliquam evacuationem suppressione alia evacuatione. Quippe femina tempore suppressionis mensium si inciderit in vomitum cruentum, non facile liberabitur ab eo morbo manentibus suppressis mensibus, quum feminarum corpora naturaliter generent majorem sanguinis abundantiam, quæ renovabit vomitum cruentum. Si vero tali in femina menses erumpunt, duo simul fiunt, quæ compescent vomitum cruentum; fit enim per menses non solum ablatio quantitatis sanguinis, qui ventriculi vasa dilatabat; verum etiam directio impetus avertitur a ventriculo ad uterum, quo minus ventriculi vasa distenduntur. Eodem etiam modo, sed minus secure per aliam hæmorrhagiam & venæ sectionem sisteretur vomitus cruentus; quia vero sanguinis missio simul non habet signum directionis ad aliam partem, tam certe non compesceret Vomitus cruentum: neque venæ sectio, neque quævis alia hæmorrhagia tam certe promitterent menstruationem in ordinem redituram, quam promittitur erumpentibus mensibus, sine quibus femina matura, neque gravida, neque lactans, vivere nequit sana. Ergo non solum solutio fit vomitus cruenti, sed promittit quoque integram sanitatem, quam non tam secure ex aliis evacuationibus sanguinis possumus promittere. Hoc bonum observavit Auctor ex mensibus erumpentibus in vomitu cruento, & ulterius non concludit, quum sit mera simplex practica observatio: sed si, perpendatur causa solutionis, hæc regula ad alias quoque

que sanguinis evacuationes referri potest, & præprimis ad hæmoptysin, quæ omnium periculosissima censetur: propterea in feminis hæmoptoicis, ex mensibus erumpentibus, sanitatem promissi & multo minus periculum quam in viris, qui hac naturali evacuatione carent. Dum ita in his natura nobis optimam demonstrat viam, medicus naturæ minister, hanc demonstratam viam debet calcare, & potius per emmenagoga tempore menstruationis conari in his feminis reserare menses, quam per iteratam venæ sectionem temperare vomitum cruentum, & simul suppressere menses.

LIB. V. A P H. XXXIII.

226. **M**ulier, menstruis deficientibus, e naribus sanguinem fluere, bonum.

I.

Menses ex tribus his diversis causis deficiunt. (1) Ex quibus causis menses deficient. Si femina ætatis maturæ ob morbum aliquem non fundit statò tempore sanguinem, talis defectus ut plurimum vocatur mensium suppressio. (2) Si talis maturæ femina reddatur gravida vel lactans, in quo casu non eget alia succenturiata evacuatione sanguinis, (Aph. 224). (3) Denique increfcente ætate tandem deficiunt menses, quando nullis auxiliis sunt promovendi, quum post istud tempus ætatis si menses pergunt fluere non amplius vocatur menstruatio, sed hæmorrhagia uteri, inter morbos recensenda: adeo ut eadem evacuatio, quæ ante istud tempus ætatis salubris erat, & summum erat signum sanitatis, nunc vero post hanc ætatem, habeatur inter morbos.

II. Si rimamur has tres causas, facile erit judicare qualisnam mensium defectus sit intelligendus. Nam quibus menses deficiunt ex causa morbosa, modo simul adsit sanguinis In quibus mensibus deficientibus hæmorrhagia, videntur.

guinis abundantia, nam cum sanguinis defectu semper noceret hæmorrhagia, his levamen fit si sanguis e naribus fluit, quum fluxus tollat illam abundantiam: an vero talis hæmorrhagia bona sit dicenda vehementer dubito. Præfens quidem adfert levamen, sed eo obstinatiores suppressionem faciet, ut quæ feminæ sæpe patiuntur hæmorrhagiam narium, vel quæ curant sibi pertundi venam ut minuant symptomata ex sanguinis suppressione nata, in posterum vix unquam ad ordinatum menstruorum fluxum redeunt, sine quo vix ulla femina matura sana vivit: quare hæc ad evitandam præsentem molestiam se in majus malum præcipitant. Videtur inde patere sanguinem menstruum pejorem esse reliquo sanguine, cum ejus evacuatione maneant sanæ, sed fiunt valetudinariæ per quamcumque aliam sanguinis evacuationem. Ego vero puto differentię hujus causam non consistere in majori vel minori sanguinis bonitate, quum demonstratum sit, sanguinem menstruum æque sanum esse, quam qui aliunde educatur, & tenellum fœtum ex hoc præcipue sanguine nutrimentum & incrementum capere; sed quod omnes naturales evacuationes non patiantur integre supprimi sine ullo damno, etiam si aliqua artificialis vel nonnaturalis succenturiata evacuatio habeatur. Altera causa ex graviditate vel lactatione suppressens menses si faciat hæmorrhagiam, semper damnum infert. Propterea concipiendum est Hippocratem in hoc Aphorismo intellexisse subsistentes menses ex ætate. Quæ observatio hoc etiam tempore vera est, cui feminæ enim ex ætate subsistunt menses, huic, nisi alia fiat sanguinis evacuatio vel naturalis vel artificialis, multi generantur morbi, quum natura consueta per tam longum tempus huic evacuationi, non patitur statim supprimi. Verum non perinde est per quamcumque viam natura exitum quærit, nam si faciat vel per vomitum vel hæmoptysin, ex ratione harum partium, succenturiatam evacuationem, novos morbos generaret ex læsis organis. Sed quia hæmorrhagia narium talem læsionem non adfert, bonum dici potest, ut aliquoties experti sumus. Ratio autem cur bona censeatur

seatur illa hæmorrhagia est, quod suppleat defectum sine subsequente læsione, ergo naturam possumus æmulari instituendo venæ sectionem, quam alternis mensibus & dein rarius instituere possumus.

LIB. V. APH. XXXIV.

227. **M**ulier in utero gerenti si alvus multum fluxerit, periculum ne abortiat.

I.

Alvus multum fluit, si deponantur plura per anum, & per longius tempus, quam judicare possumus supeditari posse ab alimentis assumptis: interdum enim accidit, ut quædam recrementa collecta in intestino colo, uno die ejecta multum superent copiam ingestorum, sed talis evacuatio etiam in femina gravida salubris est, quæ liberat corpus ab inutili sarcina; hæc exoneratio non dicitur alvus multum fluere; sed si præter recrementa alimentorum & humorum eo confluentum, & sine prægressa accumulatione, alvus per longum tempus multum egerit, tunc censetur multum fluere. Ergo in tali fluxu non solum rejiciuntur inutilia, sed etiam humores utiles, vel qui inserviissent præparationi vel nutritioni. Ita ergo privatur corpus mulieris gravidæ utili suo humore, & inde redditur ineptius ad nutriendum fœtum, ut monuimus in venæ sectione. (Aph. 224, 1.) Ex hac non solum causa abortire potest detractio nutritio, verum etiam quoniam intestinum rectum utero adjacet, quod in tali alvi fluxu continuo instigatur ad egerendum, uterus per consensum non raro quoque disponitur ad elidendum id quod concepit, seu disponitur ad abortum faciendum. Quoniam duæ illæ causæ disponunt ad Abortum, mirum est inde non frequentius fieri Abortum. Monemur itaque nos non debere sine summa necessitate dare purgans mulieri gravidæ,

Alvi fluxus in gravidis cur periculum abortus infert?

quibus frequens est alvus adstricta; sed si necessitas ducendi alvum in gravidis urget, solummodo alvum laxantia sunt propinanda, & tam parva dosi, sed tamen iteratis vicibus, ut duntaxat semel aut bis ex medicamento usu alvum deponant.

LIB. V. APH. xxxv.

228. **M**ulier ab hysterica passione vexatae, aut difficulter parienti, sternutatio superveniens, bonum.

I.

Hysterica
quid noiet.

Quum ipse Galenus optimus Hippocratis interpres fateatur obscuritatem esse in vocabulo *ὑστερικῶν*, num denotet suffocationem uterinam, num uteri contenta post partum, num omnes morbos uteri, non est mirum quod firma doctrina adstrui non possit, Sternutationem prodesse vel nocere. Concedendum est Literatoribus hoc vocabulum frequentissime significare Passionem Hystericam, unde medici & ipse Galenus multis verbis conantur adstruere, sternutationem prodesse hystericis. Si autem sensum Aphorismi inspicimus, multo magis conveniret per Hystericum in hoc loco intelligere secundinas retentas: nam si uterus non valet expellere fœtum vel secundinas, bonum erit si sternutatio superveniat. Sed hysterica passio nihil commune habet cum partu. Quia vero noster scopus est usum medicum quærere ex sententiis Hippocratis, non vero emendare lectionem, videbimus num sternutatio sit bona in Hysterica passione, secundinis retentis, & partu difficili.

Sternutatio
in hysterica
passione.

II. Nullum invenio in tota praxi morbum difficilius definiendum quam eum, quem solent vocare Passionem Hystericam. Qui enim hunc morbum ex sua causa definire fatagunt

gent, contendunt semen muliebre corruptum esse, & suos halitus sursum pellere ad fauces. Alii vero ipsum uterum accusant, quem putant adscendere ad fauces. Quia vero etiam ille morbus ante maturam ætatem observatur, in vi-
etis, mensium profluvio laborantibus, & in gravidis, imo etiam in virili sexu, & quoniam anatomica dissectio ad oculum demonstrat uterum adscendere non posse, patet clarissime hanc definitionem nullo modo determinare & exprimere Passionem Hystericam: neque tiro Medicus inscius ex definitione data, valeret sibi formare morbi ideam. Qui vero ad faciliorem intellectum ex phænomenis visibilibus definiunt Passionem Hystericam, putant sufficere per interceptam respirationem hunc morbum cognitum facere, vel tam multa congerunt phænomena aliis quoque morbis communia, ut vel exercitatus medicus vix perspicere valeat, quænam sint characteristica signa passionis hystericæ, & quia hystericum nomen adest, quod solis mulieribus est proprium, incerti hærent si similia phænomena etiam observantur in masculino sexu, inde coacti fuere eundem morbum in viris alio nomine appellare, propterea eum vocarunt suffocationem hypochondriacam: sed quoniam animis alte insidit opinio hunc morbum nasci ex semine corrupto, iterum nova nascitur difficultas, nuptos æque quam innuptos hoc morbo tentari, & præcipue istos, qui seminis profluvio laborant vel venere abutuntur. Ut igitur in posterum constet, qualisnam morbus in utroque sexu vocetur Passio Hystérica, repudianda est omnis analogia vocis & falsa præconcepta opinio, & tradendus est aliquis morbis suis characteristicis signis definiendus, quem aptius vocare potuissemus Suffocationem Convulsivam, quoniam species est convulsionis, quæ tandem frequentissime suffocationem inducit. In utroque sexu si in ventre inferiore sentiatur involuntaria commotio convulsiva, quæ sensim sursum vergit, in multis ac si globus adscenderet, & dein ad fauces veniens ita constringit fauces, ut impediatur deglutitio & suffocetur respiratio, hæc conjuncta phænomena vocant Passionem Hystericam: in graviore malo fauces in quendam tumorem elevantur, &

inde compressis venis jugularibus tota sæpe facies livet. In leviori malo mens manet constans, & membra non moventur convulsive. Verum in graviore malo, ipsa actio mentis exstinguitur, atque vel cadunt simul in animi deliquium, vel convelluntur membra uti in epilepsia, interdum vero mens manet constans, dum tamen membra variis modis convulsione agitantur. Accedentia illa igitur symptomata duntaxat magnitudinem passionis hystericæ denuntiant. Ex his phænomenis nullo modo patet uterum esse affectum, & hoc etiam cadaverum inspectio confirmat, quoniam in hystericis passionibus suffocatis & mortuis uterus fuit inventus insons, & æque sanus quam aliis sanissimis feminis, sed phænomena docent Convulsione incipere in mesenterio & intestinis, propagari per ventriculum & œsophagum ad Pharyngem, cujus muscoli una cum musculis Laryngis tetanica constrictione contrahuntur: quod si illa convulsio tandem communicatur meningibus, exstinguitur mentis actio, ita comprimitur cerebellum ut non emittat spiritus ad actionem cordis & respirationis; vel si motus ille magis est inordinatus, membra externa convulsione epileptica exagitat. In tali nunc suffocatione hystERICA nunquam in tota mea praxi potui observare sternutationem profuisse, neque video quid boni adferret. Propterea malo credere in hoc loco intelligendas esse secundinas retentas.

Sternutatio
in secundinis
retentis
bonum.

III. Dum formatur in utero fœtus, quasdam dedit Deus partes auxiliatrices seu intermediarias inter matrem & fœtum, quarum ope inter hæc duo viventia corpora communis habetur vita, ea lege ut tamen mater sine his vivere possit, sed fœtus ante perfectionem si iis privetur, aut si partes auxiliatrices non communicent matri, fœtus necessario moritur, ut constat ex abortu, antequam fœtus in suis organis est perfectus. Si vero fœtus tandem organa perfecta acquisivit, quod raro fit ante septimum mensem a conceptu, patitur illam separationem & suam propriam vitam agere potest, eo tamen debiliorem quo est conceptui propior, unde cadit falsa opinio fœtum octo mensium debiliorem esse quam septem mensium, quum debilitas dependeat.

deat a minus perfectis organis ante exclusionem, quæ octavo mense perfectiora sunt quam mense septimo. An vero hæ partes auxiliatrices quoque vitales sint vel mortuæ, nullam apud auctores invenio mentionem. Si vero perpendimus impedimenta circulationis a matre per placentam, funiculum umbilicalem intortum longissimum ad fœtum, atque vicissim ex fœtu debilissimo per easdem partes ad matrem, fateor me concipere non posse sine vitali actione propellente sanguinem in his partibus, fieri posse communem circulationem: sed si concedimus his partibus actionem vitalem, quam Deus noluit ultra novem menses durare in generatione hominis, egregie & clarissime multa obscurissima in generationis negotio explicari possunt. Cur nempe fœtus cogatur nono mense in lucem prodire? Cur mola formari possit, si in principio imprægnationis moriatur embryon? & multa alia, quæ non sunt hujus loci exponere, sed indicare volui multa obscura ex doctrina hac lucem mutare posse. Si igitur contingat, ut Secundæ hæ maneat in utero post partum, adstruit Auctor bonum esse si superveniat sternutatio. Hæ secundæ vel sunt partes firmæ uti placenta, membranæ & funiculus umbilicalis, quæ partes proprie dicuntur secundæ; vel sunt humores nempe sanguis qui fluit ex lateribus uteri & ex abrupta placenta, qui sanguis Lochiorum nomine venit. Forfan Hipp: ad partes non solum firmas, sed & sanguinem retentum significandum, dixit *ὑσπερικῶν*, in quo casu salutare est si superveniat sternutatio: nam si cuncta hæc post partum retinentur, signum est orificium uteri esse clausum, quod ut aperiretur, sternutatio violenter contrahens ventris musculos multum valere potest, quoniam talis puerpera ex voluntate non valeat tantam ventris constrictionem facere, ut fit in sternutamento, quæ aperiret orificium uteri clausum.

IV. Qui existimaret in omni Partu difficiliore conducere sternutamentum, & inde vellet adhiberi sternutatoria ad facilitandum partum, multa damna inferret sua præpostera medela; nam si ob situm alienum fœtus difficile parit mater, a concussionem sternutationis majus induceretur impedimentum, truderetur

Sternutatio in partu difficili, bonum.

deretur enim fœtus in tantas angustias, ex quibus postea nulla manuum ope extricari potuisset. Sed si fœtus legitimo modo fuerit locatus, & propterea non parit, quod conamina parturiendi non sufficiant ad dilatandum uteri orificium & elidendum fœtum, sternutatio superveniens, majori conamine contrahens abdominis musculos valuit in quibusdam parturientibus extrudere fœtum. Tali etiam in casu conducere sternutatorium admoveere naribus.

LIB. V. APH. XXXVI.

229. **M**ulier menses decolores, nec eodem semper modo, & tempore prœdeuntes, purgationem indicant esse necessariam.

I.

Menses decolores qui nam dicantur.

IN omni sanguine sano est color ruber, qui post concretionem & exsiccationem magis in nigredinem vergit, simulque inest prompta concretio dum stagnat; quotiescunque minuitur in sanguine rubedo, simul amittit aliquomodo eam potentiam concrescendi. Hanc rubedinem acquirit satis valida vitæ actione; quare omnibus in debilibus sanguis minus ruber est & pallescens. Si hujusmodi sanguis evacuetur per pudenda in femina matura, fluxum illum menses decolores vocant, quando statis temporibus redit & iterum cessat. Si autem fere continuo stillat liquor albicans, ille morbus vocatur fluor albus. Constat ex dictis menses decolores arguere actionem vitæ debiliorem, & præsentiam cachymiae.

Menses inordinati.

II. Menses ratione temporis quo fluunt, & ratione quantitatis possunt fieri inordinati. Regularis fluxus est singulis mensibus, quando per unum, duos tresve dies sanguis ille evacuetur ad certam quantitatem, non omnibus feminis æqualem. Si vero idem tempus periodi servant, sive sit lon-

longius five fit brevius, & si istis temporibus æqualis fere copia emittatur, menses dicuntur regulares: sed qui vel in tempore vel in quantitate variant, inordinati vocantur. Ita fiunt inordinati ob aliquam morbosam causam, plerumque ex cacochymia, quæ ex debilitate virium nascitur.

III. Conjunxit duo signa mensium, ut inde formaret indicationem ducendi alvum ea ratione, quoniam unum ex his potuisset ex variis causis nasci, quæ omnes non exigèrent purgationem: ita in hystericis sæpe fiunt menses inordinati qui tamen non egent purgatione. Sed quando decolores sunt & in tempore atque copia simul variant, pro certo accipi potest cacochymiam simul esse in primis viis, quæ sui eliminatione eget. Itaque magis ut signum purgationis tales censentur menses, quam quod ipsi menses decolores curarentur purgantibus. Quippe sanguis pallidior non recuperat colorem per purgans, neque purgans valet errantes menses redigere in ordinem. Sed quoniam horum causa est cacochymia, purgans requiritur ad eliminandam illam. Non tamen præciperem aliquoties ducere alvum, majorem enim induceret debilitatem, sed postquam corpus a caco-chymia est liberatum, satius erit corporis vires firmare roborantibus, ne nova generetur cacochymia, quæ mensium ordinem turbat, & pallidiorem producit sanguinem.

Cur menses
decolores
& inordi-
nati purga-
tionem in-
dicant.

LIB. V. APH. xxxvii.

230. **M**ulier in utero gerenti, si mammae ex impro-
viso graciles fiant, abortit.

I.

Inter multas corporis partes mirabilem esse Consensum, quem non possumus ex legibus mechanicis deducere. passim (*Aph.* 125, III. 126, III. & 127, IV.) indicavimus. Sed maximus & mirabilis Consensus observatur inter Mam-
mas

Consensus
inter mam-
mas & ute-
rum.

mas & Uterum, etiamsi partes eæ admodum distent. Facile concipitur cur inter lumbos, intestinum rectum & vesicam, propter nexum membranarum, Consensus habetur cum Utero, verum quoniam inter mammæ & uterum non inveniunt talem membranarum nexum, multis medicis magnam difficultatem paruit mediam partem Consensum facientem invenire. Galenus posuit venas, hodierni assignant arterias. Fateor, nisi frequentissime in gravidis, lactantibus & morbis uteri & mammarum fuisset detectus Consensus, nemo anatomicorum & physiologicorum, ex inventa fabrica, & experimentis hydraulicis vel mechanicis unquam detexisset hunc mirabilem Consensum: sed post eum detectum quæsi-
verunt id quod Consensum faceret. Hinc forsan neoterici auctoritate Galeni & aliorum ducti substituerunt arterias loco venarum, quæ Consensum facerent. Sed si per experimenta in viventibus tentemus inter arterias ab eodem trunco venientes rimari Consensum, eum nullibi talem invenimus, nam ex affecta arteria unius manus altera non consentit, neque consensus inter arterias utriusque pedis detegitur, etiamsi major sit communis origo inter istas arterias, quam quæ detegitur inter arterias uterinas & mammarias. Quare mihi verisimile videtur, arterias magis excogitatas esse ad Consensum explicandum ut aliquid dicerent, quam quod sit vera animi sententia eorum, qui hanc promulgarunt sententiam, cum nemo fuerit, qui inter fauces titillatas & musculos abdominis vomitum facientes, vel qui inter membranam internam narium titillatam & musculos respirationis sternutamentum facientes, ausus fuit eum Consensum ex anastomosibus vel ramificationibus arteriarum deducere. Quare fateri debemus latitare aliquod arcanum, quod Deus locavit inter quasdam nostri corporis viventis actiones. Et quoniam uterus & mammæ in eandem rem perficiendam tendunt, nempe ad generationem & nutritionem prolis, non est mirandum inter functiones has majorem esse societatem quam inter reliquas. Dum enim matura redditur virgo, quando ovaria incipiunt formare ova imprægnationi apta, mammæ quoque fororiant. Et dum
mulier

mulier facta est gravida, sensim cum increfcente fœtu, tument non solum mammæ, sed lac stillare incipiunt, ut post partum promptum sit organum, quod infanti lac præbere potest. Hoc observatu est mirabile, quod tempore eo non mutetur mammarum structura aut cursus vasorum, sed quod solummodo earum actio mutetur, quæ mammæ aliter nunquam præbuissent lac, nunc vero ex sua actione mutata satis copiosum lac conficiant & emittant. Sed si hanc mutationem actionis conferamus cum reliquis actionibus generationis, nihil arcani involvit. Nam ante maturitatem tam in viris quam mulieribus organa genitalia eandem habent fabricam, sed graciliorem, sensim vero ad maturitatem accedentia, redduntur majora, turgidiora, & generant semen & ova prolifica: tandem vero in vietis, licet structura organorum non mutetur, hæ tamen partes sensim exarescunt & generatur naturalis sterilitas. Idem quoque statuendum mihi videtur inter Mammæ & Uterum, dum enim uterus fœtu est prægnans, sensim roborari actionem Mammarum, ut requisito tempore in se conficiant lac proli præbendum. Si quis autem quærit quas partes intermedias assignarem hunc Consensum facientes, nullam huic negotio aptiorem agnoscerem quam nervos, quorum mirabilis consensus multis etiam in morbis observatur, ut tradidi in *Comp. T. 17. xxx ad xxxiv.*

II. Præter motum animale ex voluntate, vitalem perpetuum, & particularem in quibusdam organis, uti in ventriculo & intestinis, quædam alia motus species in nostro corpore vivente detegitur, qui solummodo ob certam causam agentem se exercet. V. G. non est in voluntate nostra constringere & dilatare oculi pupillam, vel movere lentem per ligamentum ciliare, sed hæc actio se accommodat visui, in tenebris enim etiam contra nostram voluntatem pupilla se dilatat, verum contrahitur in clariore luce. Hæc maxime in partibus genitalibus observatur, quæ ex voluntate neque rigent neque flaccescunt. Neque femina parturiens conatum parturiendi cohibere potest. Ita etiam mammæ sensim magis turgent increfcente utero. Sed si interim

Cur mam-
mæ ex in-
provisto gra-
ciles abor-
tum ræfa-
giunt.

uteri actio debilitetur, simul ob summum consensum debili-
 or fit Mammarum actio, uti post seminis ejectionem de-
 tumescunt corpora spongiosa. Si ergo mammae in gravidis
 subito gracilescent, hujus detumescentiae causa in ipsis Mam-
 mis non est quaerenda, sed in eo organo debilitato, quod
 antea valens per Consensum turgere faciebat Mammæ.
 Ergo signum est uteri actionem esse debilitatam. Quæ talis
 si fiat, vel quod fœtus in utero moriatur, vel quod placenta
 ab utero fuerit debilitata, necesse erit, ut post paucos
 dies ejiciatur fœtus, qualem abortum nullis auxiliis præve-
 nire possumus.

LIB. V. APH. XXXVIII.

231. **M**ulier in utero gerenti, si altera mamma gra-
 cilis fiat gemellas gestanti, alterutrum abortit.
 Et, siquidem dextra gracilis fiat, marem, si vero sinistra,
 fœminam.

I.

An alteru-
 ter gemel-
 lorum ne-
 queat ab-
 ortum fa-
 cere,

Veteres sectione reliquorum animalium in structura ute-
 ri admodum decepti, existimantes uterum constare
 multis cellulis, vel etiam duobus receptaculis seu cor-
 nubus, facile concipiebant alterutrum gemellorum abortiri
 posse. Postquam autem in feminis detexerant neoterici
 uterum intus unicam habere cavitatem, inter quos
 quidam fuere existimantes gemellos eadem includi membra-
 na, & communem habere placentam, negarunt abortum
 fieri posse, altero servato. Ego vero in quadam honestissi-
 ma matrona observavi abortum, quæ matrona post tres vel
 quatuor menses parturiit gemellos: quare a tribus fœti-
 bus fuit gravida, quorum unus ante legitimum tempus per
 abortum periit, duo reliqui gemelli perfecti in lucem pro-
 dierunt viventes. Ergo certum est alterutrum gemellorum
 abortiri.

aboriri posse. Sed inde non constat uterum mulierum constare multis loculis distinctis, ut in quibusdam quadrupedibus. Verum constat gemellos non habere communem placentam, neque in eadem membrana concludi. Uterus quidem unam communem habet cavitatem, sed regulariter unusquisque fœtus, si plures simul sint in utero, suam propriam habet membranam & placentam; interdum autem tali in casu placentæ illæ inter se concresecunt, in quo casu necesse est, ut eodem partu gemelli prodeant. Aliter autem qui proximus adjacet uteri orificio abortiri potest relicto altero.

II. Rarissima sunt exempla fœminam gemellis gravidam alterutrum abortire; forsân Hipp: talem vidit abortum semel aut bis, & in iis observavit Mammam dextram gracilem factam antecessisse, dum elidebatur mas, sed sinistram, dum femina. Inde forsân judicavit hoc perpetuum esse, quum ex sectione quadrupedum constabat uterum habere duo cornua. Hanc igitur sententiam posteritati reliquit, quæ magnam habens in verbis hujus Senis auctoritatem, non dubitavit eandem amplecti. Si vero ipsa experimenta consulamus, nihil certi in hac observatione detegimus; quare non amplius hoc præfagium Mammæ gracilescens inter certa prognostica tenendum. Et quamvis verum esset præfagium, nulla propterea in arte Medica utilitas, nam sive marem, sive feminam abortiat, par esset periculum, & nulla differentia medelæ.

An dextra
mamma
gracilescens
abortum
maris præ-
fagit, & vi-
cissim?

LIB. V. A P H. xxxix.

232. **S**I mulier quæ nec prægnans est, nec peperit, lac habeat, ei menstrua defecerunt.

I.

ETiamsi lac liquor sit visibilis, qui patiat experimentis examinari, & constanti lege in omnibus viviparis animalibus post partum generatur in Mammis, est

Lac quid
sit.

tamen inter Auctores Medicos magnum diffidium, quinam sit humor. Quidam enim dicunt esse chylum per ductum thoracicum ad mammas delatum: alii statuunt esse chylum cum sanguine ad mammas delatum & dein separatum: nonnulli contendunt esse sanguinem per mammas in lac conversum: denique sunt, qui Lac & Pus eundem humorem faciunt. Nos non immorabimur aliorum sententiis ponderandis & refutandis, duntaxat exagitaturi quæ vera sunt & ad scopum medicum pertinent, ex quibus demonstratis cetera facile corruent. Lac est humor admodum heterogeneus, nutritioni aptissimus, secretus & confectus in mammis & dein emissus. Neque ipse chylus est, neque sanguis, quum stagnans præbeat butyrum, & coagulatum formet caseum, quæ proprietates neque in chylo neque in sanguine observantur. Est ergo liquor particularis in animali corpore. Si autem lactis originem spectamus, proxima materia, ex qua formatur, est chylus, qui ulteriore actione corporis est elaboratus, & tandem ad mammas ductus, ad maiorem perfectionem deducitur, & a reliqua massa sanguinis segregatur, cum liquor ulterius in mammis lactantium confectus & emissus post longam inedia, dum nihil amplius restet in corpore chyli, amittat naturales lactis dotes, & infans eum liquorem abhorreat, atque quædam proprietates assumentorum, quæ actione corporis viventis non facile subiguntur & extinguuntur, in lacte etiam detegantur. Hoc specificum est in lacte, quod contineat etiam materiem nutritivam & corpori utilem, dum vero reliqui humores, qui excernuntur in sanitate sint corpori inutiles. Sed hoc mirabile est in omni humore qui generationi inservit: nam ipse sanguis menstruus, & semen virile non est humor inutilis.

Lactis generatio.

II. Omni igitur tempore & in utroque sexu præsens est Lactis materia, quum chylus in primis viis natus, in sanguinem delatus, ibi ulterius elaboratus inveniat: non tamen omni tempore & in utroque sexu invenitur lac separatum, & per mammas emissum, sed regulariter in puerperis, in quibus etiam per longum tempus ea continuatur lactis generatio & emissio. Interdum autem quibusdam puerperis
nulla

nulla sequitur Lactis confectio. Observatum quoque fuit facta frequenti mammarum suctione, sine prægresso partu, mammas lac præbuisse; imo in quibusdam viris, sed rarissima sunt exempla: verum in recens natorum mammis aliquid lacti simile sæpe invenitur, quod ab obstetricibus exprimitur, ne mamillarum durum relinqueret tumorem. Quod autem regulariter in fine gestationis & in puerperio generetur lac, id demonstrat, quod mammarum glandulæ, si ita liceat vocare mammarum fabricam, in puerperis acquirant actionem seu motum, quem antea non habuere, quo materies chylosa in communi massa sanguinis confecta, in mammis ulterius ad perfectionem deducitur, & a reliqua massa separatur. Ergo ad inquirendam lactis generationem duntaxat est assignanda causa, quæ hunc motum in mammis producit. Illa causa manifesta est, nam postquam uterus sensim major est factus & robustior, si partes auxiliatrices fœtus incipiunt mori, vel ab utero separantur, uterus non amplius valens confectum humorem tradere fœtui, mammas in consensum trahit, earumque actionem instigat, quæ tunc in principio conficiunt Colostrum, sed cessante instigatione uteri, sua continuata actione purum lac conficiunt & emittunt. Observavi in feminis robustissimis, quæ toto gestationis tempore fuere lactantes, quod tamen post partum præbebant Colostrum, certo indicio colostrum non formari ex materia pinguiore retenta, sed speciali instigatione uteri, seu speciali uteri actione ad mammas delata.

III. Ad lactis generationem in mammis non sufficere ut abundaret sanguis vel chylus in corpore demonstravimus, sed insuper generari debere motum seu actionem in mammis particularem, quæ allatum chylum cum sanguine ulterius in naturam lactis commutet, & a reliqua massa segreget: inde suctione mammarum frequens hunc motum suscitans, tandem Lactis generationem produxit, & femina lactans continuata suctione pergit generare lac; sed sensim minuta suctione, donec cessaverit hæc actio, sine incommodo evanescit lactis generatio. Inde non omnis

Quando
menstrua
retenta lac
generant in
mammis.

mensium suppressio lactis generationem producit, neque falsa graviditas lac præbet mammis, quum uterus morbosus non valeat sanam illam & vegetam in mammis per consensum concitare actionem; etiamsi chyli abundantia habeatur in corpore, sine hoc motu non fit ejus conversio in lac, neque segregatio a reliqua massa sanguinis. Ex quibus omnibus concludere possumus ad lactis generationem requiri materiem productioni Lactis aptam, atque motum mammarum particularem, & sive hoc, sive istud deficiat, non formari Lac. Si ergo menses deficiunt, generatur quidem abundantia humoris, sed si simul uterus morbosa afficiatur, non generatur illa requisita actio: verum si in mensibus retentis uteri actio reddatur robustior, quod interdum fit, tali in casu mammarum in se lac generare possunt: Quod autem in menstruantibus non generetur regulariter lac, inde est quia Lactis materia aliunde evacuatur. Novi tamen feminas, quibus omni tempore erat lac in mammis, etiamsi menstrua ordinate fluebant: hæc etiam in gravitate & lactantes menstrua fundebant, sed erant admodum succulentæ & plethoricæ. Nunquam autem lac in mammis observavi, nisi præcesserat partus, quo hæc actio mammarum fuerat concitata, nunquam vero in virginibus, nisi subsistant menses. Egregium ergo est signum si virgo celat partum, ad detegendum an partus præcefferit, quia rarissimum est sine partu prægresso mammas generare lac.

LIB. V. APH. XL.

233. **M**ulieribus quibus in mammas sanguis convertitur, insaniam significat.

I.

An mania,
prædicatur
ex sanguinis
collectione
ad mam-
mas.

Eandem sententiam habet (H. a. 711), sed in masculino, Hippocrates, unde patet non solum mulieribus, verum etiam viris maniam præfagiri ex sanguinis conversione

versione ad mammas. Ut formetur præfagium ex phænomenis, certe constare debet, quodnam istud sit, ex quo præfagium sit petendum: verum non satis constat quid sit sanguinis conversio aut collectio in mammas. Si in communi significatione hæc accipiatur phrasis, denotaret sanguinem ad mammas ferri majore impetu quam ad alias partes, & per mammas libere meare non posse, unde fieret mammarum tumor, rubor, ardor, dolor, pulsatio: ex quibus conspectis signis prædiceremus Maniam, id est Delirium vehemens & constans. Nullus dubito, quin Auctor noster post illa signa circa mammas observaverit maniam fuisse secutam, & propterea hanc observationem transtulerit in præfagium. Sed haud credo sæpe fuisse observatum, quum ego in tota mea praxi nunquam hoc observare potuerim: neque convenit aliis legibus, quas in consensu & metastasi morborum observamus. Inter mammas enim & cerebrum vix ullus consensus, sæpe dirissimos mammarum dolores, tumores, inflammationes & cancos tractavi, sed nunquam inde secuta fuit mania: neque metastasis morborum ad mammas maniam intulit. Hoc autem contingere potest in morbis mammarum, ut in aliarum partium morbis, quod acris materia in mammis nata a sanguine recepta ad cerebrum delata maniam inferat: vel quod corpora valde mobilia nimio dolore mammarum commota in maniam præcipitent; sed ex rarissimis his exemplis & nihil speciale a reliquis partibus habentibus, non possumus formare præfagium. Quare credo Auctorem nostrum, dum observaverit ea signa circa mammas, & dein maniam, forsan judicasse hæc signa præbuisse causam maniæ sequentis, dum quivis alius morbus interim maniam induxisset. Hoc etiam fallere potest exercitatissimos in arte medica, & fateor me non semel tali modo delusum fuisse, si æger binis morbis laborabat, quorum alter latens, quædam symptomata inducat, quæ ex morbo manifesto vix oriri potuere.

L I B. V. A P H. XLI.

234. **S**I scire velis an mulier conceperit, dormituræ aquam mulsam propinato, & si ventris tormina eam corripuerint, concepit, sin minus, non concepit.

I.

An ex melicrato exhibitio graviditatem cognoscere valeamus.

SI femina gravida fuerit per quatuor vel quinque menses, ut fœtus se movens, uteri & mammarum tumescencia certa præbeant indicia imprægnationis, non est opus periculum facere per melicratum, num femina sit gravida: sed primis gestationis mensibus utile foret hoc detegere posse, ne tempore eo darentur emmenagoga vel purgantia fortiora, quibus procuratur abortus. Propterea sedulo omnia pertentantur medici, num non possent primis mensibus graviditatem detegere. Inter experimenta erat Melicratum vespertino tempore datum, sed non additur hujus ingerendi quantitas; neque præparandi modus, an ex aqua & melle vel crudo vel cocto, an aniso vel cumino adjecto, an ex melle cum lacte, dein an post cœnam, an vero incœnatæ mulieri sit dandum, quæ omnia præscienda erant, antequam aliquid certi ex melicrato ad definiendam graviditatem potuisset hauriri. Denique quædam mulieres hystericæ vel mobilitate laborantes, etiamsi non sint grævidæ, sed huic potioni non assuetæ, in ventris tormina inciderent. Ex quibus omnibus clarissime patet admodum incertum esse experimentum, ut inde concluderemus, num femina primis mensibus esset gravida aut non. Quamvis quotidie examinari possint signa graviditatis, tamen ad hoc usque tempus, etiam in mulieribus multorum liberorum matribus, tam incerta & dubia habentur, ut primis mensibus, non nisi per conjecturas detegere valeant

valeant graviditatem. Inter certissima inveni in mulieribus sanis, quæ regulares habent menses, mensium suppressionem sine causa manifesta, dum interim simul reddant urinam sanam: nam quoties non ex imprægnatione menses subsistunt, urina sanitatis notam non servat, sed aliquod signum morbi latentis solet præbere, quum sanguis morbose detentus æquilibrium destruens, aliqua labe inficiat urinam: sed retentus ex graviditate, in incrementum fœtus cedens, non ita destruat æquilibrium. Si vero, ante imprægnationem, illa femina aliquo morbo laboraverit, hoc signum etiam est incertum. Quæ mulieres etiam gravidæ menses fundunt, non possunt cognoscere graviditatem, nisi quod menses pauciores fluant quam antea. Idem quoque sentiendum in lactantibus, hæ enim experiuntur lac minus copiosum generari, dum tamen sanæ maneant. Reliqua signa uti appetitus alienus, nausea, vomitus, inordinatus motus in ventre, anomala sunt, & æque vexant mulieres mensium suppressione laborantes, quam gravidas, & sæpe magis. Invaluit apud mulierculas, medicos videre posse ex urina, num fœmina sit gravis, & medicus ex inspecta urina sæpe verum pronunciat præsagium, quoniam ex duobus facile est forte fortuna conjicere verum. Sed si tamen sine fallacia præsagium sit faciendum ex urina de graviditate, id paucis medicis est datum, & multi medicum vilipendentes urinæ inspectionem, omnino irrident hoc signum. Ego autem sæpius sine fallacia, tam in honestis matronis nuptis, quam in virginibus corruptis ex urinæ inspectione prædixi graviditatem. Quia vero illa uromantia nihil arcani in se continet, & aliis quoque usui esse potest, meam tradam methodum. Si honesta matrona nupta urinam inspiciendam præbet, dubitans an per duos tresve menses sit gravis, & invenio urinam in omnibus signis sanam, percunctor an ante illud tempus regulares habuerit menses, & an in præsentem ceteroquin sit sana, præterea an aliquas motiones in ventre inordinatas sentiat & ventriculi aliena appetentia, vel nausea laboret; quod si annuet, pronuntio esse gravidam, ex hoc principio, quoniam
Iiii
aliter

aliter reddidisset urinam morbosam: si vero dicat se inordinata solere menstrua habere, & nunc subsistere integre, atque reddere urinam morbosam, nihil certi de imprægnatione dicere valeo; quum tam in gravidis quam non gravidis morbosa possit reddi urina. Verum si quis pro virgine corrupta adferat urinam, ut videamus num sit grvida, prudentissime debemus agere, semper rogandum per quot menses substiterint menstrua, an primis mensibus suppressionis graviora vel leviora aderant symptomata. Quod si reponat percunctatrix symptomata fuisse graviora, sensim quidem minora & mitiora fieri, sed plane non evanescere, & propterea auxilium petere, ut integre liberetur, dum interim habeatur urina sana, nunquam me fefellit, quin talis virgo fuerit grvida. Si tunc a nobis exigunt Emmenagogum, ut ducantur menses, de quorum suppressione primarie conqueruntur, nunquam tale quid dandum est, & tamen medicamentum aliquod non est denegandum, quia aliter adiret forsan alium medicum minus peritum vel pharmacopolam, qui ipsi daret petitum forte emmenagogum, & ita procuraret infandum abortum. Tali igitur in casu semper aliquod propinandum medicamentum roborans, quod sedulo moneo hauriendum esse per mensem integrum: quia vero raro tales virgines defloratæ ante tertium mensem suspicantur se gravidas esse, usu hujus medicamenti, ad istud tempus gestationis perveniunt, ut motum foetus sentiant, & venter ipsis visibiliter tumere incipiat, quando non amplius medicamentum ecbolicum exposcere audent. Juniores ergo medicos moneo, ne ita prompti sint in præscribendis emmenagogis, quamvis a virginibus postulentur; sed ut semper secundum dictam methodum prius investigent, num talis virgo sit grvida; ne sua præpostera exhibitione petiti medicamenti abortum faciant, quod a nobis non minus quam infanticidium tenetur. At honeste fallere debemus virginem defloratam ecbolicum a nobis exigentem, & prævenire ne malevolorum auxilia sibi comparet.

LIB. V. A P H. XLII.

235. **M**ulier prægnans, si quidem marem gestat, bene colorata est: si fœminam, male colorata.

I.

QUæ observationibus vel experimentis obviis demonstrari possunt, non erit opus auctoritate comprobare. Nostro tempore æque quam olim mulieres marem & fœmellam utero gerunt: sed ad prædicendum num paritura sit marem vel fœmellam, hodie tam parum constat ac olim. Quare constat nulla certa esse criteria, ex quibus aliquid conjicere possumus in gravida, qualis sexus contineatur in utero. Posuit autem Hippocrates gravidam coloratorem esse si marem gerat in utero. Hanc sententiam, quæ nullis nititur experimentis, sed quadam recepta opinione, mares fœmellis robustiores esse, paucis ponderabimus. Faciei color dependet a liquore colorato per vasa faciei fluente; cum ipsa vasa omni colore careant. Quod si sanguis & lympa per hæc vasa circulantia sana sint, facies bene colorata erit; sed in cacochymiam conversa faciem alieno etiam colore inficiunt. Igitur faciei color denuntiat humorum bonam & malam constitutionem. Quando igitur mulier fit gravida, & fœtus tantum insumit, quantum per menses antea emittebatur, & uterus sua extensione nulla symptomata inferat, talis mulier sive marem sive fœmellam gerat, retinebit colorem vividum faciei: sed si fœtus plus vel minus consumit, ut ita destruat æquilibrium, vel si fœtus ægrotat, aut uteri extensio per consensum afficit chyli organum, quædam cacochymix species generatur, quæ faciem alieno colore inficit. Hoc autem quoniam non dependet ex diversitate sexus, ejus quoque signum esse nequit. Atque sexus differentia etiam post nativitatem usque

An ex colore gravidæ marem vel fœminam prædicare possimus.

ad pubertatem tam exigua est in hominibus natis, ut inde vix quidquam deduci possit: sed si organa genitalia perfecta sunt, tunc demum eæ diversitates introducuntur, quæ naturam maris & feminæ solent sequi. Quamobrem hanc sententiam incertam & futilem relinquimus Auctori & iis qui in re nullius arcana quærunt.

LIB. V. APH. XLIII.

236. *SI mulieri prægnanti erysipelas in utero fiat, lethale.*

I.

Uteri erysipelas an distinguatur ab Inflammatione.

QUum Erysipelas & Inflammatio in partibus externis a medicis sæpe confundantur propter multa communia signa, non erit mirum istos morbos in partibus interioribus, ubi multo pauciora signa habentur characteristica, ut plurimum confundi, & vix a peritissimo a se invicem dignosci. Qui ponunt horum morborum differentiam in diversis humoribus, Erysipelas scilicet oriri ex bile acri, & calida, Inflammationem ex puro sanguine, satisfecisse existimant: sed quando ægra uteri morbo laborat, non indicat simul juniori medico, num morbus ille veniat ex bile acri calida, an vero ex sanguine puro, sed medicus tenetur ex observatis signis latentem differentiam eruere. Facile concipere possum Erysipelas uteri valde periculosum esse, difficile autem erit detegere, num uterus Erysipelate tentetur, tum ex convenientia cum inflammatione, tum ex affectione partium circumjacentium, & quoniam tumor, dolor, & color sensibus externis non patent. Inde majoris momenti est invenire, num uterus Erysipelate afficiatur, quam ex Erysipelate prognosin formare. Quantum ergo vel ex præxi vel lectione auctorum ad cognitionem hanc mihi comparare potui, proferam. Si fœmina in infimo ventre sentiat do-
lo.

lorem vehementem, calorem æstuantem, quæ symptomata magis simul urgent vaginam & pudenda quam intestinum rectum & vesicam, quamvis semper hæ quoque partes consentiant, constabit ex his vel Erysipelas vel Inflammationem tentare uterum. Sed si tunc simul per reliquum corpus habeatur febris remittens magis quam continua, cum calore mordaci magis quam urente; si urina evacuata sit flammea acris pellucida ad flavedinem vergens, ut plurimum sine sedimento & sine signis coctionis; pulsus celer magis quam durus; sanguis emissus si fluidus fere maneat & rubellus, nullam cuticulam formans, judicabimus uterum Erysipelate tentari. Sed si febris continua ardens, urina rubra sæpe cum incipientibus signis coctionis, pulsus durus & frequens simul adint, judicandum est uterum inflammatione affectum esse, quod Galenus ponit quæstione dignum.

II. Uterus in gravidis non solum fit amplior verum etiam in suis lateribus crassior & magis valens, ut docuit anatomica inspectio in mulieribus paulo ante vel post partum denatis: & Clarissimus Ruyschius detexit hoc tempore in uteri fundo fibras motrices orbiculares, quas musculum vocat, certo indicio movendi potentiam tunc temporis multo validiorem esse quam in non gravidis. Docet nos observatio practica, quo pars erysipelate tentata majorem habeat movendi potentiam, eo quoque plus periculi inferri ab eadem irritante causa, quum actio valens instigata, omnia destruat, quod non ita ex debiliore actione erit expectandum; ex qua causa variolæ in robustis censentur periculosiores quam in pueris debilioribus. Ergo tempore prægnationis erysipelas plus periculi adfert, quam alias ex sua natura intulisset. Fœtui fere semper mortale est Erysipelas, quamdiu non est perfectus, faciet enim abortum; si vero circa finem gestationis fieret, potuisset exclusus fœtus manere vivens. Retineri enim in utero nequit fœtus, quum uterus Erysipelate affectus, cum motu valido inordinato, tum exsudante ichore erysipelatoso placentam ab adhæsione sua depellet: & sanguis materia erysipelatosi infectus fœtus nutritioni erit ineptus. Si ergo Erysipelas uteri generatur

Cur uteri
Erysipelas
prægnanti
letale.

ante fœtus perfectionem, mortiferum est fœtui; sed dein si veniat, fœtus exclusus superstes manere potest: inde fœtui lethalis, id est non semper sed sæpe mortem inferens: matri quoque lethalis, nam a parvo Erysipelate si sit affectus uterus cum subsequente fœtus exclusione, non semper extinguitur mater, sed si magnum sit, mortem inferre potest.

LIB. V. A P H. XLIV.

237. **Q**Uæ præter naturam tenues existentes in utero gerunt, abortiunt, priusquam crassescant.

I.

Præter naturam tenues, quæ dicantur.

SUPRA (Aph. 69, II.) exposuimus corpora ex naturâ gracilia seu tenuia, & diximus maciem illam tunc sanitati & corporis actionibus non obesse: atque in hujusmodi corporibus invenimus interdum majorem esse vigorem & copiam sanguinis quam in crassis seu obesis. Hic autem dicit Auctor præter naturam Tenues mulieres. Ergo hoc in loco majorem gradum extenuationis intelligit, quæ simul defectu aliquo sanguinis laborat, & corpus propter extenuationem quasdam actiones exercere cum tanto vigore & constantia non valet, ut alia corpora sana. Ita tamen ut non sit extenuatum corpus ex morbo uti in phthisi vel marasmo, sed quod ceteroquin habeatur sanum. Nempe quod corpus macie confectum est sine sensibili morbosa labe, tantummodo quod ex alimentis assumptis non satis nutriatur. Multi Commentatores in ea sunt sententia, hic intelligi corpus inedia confectum, sed experimur pauperas, licet macie confectas, minus abortire quam laute viventes, quare intelligendæ sunt feminae macilentæ nimis, ex deficiente actione nutritionis.

Cur hæ abortiunt priusquam crassescunt.

II. Si ita gracilis & macilenta femina fit gravida, cuius actio ad bonos generandos humores, ut se ipsam nutriat, est debilitata, vix esset rationi conveniens, hoc corpus valere

valere conceptum fœtum non solum nutrire verum simul incrementum dare. Propterea primo & secundo adhuc mense, dum tenellus embryon, pauco liquore absorpto vivere potuit, non excluditur, sed vero majus incrementum capiens, egens copiosiore nutrimento ex uteri vasis, propter humorum defectum in corpore matris, amplius nutriri nequit, inde tandem nutrimenti defectu moritur atque excluditur, plerumque secundo vel tertio mense. Tam diu igitur abortui obnoxia sunt, donec sufficiens iterum sanguinis copia in eo corpore generetur, quod ex corporis augmento conjicitur: quare tandem crassescente corpore valent fœtui sufficiens nutrimentum dare & gestare ad legitimum pariendi tempus.

LIB. V. APH. XLV.

238. **Q**Uæ vero mediocriter corpus habentes abortiunt bimestres & trimestres sine causa manifesta, his uteri acetabula mucos plena sunt, & non possunt continere fœtum præ graviditate, sed abrumpuntur.

I.

TRIBUS his aphorismis vult Auctor ex corporis habitu præfagire abortum sine causa alia manifesta. Demonstravit quomodo in corpore gracili generatur, & demonstraturus est abortum in obesitate: sed quia mediocris habitus nequit esse abortus causa, si tamen talis femina abortum faciat sine causa manifesta, quæ potuisset in quovis habitu abortum facere, indicare vult causam internam latentem, eam dicit esse mucum opplentem cotyledones uteri. Quoniam hæc causa est latens, ea debuit erui ex anatomica dissectione, quod hujusmodi mulieres dein mortuæ habuerunt cotyledones mucos plenas: vel ex aliis simul apparentibus signis conjicere debemus has partes mucos plenas esse.

Uteri cotyledones mucos plenæ an abortum faciant.

De Anatomica dissectione vehementer dubito, nam si Hipp: inspexisset uterum feminineum, non dixisset Cotyledones, sed dixisset uteri cavitatem, quoniam quadrupedes Cotyledones habent, sed feminarum uterus intus unica cavitare donatus satis demonstrat Hippocratem non inspexisse uterum hujusmodi feminarum, num mucus fuisset abortus causa. Ergo hoc ex aliis signis conjicere debuit, si nempe femina multum muci continuo fundat per pudenda, si post menstruationem etiam multi muci effundatur, & quando una cum abortu multum muci exit. Ex quibus conspectis forsan judicavit, habita ratione analogiæ quadrupedum, mucum illum cotyledones nimis implere.

Mittamus ergo sententiam cotyledonum, quæ in feminis non inveniuntur, sed ponamus feminam mediocriter crassam continuo, secundo vel tertio mense abortire sine manifesta causa, eamque ante graviditatem multum muci evacuare, & una cum abortu multum muci prodire, non erit mirandum hanc feminam ex muci abundantia abortum facere, priusquam grandior nascitur fœtus. Si enim uteri cavitas muco abundat, signum est in uteri fibris debilem esse motum vitalem, quæ causa ubique mucum producit. Si igitur tali in utero debiliore non satis etiam constringente ejus orificium, ovum feminineum a femine virili imprægnetur, primis mensibus, quamdiu per placentam non est nexum utero, sed solummodo retinetur in utero ejus orificio clauso, humorem in cavum uteri depositum imbibit & sic sensim increfcit: dein vero quando debet applicare placentam utero, ut acquirat cum matre communem circulationem, tenax mucus latera uteri obfesa tenens intercipit ingressum vasculorum placentæ in oscula uteri hiantia: quare fœtus ampliore nutrimento egens, non potentia vascula placentæ intrare oscula interna uteri, debita copia nutrimenti fraudatus moritur, & quia os uteri laxius est constrictum, facile excluditur.

Ita concipimus ex muci abundantia generari posse abortum in feminis mediocriter crassis, sed inferre velle hanc unicam in his esse causam, ut plerique ex Auctore nostro colli-

colligunt, nimis arduum videtur: quum non semper ex matris culpa nascatur abortus: potest enim semen virile non satis valens debiliorem præbere embryon, qui primis mensibus moriens, vel facit abortiri ovum vacuum, vel si placenta tunc maneat vivens, producit molam: potest etiam vita partium auxiliatricum extinguì primis mensibus, quando mulier abortiens excludit parvum admodum fœtum. Quare causa abortus primis mensibus tam in patre & partibus auxiliatricibus est quærenda, quam in matre, cujus uterus mucò esset plenus.

L I B. V. A P H. XLVI.

239. **Q**Uæ præter naturam crassæ existentes non concipiunt in utero, his omentum os uteri comprimit, & priusquam attenuentur, prægnantes non fiunt.

I.

SI perpendimus ea, quæ Hipp: protulit de uteri structura & cotyledonibus, facile constare potest, eum non inspexisse cadavera humana, & propterea nunquam vidit in denatis sterilibus, num omentum usque ad uterum sit protensum. Igitur per certam quandam conjecturam in præter naturam crassis, judicavit os uteri ab omento compressum Sterilitatem induxisse. Experimur quidem etiam his temporibus præter naturam crassas mulieres non ita fertiles esse, quam quæ mediocriter pingues sunt, interim tamen notæ mihi sunt mulieres obesæ satis fertiles. Id autem fatendum est mulieres præter naturam crassas, quales intelligit Auctor, raro concipere. Hujus causam dicit esse omentum comprimens os uteri, ut inde istud non potuisset se satis dilatare ad recipiendum semen virile. In valde obesis invenimus quidem hodie Omentum usque ad pudenda pendulum & attingere posse externam

Omentum
os uteri pre-
mens steri-
litas causâ.

uteri substantiam, inde vero argumentari velle os uteri comprimi, ita ut semen accipere non possit, non erit conveniens: nam in aqualiculo seu in pelvi hæret intestinum rectum laxum & compressibile; atque uterus durus crassus & firmus; ad anteriorem partem sub osse pubis hæret vesica urinaria, peritonæo tecta: reliquum spatium impletur intestinis tenuibus & magna copia pinguedinis. Si increseat ita Omentum, ut etiam in pelvi pendeat, recedent intestina tenuia, sed vesica, intestinum rectum & uterus comprimuntur a molli omento. Quæ partes hoc in loco sunt molles & compressibiles, eæ facilius comprimuntur, quam duriores & firmæ. Si ergo quædam fieret alicujus partis compressio, vesica urinaria, vel intestinum rectum, vel tenuia intestina potius comprimerentur, quam uterus, qui ita firmus est in non gravidis, ut vix cultro perscindi possit. Quia vero neque in urinæ neque in alvi egestione nullam experimur difficultatem, etiamsi mulier sit præter naturam crassa, quæ tamen fieret, si ab omento premente hæ partes nimis comprimerentur; optimo igitur jure concludere possumus Omentum premens uterum sterilitatis causam esse non posse; præprimis quia uteri os coitus tempore ab omento comprimi non possit, nam vagina membro virili distenta favet dilatationi orificii uteri. Neque ad recipiendum semen magna orificii uteri dilatatio requiritur, modo enim paulo magis hians fiat, quam est amplitudo urethræ virilis, ad recipiendum semen satis capax erit. Qui ergo perpendit uteri firmitatem, & parvam orificii dilatationem, non facile admittere potest Omentum premens orificium uteri causam esse posse sterilitatis. Interim tamen præter naturam crassæ mulieres ob pinguedinis abundantiam sæpe non concipiunt: cujus ratio mihi videtur, quod tanta pinguedinis copia in pelvi formetur, ut inde ova in ovario nata venire nequeant in tubam Fallopianam, sine quibus femina manet sterilis, etiamsi semen masculinum in utero recipiat. Sive nunc receptio ovulorum in tuba Fallopiana interceptatur ab omento interposito, sive a reliquæ adjacentis pinguedinis incremento, æqualis

æqualis nascitur sterilitas, & eadem est causa, nam dum in præter naturam crassis increfcit omentum, reliqua quoque pinguedo augetur. Hanc receptionem ovulorum a pinguedinis, abundantia fieri posse ex anatomica demonstratione facile liquet: nam ut ovulum in ovario confectum veniat in tubam fallopianam & dein in cavum uteri, ovarium amplectendum est a tubæ fimbriis, qualis amplexus ob interpositam pinguedinem facile fieri nequit. Quod si hic pinguedinis interpositus sit causa sterilitatis, facile concipitur tam diu duraturam sterilitatem, donec pinguedo sit ita minuta, ut fimbriæ tubæ iterum amplecti possint ovarium. Igitur conducit ad hanc tollendam seu curandam sterilitatem, corpus extenuare parciore diætâ, laboribus & exercitiis validioribus, medicamentis evacuantibus, atque frequentiore venæ sectione. Sed quoniam hæc causa non nisi in Divitibus otiose & opipare viventibus reperitur, medicus raro voti compos fiet, nolente tali matrona tam duram propterea agere vitam.

LIB. V. A P H. XLVII.

240. **S**I uterus coxæ incumbens suppuratus fuerit, necesse est medicamenta in linteo carpto applicari.

I.

IN nullo inveni Aphorismo exponendo plures tricas, quam in parvo hoc Aphorismo: nam multi contendunt uterum ligamenti firmatum coxæ incumbere non posse, & si ibidem hæreat, non fore necesse ut suppuretur. Denique multum litigant de significatione vocabuli ἔμμοτον, num significet medicamentum linteo carpto receptum & applicatum, num vero ulcus cavum, quod tali medicamento eget. Nos vero missis criticorum conjecturis, videbimus quomodo uterus coxæ incumbens suppurari possit; quid dein ex tali

suppuratione sit expectandum; denique qualia auxilia sint adhibenda.

Uterus coxæ
incumbens
suppuratus.

II. Uterus pelvi & inguinibus nexus ligamenti latis & rotundis satis valide in suo situ firmatur; sed quoniam ligamenta hæc multis etiam scatent arteriis, hæc æque quam partes reliquæ inflammatione, quæ commutatur in suppurationem, corripì possunt. Ita tumida & inflammata ligamenta coxæ cohærentia si ab uno latere inflammantur, uterum versus istud latus trahunt & coxæ dolorem inferunt. Quia vero veteres nesciverunt hæc ligamenta inflammari posse & dein suppurari, ex apparentibus signis & conversione uteri ad latus dolens, judicarunt uteri conversione hunc dolorem generari, qui tandem in suppurationem abiebat. Sed quoniam ex generali cognitione inflammationis facile concipimus fieri posse suppurationem, nihil amplius obscuri in hac observatione latitat. Ita etiam pleura, aliæque membranæ, & ligamenta inflammantur & suppurantur.

Quid sit expectandum
ex uteri
coxæ incumben-
tis suppuratione.

III. Si vero ligamentum uteri, hujus vel istius lateris inflammatum abeat in suppurationem, pus suppuratione confectum sub multa pinguedine ibidem hærente latens sensim fit acrius, formatque sinum sua gravitate sensim magis deorsum, donec ad latera pudendorum, vel in inguinibus, vel circa interfemineum, aperturam fistulosam faciat. Quod ulcus cum longe remotum habeat fomitem instar fistulæ ani in viris, difficulter sanabitur, & perpetuo vel pus vel ichorem fundet. Si vero uterus ipse suppuraretur potius, pus vel ichor per pudenda exstillaret. Quia autem ἔμμοτος notat eum, qui ulcere cavo laborat; atque ἔμμοτον, si subintelligitur φάρμακον, designat aliquod medicamentum molle & liquidum, quod linteo carpto receptum, uti hodie habentur digestiva a chirurgis, ulceribus cavis inditur, magis conveniens sensui hujus aphorismi intelligere ulcus cavum quam medicamentum ἔμμοτον applicatum.

Curatio in
uteri coxæ
incumben-
tis suppura-
tione.

IV. Quum secundo ad principium hujus ulceris cavi & fistulosi pertingere non possimus, atque pinguedo adjacens a stagnante pure corrumpatur, curatio non solum est difficillima,

cillima, sed & debet artificiose pertractari. Si enim externe applicetur medicamentum aptum, ejus virtus ad originem mali pertingere nequit; liquor injectus nimis cito effluit; turunda indita claudens aperturam nimis diu intus retinet pus aut ichorem. Præstantissima quæ mihi successit curatio, constabat ex injectione quadam confecta ex melle rosarum, vel quodam digestivo ex terebinthina cum vitello ovi soluta, quæ medicamina postea diluta decocto agrimonie, vel scordii, injecta intus depurabant ulcus istud cavum, dein immittebam turundam ex terebinthina cocta confectam, cui admiscebam myrrham, aloëm, olibanum, pulverem sabinæ, vel mitigabam virtutem turundæ addito gummi tragacanthi, mucilagine radice althææ vel symphyti. Dein tegebam aperturam plumaceola cum aliquo digestivo oblinita. Interna autem medicamenta nihil speciale continebant, talia enim erant, quæ ulceribus internis adhiberi solent.

LIB. V. APH. XLVIII.

241. **F**œtus, mares quidem in dextris, fœminæ vero in sinistris magis.

I.

OMnia, quæ obviis experimentis & observationibus possunt detegi, non erit opus firmare auctoritate. Quemadmodum olim, ita & hodie fœminæ fiunt gravidæ, & marem vel feminam gerunt: quod si aliqua esset in hoc vel illo latere gestatio pro differentia sexus, hoc æque nobis quam Hippocrati & aliis veteribus esset cognitum, dum tamen nemo compertum habeat, num masculinus vel femineus partus sit futurus, quæ res tam est incognita, ut nihil nisi inanis conjectura supersit. Quæ dicuntur de majore calore dextri lateris, de perfectiore semi-

nis elaboratione pro sexu masculino ex dextro teste, ridicula sunt, quum ablato uno teste vir tamen generaverit sexum utrumque. Neque magis valet Galeni sententia de majore hepatis caliditate, cui accumberet ovarium dextrum, nam in femina non gravida longum interest spatium inter ovarium muliebrem & hepar, & mesenterium cum suis intestinis est interpositum. Quare ratio hujus differentiae non plus valet, quam ipsa observatio futuri infantis. Solummodo ex dictis concludere possumus naturalem structuram & uteri situm veteribus parum cognitum fuisse, (Conf. *Aph.* 231.) atque rationem istos deduxisse ex uteri fabrica in animalibus. Quippe uterus femineus non habet cavitatem dextram vel sinistram, sed unicam in medio ejus, ut mares & feminae in eodem loco contineantur. Si autem foetus hoc vel istud latus magis occupat, id dependet ab uteri obliquo situ, & talis positura non promittit marem aut feminam, sed ut plurimum difficiliorem partum, quem omnium optime descripsit van Deventer.

LIB. V. A P H. XLIX.

242. **U**T secundae excidant, sternutatorio indito, nares & os apprehendere oportet.

I.

An secundae
expellendae
sternutatio-
rio.

Superius (*Aph.* 228, III) demonstravimus bonum esse, si in secundinis retentis superveniat sternutatio, quae os uteri clausum retinens secundas aperitur: si vero ex natura non sequatur sternutatio, arte ea est facienda; qualia autem medicamenta naribus attracta sternuere faciant, non est opus hoc loco recensere, quum collata inveniantur in filii nostri *Davidis de Gorter Materia Medica*. Haec dum adhibentur, monet Auctor, ut simul claudantur nares & os, quo simul majore nisu deorsum trudentur viscera ventris, &

& eo validius extrudatur id, quod post partum in utero restat. Ex generali hac medendi regula Junior Medicus & etiam obstetrices judicarent se semper debere tali modo sternutationem concitare, si modo relinquantur secundæ post partum. Ne autem ex hac medendi methodo pejora sequantur mala, quam ex secundis relictis, causæ retinentes secundas primo sunt perpendendæ. Quod si remaneant post partum, quia uteri os nimis constrictum est, ut monuimus, (Aph. 228, III.) maxime conducit sternutationem concitare. Si vero remanserint secundinæ cum uteri orificio aperto, quia placenta tenacius adhæret utero, quam ut statim expelli possit, non esset tutum adhibere sternutatorium; validior enim illa protrusio simul forsitan extruderet uterum nunc suo sustentaculo orbatum, quod aliquoties observavi factum per violentiorem funiculi umbilicalis tractionem. Quæ uteri inversio si non protinus reponatur, quod nesciunt illæ obstetrices, majus periculum est expectandum, quam a retentis secundinis. Majus malum est expectandum si portio placentæ separata fundat sanguinem, dum altera pars magis adhærens deneget exitum; nam non solum periculum est ne invertatur uterus, sed etiam nimia sanguinis profusione purpera non raro in animi deliquium incidit, & convellitur, atque deinceps pallescens diu vitam debilem & valetudinariam agit, bono sanguine privata. Hanc tenaciorem placentæ adhæSIONem sæpe observavi in partu præmaturo, dum placenta, antequam ejus propria extincta sit vita, ab utero separari debet. Atque hoc etiam aliquomodo culpæ obstetricum est adscribendum, quæ post partum non ligant portionem funiculi versus placentam, ut per funiculi vasa aperta effluere possit sanguis, qui hac via intercepta, magis detrusisset adhærentem placentam ab utero. In utroque igitur casu cum orificio uteri aperto, quoniam non caret periculo indere sternutatorium, ego soleo cingere & sustentare totum abdomen, cujus adminiculo fere semper brevi post partum extrudetur placenta cum membranis: si autem non procedat, obstetricem moneo, ut secundum ductum funiculi umbilicalis immittat manum, qua artificiose

&

& prudenter adhærentem placentam separat ab utero, & dein unâ cum manu sua, adjuvante conatu matris, placentam educat.

LIB. V. A P H. L.

243. **M**ulierî menstrua si velis cohibere, cucurbitam quam maximam ad mammas appone.

I.

Quomodo
cucurbitæ
mammas
applicatæ
cohibent
menstrua.

A Nobis supra (*Aph.* 230, I.) demonstratum est inter uterum & mammas magnum esse Consensum, atque sententia hæc hoc experimento ulterius confirmatur, dum nempe applicatione Cucurbitæ quam maximæ ad mammas minuatur & sistatur menstruatio. Quali modo applicari possunt Cucurbitæ cuivis notum est, quoties enim cucurbita admodum calefacta cuti applicetur, postquam contentus in cucurbita aër calefactus refrigeratur, cuti tenaciter adhæret; aut hoc olim fiebat accensa flamma, quæ calefaciebat aërem cucurbita contentum, quo dein extincta flamma refrigerato uti adhærebat cucurbita; hodie vero ope Antliæ valvula instructæ aër extrahitur ex applicata cucurbita, quæ methodus hoc commodi habet, quod pro lubitu aërem extrahere possimus, dum vero olim sæpius repeti debebat operatio. Ope cucurbitæ eo in loco minuitur supra partem naturalis aëris pressio, unde ad locum minus pressum magis confluunt humores, & ita partem in tumorem attolunt, quod fieri nequit, quin partes reliquæ priventur humoribus: hæc autem mutatio maxime inducitur partibus proximis, atque iis quæ huic parti maxime consentiunt. Quia vero inter mammas & uterum maximus est consensus ratione evacuationis, non recedit a generali regula, quod aucta derivatione ad mammas minuatur eadem ad uterum: hinc feminæ lactantes rarissime menstrua fundunt. Propterea

rea

rea non est mirum, quod moneat Auctor noster Cucurbitam maximam applicandam esse, ut ita possit magnam ad mammas facere derivationem, & ita notabilem diminutionem facere ad uterum. Nunc quærendum est num Hipp: hunc aphorismum posuit, ut simplex experimentum, an vero curationis scopo in mensibus profluentibus. Si velis, inquit, cohibere, unde videtur solummodo voluisse indicare fieri posse menstruationis diminutionem per cucurbitas ad mammas applicatas. Si vero hoc auxilium voluisset adhibere in mensium profluvio, præcepisset in mensium profluvio applicandæ sunt cucurbitæ mammis. Quamobrem mihi videtur hanc operationem tanquam mirum experimentum proposuisse, ad probandum maximum consensum inter mammas & uterum.

LIB. V. AP H. LI.

244. **Q**Uæ in utero gerunt, harum os uteri clausum est.

I.

INter certissima Graviditatis signa numerant orificiî uteri clausuram. Obstetrices in anatomicis non satis expertæ credunt os uteri esse eam angustiam, quam statim in pudendis offendunt, quæ pars connivens perperam a multis vocatur os uteri, dum vero sit externa coarctatio vaginæ, quum uteri os adhuc satis distet ab hac parte, nempe hæret in altera interna extremitate vaginæ. Qui igitur ex huius vaginæ orificio clauso vellent judicare num femina esset gravida, omnino deciperentur. Dum mulier concepit, necesse est, ut conceptum semen & dein ovum imprægnatum retineatur in uteri cavitate, ut ibidem ulterius nutriatur & incrementum capiat: uterus autem ipse suis fibris contractilis, atque muscutorum abdominalium pressio, & u-

Os uteri
clausum an
graviditatis
signum.

teri orificium in parte inferiore positum, non permetterent ut receptum semen vel ovulum imprægnatum retineretur in uteri cavitate, sed causis his expelleretur: propterea factum fuit, ut post conceptum uteri orificium contrahatur ita, ut causis his non possit aperiri & eructare contentum. Ita etiam contractum orificium omnem communionem cum aëre ambiente intercipit, ut natura methodo consueta omnibus suis operationibus, in loco clauso id faciat, quod in generatione requiritur. Inde toto gestationis tempore uteri os manet clausum, tam diu, donec vel partus vel abortus instans oris dilatationem exigat. Hæc sententia quibusdam paradoxum videtur, quum quædam feminae, quales nonnullas novi, toto gestationis tempore menses fundant ordinate, ac si non essent gravidæ, quam evacuationem fieri non posse contendunt nisi uteri os aperiatur. Quia vero similia sunt vasa in vagina suis ostiolis donata, uti in utero, verisimile est his mulieribus menstrua fluere non ex utero, sed ex vagina. Alterum dubium majoris est momenti, fœminas quasdam passas fuisse superfœtationem, quod etiam observavi: quæ si fiat, concedendum est os uteri interea temporis fuisse apertum. Sed si animadvertimus quam parva requiratur apertura, ut ingrediatur semen, dum interim glans penis huic orificio applicata exitum intercipiat, vix verendum est, hoc tempore expelli posse ex utero contenta. Sed ut sit signum graviditatis, hæc duo adesse debent, primo istud os clausum duntaxat esse debebat solo tempore gestationis: verum utplurimum omni tempore clausum est, quare deciperet eum, qui tangeret os uteri clausum, indeque semper judicaret feminam esse gravidam. Si vero inveniret uteri os apertum, tunc tuto iudicium ferre posset feminam non esse gravidam; aut si offenderet gravidam, instare abortum vel partum. Altera est difficultas, quod in non gravidis os uteri ita habeatur a pudendis remotum in quibusdam, ut digito attingi non possit: in gravidis vero, præprimis instante partu, magis ad pudenda descendens tactu explorari potest, quando non requiritur hoc signo uti ad investigandum, num gravida sit nec ne.

Prop.

Propterea hoc signum & quoniam est incertum, atque etiam impudicum, puto nunquam adhibendum esse, ad investigandum num femina sit gravida: sed ut cognoscamus num partus instet, obstetrix eo signo carere nequit; quamdiu enim sentiat suis digitis os uteri firmiter esse contractum, licet dolores parturientium adsint, non potest expectare foetus exclusionem.

LIB. V. APH. LII.

245. **M**ulier in utero gerenti si multum lactis e mammis fluxerit, infirmum foetum significat. Si vero solidæ fuerint mammae, sanio rem foetum significat.

I.

Circa finem graviditatis, sexto, septimo & octavo mense, quando sensim debilitari incipit actio vitalis in placenta & funiculo umbilicali, Mammæ sensim cum decremento hujus actionis, disponuntur ad lactis præparationem, ut tandem, quando requiritur lac pro infantis nutritione, mammae satis validam possideant præparandi & evacuandi lactis potentiam. Sic Deus voluit, ut omnia suis temporibus ordinate fiant, cessante una actione generationis altera magis valens fiat, sine mutata fabrica in ipsis organis: nam quod uterus quoque fiat major & validior in gravidis, propterea non mutatur ejus fabrica. Neque alia est ante pubertatem & in vieti fabrica organorum genitalium utriusque sexus, quam in maturis, verum organa duntaxat fiunt majora & potentiora, & denique debilitantur & exarescunt. Si vero contingat, quod mammae, quæ debebant sensim magis turgere & solidiores fieri, se accingentes ad lactis generationem, fiant flaccescentes & fundentes multum lactis, ut signum & causa foetum infirmum

Lactis copiosior effluxus in gravidis cur foetum infirmum significat.

num esse declarant. Fœtus enim debilitatus simul minuit uteri vigorem, qui est causa, quod mammæ per consensum turgent, hujus autem flaccescencia dependens ab uteri debiliore actione signum est fœtum non esse firmum, sive hoc fiat a fœtu prius debilitato, sive ab utero ipso infirmiore, quæ infirmitas quoque debilitabit fœtum. Si autem mammæ multum lactis fundunt, signum est detrahi materiem nutritiam, quæ ad nutritionem & incrementum fœtus erat destinata, cujus privatione fœtus necessario redditur debilior, & quoniam directio ad mammas minuit directionem humorum versus uterum, ut demonstravimus, (*Aph.* 243.) ex minori itaque humorum copia ad uterum derivata etiam fit debilior fœtus. Hoc ergo signum ex mammas desumptum egregium est indicium ad cognoscendum, num fœtus in utero hærens sit debilis vel valens.

Cur mam-
mæ solidio-
res firmio-
rem fœtum
inducant.

II. Ex eadem translatione actionis ab utero ad mammas intelligitur mammas turgentes & solidas indicare fœtum & uterum valere: tument enim tunc & solidiores fiunt mammas etiam in puellis, quando uterus ad concipiendum fit aptus, ut ex sororiantibus mammas, etiamsi talis puella non fundat menstrua, conjiciamus eam esse maturam; eo magis si circa finem gestationis fieri debeant lactis promptuaria, tunc enim sensim copia colostri magis turgent, ut non fiant duræ, sed solidæ & tumentes, promptæ ad fundendum lac pro infante.

LIB. V. A P H. LIII.

246 **Q**Uæ perdituræ sunt fœtus, his mammæ graciles fiunt. Si vero rursus duræ fiant, dolor erit, aut in mammis, aut in cæxis, aut in oculis, aut in genibus, & non perdunt.

I.

QUod si retineatur translatio T. J. ab Almeloveen & multorum aliorum, hic esset sensus Aphorismi, quibus mulieribus gravidis mammæ fiunt graciles, hæ abortiunt: sed si post ea signa abortus instantis mammæ fiant duræ, non fiet abortus, verum dolor erit aut in mammis &c. Ergo erunt mammæ graciliores incertum signum abortus, nam graciles mammæ in duras mutatæ indicarent, non expectandum abortum sed dolores. Alii vero πάλιν per Contra exponunt, & tunc magis conveniens est Aphorismi sensus: nam tunc graciles mammæ abortum præfagiunt; sed mammæ duræ non præfagiunt abortum, verum dolorem partium recensitarum, quod observationi practicæ est conveniens.

Sensus.

II. Cur mammæ ex improvilo si graciles fiant abortum præfagiant exposuimus (Aph. 330, II) propterea quibusdam videbitur Auctorem rem eandem repetere superius pronunciatam. Sed hoc in praxi sæpe debet fieri: nam quando debemus enumerare signa abortum præfagientia, annumerandæ sunt mammæ graciliores factæ. E contra si volo ex phænomenis apparentibus aliquid futurum pronunciare, solummodo pono istud phænomenon, & dein pronuncio, quæ bona vel mala ex tali phænomeno sunt expectanda. Ea methodus egregia est in praxi medica. Gravidæ verbi gratia dicit sibi graciles fieri mammæ, ergo Medicus adhuc est incertus, quid boni vel mali signifi-

Graciles.
mammæ
abortum
præfagiunt.

cet, hinc consulit observationes practicas, ut inveniat quid secutum fuerit post phænomenon hoc; inter prædicta mala ex mammis gracilibus invenit abortum præfagiri; itaque non confidens huic soli phænomeno, quod fallere potuisset, examinat signa reliqua abortum præfagientia: si ergo invenit præter mammas graciliores reliqua quoque phænomena instantem abortum declarantia, tunc certa fide prædicere potest futurum abortum. Hoc non solum in hac re, sed & in omnibus signis est faciendum, ut si ex urina, pulsu, aliisque phænomenis singularibus possimus aliquomodo judicare hunc vel illum morbum instare, antequam eum morbum pronunciamus futurum, reliqua phænomena eundem morbum præfagientia sunt examinanda an adsint. Hinc quam maxime patet, quantum a veritate practica recedunt, qui ex solo pulsu, urina, sudore, respiratione, dolore & ceteris solitariis signis iudicium ferunt, postpositis reliquis ad pronuntiandum, qualis sit morbus præsens, vel qualis exitus sit expectandus, quum pauci sint morbi ex unico phænomeno cognoscendi, sed semper ex multis simul collectis. Propterea hoc semper in meis Collectaneis feci, ut unumquodque phænomenon duobus ad minimum in locis collegerim: ita sponte cuncta, quæ indicabantur ex tali phænomeno, collecta invenire possum; atque ad rem aliquam cognoscendam vel præfagiendam omnia quoque phænomena indicantia simul invenire potui. Hoc utut sit molestum, usum practicum suggerit egregium, & hoc nisi a multis annis fecissem, fateor me non ex proprio ingenio formare potuisse omnia præfagia cujusvis phænomeni, neque omnia phænomena eandem rem indicantia colligere. Quoniam talia non ex ingenio sunt depromenda, sed ex constanti observatione practica. Recte ergo & cum iudicio Noster egit Auctor, qui idem phænomenon ob scopum diversum plus semel repetit.

Mammæ
duræ in gra-
vidis quid
præfagiant.

III. Versatur Auctor noster in exponendis malis, quæ ex vario phænomeno mammarum desumuntur in gravidis, tradidit mammas graciles & flaccidas (Aph. 330, II & 331, II) solidiores & tumentes (Aph. 245.) Nunc vero
vult

vult prædictionem formare ex mammis duris. Hæc ergo Durities est distinguenda a mammis solidioribus, quæ firmum fœtum indicabant, & nihil mali portendebant. Neque Durities scirrhusa vel inflammatoria, aut scrophulosa est accipienda, quæ æque in non gravidis, quam gravidis accidit; ita etiam lactantibus abundantia vel concretionem lactis mammæ indurescunt: verum hæ omnes species non præfagiunt recensita mala: Quare talis Durities est concipienda, quæ provenit ab eadem sed majore causa, ex qua proveniebant mammæ solidiores & tumentes. (Aph. 245) Qui impetus major ita implet mammarum vasa sine emissionem lactis, ut ad attactum non sint solidiores & firmæ, verum duræ & ita renitentes, ut ad digitos prementes non admittant foveas, & propter turgescientiam illam nimiam Dolorem inferant. Signum ergo est uteri actionem validissimam esse, unde ad Abortum faciendum nullum erit periculum, qui non fit valente uteri actione, sed ex ea debilitata vel perturbata. Quoniam adjacentes partes hac prævalente uteri actione simul agitantur & sanguine implentur, inde in coxis & genibus quoque dolor. An vero oculi inde doleant, dubitare possumus, sed quoniam in lactantibus observavi, quoties mammæ nimia copia lactis turgebant & dolebant, oculos quoque dolere, verisimile videtur mihi hos oculorum dolores magis ex duris & nimis impletis mammis oriri, quam ex actione uteri validiore.

LIB. V. APH. LIV.

247. **Q**uibus os uteri durum est, his necesse est os uteri clausum esse.

I.

Uteri os in vaginam patens optime comparari potest processui ciliari in oculi bulbo, cujus ope pupilla redditur amplior & angustior: quando nempe uteri

Os uteri durum
cum
clausum.

os,

os, quod caret motu voluntario in perfecta sanitate, possit suis fibris orbicularibus sphincterum instar contrahi, & fibris centralibus contractis dilatari; anus vero & oris labia musculis voluntariis gaudent, quibus ab imperio mentis fieri potest dilatatio & constrictio. Os autem uteri & etiam multa alia oscula emissariorum suis sphincterulis contrahuntur, uti etiam oculi pupilla. Quia vero attactu constat, quoties uteri os est contractum, simul esse durum, licet nullus adsit tumor inflammatorius vel scirrhus, inde patet, quod hæc constrictio dependeat a contractione fibrarum orbicularium, qua contractione, uti omnes reliqui musculi, hæ fibræ induratæ sentiuntur: sed orificii uteri dilatatio videtur præcipue oriri relaxatis fibris orbicularibus. Hinc tempore conceptus, partus, & menstruationis, hæ fibræ orbiculares videntur relaxari, ut transitum præbeant per hoc orificium. Si vero os apertum æque esset durum, quam dum sit clausum, signum esset orificium uteri æque suis fibris distrahi quam contrahi, quod nunc contrarium patet. Inde etiam est, ut ad os uteri clausum & contractum cum successu adhibeamus laxantia, quæ nihil præstarent, si uteri dilatatio fieri deberet per contractas fibras, quemadmodum ejus fit constrictio. Ergo quoties invenitur os uteri durum, signum quoque est istud contractum esse. Quibus nunc causis uteri os constringi possit, non satis constat inter auctores. Galenus & alii accusant oris uteri Inflammationem, scirrhum, vel & callum: concedendum est hos morbos os uteri durum facere, haud tamen credo hoc in loco talem debere intelligi duritiem, sed talem, qualem in mammis duris præcedente *Aph.* indicavi, ut constaret in gravidis, num partus instaret, qui fieri nequit, quamdiu os uteri est clausum. Ut igitur obstetrix sciat in parturientium doloribus, num expectandus sit partus, tangens uteri orificium, si istud inveniat durum, pronunciare potest uteri os esse clausum & propterea partum fieri non posse, & expectandum esse monet, donec uteri os mollescat. Hoc signum quoque valet in lochiis vel menstruis retentis & in uteri hydrope: nam si detegat

os uteri durum, novit os esse contractum & ita intus continere humores; si vero molle inveniat, judicare potest istorum retentionem non oriri ab ore uteri contracto. Sic valet medicus opportuna adhibere auxilia, vel laxantia vel instigantia, ut evacuet id, quod in utero retinetur.

L I B. V. A P H. L I V.

248. **Q**Uaecumque in utero gerentes a febris corripiuntur, & vehementer attenuantur absque manifesta occasione, difficulter & periculose pariunt, aut abortientes periclitantur.

I.

EXposuimus supra (Aph. 223.) mulierem gravidam morbo acuto corripitur lethale esse, quoniam vehementer circulatione vel depellebatur placenta, vel ita invertebantur humores, ut ad nutriendum foetum erant inepti. Hoc vero loco agit de muliere gravida, quae corripitur febris. Ego sentio hic intelligendam esse febrem remittentem (Aph. 100, II.), quae recurrentibus paroxysmis quasi multas febres facit, quae etiam frequentius summam extenuationem inducit, quam febres reliquae continuae & intermittentes. Observavit Noster Auctor ut & nos in praxi quotidiana gravidas feminas ita vehementer sine manifesta causa extenuatas partum subiisse difficiliorem & periculosiorem, & hoc sufficeret in memoria tenere ad praedictionem formandam. Si vero hanc observationem practicam rimamur, clare constabit, talem partum instare. Ut enim partus fiat facilis, parturientis vires debent constare, ut foetum excludat, atque placenta una cum partu foetus ab utero secedere debet, dein sanguinis effusio copiosior a tali puerpera tolerari debet, sine multo virium dispendio. Verum si gravida diu fuit febris vexata, vires vix valebunt

Cur partus
difficilis &
periculosus
si gravida
corripitur
febris &
vehementer
attenuetur.

ad excludendum fœtum, unde partus difficilior; & sanguinis copiosior deinceps evacuatio, si quædam restent vires, istas simul auferet, unde partus periculosus. Hoc autem eo magis, si femina gravida vehementer fuerit extenuata, sive respiciamus ad humorum defectum tali in corpore, sive ad causam illam non manifestam, quæ vehementem extenuationem induxit. Nam propter placentæ separationem ab utero necessario sequitur sanguinis evacuatio lochiorum nomine veniens, atque hoc in corpore vehementer extenuato magnum malum inducet. Causa hæc non manifesta Extenuationem inducens est febris remittens colliquativa, quæ eo fit major, quo magis evacuamus: igitur dum post partum emittitur tanta copia sanguinis, partim sanguinis defectu, partim augmento febris colliquativæ moritur puerpera. Ab eadem hac extenuatione & febribus Partus fit difficilior, quia vitio matris excluditur fœtus; quia vero vita placentæ extincta fœtus non conatur in lucem prodire, inde sæpe fit, quod post fœtus exclusionem placenta tenaciter utero adhærens, quia non satis exaruit, post partum statim non sequatur, sed remanens partum difficiliorem faciat & periculosum, cum stagnans, corruptionem suscipiens, febrem colliquativam augeat.

Cur hæ abortientes periclitantur.

II. Sive circa principium, sive medium, sive finem gestationis gravida fœmina febribus colliquativis vexata, & vehementer extenuata excludat fœtum, idem patitur periculum. Nam & in abortu & in partu naturali, effudit majorem sanguinis copiam, & placenta tenacius adhærere solet utero, quam ut perfectum abortum facere possit. Ergo per easdem assignatas causas in abortu femina ita extenuata periclitatur.

LIB. V. APH. LVI.

249. **S**I fluxui muliebri, convulsio, & animi deliquium superveniat, malum.

I.

Galenus & fere omnes Commentatores hic accipiunt pro fluxu muliebri Mensium profluvium, vel fluxum album, vel quamcunque aliam copiosiore evacuationem per pudenda, quæ diu durare debuit, ut tandem acrimonia humorum inde nata induceret irritando Convulsionem. Quia vero noster Auctor antea egit (Aph. 196 & Aph. 197.) de Convulsione ex nimia evacuatione, non possum credere Hippocratem hic voluisse intelligere mensium profluvium, verum solitam sanguinis menstrui evacuationem, quæ non est causa Spasmi vel Lipothymia, quali in sensu fere ab omnibus accipitur: propterea voluerunt hic intelligere immodicum fluxum. At vero ipse textus non indicat immodicum vel diu durantem mensium fluxum, neque dicit ex fluxu muliebri si fiat Convulsio vel Lipothymia, verum dicit huic fluxui si superveniat, id est si talia symptomata fiant in fluxu muliebri, malum signum est. Equidem hodie pronunciamus malum, si femina versetur in naturali menstruatione, atque tum a Convulsione vel Lipothymia corripiatur; nam observavi ab his supervenientibus symptomatibus illam menstruationem non solum turbari, verum etiam in medio fluxu sufflaminari, cum multo detrimento mulieris. Novi multas feminas, quæ sæpissime menstruationis tempore hujusmodi symptomatibus corripiuntur, quæque per triduum vel ultra decumbere debent, donec cessaverit ille fluxus, etiamsi non sit immodicus. Igitur Convulsionem & Lipothymiam non deduxi ex nimio profluvio, sed ex aliquo morbo latente, qui producit Lipothymiam aut Convulsionem, dum uterus se accingat emit-

In mensium fluxu convulsio aut lipothymia, malum.

Menses flu-
unt motu
particulari.

tere sanguinem menstruum. Quid sit Leipothymia (*Aph.* 66.) & Convulsio (*Aph.* 51, III & *Aph.* 194, I) exposuimus, ex quibus constat, homines debiles, mobilitate solidorum laborantes, his morbis sæpe tentari ex levissima causa. Restat ergo inquirere, an menstruatō talem causam suppeditet, & quando inde fiat Convulsio aut Lipothymia, quid mali ex his supervenientibus sit exspectandum. Quamvis fere omnes Medici hodie menstruationem ex sanguinis plethora derivent, non possum tamen his in omnibus assentiri, quoniam observavi in multis feminis, quibus sanguinis erat defectus, hunc tamen statō tempore fieri fluxum: sed quando motus aliquis particularis fieri incipit in uteri vasis, tunc sanguis in uteri vasis hærens extruditur, qualem motum quoque observavimus in mammis aliisque partibus genitalibus (*Aph.* 230. II & *Aph.* 232, II). Imo viri hæmorrhagiis narium assueti, priusquam sanguinem fundunt, circa nasum motum insolitum percipiunt. A forti pulsu in ulceribus sanguinis eruptio est exspectanda, ut infra sumus demonstraturi. Ex quibus omnibus colligere possumus ipsam plethoram per totum corpus non sufficere ad menstruationem, sed causam adesse debere moventem, quæ contentum sanguinem in arteriis magis ducit ad uterum & ibidem evacuat. Quoties hæc causa dirigens cessat, etiamsi maneat tali in corpore sanguinis abundantia, menses tamen sistuntur, quod experimur in feminis menstruantibus si subito aliquo terrore corripuntur. Hic nunc motus particularis derivans sanguinem ad uterum, & eum evacuans, non raro reliquum corpus in consensum trahit: quod si cadat in mulieribus mobilitate solidorum laborantibus, quorum corpora ex minima causa admodum turbantur, sæpe fit quod per consensum hunc mulier corripatur Animi deliquio aut Convulsione, quæ hodie vocatur Convulsio Hyßterica. Quibus symptomatibus obortis, sæpissime in medio fluxu supprimuntur menses, qui deinceps difficile revocantur. Nam Leipothymia exstinguens omnem motum vitalem etiam simul exstinguit hunc motum particularem uteri, qui cessante lipothymia non semper redit, quod sæpe observavimus in

in feminis Mobilitate solidorum laborantibus & ceteroquin sanis. Eodem modo Convulsio hysterica commutat motum alternum constringentem & dilatantem, quo propellebatur sanguis menstruus, in motum tonicum perpetuo contrahentem, quæ tetanica constrictio non solum valet cohibere menstruum sanguinem, verum etiam lochiorum fluxum, imo si parturienti superveniat, quod sæpe observavi, inhibet foetus exclusionem. Igitur Lipothymia vel Convulsio superveniens valet suppressere naturalem mensium fluxum. Non erit ulterius opus rogare, cur dicatur malum, & quid mali fiat, si Animi deliquium vel Convulsio superveniat, quum menstrua naturalia suppressa semper malum dicantur. Non sufficit in Arte Medica scire, quid sit malum, simul indicandum est auxilium, quod id malum vel tollit vel mitigat. Quoniam hoc malum sæpe accidit & per experientiam didici, si ex spasmis subsistebant menses, me potuisse antispasmodicis anodynis menses revocare & minuere molestiam ex spasmis natam, hæc auxilia reticere nolui in juniorum Medicorum gratiam. Si vero Lipothymia fuerit causa, his admisceo quædam spirituosæ aromatica & sales volatiles cum optimo successu.

LIB. V. APH. LVII.

250. **M**ensibus copiosioribus prodeuntibus, morbi contingunt: & non prodeuntibus, ab utero sunt morbi.

I.

Superius (Aph. 3, v.) notavimus mensium fluxum esse feminis naturalem evacuationem, si sint ætate maturæ, neque lactantes, neque gravidæ; hoc autem loco determinanda est hujus evacuationis quantitas, aliter enim intelligi nequit num menses fluant copiosiores. Hippocrates

Mensium
naturalis
quantitas.

& ex ejus auctoritate multi medici quantitatem comparant duabus neminis Atticis. Quia vero stillatim exit sanguis, & recipitur linteis, ratione exsiccationis & quia sanguis ille seorsim ponderari nequit, vix valemus evacuati sanguinis pondus determinare. Præterea non omnibus mulieribus æqualis est quantitas, quædam enim triplo majorem copiam fundunt quam aliæ, quæ tamen omnes sanæ vivunt. Quamobrem ut determinetur quantitas mediocris, id debemus sciscitare ex ipsa femina, an dum sana sit, soleat tantam circiter quantitatem singulis mensibus evacuare. Hæc quantitas varia in diversis feminis, sive sit major sive minor, mediocris censenda est. Possumus tamen aliquomodo ex habitu & diætâ conjicere quantitatem. Quippe in corporibus mollibus succulentis & feminis otiose & opipare viventibus, multo major est menstruationis mediocris quantitas, quam in corporibus strigosis & durioribus, atque in feminis duriter & parce viventibus.

Quinam
morbi ex
mentibus
copiosioribus.

II. Si femina vel singulis vicibus majorem copiam sanguinis fundat per pudenda, vel crebrius menstruationem patiatur, vel laboret continuo stillicidio, illa evacuabit majorem sanguinis copiam, quam suum corpus ex alimentis assumptis conficere potest, unde generatur sanguinis rubri defectus, & reliquum corpus conficietur macie, vel turgebit humore lymphatico aut cachectico. Nam continuata nimia sanguinis evacuatione, quæ ingeruntur alimenta & potulenta non possunt in bonum humorem commutari, quam ad humorum præparationem, non solum requiratur firmarum partium actio, sed & debita vitalis humoris admisti quantitas, quæ tali in corpore deficit. Illa ingesta alimenta & potulenta actione vitæ non subacta in propriam corruptelam abeunt: prout nunc ille humor ex alimentis imperfecte præparatus in tenuitatem, lympham, cacochyliam, putrilaginem abeat, ita quoque demum nascuntur morbi. Nam tenuitas humorum vasculorum orificiis non retinenda relinquit corpus aridum, & tandem marasmo consumit. Lympha tenuis, vel pituita viscosa in cellulis pinguedinosus collecta Anasarcam, vel Leucophlegmatiam inducit. Putrilago
nata

nata producit Cacohymiam cum colore lurido. Omnes hi morbi omnem respuunt curationem durante copiosiore menstruatione, sed si moderatus fiat fluxus, & corpus firmetur roborantibus, atque alimentorum confectio promoveatur stomachicis, sensim evanescent recensiti morbi, & recuperabitur color ruber sanguinis.

III. Menses non prodeunt vel ex naturali vel ex morbosa causa; nam ante pubertatem, & vietus salubriter non apparent; neque in gravidis & lactantibus. Quare ad has subsistentes menses non respicit Auctor, verum si in femina matura neque gravida neque lactante menses non prodeunt observavit uteri morbos fieri. Sed inde concludere nolit per reliquum corpus nullos fieri morbos, hoc enim non quadraret observationibus practicis, quæ docent multos morbos totius corporis fieri a mensibus non prodeuntibus, quod non est hujus loci exagitare. Verum ex mensibus non prodeuntibus multo frequentius fiunt uteri morbi quam ex mensibus profluvio: nam in profluvio si quid morbosum esset in utero, id simul evacuetur: sed in mensibus non prodeuntibus plerumque causa suppressionis latitans in utero, ibidem continetur, atque sanguis hic evacuandus retentus & accumulatus uteri morbos inferre potest, nempe obstructionem, sanguinis coagulationem, stagnantis corruptionem & multa alia mala. Propterea conducit ad evitandos uteri morbos procurare, ut menses non prodeuntes omnimodo referentur & ducantur, priusquam recensiti morbi fuerint firmati. Curationis modum hic addere nequeo propter multiplices causas menses supprimentes, quæ non omnes eadem methodo sunt tollendæ.

A Mensibus non prodeuntibus, ab utero fiunt morbi.

LIB. V. APH. LVIII.

251. **R**ecto intestino inflammato, & utero inflammato, & renibus suppuratis, urinæ stillicidium supervenit. Hepati autem inflammato, singultus supervenit.

I.

Intestino recto inflammato supervenit stranguria.

Quid sit Stranguria seu Urinæ stillicidium supra (Aph. 110, IV) exposuimus, ex quo loco simul constitit hunc morbum ex variis causis nasci: hoc autem loco indicat Auctor intestini recti inflammationem, sed non determinat, num Inflammatio hæc sit causa stranguriæ, an vero stranguria per aliam causam natam ad Intestini recti inflammationem accedat, nam utroque modo stranguria supervenire potest. Hoc autem non fecit sine ratione, quum non semper ex intestino recto inflammato generetur stranguria. Quippe in feminis raro fit ex intestino recto inflammato stranguria, quia vagina interposita facit ut inter intestinum rectum & urethram minor sit communitas quam in viris, in quibus hæ partes juxta locatæ sunt. Dein non semper ex Inflammato intestino recto ita consentit vesica vel urethra ut stranguriam faciat. Tamen propter vicinitatem harum partium, & quia ex Intestino recto inflammato etiam interdum afficitur Vesica vel Urethra, fieri potest stranguria. Propterea non debemus semper in inflammatione intestini recti quærere aliam causam stranguriam inducentem, quamvis videatur morbus novus, quum Inflammatio latius dispersa, vel vesicam & urethram in consensum trahens, stranguriam inducere possit. Hoc boni ex hac observatione habemus, quod solummodo tentemus curare Intestinum rectum inflammatum, post cujus mitigatione-

tigationem & curationem curabitur quoque sponte stranguria.

II. Hoc in loco non solum illam partem intelligi, quam hodie uterum vocamus, verum etiam Vaginam mihi verisimile videtur, quoniam vagina magis consentit urethræ & vesicæ, quam uterus ipse. Quando igitur in femina Uterus aut ejus Vagina ab inflammatione tentatur, eodem modo, ut statim dixi de Intestino recto in viris, stranguriam inducere potest, & curari debet. Quomodo Inflammatio ab Erysipelate harum partium distingui potest supra (Aph. 236.) exposuimus; interim credibile est Erysipelas æque quam Inflammationem producere posse stranguriam.

Utero inflammato
supervenit
stranguria.

III. Sive Renes, vel ex prægressa inflammatione formaverint pus, sive corrodendo vel detritu calculi contraxerint ulcus pus fundens, quamdiu istud pus est blandum redditur per urethram sine ulla rosione, unde sæpe in empyematicis, phthisicis, & critica evacuatione morborum acutorum redditur cum urina pus, sine ulla inducta stranguria, quoniam interna urethræ latera mucos naturali obducta non afficiuntur a puris transitu. Si vero istud pus redditur acre corruptum & ichorosum, non solum simul in transitu suo aufert mucum naturalem, verum etiam tangens nuda latera vesicæ & urethræ, irritando facit ut involuntarie contrahantur. Hinc in principio dum fluere urina incipit, urethra se dilatari permittit, sed in transitu irritata se contrahens iterum exitum urinæ & puris intercipit, qualis morbus vocatur stranguria. Quoniam non omni in casu pus ita est acre & corruptum, non semper adest stranguria. Sed si superveniat, signum est majoris acrimonie & corruptionis in pure transeunte, quod malum est, & difficiliorem curationem arguit.

Renibus
suppuratis
stranguria
supervenit.

IV. Hepar inflammari posse, quum donatum sit arteriis ab aorta provenientiibus, in quibus omnibus inflammatio fieri potest, nemo inficias ire potest: non tamen in omni Hepatis inflammatione generatur Singultus, propterea, si interdum Singultus superveniat interdum vero non, vel hoc pendere debet ex natura aut magnitudine inflammationis,

Hepati inflammato
singultus
supervenit.

vel ex diverso loco inflammato provenire debet. Quum vero experimur interdum in graviore hepatis inflammatione non fieri Singultum, qui vero supervenit quandoque leviori inflammationi, videtur mihi ex parte hepatis diversa inflammata Singultum nasci. Hepar ipsum præter motum exiguum vitalem ad nutritionem sui, & motum particularem ad bilis confectionem, non possidet motum, quo potuisset æmulari Singultum: inde necesse est, ut hepatis quædam pars inflammata Diaphragmati consentiat, ut ita convulsive deorsum tracto subito Diaphragmate, cum simul clauditur larynx, in nobis generetur Singultus. Nam statuere velle ab oesophago convulso singultum fieri, id non responderet phænomenis, quia oesophagi convulsio, elevando diaphragma extruderet aërem, dum in singultu attrahitur aër, cujus introitus simul intercipitur. Crederem ergo Ligamenta hepatis nectentia hepar diaphragmati esse inflammata, quando singultus superveniat. Facile ergo ex his colligitur omnia spirituosæ & arcana contra singultum hunc nihil valere, sed eum curandum esse, uti curantur omnes morbi inflammatorii.

L I B. V. A P H. LIX.

252. **M**ulier si in ventre non concipiat, velis autem scire an conceptura sit, vestibis circumtectam subter suffito, & si quidem procedere tibi videatur odor per corpus ad nares & ad os, scito, hanc non propter se ipsam infæcundam esse.

I.

An suffitus
dignitatem
possit num
mulier sit
fœcunda
vel sterilis.

Nulla in parte Medicinæ plures nugæ & perversas sententias detexi, quam quæ complectitur partes genitales & ipsam generationem, quod forsan ex ignorantia structuræ præcipue natum est. Ita supponit

Auctor

Auctor feminam foecundam transnittere fumum aromaticum (Aph. 221) pudendis receptum, ut naribus & ore percipi possit: e contra feminam sterilem non transnittere eum vaporem. Quasi aura feminalis per totum corpus feminae incurrere deberet, ut inde redderetur femina praegnant. Haec sententia tam inanis est & inutilis, nullis experimentis fundata, ut non egeat refutatione, quia ad concipiendum sufficit si semen virile veniens in uteri cavitate impraegnet ovum femineum maturum aliter sterile. Sed non est opus totum corpus permeat semen virile ad impraegnationem. Praeterea multae sunt causae sterilitatem inducentes, quae experimento unico unam verbi gratia causam detegente, non possunt detegi. Quamvis poneretur feminam percipere debere odorem in naribus & ore, forsitan annueret se percipere odorem eum, ut celaret sterilitatem. Satiuse ergo duco hoc experimentum non instituere, ut nulla suspicio foecunditatis vel sterilitatis per experimentum hoc introducatur. Si tamen scire expedit, inspiciendae sunt externae partes genitales, num tali laborarent vitio, quod seminis virilis admissionem intercipit, quo non invento pronuntiandum est, nos nullam causam sterilitatis detegere posse.

LIB. V. A P H. LX.

253. **S**I mulieri in utero gerenti purgationes prodeant foetus sanum esse impossibile.

I.

Observavit quibusdam in feminis Auctor menses fluere etiam si sint gravidae, hoc etiam hodie observatur, sed raro: in his detexit semper fuisse foetus debilem, unde iudicavit hoc aliter fieri non posse. Videamus an ex natura rei fieri non possit, ut foetus tamen nascatur

An perseve-
rante men-
struatione
foetus sanus
manere ne-
queat.

fanus ex gravida fœmina, cui prodiebant purgationes. Creavit Deus ita corpora feminarum, ut ætatis tempore maturo plus conficiant ex alimentis assumptis, quam ad nutritionem sui requiratur, hoc abundans, nisi statim tempore evacuetur, multos parit feminis morbos. Non omnibus autem feminis æqualis est hujus abundantiae generatio, quædam enim novi, quæ & tempore graviditatis & lactationis satis copiosa menstrua fundebant, sine ulla inducâ debilitate. Quamobrem Auctori in omnibus assentiri nequeo statuenti fieri non posse, ut fœtus maneat sanus; sed statuendum est hoc raro fieri, quod quædam femina gestationis tempore menstrua habeat. Adducunt tamen argumenta, quæ ex natura rei probarent fœtum debilem fieri debere. Nam menstruus sanguis, quî destinatus erat ad alendum fœtum, eliminatur; unde supra (*Aph.* 224) dixit, mulierem gravidam secta vena abortire. Alii autem putant menstrua fluere non posse, nisi uteri os aperiatur, vel & quædam placentæ portio separetur ab utero. Quod si rationes hæ essent veræ menstrua non fluerent sine instante abortu: verum quibusdam feminis satis copiose menstruantibus ex vagina profluit sanguis, ut non sit opus in quovis fluxu menstruo, os uteri aperiatur in tali gravida, vel placentæ portio separetur ab utero. Hoc autem verum est in gravidis menstrua detrahare portionem nutrimenti: sed si fiat in femina admodum plethorica, illa ablata quantitas nullum periculum adferre potest; quare his temporibus admodum frequens venæ sectio in gravidis raro abortum infert: & inveniuntur feminae plethoricæ, otiose & opipare viventes, quibus, nisi bis aut ter gestationis tempore secetur vena, abortus imminet.

LIB. V. A P H. LXI.

254. **S**I mulieri purgationes non prodeant, neque horro-
re, neque febre superveniente; cibi autem fasti-
dia ipsi accidant, hanc in utero gerere putato.

I.

SI concepit mulier non est opus ut ulla mutatio morbo-
sa in eo corpore fiat, solummodo enim augetur uteri
moles, & sanguis, qui per menstrua effundi solebat,
nunc cedit in embryonis incrementum: unde quædam femi-
næ ex conceptu nullam molestiam percipiunt: imo inveni-
untur, quæ nullo tempore ita vivunt valentes, quam dum
sunt gravidæ vel lactantes. Si igitur femina perfecte sana,
cui sine ulla visibili vel cognita causa subsistunt menses, a no-
bis exigit scire, num ipsi ex graviditate vel morbosa causa
interna menses subsistant, egregium responsum dedit nobis
Auctor, dicens si huic superveniat cibi fastidium vel & ap-
petitus alienus sine horrore & sine febre, judicandum est
talem feminam esse gravidam, modo per tres quatuorve
periodos non prodierint menstrua. Non tamen judican-
dum est omnibus feminis in principio gestationis corripi
cibi fastidio, si vero istud accadat necesse erit, ut non habeatur
simul horror & febris: nam si dicta simul adessent, incer-
tum esset signum graviditatis, sed potius morbosæ suppressio-
nis. Meretur igitur rimari, cur a mensibus suppressis ex
morbosa causa febris & horror simul producantur, dum
vero in Menstruis subsistentibus fere semper solum cibo-
rum fastidium producat. Si menstrua subsistunt ex gra-
viditate, non est opus, ut illa labes morbosa fiat ex destru-
cto æquilibrio humorum, quod semper destruitur, si men-
strua subsistant ex causa morbosa. Uterus autem sensim
mole increscens intestina ex sua priori sede detrudit, atque

Menstrua
sponte sub-
sistentia
cum fasti-
dio, sine
horrore &
febre gravi-
ditatis sig-
num.

uteri actio fit majoris vigoris. Per hanc mutatam sedem & auctam uteri actionem, ventriculi motus sæpe in feminis perturbatur, ut vomant, nauseant, fastidiosæ fiant, ut quidam procelloso mari non assueti: tandem vero magis progressæ gravidæ feminæ, huic motui & sedi assuescentes, nam amplius fastidiosæ manent, ut homines longis navigationibus exercitati. Hujusmodi etiam feminis, licet ita fastidiosæ sint, urina manet sana, ut indicavimus (*Aph.* 234, 1.) Sed quando menstrua ex morbosa causa subsistunt, non solum generatur fastidium, sed propter cacochyliam (*Aph.* 127, II) ex æquilibrio destructo natam, generantur insuper horror, febris, & alia cacochymix signa. Docemur ex hac observatione evidentissime, quid sit in tali gravida femina fastidiosa agendum, nempe compescendus est motus ille inordinatus ex consensu productus per similia, quæ experientia didicit compescere nauseam navigationis, qualia sunt vinosa grata acidiuscula, & spirituosa aromatica, quæ si non sufficiunt, aliquod anodynum lene est admiscendum. Talia danda sunt ad compescendum fastidium, ne continuato fastidio gravida femina aliquod damnum patiatur.

LIB. V. APH. LXIII.

255. *Quæ frigidos ac densos uteros habent, non concipiunt. Et quæ præhumidos habent uteros, non concipiunt: extinguitur enim ipsis genitura. Et siccos magis & adurentes: alimenti enim inopia semen corrumpitur. Quæ vero ex utrisque temperamentum habent moderatum, hæ ipsæ proliferæ sunt.*

I.

Uteri tempera-
menta-

Quemadmodum Veteres quatuor posuerunt in homine vivente Temperamenta simplicia, totidemque composita finxerunt. Ita etiam in Utero, tanquam parte speciali,

speciali, eadem Temperamenta quæsiuerunt, nempe Frigidum, Humidum, Siccum, & Calidum; atque ex his quatuor compositum, ut frigidum & humidum vel siccum; atque calidum & humidum vel siccum. Quod si vero nihil horum excedebat, dicebatur Eucrasia. Hæc temperamenta erant Temperata, quando non ita excedebant, ut inde fierent morbi, sed Intemperata, si morbos producerent. Quamobrem in fine inquit moderatum temperamentum non inferre sterilitatem, sed quando Temperamenta illa modum excedunt, sterilitatem inferunt. Quando igitur hic agendum erit de Temperamentis sterilitatem inferentibus, semper intelligendum erit Temperamentum intemperatum. Ex his elegit solummodo quatuor Temperamenta simplicia, quia si habeantur composita temperamenta intemperata, eo maior erit sterilitatis causa. Hinc quoque concipitur, ex qua causa dicit *ex utrisque*, ut indicaret Temperamentum simplex & compositum, aliter dicere debuisset ex his quatuor &c.

II. Quum Uterus in corpore lateat, per propria signa non potuerunt ejus intemperantiam detegere, propterea si volebant scire, num hac vel illa laboraret intemperantia, primo perscrutabantur signa generalia. Temperamenti frigidi, calidi, sicci & humidi totius corporis, ex quibus conjiciebant uterum eadem intemperantia laborare: dein perpendebant magis propria signa ex pilis pudendorum, ex mensibus fluentibus, & denique ex actione generationis. Si igitur Pili essent breves, molles, rari, flavescentes, non ultra pudenda nascentes; si Menstrua sero veniant interdum post vigesimum ætatis annum prima vice sine causa alia morboſa retinente, quæ etiam præmature desinunt vix post quadragesimum annum, quæ prodeuntia fundebant sanguinem tenuem, aquosum, frigidum; si feminae se facile abstineant a venere & eâ vix dilectantur, statuebant hujusmodi uterum intemperantia frigida laborare. In tali utero simul statuit densitatem, utpote ex abundantia frigiditatis uterus non potuit allatos humores discutere, sed ex iis in se collatis densitatem facit. Quamobrem vero talis Ute-

Uteri frigiditas sterilitatis causa.

rus sterilitatem parit rationem dat, quia genitura in ipsis exstinguitur, quæ quoque ratio est in utero præhumido. Certe ratiocinium hoc non ita recedit ab experientia & veris rationibus, ut multi ex hodiernis autumant, est utique magis conveniens quam ex fermento corrupto vel quavis postea inducta hypothesi deducere sterilitatem. Nam si ponamus in partibus genitalibus actionem languidiorem, cujus ope conficiuntur ova matura, & ea devolvuntur ad uteri cavitatem, ea deficiente formantur immatura ova generationi inepta & non pervolvuntur in uteri cavitatem, ut ab allato semine virili imprægnari possint, sine quibus femina concipere nequit. Nemini mirum videri potest quod solus uterus frigiditate laborare possit, qui perpendit actionem generalem vitalem, quæ in nobis est calefaciens causa, quadam in parte ita languere posse, ut una duntaxat pars, verbi gratia manus vel pes, præ ceteris partibus frigida sit: & eo magis si perpendimus partes genitales habere specialem sibi actionem, quæ sola debilitari potest, quod frequentissime quoque experimur in ventriculo, intestinis, hepate, cerebro, aliisque organis particularibus. Quali modo hæc intemperantia frigida sit curanda, ut ita fiat femina fertilis, ex data theoria facile deduci potest, nam generalia quæ intemperantiam frigidam curant, sunt adhibenda & ad pudenda applicanda, vel ex uterinis eligenda, quæ simul calefaciunt & roborant, qualia medicamina passim exstant apud Veteres Practicos.

Uteri humi-
ditas sterili-
tatis causa. §

III. Quod monuimus supra in Uteri frigiditate, hoc est repetendum in Uteri Humiditate: nam post signa generalia temperamenti humidi attendendum est ad partes genitales, quæ ad contactum sunt molles tumidæ & frigidiores; menstrua pallida, aquosa, sæpe copiosa; frequens fluor albus; lumborum frigus & gravitas. Quia vero non generatur talis intemperies humida, nisi simul adsit firmarum partium laxitas atque motus vitalis & actio istius partis sit debilior, eodem fere modo ut frigida intemperies Sterilitatem inducit, imo frequentius, quia humoris crudi abundantia, si forte generarentur ova matura, ita submergeret ova, ut

ut a femine virili non potuissent imprægnari. Præter recensita auxilia Discutientia hic conveniunt.

IV. Non omnis Uteri ficcitas ad hunc titulum pertinet, nam ficcatus uterus ex inflammatione aut erysipelate, vel si propendens ficcetur, talis ficcitas numeratur inter morbos: verum si Uterus suo loco manens minorem copiam humoris in se continet, & fundit per pudenda, talis dispositio uteri sicca intemperies vocatur, quæ desumitur ex signis generalibus Siccitatis totius corporis, atque ex pudendis aridioribus, vix ullam humiditatem stillantibus, ex mensibus paucis & sanguinem compactum exhibentibus. His fieri dicit Auctor Sterilitatem ob alimenti inopiam. Ova quidem generantur & imprægnari possunt, sed quando illa ex uteri lateribus capere debent nutrimentum & incrementum, ex humidi defectu ovum imprægnatum perit, atque ita in principio gestationis fit abortus: vel dein liquescens in utero, abiens in humorem tenuem corruptum, absorbetur, ut non prodeat in lucem. Talis ergo femina otiose vivere debet, & diæta humectante uti, conducet etiam genitalia fovere fotu vel vapore aquoso, ut laxentur fibræ & suppeditetur major humidi copia.

Uteri ficcitas sterilitatis causa.

V. Etiam si veneris appetentiam deducant ex Uteri caliditate, Calida tamen Intemperies hic proponitur ut causa Sterilitatis, quia semen corrumpitur alimenti defectu: igitur non multum distat ab intemperie sicca, nisi quod simul habeatur major veneris appetentia, imo furor uteri. Sed quoniam uteri Caliditate id est validiore motu in suis fibris, omne humidum discutitur, ova imprægnata exsiccantur, ut in fœtum increfcere nequeant. Præter recensita auxilia in ficcitate quædam simul refrigerantia sunt adhibenda. Auctores præcipiunt feminam talem sterilem imprægnari posse si nubeat viro opposita intemperie laboranti: ut si femina frigida in matrimonio habeat maritum calidum, & ita porro, unde provenit quod in sequentibus nuptiis talis femina sterilis fiat prolifera.

Uteri caliditas sterilitatis causa.

LIB. V. APH. LXIII.

256. *Similiter autem etiam in masculis. Aut enim propter corporis raritatem spiritus extra fertur, ut semen non demittat. Aut propter densitatem humidum non pervadit foras. Aut propter frigiditatem non incalescit, ut ad hunc locum congregetur. Aut propter caliditatem hoc idem contingit.*

I.

An Intemperies nequit esse sterilitatis causa in masculis?

UTi in feminis formantur ova speciali fabrica & actione ovarii, ita in viris a testium fabrica & actione conficitur ex allatis humoribus semen, quod ulterius per epididymidem & vas deferens delatum, atque in vesiculis feminalibus collectum ad majorem perfectionem deducitur. In utroque sexu vitiato organo induci potest sterilitas. Ita ab uteri morbis vel vitiata fabrica interdum non conceditur feminis virilis admissio; vel ovaria corrupta vel obstructa non proferunt ova: In masculis eodem modo a membro virili intorto vel nimis curto, vel alio modo vitiato, semen duci interdum nequit in uteri cavitatem, vel a testibus scirrhis vel obstructis non generatur in viris bonum semen. Atque ita per multos morbos in utroque sexu nascitur sterilitas. Has autem omnes causas noster Auctor in hoc Aphorismo assignare noluit, quamvis a Commentatoribus allegantur, sed per hanc sententiam adstruere conatur ab intemperie æque in masculis quam in feminis sterilitatem induci posse, hujusque rationem addit, quæ an multum vel parum valeat non curabimus. Observavit Hippocrates, ut & nos hodie, quod viri interdum ex matrimonio non accipiant liberos, in quibus viris vel feminis nullum apparet vitium sterilitatis, femina tamen illa in secundis nuptiis invenitur prolifera. Propterea judicavit vitium

tium sterilitatis in femine virili latitare, quod quadam Intemperie laborat. Galenus acriter hic insurgit, credens hunc aphorismum esse spurium & Hippocrati indignum, quasi ex Intemperie non potuisset in masculis fieri sterilitatem. Ego vero puto hanc causam æque valere inferre sterilitatem masculis quam feminis. Uterus etenim non est organum ova feminea formans, sed ea generantur in ovario, ex humore suis vasis allato, per actionem specialem: sine ovis his maturis & bene formatis nullus fit conceptus in utero, etiamsi uteri cavitas femine virili optimo esset plena. Itidem in viris per actionem testium ex allato humore præparatur semen prolificum: si vero illa actio testium vel sit debilior vel aliena, conficitur quidem in testibus liquor & ducitur ad vesiculas feminales, sed quia non continet illa animalcula viventia, quæ in femine bono deteguntur microscopiis, ille liquor feminalis ad ovula feminarum applicatus, ovulum imprægnare nequit. Non enim sufficit ut ovum maturum femineum in utero irroretur liquore quodam ex viro proveniente, ut imprægnetur, sed requiritur semen maturum his viventibus animalculis præditum. Quia vero demonstravimus per Intemperiem ita mutari posse actionem, quæ facit ovula in ovario, ut nullum inde perfectum & maturum ovulum prodeat, nulla mihi videtur restare ratio, cur non æque in viris per Intemperiem prædominantem potuisset produci liquor feminalis generationi ineptus. Imo verisimile videtur, hanc causam frequentissimam esse causam sterilitatis in viris. Sed quoniam in feminis hæ causæ non solum inferunt sterilitatem ex imperfectis natis ovis, verum etiam si uteri quoque corpus eadem laborat, ratione incrementi foetus, virisimile videtur hanc Intemperiem frequentius in feminis quam viris inducere sterilitatem.

LIB. V. APH. LXIV.

257. **L**ac dare capite dolentibus malum. Malum vero etiam febricitantibus, & quibus hypochondria elevata sunt murmurantia, & siticulosi. Malum autem & quibus dejectiones biliosæ, & qui in acutis sunt febribus: & quibus copiosi sanguinis facta est egestio. Convenit vero tabidis non admodum valde febricitantibus lac dare, & in febribus longis & languidis, nullo ex supra dictis signis præsentem: & præter rationem quidem extenuatis.

I.

Lactis exa-
men.

Quid sit Lac & quomodo generetur in mammis mulierum vel uberibus animalium exposuimus (Aph. 232,) ex quibus colligi potest, præcipuam materiem esse chylum ex alimentis assumptis confectum, actione corporis aliquomodo mutatum, ut ex eo facilius quam ex crudis alimentis produci possint nostri humores sani & proprii. Omnia genera alimentorum ab lactantibus animalibus assumpta, per actionem organi chylicationis & affluxum humorum saponaceorum ita solvuntur in sua veluti principia, ut referant massam homogeneam albicantem ad adspectum, quam chylum vocamus. Hic constat ergo alimentis solutis, liquoribus affusis, quibusdam partibus non solubilibus, quibusdam etiam adhuc immutatis, & portione quadam omnino soluta & nutritioni adaptata. Talis humor in massam circulatoriam delatus, reliqua actione pulmonum & artierum per totum corpus, & propria natura admistorum nostrorum humorum, magis præparatus in humorem nutritivum, amittit sensim indolem priorem, quam possidebat in assumptis, & tandem iterata actione corporis viventis omnem priorem

priorem naturam amittit, & convertitur in nostros proprios humores. Antequam ad eam pervenerit perfectionem, utcunque quasdam retinet, proprietates priores, ut patet ex odore aliisque specialibus detectis in hoc humore proprietatibus. Quamdiu chylus talis sanguini circulantibus mistus est, in femina vel animali lactante ad mammas delatus, actione ea speciali mammarum a sanguine separatur, ubi simul utcunque in Lac commutatur, quod in se aliquomodo continet naturam non facile domabilem assumptorum. Non debemus judicare purum chylum ita separari ab allato sanguine, sed tenendum est etiam aliquid de præparatis propriis humoribus istius corporis chylo esse mistum, ut constituat Lac, quibusdam in proprietatibus a chylo distans, & eo magis, quia actione mammarum ille allatus chylus aliquam quoque mutationem subiit. Hinc Lactis materia petenda ex assumptis & propriis humoribus istius corporis, qui uniti subierunt aliquam mutationem in mammis. Ille igitur humor experimentis est examinandus, quales proprietates possideat, antequam aliquid certi de ejus usu in morbis possimus adstruere. Lac ex animalibus desumptum, quæ solis plantis vel gramine vescuntur, in loco tepido retentum, secedit in tres partes, superne colligitur butyraceum oleosum pingue, reliquum inferius partim abit in materiem caseosam, & partim in liquorem tenuem serosum. Tota massa brevi tempore acorem contrahit. Sed quod Lac generatur in mulieribus & aliis animalibus carne utentibus, sibi relictum non contrahit acorem sed potius rancorem. Omne Lac facile coagulatur, seu ejus pars caseosa facile unitur & secedit a reliquis, & se uniet in corpus firmum. Meretur nunc inquirere quodnam genus lactis in hoc loco intelligitur. Quia vero olim ut hodie Lac vaccinum in frequentissimo fuit usu, nullum est dubium, quin in hoc loco sit accipiendum Lac vaccinum, nam ovinum vel asininum si dari debet, animalis nomen adjectum invenitur. Lac vero ex animalibus carnem vescientibus raro vel nunquam datur: sed ex mulieribus solis phthisicis & infantibus conceditur. Quare quidquid dicatur

de usu lactis in sequentibus morbis, id Lacti vaccino est adscribendum. Hoc lac quia desumitur ex animali, quod solo gramine & aqua vescitur, ejus spontanea mutatio est in coagulationem & acorem, ejus materia ita est soluta & præparata, ut proxime accedat ad naturam nostrorum humorum.

Lac in capite dolentibus an malum.

II. Non inficior Hippocratem observasse usu lactis intendi capitis dolorem, & qui his doloribus sæpe sunt obnoxii per nimium lactis usum in Capitis dolorem incidisse. Neque negari potest, capitis dolorem leniri usu lactis, quod sæpe in praxi observavi. Ergo incertum videtur, num lactis usus conveniat vel noceat. Quia vero Capitis dolor a multis causis possit fieri, quarum quædam usum Lactis exigunt, aliæ vero respuunt, absolute poni nequit, num conducatur vel noceat Lactis usus. Ita tamen solent Veteres ratiocinari in morbis, qui ex diversis causis oriuntur, ut morbum talem habeant legitimum, qui ex frequentissima causa oritur. Ita absolute dicitur Pleuritis si fiat ab inflammatione; Nephritis a calculo: iidem autem morbi ab alia causa nati habebantur illegitimi seu nothi. Hoc etiam statuendum est in Capitis dolore, qui frequentissime oriuntur ex sanguinis abundantia & impetu majore ad caput. His hominibus si detur multum Lactis, quod prompte cedit in bonum sanguinem, generatur ex exhibitione ea capitis dolor, quia augetur sanguinis copia, quæ doloris est causa. Hic vero Lactis acorem accusare vel vaporem caput petentem ut multi, non videtur mihi alicujus momenti, cum decocta farinosa, quæ citius acorem contrahunt, laudentur; & sæpe utimur lactis vapore naribus attrahendo, ut medemur capitis doloribus.

An Lac non dandum febricitantibus.

III. Propter rancorem, in quem dicunt cito abire Lac, non sunt ausi Lac dare febricitantibus, magis credo ut quadam ratione firmarent Hippocratis & Galeni sententiam, quam ut proferrent veritatem. Nam in febribus essentialibus (*Aph.* 153) conveniunt acescentia, quale medicamentum est Lac, quod in calore retentum brevi acescit, ut supra probavimus. Reponunt tamen, lac potum brevi post rutum.

Etum nidorosum facere, quod ejus cremor seu pars buty-
racea in rancorem abeat; & Lac coctum rancidum fieri.
Vera sunt experimenta, sed non probant id, ad quod ad-
ducuntur, nam iisdem in hominibus a pura tepida aqua
pota etiam fit ructus nidorosus, ex quo experimento nemo
colligere potest aquam commutari in nidorem, sed adfuisse
pinguedinem corruptam in ventriculo, eamque aquæ tepidæ
potu solutam, & ita supernatantem, ructum nidorosum face-
re, quod etiam a lactis potione fit. Lac diu coctum ni-
dorem contrahere verum est, sed tantus non est ventriculi
in febricitantibus calor, ut inde lac coqui possit. Alia i-
gitur esse debet ratio, quamobrem non damus febricitan-
tibus Lac, & cur ex ejus usu intenditur febris. Illa ratio
plana est: in omnibus febribus calidis victus humidus (*Aph.*
16.) est imperandus, & tenuis debet esse Diæta in omni
morbo acuto (*Aph.* 7, 8, 10, 11 &c.) Quando igitur
Lac multum nutrimenti præbet, febribus obest. Lac vero
multum nutrimenti continere cum ex chylo formetur, nemi-
nem latere potest. Si ergo quis vellet Lac dare febricitan-
tibus, istud multa aqua prius est diluendum. Tali modo di-
lutum Lac expertus sum febricitantibus potum esse egre-
gium, sed si merum Lac detur, propter copiam nutrimenti
a febricitantibus tolerari non potuit.

IV. Nonnulli elevata hypochondria murmurantia referunt ad febriem antecedentem, alii vero hoc phænomenon sine febre accipiunt: utrumque casum perpendemus. Si hypo-
chondria sint elata murmurantia ex febre, tunc signum est
materiem febrilem magis ferri ad intestina, & eorum mo-
tum turbare. (*Aph.* 183) Ex febris ratione deduximus
non convenire Lac, sed & motus admodum perturbatus in-
testinorum convertit Lac merum assumptum in corruptelam.
Experientia constat eo validiorem corruptelam fieri, quo
plus nutrimenti est in assumtis, inde teterrima corruptio
ex pinguedine producit. Propterea Lac merum in tali
symptomate non conducit. Quibus vero hypochondria ele-
vata murmurant sine febre, illis utplurimum contenta inte-
stinorum aliquam faciunt commutationem in acidum specie
fermen-

Lac an no-
ceat quibus
hypochon-
dria elata
murmurant

fermentationis, & quoniam lac in loco calido citò etiam acescit, non convenit tale dare alimentum, quod sponte acescit.

An Lac non
dandum si-
ticolosis.

V. Sitis naturalem causam esse defectum humidi in corpore, quo os siccatum nobis Sitis sensum concitat, demonstravimus in speciali Exercitatione de Siti: hæc causa fit eo major in febribus, quibus omne humidum expellitur & reliquum compingitur, quare in febribus frequentissimum & molestissimum est symptoma. Hoc ut tollatur, exigit humidi abundantioris ingestionem, quod vix aliquid nutritii in se continet. Si nunc examinemus Lac merum, id nutritio abundans, non præbet tale humidum, quale ad Sitim leniendam exigitur. Si vero magna copia ingeratur, corpus multitudine nutrimenti, quod in febribus est evitandum, opprimitur, & non suppeditatur tantum humidi, quantum ad Sitim leniendam requiritur. Qui ergo Lac potandum dare vult sitientibus cum vel sine febre, id admodum erit prius diluendum magna copia aquæ.

Num Lac
inalum,
quibus de-
jectiones
sunt bilio-
sæ.

VI. Biliosas dejectiones supra (*Aph.* 40, II, & *Aph.* 138, III) descripsimus, ex quibus constat eum hominem habere in intestinis materiem pinguem corruptam, acrem, & calidam: his igitur hominibus nulla sunt danda pingua, ne materiæ biliosæ, quæ ex pinguedine corrupta præcipue formatur, demus suppetias. Quia vero in lacte multum pinguedinis hæret, ut patet ex ejus supernatante cremore, facile intelligitur Lac dandum non esse, nisi magna copia aquæ dilutum, sed potius acescentia macra. Lactis exhibitio eo magis est evitanda, si febris acuta adsit, quæ prompte humiditatem discutit, & reliquum pingue in rancorem convertit. In dejectionibus autem biliosis sine febre lactis serum acescens, quod pinguedine caret, expertus sum egregium fuisse medicamentum, quo potui omne biliosum corruptum eliminare.

An Lac no-
cet, quibus
copiosi san-
guinis facta
est egestio?

VII. In dictione hac quædam est obscuritas, quidam enim intelligunt Diarrhœam vel Dysenteriam cruentam, in qua noceret exhibitio meri lactis; alii accipiunt sub hoc sensu omnem sanguinis evacuationem ex quacumque parte,
in

in quo etiam non conduceret; denique intelligunt quidam tempus illud, in quo æger per antecedentem sanguinis evacuationem est sanguine veluti privatus. Qualis autem sit vera sententia Auctoris non rimabimur, sed videbimus quid sit sentiendum in his diversis casibus. In Diarrhœa & Dysenteria cruenta per experientiam constat Lac ingestum vel clysmatis ope injectum magnum solamen attulisse, nam id acre quod intestina vellicat, lactis injectione & assumptione egregie temperatur. Si vero sanguis ejicitur propter tenuitatem sanguinis, vel laxata oscula vasorum, hanc dejectionem equidem non curabit, sed quoque nihil damni adferet. In quavis alia sanguinis evacuatione multi suadent lac non esse exhibendum, quia copiosiores hæmorrhagiam facit, quod etiam experimur; sed propterea non debet æger se abstinere ab omni lactis usu, modo enim moderatam copiam ingerit; sed ex copia majore damnum pateretur, quia corpus sanguine exhaustum leni & paucio nutrimento est sustentandum, quale est lac modica copia sumtum. Sed sese abstinere a lactis usu, qui debilitatus est per antecedentem sanguinis evacuationem, eum male agere existimo, corpus enim illud est restaurandum bono & levi nutrimento, quale lac suppeditat: verum hoc corpus onerare magna copia Lactis puri, esset obruere vires multitudine alimenti: quare credo Auctorem in hoc casu vetare nimiam lactis puri ingestionem. Hoc ex textu constare potest, quia dicit, quibus copiosa est facta sanguinis egestio, quibus verbis indicat eam egestionem non fieri sed factam esse, quod corpus debilitatum non fert tantam copiam puri lactis ingestam.

VIII. Quid sit Phthisis superius (Aph. 85, 11) definivimus, in quibus hominibus non est defectus concoctionis in organis chylopoieticis, sed corruptio præparati humoris præprimis in pulmonibus: in his igitur, quia tanta est boni humoris consumptio in materiem purulentam, convenit ut suppeditetur alimentum satis copiosum, quod non eget multa præparatione, quale est Lac. Propterea phthisici si non amplius alia alimenta ferre queunt, solo lacte sustentantur.

Lac convenit
tabidis.

tur. Multi quidem Lac asininum eligunt, sed ex qua ratione non intelligo. Ruminantia animalia enim perfectius sua alimenta præparant ruminando, quam non ruminantia ut Asinus, atque meliori gramine vescuntur. Si Lac asininum sit magis dilutum & inde facilius digeritur, hoc quoque obtineri potest affundendo aquam Lacti vaccino. Igitur concedo Auctori nostro, qui laudat Lac vaccinum in Tabidis, qui non admodum febricitant, ne multitudine nutrimenti lac obsit feбри, ut antea monuimus.

Lac convenit febribus longis & languidis.

IX. Diætam tenuem imperandam esse in Acutis passim observavimus in Libro Primo, ex hoc principio quoniam vis vitæ admodum laborans a morbo, per multa alimenta aggravata magis laboraret & forsan succumberet: si vero febris longior erat expectanda concedebatur victus largior, quia corpus per tam longum tempus victu tenui non potuisset sustentari. Eadem est in his febribus ratio, nam assignatur febris longa & languida, in qua corporis vires non multum instigantur, sed quæ tamen diu duratura est: in qua si non suppeditetur nutrimentum sufficiens, vires vitæ debilitarentur alimenti defectu. Hinc lac nutrimentum satis copiosum præbens, sed quod etiam facile ab actione corporis potest subigi, his hominibus est dandum ut sustententur vires.

Lac convenit præter rationem extenuatis.

X. Quænam dicantur corpora extenuata unusquisque intelligit, sed cur dicatur præter rationem meretur observare. Hæc est communis locutio Hippocratis, si significare vult non adesse causam manifestam, ex qua possumus tantam Extenuationem expectare. Mirum enim non est, quod aliquis ex morbo acuto, vel febre, vel ulcere pulmonis admodum extenuetur; sed si ipsi ægri mirantur se summo opere extenuari, dum tamen belle comedunt & non multum ægrotant. Talis tunc Extenuatio inde oritur, quia assumpta alimenta ingesta defectu virium non compinguntur in humores crassos sanos, sed tenues manent. Quo nunc alimenta majori actione compingenda sunt in humores nobis naturales, eo minus conveniunt: quæ vero levi actione vitæ commutabilia sunt, uti est lac, ista præstantissima censenda sunt. Inde Hipp: per experientiam practicam id detexit,

textit, quod ex firma theoria debuisset deduci. Sic videmus veram Theoriam semper respondere praxi.

LIB. V. APH. LXV.

258. **Q**uibus tumores in ulceribus apparent, non valde convelluntur, neque insaniunt. His autem de repente evanescentibus, quibus in postica quidem parte fuerint, convulsiones, tetani, quibus verò in antica, insaniæ, aut lateris dolores acuti, aut suppuratio, aut dysenteria, si rubicundi fuerint tumores.

I.

Hoc in Aphorismo Hipp: naturæ arcana revelat, quæ a paucis bene intelliguntur, quum sine cognitione anatomica & intellectis actionibus corporis viventis intelligi nequeant: ea tamen detexit Auctor per praxin, non vero ex prævia cognitione theoretica. Nobis enim quædam mira reliquit exempla, quomodo morbus in uno loco corporis natus possit etiam alia in parte producere morbum; num vero ille alter morbus per sympathiam vel metastasin generetur non explicat; verum docet quinam morbi producant alium in aliquo loco remoto, & quinam raro id faciant. In superioribus (*Aph.* 125, III. *Aph.* 126, III. *Aph.* 127. IV. *Aph.* 230. I. &c.) inter quasdam corporis partes maximum valere Consensum, & maxime inter illas, quæ ex eodem ganglio nervos habent, vel communem ferre exercent functionem. Inde si pars una afficiatur morbo, altera etiam afficitur, sed quoniam tali in casu non fertur morbi materia ex uno loco in alterum, hi morbi ex Consensu nati non adferunt levamen, verum semper magis opprimunt ægrum. Si vero morbi materia ex uno loco ad alterum feratur, quando vocatur metastasis, talis transplan-

Morbi ex
consensu
& metasta-
si.

tatio bona esse potest, & mala. Nam ut bona sit, omnis materia est transferenda ex parte magis principi ad minus principem, ex loco ubi exonerari non potuit ad aliquod emunctorium conveniens: ita enim æger liberari potest ab omni materia morbi. Si vero imperfecta sit translatio, vel ad partem, ubi eadem materia majus periculum inferre potest, augebitur morbus. Semper ergo attendendum in prædictionibus & curationibus ad has regulas generales. Has applicabimus ad exempla allata, multo plura quidem sunt, sed quoniam hic non est locus omnia tradere, quæ dicenda sunt de Consensu & Metastasi, pauca ea ab Auctore allata sufficient.

Non valde
convellun-
tur aut in-
saniant qui-
bus tumo-
res in ulce-
ribus appa-
rent.

II. Chirugos per Ulcus intelligere vetustam solutam unitatem in partibus firmis, in qua plerumque quædam portio simul demta est, ex nostra Chirurgia repurgata & aliis libris Chirurgicis intelligi potest. Ambitus hujus ulceris seu ora ejus vel tument vel non elevantur, prout fluens humor morbosus in istis colligitur vel non. Si multa sunt Ulcera dispersa per cutim, ut hic habetur in plurali, non possumus accusare vitium locale, sed humorem morbosum per totum corpus dispersum uti in variolis: in tali nunc statu morbofo observavit Auctor ægros non valde convelli, aut insanire, id est, rarum est si ora ulcerum turgeant, quod tunc ægri corripiantur Convulsione vel Insania: hoc etiam observamus in variolis, quoniam morbi materia per corpus dispersa tunc colligitur ad ulcera, propterea non fertur ad encephalon, ut irritando nervos inferret Convulsionem vel Insaniam. Si vero illa intumescencia evanescat, facile fieri potest, ut ad Encephalon delata materia istos morbos inferat. Non tamen illa intumescencia tam certum est signum, ut nunquam inde fieri posset Convulsio aut Insania, nam observavi in ulceribus cum læso nervo vel tendine intumescencia magnam præfagisse Convulsionem vel Insaniam. Hujus discriminis ratio est, quoniam alia pars in Consensum potest trahi, & per Metastasim recipere morbi materiem. Quod si vero ex intumescencia læsi nervi vel tendinis generetur Convulsio aut Insania, hi morbi non su-
per-

perveniant ex Metastasi sed ex Consensu, qui non admodum frequens est in ulceribus cutis.

III. In superioribus demonstratum est multa ulcera arguere morbi materiem generari per totum corpus, quæ ad ora ulcerum delata ibidem manet, donec tandem acquisita maturitate per apertum ulcus evacuetur. Si vero tali in statu evanescat intumescencia derepente, signum est eam materiem non fuisse evacuatam per ulcera, sed rediisse in communem circulationem, quod malum est, quia fertur a peripheria corporis ad interiora, & a loco ubi potuisset evacuari ad locum magis principem & ubi tam commode evacuari non potest. Igitur talis disparentia tumorum semper mala est; verum non determinat, qualis morbus sit expectandus; nam prout illa retrogressa materia in hanc vel illam partem deponitur, ita quoque morbus erit varius, & magis minusve periculosus. Actio tamen vitæ non ita est inconstans, ut sine ullo discrimine quemcumque morbum ex tali metastasi faciat, propterea experimenta practica sunt consulenda, quid natura facere soleat in tali regressu materiæ, nam hoc ex legibus hydraulicis demonstrare non valeo. Videamus ergo quid Auctor noster in morbis his detexit, & quod dein per experientiam practicam fuit firmatum.

IV. Qualis sit morbus Convulsio & Tetanus, & quantum differant, ex iis, quæ exposuimus (Aph. 167) facile colligi potest. Experimenta in corporibus viventibus docuerunt, irritatione facta ad nervos, vel duram matrem, totum corpus ceteroquin sanum adigi posse in Convulsionem vel & Tetanum. Quibus constare potest, si modo aliquid acre internum feratur & applicetur ad recensitas partes, id acre inferre posse Convulsionem & Tetanum. Nullus autem erit, qui per se non potest concipere tale quid fieri posse, si tumores derepente circa Ulcera evanescant: nam ille humor corruptus circa Ulcera subsistens evanuit, seu potius inde depulsus fuit & non emendatus, & receptus est in communi massa circulante, igitur mirum esset, si illa materia acris & morbosa quoque non fereretur.

Qui morbi
fiant ex de-
repente dis-
parentibus
tumoribus
circa ulcera.

Ex ulcerum
derameli-
centia Con-
vulsio &
Tetanus.

ad nervos & cerebrum, & in his partibus sua rosione produceret motum illum validum & involuntarium.

Ex ulceris
detumescen-
tia aut lateris
dolores
acuti.

V. Quoniam speciali titulo in nostra *Medicina Dogmatica* exposuimus Delirium, Insaniam, ceterosque congeneres morbos, non erit opus hoc loco repetere. Pleuritidis definitionem exhibuimus supra (*Aph.* 109, IV.) Ex iis, quæ in hoc Aphorismo generaliter explicavimus constat materiem acrem ex tumentibus marginibus ulcerum intro ferri. Illa materia si feratur ad nervos motorios, inducebat motum involuntarium validum; sed si feratur ad partes acuto sensu donatas, idem tunc acre validos dolores infert, qui hic dicuntur Dolores lateris, qui locus solus non est obnoxius huic receptioni, observavi quoque ex tali disparentia natos fuisse dolores capitis & ventris, sed quoniam ille dolor pectoris observatus fuit ab auctore, eum pronunciat; sed propterea non negat alias quoque partes dolore corripì posse. Eodem modo ratiocinandum est de Insania, nam materia illa ad eum locum cerebri delata, in quo mens nostra sensus internos exercet, eum locum in suo placido motu ita perturbat, ut mens tali modo afficiatur ex hac commotione interna, ac si agitaretur perturbatis quibusdam sensibus externis, & quoniam tunc anima nostra ex perturbato motu interno ratiocinatur, & operatur, talis actio dicitur Insania. Hoc autem mirabile observavit Auctor in hac metastasi, quod ex ulcerum detumescencia in partibus posterioribus frequentius generetur Convulsio & Tetanus; sed ex metastasi partium anteriorum frequentius Insania & Laterum dolores. Ego fateor me in praxi illam differentiam observare non potuisse, interim tamen non possum inficiari, qui tale quid detexerit per suam praxim frequentiore.

Ex ulceram
detumescen-
tis sup-
puratio.

VI. Quomodo autem ex hac detumescencia generari possit Suppuratio seu Empyema, primo intuitu videtur conceptu difficile, sed quoniam materia purulenta in marginibus ulcerum confecta, uti alibi in corpore, inde reduci potest, & humoribus circulantibus misceri, ex communi observatione translationis puris satis evincitur, suppuratio-
nem

nem alibi in corpore, vel in cavo pectoris, fieri posse: ita observavimus in febre per metastasin fieri Anginam (*Aph.* 144.) ex Angina Peripneumoniam (*Aph.* 203.) Obstat tamen videtur nimia puris crassitudo, & nulla patens via ex una parte in aliam. Verum sæpe experimur in empyematicis pus evacuari per urinas, non quod ex pectore ad renes sit canalis apertus transmittens pus; sed pus aliquomodo liquatum, venulis absorptum, cum sanguine circulante circumductum, actione renum iterum separatur & cum urina exit. An vero talis metastasis bona vel mala sit sentienda, facile intelligitur, quia translatio a peripheria corporis ad interiora semper est mala, unde quoque talis suppuratio non solum mala est, sed & revocationem ad priora loca relicta exigit.

VII. Dysenteriam non solum significare sanguinis ejectionem per anum, superius (*Aph.* 134, I) demonstravimus, sed etiam notare alvi frequentem dejectionem cum dolore, sive sanguis exeat sive non. Talem dejectionem observavit Auctor exspectandam esse, si derepente tumores circa ulcera evanescant. Sed hic addit, si tumores fuerint rubicundi, quam phrasin ego referrem duntaxat ad hanc metastasim ex ulceribus ad intestina, non vero in reliquis omnibus: nam si rubedo illa major adsit in oris ulcerum, significatur materiem erysipelatofam vel & aliam acrem & irritantem adesse, non vero purulentam, uti in præcedente metastasi. Si illa materia acris rubedinem inducens, quæ veteribus dicitur biliosa, miscetur sanguini circulanti, illa quoque frequentissime deponitur ad intestina; ubi sua irritatione generat dolorem & tormina, & quoniam ad partem stimulatam magis confluunt humores, intestina irritata magis mota, majorem copiam recipientia, generant Dysenteriam humoris acrioris, qua egestionem continuata tandem egeritur etiam ipse cruor. Quamvis illa metastasis fiat ad organum excretorium, non tamen ita bona est censenda, nam id acre obambulavit prius totum corpus, ubi reliquos quoque humores inquinare potuit; ulcus eo fluxu non est sanatum, unde fit imperfecta Metastasis, quæ semper mala; evacuatione

Ex Ulcerum
d tumef-
centia Dy-
senteria si
rubicundi
fuerint tu-
mores.

tione hac sæpe etiam exulcerantur intestina, ut ita augeatur malum; contenta alimenta in intestinis tali corrupto humore perfusa non concoquuntur, & una cum corrupto humore eliminantur, atque ita privatur corpus suo naturali pabulo. Tot ergo concurrentibus rationibus persuasus credere nequeo hanc Metastasim esse bonam, sed potius malam censendam esse statuo. Quid vero sit agendum in his omnibus, quoniam nimis longum foret exponere, istud reservabo in locum magis opportunum.

LIB. V. A P H. LXVI.

259. **S**I magnis & pravis existentibus vulneribus, tumores non appareant, ingens malum.

I.

In magnis
& pravis
vulneribus
& contusionibus nulli
tumores,
ingens malum.

ULcera observantur cum & sine tumore in ambitu, sed omnia Vulnera magna, & Contusiones validæ semper circumquaque Tumores faciunt, quod primo exponendum venit. Duos hos morbos hoc loco accepi, quoniam uterque generatur ab externa causa solvente, sed si fiat ab instrumento acuto secante, hodie propriè vocatur Vulnus, sed per instrumentum vel corpus obtusum diffractione facta in partibus mollibus hodie propriè dicitur Contusio. Qui vero generaliter agunt de Vulneribus, simul solent Contusiones eodem titulo pertractare. Sic quoque apud Hippocratem τραῦμα sæpe significat Vulnus & Contusionem. Quia vero in utrisque his morbis Tumores non apparentes malum indicium præbent, hos morbos conjunctim explicare volui. Sive ab instrumento acuto sive obtuso læsio notabilis est facta, illæ partes læsæ se magis movent, ex lege generali omnis pars mobilis in nostro corpore vivente irritata se magis movet. Hoc motu aucto ita urgetur sanguis per suas arterias versus ramos minores, ut arte-

arteriæ lymphaticæ distentæ a majore illo impetu sanguine rubro impleantur; & quoniam sanguinis transitus per venas multis in locis ibidem est interceptus, pars contusa vel vulnerata sensim in majorem tumorem rubrum elevatur. Hinc quamdiu vis vitæ valet, sensim magis increfcit tumore pars læsa, usque dum suppurare incipit. Quando ergo post læsionem hanc non generatur tumor, indicium est vitalem actionem in ea parte esse extinctam. Propterea addit in Vulneribus & Contusionibus pravis ingens malum, ut intelligeremus actionem vitalem eo in loco, ubi quædam pars vitæ admodum necessaria hæret, extinctam magnum periculum portendere: nam ea sunt Vulnera & Contusiones praviæ, quæ lædunt aliquod viscus vel partem principem. Ex quibus colligere possumus naturaliter ad omnes Contusiones & Vulnera magna, expectandos esse tumores, ex quibus non apparentibus malum præsagium desumitur. Et novimus inde in facienda futura humida, ne nimis arcte consuamus vulneris magni labia, quin fila transfuentia aliquomodo dimitti possint cum increfcente tumore. Atque in Contusionibus omnino cavendum, ne comprimendo vel cingendo conemur inhibere Contusionis tumorem: sed applicanda sunt emollientia & laxantia, quæ tumoris generationem promovent. Si vero Tumor major pro ratione Vulneris vel Contusionis nascatur, hoc etiam malum est, non propter Tumorem ipsum, sed propter signum latentis mali: nam si ingens Tumor nascatur, indicium est latitare aliquod malum, oculis non patens, quod tantum tumorem faciat.

LIB. V. APH. LXVII.

260. **L**axi tumores, boni: crudi vero, mali.

I.

Cur tumores molles boni, duri vero mali.

HOc in Aphorismo intelligi Tumores, quamquam non habetur in textu græco, ab aliis satis demonstratum est: sed non conveniunt, num hoc in loco sentus sit generalis de omnibus Tumoribus, an vero solummodo de Tumoribus vulnerum & contusionum. Ego existimarem solummodo in hoc loco accipiendum esse Tumorem, qui ex vulnere vel contusione nascitur, ut hic Aphorismus sit veluti continuatio prioris. Sententia ergo est Tumores vulnerum & contusionum Laxi seu potius molles sunt boni; at Crudi id est duri & renitentes sunt mali. Quod paucis videbimus. Dum propter irritamentum vulneris vel contusionis circumquaque generatur Tumor laxus seu mollis, qui digitis tangentibus aliquomodo cedit, & habet paulo majorem calorem, quam est naturalis calor in tali parte, talis Tumor denotat quidem motum vitalem instigatum esse, sed tamen tam moderate, ut pars modice distendatur & impleatur. Si talis tumor ad tempus suppurationis pervenit, quando sensim iterum instigatus motus incipit sedari, vasa illa laxiora facile permittunt, ut compactus humor in purulentiam conversus sine ulteriore læsione vasorum evanescat, seu tradatur sanguini circulanti, & ita evanescit sæpe tumor contusionis sine evacuatione. Si vero Tumor crudus id est durus, quoniam omnis tumor durus in suppurationem seu coctionem non abit, observatur, malum erit signum; nam durities renitens oritur ex compactis & concretis humoribus, qui difficulter solvantur, vel ex validissima vasorum infarctione, qua vasa ut-

ut plurimum disrumpuntur, & humores ita infarcti raro retropelluntur. Igitur ex duritie ea cognoscimus validam fieri irritationem, humores nimis compactos esse, quam ut resolvi possint, & multa vasa destructa per tam validam impletionem.

LIB. V. A P H. LXVIII.

261. **P**osticâ capitis parte dolenti, recta in fronte vena secta juvat.

I.

Expertus est Hippocrates Capitis dolorem in parte posteriore sublatum fuisse facta venæ sectione in vena frontali; hoc etiam posteriores Medici experui sunt, non tamen voluit ex uno alterove experimento formare regulam generalem curationis, quare dixit Juvat, non vero curat, vel secanda est vena frontis in capitis dolore, qui posteriorem partem affligit. Neque affirmari potest hæc doctrina: antequam enim definiri potuisset, num vena esset secanda, constare deberet, an dolor erat in partibus externis vel internis, & quænam esset causa eum dolorem faciens. Sed quoniam hoc non est determinatum, incerta foret curatio. Multi tamen medici hanc curationem imitati sunt, donec detecta circulatione judicarunt frustra hanc venam secari, & eundem effectum expectari ex secta vena in brachio, quare postea obsoleta fuit hæc operatio. Deinceps vero Hydraulici demonstrantes nos posse variam facere derivationem, si hac vel illa vena aperiatur, iterum a quibusdam instituta fuit phlebotomia in vena frontali. Quia vero ratione derivationis, sive hæc vel illa vena aperiatur, non multum boni vel mali sit expectandum, atque illa venæ sectio non instituitur, nisi collum stringatur, ut compressis jugularibus detineatur sanguis in capite, non videtur mihi opus amplius ad capitis dolores leniendos,

An vena frontis secta curet capitis dolorem.

hanc pertundere venam. Quæ narrantur de derivatione in partem oppositam, ab uno latere ad alterum, non sunt alicujus momenti, quia quæcumque vena lecta exonerat illum sanguinem, qui ad partem eam adducitur per arterias ejusdem lateris, quare magis evacuat sanguinem ex parte ipsa & adjacentibus, quam ex parte opposita.

L I B. V. A P H. LXIX.

262. **R**igores incipiunt, mulieribus quidem ex lumbis magis, & per dorsum ad caput. Viris autem, postica magis parte, quam antica corporis, velut ex cubitis & femoribus. Sed & cutis viris rara est. Hoc quidem pilus indicat.

I.

Cur Rigo-
res magis
ex lumbis
incipiunt.

Supra (*Aph.* 156.) exposuimus quid sit Rigor, & ex qua causa proxima nascatur. Constitit omne acre noxium nervis sensuum & motus vitalis applicatum, Rigorem inferre, quod nuper expertus fui in viro fistula in lumbis laborante, si modo immittebatur stylus, qui tangebat nervum, vel injiciebatur liquor vix quandam acridinem habens, ipso momento Horrore & Rigore corripiebatur per totum corpus. Quærendum ergo est, cur Lumbi magis quam partes reliquæ corporis tali noxio applicato afficiantur: & dein, cur Rigores eo in loco incipientes petant caput. Ex tota theca vertebrarum nullibi plures emergunt nervi, quam ex vertebra lumborum, inde enim emergunt nervi, qui ad omnia viscera ventris tendunt & ad pedes. Lumbi etiam constituunt partem infimam medullæ spinalis, ubi illa medulla in caudam veluti compactam, non amplius mollem medullosam, abit. Hoc etiam in loco Infantes frequentissime patiuntur spinam bifidam. Humor roridus nutriens vagina medullæ spinalis coarctatus, hic satis magna copia colligitur, & nudis nervis accumbit. Ideo-

deoque nervi in hoc loco maxime sunt expofiti rebus acribus applicandis: quoties enim aliquid acre in illo fucco hæret ob locum declivorem & ampliorem ad nervos hic nascendos applicatum, Horrorem & Rigorem inducit. Quia omnes hæ concurrentes causæ minus inveniuntur in locis reliquis, magis hoc in loco habetur Rigoris origo in lumbis quam in partibus ceteris. Non ignoro a quibusdam Rigores hos deduci a fucco pancreatico effervescente cum bile, sed quia hujus effervescencia diu fuit improbata, & quia succus pancreaticus, in natura vix differens a saliva, deponitur in duodenum, non vero circa lumbos, non erit opus multis verbis hanc repudiare sententiam. Neque inde constaret, cur hic concitati Rigores peterent fursum ad caput, secundum spinalem medullam. Sed si perpendimus capsulam nervi ruditer tactam concitare Rigorem, & capsulam nervi continuatam esse vaginæ medullæ spinalis, plane constare potest, per irritatam capsulam medullæ spinalis in lumbis, irritamenti propagationem fieri posse usque ad meninges, quum meninges cum vagina hac unam continuatam membranam constituent, quæ omnibus nervis per totum corpus dispersis largitur capsulam. Quod autem in mulieribus frequentius ex lumbis quam in viris incipiant Rigores, inde forsan est quod feminis major concessa sit pelvis ossea, & in ea uterus locatus, plures nervi hic oriantur quam in viris, & ita major proventus hujus succi, qui acrimoniam illam irritantem continere potest.

II. Pili copiosiores nasci in viris quam feminis constans est observatio, præprimis quando ad maturam ætatem pervenerint: an vero inde major vel minor Cutis raritas possit probari, non caret dubio: nam pili per cutis poros transeuntes, istosque implentes minorem raritatem relinquerent, quum spatiola raritatem facientia impleantur. Nec video ex qua ratione illa raritas probaret frequentiores horrores fieri ex dorso, sed absentia pilorum uti in feminis indicaret horrores fieri debere ex lumbis. Hanc ergo sententiam in medio relinquam, donec clarior ratio hanc observationem ad majorem usum redegerit.

An cutis viris rarior quam mulieribus?

LIB. V. APH. LXX.

263. **A** Quartanis correpti, a convulsione non admodum corripuntur. Si vero prius corripiantur, & postea quartana supervenerit, liberantur.

I.

Quartana correpti an non admodum convulsione corripuntur.

DUO hic proponuntur morbi utrique chronici, nempe Febris quartana (Aph. 50, II,) atque Convulsio (Aph. 51, III. & Aph. 194, I.) De quartana dici potest, quod sit morbus admodum pertinax, qui interdum ad annos continuatur suis redeuntibus paroxysmis, sed tamen raro si pura manet, hominem interficit: quia vero ut plurimum auscultet antidoto, constat unicam simplicem ejus esse causam, quæ antidoto subacta, hominem sanum relinquit. Convulsio autem est morbus ex variis causis natus, quæ propterea non habet antidotum constans, quod duntaxat valere potest in certa specie Convulsionis, sed non in omnibus. Hinc mihi quoque incertum est præsagium, an Quartanis correpti non admodum corripiantur Convulsione, cum quædam causæ Convulsionem inducentes æque generari possint, sive Quartana sit præsens vel absens. Imo observavi in praxi mea levissimas convulsiones hystericas frequentius fieri in iis, qui quartana febre laborant, quam in perfecte sanis. Nisi ergo addatur certa species Convulsionis ex sua latente causa, non possumus pronuntiare an quartanarius liber manebit a Convulsione vel non.

An convulsio tunc illius superveniente quartana.

II. Quod statim proposuimus est repetendum, quum quædam causæ esse possint Convulsionem inducentes, quæ a superveniente febre Quartana subigi possunt & cum sudore subsequente expelli: sed & sunt plures aliæ causæ Convulsiones inducentes, quæ potius per quartanam intenduntur, quales differentias in praxi mea sæpe observavi. Propterea nisi per multiplicem experientiam constet, quænam species

cies Convulsionis a Quartana subigatur, tam diu incerta manebit prædictio.

LIB. V. A P H. LXXI.

264. **Q**Uibus cutis obtenditur arida ac dura, sine sudore moriuntur. Quibus vero laxa ac rara, cum sudore moriuntur.

I.

NUllam in curatione hic Aphorismus habet utilitatem, sed solummodo Medico auctoritatem conciliare potest aliquid præfagiendo, quod omnibus non ita patet. Utplurimum experimur instante morte ex tota facie sudorem guttatim exprimi: ne autem hoc phænomenon expectemus antequam quis moritur, hoc Aphorismo addisci potest interdum sine apparente sudore homines mori. Sed ut prædicamus, num prius sudor sit expectandus vel nullus, indicia ex Cute desumenda: nam quibus tota cutis est arida & dura, hi sine sudore moriuntur. Talis est Cutis in iis, qui ex marasmo moriuntur consumtis omnibus humoribus; vel & etiam in validissima febre ardente, dum omnes humores in lentorem fuerint compacti, & tamen vehementi tali motu vitali instigato, ita destruuntur solida & consumuntur spiritus, ut æger in vigore febris moriatur. Frequentius autem diminutis viribus & coliquatis humoribus homo moritur, in quali statu ante mortem cutis defectu contractilitatis laxa est, & tenuitate corrupti humoris undique fit uliginosa.

Signum ex cute an æger cum vel sine sudore sit moriturus.

LIB. V. A P H. LXXII.

265. **I**cterici non admodum flatulenti.

I.

An Ictericis
non admo-
dum flatu-
lenti.

QUum Auctor in quibusdam Ictericis (*Aph.* 172, 1) detexerat non observari flatus, hanc regulam posteritati reliquit Ictericos non admodum flatulentos esse. Sed si ipsam observationem Hippocratis conferamus (*H.* 2, 739) satis constat, quod qui ictero tenebatur, etiam esset flatuosus. Atque nos in Praxi frequentiores flatus in Ictericis observavimus quam in aliis morbis: & miror non frequentius observari, quum ipse icterus causam frequentem flatuum contineat. Sæpe enim a spasmodica contractione ductus choledochi generatur Icterus & etiam flatus (*Conf. Aph.* 183, 1.) Bilis effusio in intestina intercepta permittit ut ingesta alimenta sponte fermentando aërem artificialem seu flatum producant. Icterus a calculo oblitipante exitum bilis in duodenum, atque hepatis scirrhusa induratio irritando flatum producit. Hinc tam frequens etiam Tympanites in Ictericis. Ex quibus rationibus potius pro regula aliqua admitterem Ictericos flatulentos esse.

M E D I C I N A H I P P O C R A T I C A ,

E X P O N E N S

A P H O R I S M O R U M


H I P P O C R A T I S

L I B R U M S E X T U M .

A P H. I.

266. **I**N diuturnis intestinorum lævitatibus ructus acidus
superveniens, qui prius non fuit, signum bonum.

I.

 Opiosior & frequentior alvi egestio morboſa varia nomina obtinuit ex diverſa materia e-
jecta, ut ſi alimenta ingeſta vix aut non mutata, brevi poſt ingeſtionem ejiciantur, Græcis *λειεντερία*, Latinis Lævitas inteſtino-
rum vocatur. Galenus eos vehementer increpat, qui tale nomen impoſuerunt huic morbo, quaſi intelligerent, aſperitate inteſtinorum cibos retineri & coqui, quod omnino negat. Non vero video, iſtos ita increpandos eſſe, quoniam per canalem intus lævigatum tranſitus fiat prompte. Qui vero ſtatuunt cum Galeno, ventriculi actionem eſſe coquere cibum, & inde hunc morbum magis pertinere ad Ventriculum, quam Inteſtina, concepta quadam opinione ſeducſi ſunt, quum ad præpa-
ran-

Ex qua
cauſa Lien-
terix dia-
turnæ.

R r r r

randa assumpta alimenta plus faciant Intestina, quam ipse
 ventriculus. Constat enim experimentis, in canali angustio-
 re & longo contentos liquores perfectius elaborari, quam in
 cavitate amplissima; & certum est etiam copiosiore affusio-
 ne humoris præparatorii perfectiorem fieri coctionem seu
 assimilationem. Hæc si conferantur ad Ventriculum & In-
 testina, res ipsa constabit: Ventriculus enim amplissima ca-
 vitate complectitur ingesta, & vix quidquam aliud agit
 quam suo calore & humiditate assumpta macerare; Intestina
 autem huc illucque agitando transeuntia, postquam istis
 admista est bilis & succus pancreaticus, non solum eodem
 calore & humiditate macerant, sed & omnia accurate
 miscent & conquassant, suis osculis lacteorum & forsan
 principiis venarum meseraicarum præparatum deponunt,
 novumque humorem vitalem ex arteriis meseraicis recipi-
 unt, contentis iterum miscent, ut ita omne solubile misce-
 atur, præparetur & dein auferatur coctum, relictis in sua
 cavitate, quæ solvi nequeunt, postea ejiciendis. Quare ven-
 triculus tanquam commune receptaculum concipi potest,
 ne homo cogeretur perpetuo sumere alimentum, ubi simul
 assumpta aliquomodo macerantur: sed Intestina vera sunt
 præparatoria organa. Si actio illa inverse consideretur, op-
 time comparari potest organo urinæ, si compareretur Ven-
 triculus vesicæ urinariæ, & intestina tenuia renibus. Ne-
 mo enim adstruet, vesicam esse organum secretorium vel
 præparatorium urinæ, sed receptaculum, ne homo omni
 tempore cogeretur reddere lotium: ita ventriculus est re-
 ceptaculum, ne homo etiam continuo cogeretur ingerere ci-
 bum. Neque hæc actio est singularis in viventibus; obser-
 vamus enim ubique naturam uti longissimis & exilissimis
 canaliculis, si aliquid sit præparandum, nunquam vero ca-
 vitatibus amplioribus. Si igitur Intestina Lævigata sint in-
 tus muco obducta, introitum in vasa lactea intercipientia,
 cum motu aucto solo eo, qui ad inferiora ducit, necesse
 est, ut Ventriculus assumpta alimenta protinus dimittat per
 pylorum in duodenum, & intestina propellentia recepta
 sine vix aliqua inducta mutatione deponant per alvum.

Con-

Constans ergo causa est in Lienteria, ut adsit motus major ventriculi & intestinorum ad inferiora, cum intercepta vel minuta absorptione per vasa lactea, sive hoc producat a muco obsidente oscula, sive deficiente motu vermiculari chylum urgente in eadem oscula. Causa igitur unica est assignanda, quæ talem motum producit & simul inhibet absorptionem, quæque diu durare potest. Hanc causam inveni esse Putredinem chronicam, quæ nascitur ex deficiente actione vitali, qua humores sibi veluti relictæ corrumpuntur, & partim abeunt in humorem tenuem & partim in tenax viscosum: quoniam omnia putrefacta in ventriculo & intestinis hærentia stimulant has partes ad ejiciendum, uti experimur, si modo putrefactum ingeritur, id enim in ventriculo hærens primo nauseam dein vomitum creat, sed in intestina delatum alvi fluorem inducit. Igitur tenax gluten corruptum lateribus intestinorum adhærens suo speciali stimulo in intestinis producit motum ad exonerandum disponentem, & quia simul obstipata a viscoso sunt oscula absorbentia, & tunc simul non fit ille motus vermicularis, qui requiritur ad pellendum chylum in lactea vasa, cuncta quæ tunc ingeruntur, non mutata per intestina trajiciuntur & egeruntur. Quia vero talis spontanea corruptio diu perseverare potest, & corruptum tenaciter adhærens lateribus intestinorum, expelli nequit, necesse est, ut talis Lienteria interdum duret per multos annos, ut in quibusdam observavi.

II. Constitit ex iis, quæ disputavimus, putredinem chronicam permanentem esse causam Lienteriæ diuturnæ, ergo ex Ructu acido superveniente constare debet, causam hunc ructum producentem tollere posse antecedentem putredinem. In Ructu acido duo sunt observanda, primo ructum fieri motu ventriculi inverso, quo truditur aër in ventriculo contentus per œsophagum; & secundo ut ille aër imprægnatus sit vapore acido. In vetusta Lienteria continuus motus erat deorsum, sed quoniam nunc fit ructus, signum est, eum motum deorsum non ita constantem esse, sed quoque incipere sursum, hinc spes est, fieri posse, ut restituatur motus.

Ructus acidus in Lienteria diuturna bonum signum.

peristalticus, qui vicissim operatur sursum & deorsum in intestinis, quali modo agit in sua actione naturali, qua præparantur alimenta; & quia in ordinem redire incipit, signum est, causam priorem, eam propulsionem facientem, incipere minui. Hinc solus Ruëtus si prius non adfuit bonum signum præbet. Sed si Ruëtus fiat acidus, eo signum est melius: nam spontaneæ corruptiones sunt duplices, vel per putredinem in alcali corruptum, vel per fermentationem in acidum. Ex Chemicis experimentis discimus, hæc duo simul constare non posse putredinem & fermentationem, cum alcali & acidum se mutuo extinguant. Si ergo signa adfunt, fieri fermentationem, certus sum, putredinem cessare. Ruëtus autem ille Acidus tale certum est signum, quoniam sine fermentatione tale quid in nobis nunquam generatur. Igitur ex Ruëtui acido scio, eum nunc hominem, qui tamdiu laboravit putredine, nunc laborare acido fermentato: quæ dicuntur de Acido succo pancreatico & ventriculi naturali, quoniam satis refutata sunt, non erit opus hoc loco repetere, sufficiet accipere, quod ab omnibus physiologis experimentis fuit probatum & acceptum, acidum ventriculi generari ex assumtis vegetantibus per fermentationem in acidum commutatis. Differentia itaque morborum nunc est proponenda, ex qua deducere debemus, acidi productionem bonum esse signum. Experimentis confirmatur, mutationem inductam per Putredinem immutabilem deinceps esse, nos nulla arte corruptam carnem ita emendare posse, ut non sit corrupta: sed acidum fermentatione natum facile est extinguere. Alcali quidem volatile in Putrefacto possumus per admistum acidum extinguere, sed pinguedinem adhærentem destructam in pinguedinem naturalem redigere non valemus: verum acidum fermentatione natum eodem modo per additum alcali extinguere possumus, vel repetita destillatione, atque etiam pinguedinem adjunctam nobis iterum bonam recuperare valemus. Unde constat, Putredinem maiorem destructionem facere quam fermentationem. Hæc si applicamus ad nostrum corpus, clare patebit, actionem nostri corporis valere omne
acidum

acidum fermentatione productum extinguere. Qui enim assumunt acetum vel bibunt vinum rhenanum, modo corpora sint sana, illi ne vestigium acidi evacuabunt, neque invenietur remanens in corpore. Qui autem putrefactum continet, istud emendare non poterit, sed reddere iterum debet, ut ab eo liberetur. Si ergo Ruētus acidus superveniat, signum est, motum peristalticum in ordinem redire; putredinem cessare; sed laborare morbo ex acido, qui cum possit actione nostri corporis subigi, quæ causa præcedens non erat domabilis, certe tale signum est bonum. Ex istis facile decernere possumus, an succi vegetantes saponacei acidi ita sint vitandi in diuturna Lienteria; an debeamus adstringentibus talem Lienteriam compescere; an jura carniū sint danda ad majorem nutritionem, ut multi præcipiunt.

LIB. VI. APH. II.

267. **Q**uibus nares naturâ humidiores, & genitura humidior, imperfectius sani sunt: quibus vero contraria, perfectius.

I.

Hippocratis scopus est in hoc Aphorismo ex quibusdam signis colligere magis & minus firmam Sanitatem: requiritur itaque, ut primo perpendamus signum ipsum, ex qua causa nascatur, antequam possimus ex designata causa aliquam prædictionem formare. Nares naturâ sunt humidiores, ergo tales esse non debent ex aliquo morbo vel medicamento adhibito, uti in Coryza vel ptarmico attracto; neque illa humiditas per breve tempus durare debuit. Verum naturâ humidiores Nares designant, constantem esse causam eam humiditatem inferentem. Omnibus hominibus sanis interna cava narium sunt humida, sed si tanta humiditas in hoc loco proveniat, ut exstillet

Nares naturâ
humidiores
quid
noceant.

mucus, nares dicuntur humidiores. Hanc abundantiam muci non ita provenire ex copia majore humorum, quam ex motu debiliore in membrana pituitaria, demonstravimus (Aph. 110, xi.) Igitur ex naribus humidioribus scire possumus, eam membranam debilem habere motum, & quia dicitur naturâ humidiores nares, illa debilitas est constans non facile curanda.

Genitura
humidior
quid notet.

II. Omnes fere Commentatores cum Galeno per genituram intelligunt semen virile, & inde ex ejus majore humiditate præfagium formant. Ego autem puto, genituram in hoc loco non notare semen, sed partes genitales tam virorum quam mulierum, quoniam γονή æque notat partes genitales quam semen, & hoc loco agitur de naribus humidioribus, non vero de muco humidior; itaque conveniens est, ut hic quoque accipiantur partes genitales, non vero semen. Et quid quæso signum desumeretur ex semine humidior, nisi vir laboraret pollutione vel gonorrhœa, quum alias humiditatem feminis non esset licitum observare. Propterea concipiendum est, Hippocratem intellexisse humiditatem partium genitalium utriusque sexus. Quæ humiditas in his partibus eodem modo, uti in naribus oritur ex laxitate & deficiente motu in partibus his.

Cur nares
humidiores
& genitura
humidior
minus perfectam
sanitatem indicant?

III. Etiam si quibusdam in partibus quidam sit debiliior motus, quam qui potest suos humores attenuare & discutere, inde non sequitur, ut inde homo aliquo morbo dicatur laborare, tam levis enim est hujus partis affectio, ut non mereatur morbi nomen, sed tamen non est perfecta sanitas, tam ratione signi, quam ratione causæ; sæpe enim fit, ut si quadam in parte conspiciatur debiliior actio, etiam in reliquo corpore actio habeatur languidior, præprimis si duobus simul in locis talia signa inveniuntur, uti hic in partibus genitalibus & naribus. Atque humores his in locis stagnantes, minus commoti, sensim corrupti & minus præparati traduntur communi circulationi, ubi totam massam inficiunt humore crudo & leviter corrupto, qui quidem actione vitali emendari potest, sed tamen inde non fruitur ille homo perfecta sanitate.

IV. Si

IV. Si vero partes, quæ ex naturâ sunt laxiores & uliginosæ modice siccæ inveniuntur, signum est huc confluentes humores ita attenuari, ut per insensibilem perspirationem evolent, quod etiam hoc in loco notavit Galenus: nam actio validior in his partibus non solum propter majorem concitatum calorem ex hoc motu, & promptiorem expulsionem minuit hujus partis humiditatem, verum etiam reducit per vasa absorbentia & venosa eam humiditatem, quæ alias ibidem subsisteret. Hinc ratione signi & causæ harum partium siccitas modica est bona, quum notet actionem valentem, & non permittit, istos humores stagnando corrumpi.

Nares & genitalia sicciora perfectiorem sanitatem indicant.

LIB. VI. APH. III.

268. **I**N longis dysenteriis apositæ, malum, & cum febre pejus.

I.

Satis constare potest ex iis, quæ diximus (Aph. 134, I.) quid proprie per Dysenteriam sit intelligendum: verum in hoc loco designantur Dysenterię longæ seu diuturnæ. Adeoque Apositiam non ita damnat in initio Dysenterię, sed si aliquamdiu duraverit. Quæ differentia est notabilis, nam fieri potest, ut humor aliquis acris in intestina depositus rodendo inferat dolorem cum copiosiore dejectione, sed postquam hic humor fuerit evacuatus, sensim quoque cessat Dysenteria. Verum diuturnæ Dysenterię denotant, scaturiginem humoris acris exhauriri non posse, vel eum humorem acrem induxisse intestinorum exulcerationem, quæ dein Dysenteriam continuare facit. Ergo solæ dysenterię longæ per se sunt malæ, quod corpus exhauriant, & malam latentem causam designant. In his si fiant Apositæ, malum. Ut intelligamus hanc prognosin, videndum, ex qua causa latente illa Apositia fiat. Nostrum corpus,

In longis dysenteriis apositæ, malum.

pus vivens ita est creatum, ut egeat nutrimento, quod restaurat deperditum inevitabili actione corporis. Deus, ut caperemus alimenta, nobis concessit sensum famis, qui nos instigaret ad alimenta capienda, & simul Gultum, ut acciperentur cum oblectamento. Quando per morbosam aliquam causam deletur famis sensus, etiamsi in corpore habeatur alimenti defectus, qui naturaliter in nobis famem excitat, proprie vocatur Inappetentia; sed quando simul capienda alimenta aversionem pariunt, Fastidium dicitur, quod in hoc loco per Apositiam intelligitur. Potest enim æger esse sine desiderio capiendi alimenta, ut si videat ea, vel comedat, dum tamen non fastidit. Quare perpendendum, quibus frequentissimis causis fastidium generetur. Experimur Fastidium fieri, si motus ventriculi fiat inversus, uti in nauseosis, vel quando aliquid putrefactum in ventriculo hæret. Si ergo aliquis fastidiosus fiat, signum est, ventriculum consentire & putrefactum quoque in eo cohærere. Dysenteria autem est morbus intestinorum, & fastidium morbus ventriculi, ergo causa mali latius est dispersa, quod malum est: præterea per fastidium designatur, Dysenteriam abiisse in putredinem, quæ commutatio quoque est mala. Denique corpus per Dysenteriam ita exhaustum nunc privatur simul suo naturali nutrimento, quod amissum restaurare debebat. Hoc in longis Dysenteriis periculosum est, quarum causa est constans, ut monuimus; in incipiente autem Dysenteria spes supererat, evacuatâ cacochyliâ, appetentiam redituram, sed nunc vix ullam spem habere possumus, quum causa constans demum inducens fastidium, simul privet corpus suo naturali nutrimento, & signum sit, latius propagari morbum.

Et cum fe-
bre pejus.

II. Plerumque Dysenteriis adjuncta est febris, verum non semper requiritur, sæpe enim observavi Dysenteriam sine ullo indicio febris: quippe Dysenteria habet motum intestinorum perturbatum, & febris est motus vitalis cordis & arteriarum perturbatus; quare hi duo morbi sunt duas actiones distinctas afficientes, & non semper sequitur. ut ex motu vitali depravato in febribus, motus intestinorum in

in consensum trahatur, quod interdum fit, interdum vero non. Sed si motus intestinorum turbatus sit, frequentius motus circulatorius in consensum trahitur, quod etiam in aliis motibus particularibus observatur. Si ex motu particulari, ut ex motu turbato intestinorum circulatorius motus in consensum trahitur, nisi ille motus simul valeat tollere causam, ille motus, & ratione causæ & effectus, eum morbum auget, quod paucis videbimus. Si Dysenteria cum febre incepit, & tamen non cessat Dysenteria, signum est, febrem non valere causam Dysenteriae superare & expellere: interim tam longa fuit facta evacuatio, ut vires vitæ per imperfectam illam crisin fuerint exhaustæ; quare vix ulla spes superest curationis. Si vero in principio non adfuerit febris, sed postea superveniat, talis febris vel accenditur per consensum ex motu perturbato intestinorum, vel ex translatione materiæ ex cavo intestinorum ad organa circulatoria. Utrumque malum est. Nam motus febrilis in organo circulatorio per consensum concitatus non compescet motum turbatum intestinorum, neque emendabit corruptos humores in intestina confluentes, verum utraque hæc potius augebit. Si humor corruptus ex intestinis, ubi est perpetua scaturigo in Dysenteria diuturna, feratur ad organa circulatoria, tunc simul tota massa sanguinis hoc putrefacto infecta citiorem interitum minabitur. Recte ergo præcipit Auctor, cum febre pejus, quoniam latiore consensum & translationem indicat, quam quæ observatur in sola Apositia superveniente.

LIB. VI. APH. IV.

269. **U**lcera circumglabra, maligna.

I.

Ulcera circumglabra, maligna.

TRia in hoc Aphorismo essent perpendenda, primo qui morbus dicatur Ulcus, sed quoniam hujus definitionem dedimus in Chirurgia Repurgata 1293. non erit opus repetere. Alterum est quando dicantur circumglabra; & denique cur talia dicantur maligna. Pars glabra dicitur, quæ omni inæqualitate caret, si fiat in parte pilosa, si pili cadant & non renascantur, in aliis autem partibus si squamulæ epidermidis secedant & quasi politam superficiem relinquant: sed præcipue tunc habentur glabræ partes, si earum superficies obducta sit muco tenaci, ac si esset pinguedo corrupta tenax parti adhærens. Hæc ultima species an sit concipienda ac si solummodo haberet in ambitu glabritiem, an vero etiam in ulceris cavitate, disputari potest, nam si ulcus ipsum & ejus margines sint glabræ, tale ulcus quoque circumglabrum dici potest. Talia nunc Ulcera pronunciavit κακόνδεα maligna, quoniam designant, hic colligi corruptos humores, & difficilem curationem admittunt, quod quoque passim in praxi observamus. Si enim pinguedo naturalis circa partem exulceratam hærens corrumpitur, illa vel abit in ichorem tenuem, qui cuncta, quæ tangit, liquefacit, ut inde squamulæ epidermidis decidant & pili defluant; vel abit in tenacem & corruptum mucum, qui omnem consolidationem impedit. Quamdiu igitur manent signa corruptæ pinguedinis circa ulcus, non possumus expectare curationem. Hujus autem corruptionis signum certissimum præbent Ulcera circumglabra. Monemur ergo, quamdiu videmus Ulcera circumglabra, nos non posse expectare curationem, sed transitum in

in majorem malignitatem. Hinc omni ope tentanda est emendatio & ablatio corrupti per externa abstergentia antiseptica applicata, & per interna, quæ usus docuit summo opere cohibere progressum putredinis, nam putrefactum per emunctoria eliminare non facile fieri potest.

LIB. VI. APH. V.

270. **D**olores in lateribus, & in pectoribus, & in aliis partibus, si multum differant, considerandum.

I.

Observavit Hipp: Dolores ex variis nasci causis & varias aggredi partes, ut inde non potuerit certam prognosin & curationem formare, dum tamen multi ex solo Dolo-^{Sensus Aphorismi.}re sine discrimine forment prognosin & deducant curationem. Hoc etiam hodie experimur, quamprimum enim aliquis in parte quadam sentit dolorem, statim auxilium petit. Empirici quoque nihil aliud quam arcana crepantes sine ullo discrimine medicamentum vel applicant vel exhibent. Quia vero observavit Noster Auctor, nos non posse sine discrimine quemcunque lenire Dolorem, monere voluit medicam artem exercentes, ut, antequam dant medicamentum, perpendant Doloris differentias, exempla adducit, dolorem pectoris & in lateribus, sed quoniam brevissimus est in Aphorismis, non fecit annumerationem, quænam differentia sint observandæ.

II. Vix latior in tota praxi est Titulus, quam qui Dolores complectitur, quum non solum variis ex causis generetur, sed etiam fere omnibus partibus sit infestus: requiritur ergo, ut propter varietatem suam multiplicem certo proponatur ordine. (1) Maximam differentiam Doloris invenio tam ratione prædictionis quam curationis, prout variis causis & morbis producat. Ita Dolores ex In-^{Quæ doloris differentia sint observandæ.}flamma-

flammatione, Consensu, Catarrho, Scorbuto & ex multis aliis causis summopere differunt: hi enim non solum leniorem exigunt, sed etiam diversa medicamenta postulant his causis appropriata. (2) Quamvis eadem causa inferat Dolorem, Partes tamen diversæ mutant præsagium & curationem, quum quædam partes affectæ ex earum necessitate ad vitam sustentandam Doloris periculum augeant; & non omnium partium dolores eadem methodo curari possint. Ita habentur Dolores capitis, ventris, pectoris, oculorum & aliarum partium, natura & curatione admodum differentes. (3) Ipsi Dolores etiam specie differunt, ut mites; vehementes; fixi; vagi; frigidi; calidi; incrementales; decrescen-tes; constantes & intermittentes. Hi omnes multum lucis præbent ad investigandas doloris causas: nam non quælibet causa quamlibet doloris speciem infert. Si ergo quis novit, qualis species ex cognita causa generetur, eadem doloris species, sed ex latente causa, arguit, latentem & manifestam causam non multum differre. (4) Denique varii Effectus ex Doloribus provenientes sunt sedulo observandi, ut inde majus & minus malum instare cognoscamus.

LIB. VI. APH. VI.

271. **R**enum & vesicæ vitia in senibus difficulter sanantur.

I.

Supra demonstravimus (*Aph.* 64, IV.) Senum diuturnos morbos solere ad mortem durare atque, (*Aph.* 105, v) senes sæpe nephritide & stranguria (*Aph.* 110, IV, & VI) laborare. Ergo videndum est, qualia Renum & Vesicæ vitia hic intelligantur, & cur illa in Senibus difficulter sanantur. Noster Auctor H. a. 818. *Renum affectiones*, inquit, *non vidi sanatas supra quinquagesimum annum.* Frequentiora vitia Renum & Vesicæ non habentur, quam Calculus
his

his partibus dolorem inferens, quare per nephritidem ut plurimum intelligunt Calculum. Frequens quoque in senibus est renum & vesicæ dolor ab humore acri, qui sæpe vocatur nephritis notha. Reliqua autem vitia, ut inflammatio, vel scirrhus, vel ulcus, minus frequentia sunt; propterea judicarem, respexisse Auctorem nostrum ad generationem Calculi & succi viarum urinæ acrimoniam. In Pueris & Senibus frequentior est Calculi generatio, quam in reliqua ætate, cum vires minus valentes non satis attenuent partes terrestres & salinas, verum istas permittant concreescere in Calculum. Pueri autem quoniam increfcente ætate sensim roborantur, has partes terrestres & salinas ita attenuant, ut ineptæ fiant ad producendum Calculum, & ita sponte liberantur. Senes autem ingravescente ætate sensim magis debilitati, magis proni fiunt ad Calculi generationem. Quia vero non habemus medicamina, quibus possumus hanc naturalem debilitatem prævenire, inde recte monuit Auctor, hos morbos & dolores difficulter sanari posse in Senioribus. Neque multum valemus in corrigendo acrimoniam spontaneam, quæ ex debilitate nascitur in succo obliniente vias urinæ senum, quæ maxime convenit Raucedini & Gravedini (*Aph.* 65, v.) quum illa sit superanda viribus vitæ validioribus, quæ in senibus resuscitari nequeunt.

LIB. VI. APH. VII.

272. **D**olores qui in ventre fiunt, elevati quidem, leviores: non elevati vero, vehementiores.

I.

OMnes Auctores fere sequuntur expositionem Galeni, qui per *μετέωρα* intelligit dolores in partibus exterioribus ventris, seu qui sæviunt in partibus extra peritonæum locatis, sed per alios dolores, qui in visceribus ventris urgent. Ego vero puto, si voluisset Auctor illam

Dolores elevati qui dicantur.

doloris differentiam indicare, quod dixisset Dolores externos & internos, tunc enim multo clarior esset sensus; ita enim solet loqui de Doloribus Capitis & Pectoris. Si allegatus sensus esset vera sententia Hippocratis, non ita ubique vera inveniretur: nam in partibus externis æque vehementes dolores oboriuntur, sed minus periculosi, quam in partibus interioribus. Imo in hepate raro tam acuti aut vehementes fiunt dolores, quam in partibus abdominis externis. Quare credo per *πετέωρα* tales Dolores intelligi debere, quæ ventris Inflationem seu Elevationem faciunt, quando nempe per dolores intenditur venter, quasi flatibus distenderetur.

Quare ventris dolores elevati mitiores, non elevati, vehementiores?

II. Ventris nomine, quamvis multa significat (*Aph.* 15, 11), hoc loco intelligi abdomen, nemo inficias ire potest, quum cavitates reliquæ non possint ita elevari, uti abdomen. Observavit Auctor hos dolores ventris sublimes, seu elevatos mitiores, non elevatos vehementiores, quod etiam in praxi expertus sum, non solum in ventre, sed & etiam in aliis partibus. Si enim causa dolorem faciens valide agit, eo majorem dolorem infert, quo fibra magis manet re-nitens, quando talis pars simul non tumet, sed in sua con-strictione persistit: si vero fibræ dimittant tensionem, pars ea tumere incipit & tunc fit doloris lenimen, quod podagrici sæpe experiuntur, non enim sævities doloris lenitur, nisi pars dolens tumeat. Hoc omnino verum est in ventris doloribus, si motu inordinato intestinorum producitur aër artificialis, cujus expansio impeditur per validam fibrarum tensionem, immanis fit dolor: si vero relaxatis fibris aër permittitur expandi, statim mitescit dolor. Hinc calida & humida, quæ fibras laxant, applicata cum ventris intumescencia leniunt dolores.

LIB. VI. APHORISM. VIII.

273. **H**ydopicis ulcera in corpore orta, non facile sanantur.

I.

Quoniam in hoc Aphorismo agit de difficultate curationis in Ulceribus, atque nullam ulceris distinctionem proponit, sed solummodo quia accidit in corpore hydropico, necesse erit hoc loco notare, quid proprie in hoc loco medici per Hydropem intelligant. Omnis collectio humoris pellucidi, aquosi vel pituitosi copiosior, vel per totum corpus, vel in quadam parte proprie vocatur Hydrops: si illa collectio præcipue habeatur in tunica cellulosa sub cute & in cutis substantia, Aqua inter cutem appellari solet: sed in aliis partibus si fiat collectio, specialia sæpe accipit nomina, ut Hydrocephalon, Hydrocele, Ascites, qui morbi solummodo sunt species hujus morbi generalis.

Hydrops
qualis mor-
bus sit.

II. Ulcera in Hydropicis duobus modis generantur, vel per artem, vel sponte, utraque difficulter sanantur; sed quæ sponte veniunt, difficiliora. Si per caustica vel vesicatoria concitentur ulcera, ad loca ea lacerata tantus fit humorum confluxus, ut in loco eo pus formari non possit, nam ut pus formetur, aliquamdiu humores in ulcus confluentes quiescere debent, donec actione vitæ convertantur in pus, sub quo recrescit caro & epidermis, affluxus autem perpetuus lymphæ illam quietem & moram intercipit: neque aqua hydropica istius est naturæ, ut in pus converti possit. Quare experiuntur Chirurghi, factam aperturam difficulter consolidari posse. Si sponte generantur ulcera, adhuc difficiliorem curationem promittunt; nam si sponte oriuntur ulcera, signum est, tantam esse acrimoniam in latice hydropico, quæ valet corrodere cutem & epidermidem: si ergo

Hydropicis
ulcera in
corpore or-
ta, non fa-
cile sanan-
tur.

ergo ad partem eam corrosam copiosus ejusdem humoris habetur affluxus, major est expectanda corrosio & vix ulla consolidatio, nisi per effluxum illum simul auferatur lymphilla illa acris, quod fieri potest in particulari hydrope, qui per factam aperturam omnem suum humorem exonerat, sed si in generali Hydrope omnis lymphilla evacuanda sit per unam hanc partem corrosam, partes ambientes continua colluvie vexatae ut plurimum moriuntur, seu sphacelescunt. Hinc tutum non est in hydrope generali concitare emuntorium particulare, neque sanitatem promittit, si quis sponte acquirat in quadam parte ulcus fundens lympham: sed in particulari hydrope conducere potest. Atque observavi in Pectoris hydrope ulcera sponte vel & vesicatoriis in cruribus facta summum attulisse levamen, & tandem perfectam sanitatem, evacuata aqua per illa ulcera: in Ascitide autem talia ulcera multum quoque liquidi plorarunt, sed post evacuatum laticem perierunt ægri. Ex quibus omnibus perpensis colligi potest, ulcera in corpore hydropico nata difficulter sanari, sed non semper mala dicenda esse, quum quibusdam in casibus sanitatem attulerunt.

LIB. VI. APH. IX.

274. **E**fflorescentiæ latæ, non admodum pruriginosæ.

I.

Exanthemata lata quædicantur.

Multitudo morborum in cute, quia a Veteribus plerumque deducebatur a variis humoribus, sola hypothese nitentibus, maximam confusionem paruit, nam non facile est ex conspectis in cute phænomenis determinare, qualis humor hoc vel istud phænomenon inducit. Quare idem phænomenon pro mutata hypothese varium accepit nomen. Hoc quam maximè apparet in morborum cutaneorum descriptione. Nulla mihi morborum classis majorem difficultatem paruit, quam qui morbi externe cutim affici-

unt;

unt, quod patere potest ex iis, quæ in Chirurgia repurgata exhibui. Volui propterea proprium nomen græcum Exanthema (Ch. 1396.) fervare, quod alias Efflorescentia, Pustula, vel Papula vocatur. Quod Exanthema debet habere colorem rubrum in ambitu limitatum, cum quadam cutis elevatione, ut distinguatur a maculis, quæ non elevant cutim; sed tamen sine tumore elato, ut differat a pustulis & tuberculis. Talia ergo Exanthemata possunt esse lata vel parva instar stigmatis, modo aliquam in cute elevationem faciant distinctis in locis, & colorem rubrum habeant.

II. Eundem humorem seu causam Pruritus & Dolorem inferre posse, demonstravimus. (Aph. 110, x.) Ex omnibus experimentis constat, levissimam vellicationem ad nervum sentientem inferre Pruritus. Observamus præterea non sine discrimine quamcumque vellicationem Pruritus generare, imo quædam levissima acria applicata Pruritus compescere: quamobrem tenendum, speciale genus acrimoniæ potius Pruritus producere, quam Dolorem, alia autem genera Dolorem sine Pruritu. Hinc Pruritus est aliquod phænomenon, quod certam speciem acrimoniæ vel rosionis declarat. Hoc magni momenti est in Medicina & Chirurgia observare; nam si Pruritus sit inseparabile phænomenon specialis acrimoniæ, per phænomenon hoc observatum in morbis possumus judicare, qualis sit latens causa. Observavit noster Auctor Exanthemata lata minus pruriginosa esse quam Exanthemata parva seu angusta: si ergo examinavimus naturam acrimoniæ Pruritus excitantis, novimus quoque, quid sit agendum in latioribus & minus latis Exanthematibus: nempe per ea applicata vel exhibita, quæ naturam specificam pruritus inducentem extinguunt.

Exanthemata lata, minus pruriginosa.

LIB. VI. APH. x.

275. **C**aput laboranti, & circumcirca dolenti, pus, aut aqua, aut sanguis effluens per nares, aut per os, aut per aures, solvit morbum.

I.

Capitis doloris frequentissima causa quæ sit.

EX multis observationibus particularibus conatur Auctor generalem conficere Aphorismum. Detexit enim Capitis labores & dolores, tam in partibus internis, quam externis, sponte cessare evacuatione per nares, os, & aures; præterea jam liberari effluxu sanguinis, jam puris, jam vero lymphæ. Non debemus judicare, quemcumque morbum Capitis sine discrimine hoc vel illo humore effluente sanari, sed unaquæque specialis causa suo proprio effluente humore solvitur: inde necesse est, antequam cum certo fundamento valemus præsagium formare, ut perspiciamus, quinam morbi præcipue Capitis dolores inferant. Frequentissimi morbi Dolorem capitis inducentes sunt Impetus sanguinis major ad Caput, Inflammatio meningum, atque humor tenuis acer Catarrhosus. Ut morbi hi suis signis distinguantur, reliqua phænomena hanc vel illam causam concomitantia simul sunt perpendenda, secundum datum præceptum generale in doloribus, (Aph. 270.) nam capitis dolor est phænomenon, quod ex multis causis oriri potest, quæ causa detegi nequit, nisi tot colligantur phænomena dolori capitis conjuncta, quæ causam hanc a ceteris distinguere valent. Si Impetus sanguinis ad caput sit major, qui dolorem infert, vasa arteriosa in partibus externis capitis magis agitata & impleta faciunt faciem inflatam & rubentem, nares rubent & pruriunt, caput incalcescit, & arteriarum pullatio sentitur in temporibus, interdum etiam in collo. Atque partes arterias a carotidibus.

bus internis ramos accipientes motus majoris etiam indicia præbent; ita oculi protuberant, rubent, truces fiunt, cum effluxu lachrymarum; vident sæpe scintillas; aures tinnunt & sonitum audiunt vel obsurdescunt; vel cerebrum agitatum delirium vel soporem inducit. Inflammationis signa non multum a præcedentibus distant, nisi quod dolor sit levissimus & constans, & ea omnia sint vehementiora. Quando hæc cessare incipiunt sine bona crisi, judicamus abiisse in purulentiam. Sed quando morbus fuerit chronicus, vel continuum inferens capitis dolorem, vel per intervalla redeuntem, sine signis istis citatis, sed cum doloribus vagis vel fixis in aliis partibus corporis, qui nunquam abierunt in suppurationem, judicamus lympham acrem tenuem vellicare meninges & ita producere dolorem.

II. Tria proponuntur emunctoria, per quæ humor evacuat solutionem portendit, & tres evacuandi humores recensentur: verum non est judicandum, unumquodque emunctorium suum solum proprium humorem evacuare: observatione constat, Nares præcipue evacuare sanguinem, Os lympham, & Aures pus. Hæc tamen practica observatio non est ita constans, quin interdum hic ordo invertatur. Verum humoris diversi exitus magis constans est: nam Capitis dolor ex impetu majore natus optime liberatur narium hæmorrhagia, quæ minuendo sanguinis copiam majorem simul compescit illum majorem impetum & indatum dolorem. Sed circa finem morborum acutorum, si per metastasin ad caput delata est materia purulenta, aut quando in interioribus capitis fuerit exulceratio capitis dolorem inferens, sæpe observavi, puris evacuatione per aures homines fuisse liberatos, interdum etiam per os & nares: sed minus frequens per hæc emunctoria eliminatur pus. Humor autem serofus /acris capitis dolorem inferens sine multo discrimine per tria hæc emunctoria eliminatur. Hæc est quotidiana experientia, & vix aliquis exercuit praxin, quin has evacuationes detexerit cum ægri levamine. Theoretici his observationibus non contenti, rimati sunt encephali fabricam, invenientes omnia cranii foramina Durâ

Qui dolores capitis solvuntur evacuatione sanguinis, puris, vel aquæ, per os, nares, & aures.

matre tecta: quia non detegunt viam, faterentur hanc invertere practicam observationem, quasi materiæ morbosæ fieri non potuisset evacuatio per partem aliquam, nisi via anatomicis esset cognita. Verum in viventibus multa fiunt, quæ ab anatomicis in cadaveribus non possunt demonstrari, præprimis si vis vitæ instigetur ab aliqua morbosa materia. Satiùs itaque existimo veram observationem practicam mordicus tenere, quam eam repudiare, vel denegare, quoniam nos latet structura.

LIB. VI. APH. XI.

276. **M**elancholicis, & nephriticis, hæmorrhoides supervenientes, bonum.

I.

Melancholicis hæmorrhoides supervenientes, bonum.

Duplici sensu vocari homines Melancholicos, observavimus. (Aph. 119, II.) Nam si respicimus ad animam, tristes & mœrentes sine causa, & timentes non timenda, dicuntur Melancholici. Qui materiem Atrabiliariam collectam gerunt in vena portarum, sive talis animi affectiones inferat, sive non, tamen censentur Melancholici. Hanc præprimis posteriorem speciem hoc in loco intelligi, confido, quum citet evacuationem, qua illa materia evacuari potest. Quamobrem vero Hæmorrhoides supervenientes hoc loco magis extollantur, quam quævis evacuatio alia, tam sanguinis, quam aliorum humorum, attentionem meretur: reddunt etenim melancholici urinam nigram sine levamine, & ducitur ipsis sanguis, vel sponte oboritur narium hæmorrhagia cum incremento mali. Satis demonstravimus loco citato, materiem melancholicam venire non posse in sanguinem venæ cavæ vel arteriæ aortæ, nisi transeat per hepar, neque per aliam viam duci potest ad renes, ut urinam sua nigredine inficiat. Si ergo ejus aliqua portio

portio transeat per hepar, fons tamen perpetuus manet in vena portarum novam materiem suppeditans. Quod si ex naribus fluit sanguis, non magis de materia atrabiliaria eliminari potest, quam de reliquo sanguine bono: unde sæpe miratus vidi, toties tentatum fuisse melancholicos curare per venæ sectionem. Si autem Hæmorrhoides fluunt, ille sanguis venæ portarum evacuatur, qui maxime imprægnatus est materia melancholica, nam hæmorrhoidales venæ furculi sunt venæ portarum. Hæc quoniam valvulis caret, permittit sensim omnem infectum sanguinem hac via eliminari. Interim non tam certa fit purgatio materiæ melancholicæ a reliquo sanguine bono, ac fieret, si interpositum esset organum separans, quum ablata portione, & dein restaurato sanguine, in eadem vena portarum, evacuando sensim minuitur materiæ atrabiliariæ proportionata quantitas. Hæc sententia in exemplo clarius concipitur. Si verbi gratia aliquis contineret in vena portarum uncias duodecim sanguinis Melancholici, & evacuet unciam unam, duodecima portio hujus materiæ Melancholicæ evacuetur: post evacuationem si iterum bonus sanguis accederet, dein facta æquali evacuatione, non emitteretur duodecima portio materiæ melancholicæ. Et quo frequentior sit facta evacuatio & restauratio, eo minor portio materiæ melancholicæ evacuetur; adeo ut tandem in una uncia evacuati sanguinis ne quidem semi uncia materiæ melancholicæ contineretur. Hæc est ratio, quod Hippocrates dixit, Bonum, non vero Solutio fit. Imo locus aptus ad producendam atram bilem inter evacuandum iterum æqualem copiam ejusdem regenerare potest, quam est ea, quæ singulis vicibus emittitur.

II. Veteres omnes dolores lumborum, ubi renes hærent, Nephritidem vocasse ex variis locis (Aph. 110, VI) colligi potest. Credere enim non possum, dolorem nephriticum per calculum in renibus hærentem, dolorem inferentem, hæmorrhoidum fluxu curari posse. Sed mesenterium lumbis annexum, quod multos ramos venæ portarum continet, si propter impletionem a materia melancholica vel ejus

Hæmorrhoides Nephriticis supervenientes, bonum.

acrimonia lumbis dolorem infert, conceptu facile est, facta depletione per venas hæmorrhoidales levamen fieri doloris. Inde etiam toties per alvi ductionem, qua depletur vena portarum, minuuntur dolores nephritici, non quod calculum auferat, sed vasa mesenterii distenta, dolorem inferentia, depleat. Mirum nemini videri potest, me mesenterii dolorem hoc loco vocare Nephritidem, locus enim tantum non distat, ut per designatum locum dolentem has duas partes semper valeamus a se invicem distinguere.

LIB. VI. APH. XII.

277. **H**æmorrhoidas curanti diuturnas, nisi una servata fuerit, periculum est, ne hydrops superveniat, aut tabes.

I.

An hæmorrhoides diuturnæ non omnes curandæ?

PER Hæmorrhoidas hoc loco intelligi sanguinis fluxum ex venis hæmorrhoidalibus, non vero has partes dolentes (*Aph.* 109, XIII) colligi potest ex adjunctis verbis, nisi una servata fuerit, nam dolentes hæmorrhoides omnes tuto curantur, neque ex curatione doloris in hoc loco aliquid mali esset expectandum: verum si cohibeatur consuetus fluxus, materia tali modo retenta morbos varios inducere potest. Hæmorrhoides diuturnæ si solummodo bonum sanguinem fuderunt, istis sanatis, corpus huic evacuationi assuetum, quæ nunc suppressa est, ad morbos disponitur, Consueta enim non subito mutanda (*Aph.* 76, I.) Hinc etiam viri hæmorrhagiis assueti vel venæ sectioni, iis omissis in varios morbos labuntur. Maxime hoc observatur in menstruo sanguine suppresso, sive ex causa morbosa sive ætate ingravescente, rarum est, si inde non nascatur aliquis morbus. Quod si ex hæmorrhoidibus diuturnis effluxe-

rit

rit sanguis vel humor morbosus, his tunc omnibus sanatis plura mala sunt expectanda, quia tunc non solum suppressa consueta evacuatione destruitur æquilibrium, verum retentus humor sua malignitate ut plurimum periculosissimos morbos infert. Ita patere videtur, omnes hæmorrhoides diuturnas non esse sanandas: sed si permittantur, rarum esset si non generantur fistulæ ani, quæ quoque molestissimæ sunt. Ergo ancipites hæremus quid sit faciendum. Si enim curo omnes, multi morbi fiunt, si non fano, generatur ani fistula: igitur media via est ineunda, nempe sensim omnes hæmorrhoides sunt sanandæ, ne subitanea inducatur mutatio. Si interim retinetur morbosa materia, illa medicamentis internis est emendanda, vel alibi in corpore fonticuli sunt concitandi, qui collectam materiem evacuant: aut aliquoties est repetenda venæ sectio vel alvi ductio, ne subitanea mutatio introducatur.

II. Qui humor ex Hæmorrhoidibus fluit, est sanguis purus, vel melancholicus, vel est liquor aliquis morbosus. Prout diversus illius humoris efluxus supprimitur, ita etiam varii fiunt morbi. Nemo mirabitur ex suppressa melancholia vel humore morbofo retento generari morbos, sed si sanguis talis, qualis colligitur in vena portarum, hac via consuetus evacuari retinetur, tunc dicit Auctor, periculum est, ne superveniat Hydrops, aut Tabes. Ergo hæc phrasis duo inculcat, nempe non semper fieri Hydropem vel Tabem, sed interdum; & alterum est si talia superveniant, malum præbent signum, quoniam dicit periculum est. Etiam si hos duos morbos citat, non tamen reliquos excludit, sed inculcare vult, se cum damno ægri hos duos vidisse morbos consecutos. Quod mirum est in hoc Aphorismo, ex eo patet, quod citat duos morbos toto cælo sibi oppositos: nam Hydrops humorum abundantiam arguit; sed Phthisis est morbus ex summo humorum defectu. Quomodo autem hi duo morbi ex eadem causa generari possint, paucis videbimus. Si sanguinis evacuatio diuturna per hæmorrhoides supprimatur, ex abundantia humorum destruitur æquilibrium inter causas agentes & quantitatem humorum:

Cur ex hæmorrhoidibus diuturnis sanatis periculum est, ne fiat hydrops vel phthisis?

humores itaque minus compacti per spontaneum deliquium vel abeunt in Viscosum vel Laticem tenuem. Quod si id viscosum colligatur in cellulis pinguedinosis, generatur tali in corpore Hydrops. Sed si ex defectu virium liquati humores simul excluduntur per emunctoria, corpus Macie consumitur. Igitur degeneratio humorum in utroque morbo est eadem, solummodo differt evacuatio, quæ in uno morbo parcius, in altero copiosior fit. Quare duo hi morbi in sua natura non multum differunt, sed in phænomenis apparentibus, quæ a Veteribus maxime observantur, multum differre videntur. Unde sæpe observamus etiam in Phthisicis, pedes fieri œdematosos, & in Hydropicis partes tabe interdum extenuari.

LIB. VI. APH. XIII.

278. **A** *Singultu detento, sternutationes supervenientes, solvunt singultum.*

I.

Non dubito, quin Auctor noster observaverit, aliquem Singultu aliquamdiu detentum, ab iteratis sternutationibus accedentibus fuisse curatum: sed an inde generalis regula practica constans possit elici, vehementer dubito, fateor, me hoc in tota praxi non observasse. Sunt enim duo morbi motus depravati, qui ex phænomeno apparente obtinere nomen. Fieri ergo potest, ut singultus nascatur ex causa mobili irritante superius ventriculi os, ut inde convellatur diaphragma, quæ causa altera actione sternutationis depellitur; vel quod materia tenuis ab orificio ventriculi delata ad nares loco Singultus, Sternutationem faciat, & ita superveniens sternutatio curet Singultum. Sed & potest quoque Singultus esse ex multo sanguinis fluxu, (Aph. 196, 1) aut Hypercatharsi, (Aph. 197, 1) vel

vel hepate inflammato (Aph. 251, IV) vel & aliis morbis fixis circa ventriculi orificium, in quibus omnibus commotio valida sternutationis augeret morbum. Propterea si unus morbus ex phænomeno denominatus ab altero morbo superveniente debet tolli, nisi addatur prioris morbi causa distincta, omnino incerta & inutilis est observatio practica.

LIB. V. APH. XIV.

279. **A**B hydropē detento, si aqua secundum venas in alvum fluxerit, solutio fit.

I.

AN Hydropem generalem vel particularem Auctor hic intelligat, contendunt Commentatores, neque consentiant; an intelligatur aquæ fluxus in cavum ventris, vel in intestina, vel etiam per vesicam. Similem fere sententiam habet multis locis, in quibusdam vero Leucophlegmatiam ponit; aliis etiam evacuationem per urinam laudat. Denique non concipiunt, quomodo secundum Venas aqua fluere possit. Cuncta hæc subtiles sunt quæstiones, quæ nihil lucis adferunt cognitioni aut curationi: neque multum refert, num Hippocrates aliis in locis idem vel aliquid aliud statuatur, quum tota auctoritas nostra in meris observationibus practicis sit fundata. Nemo nescit, Hydropem esse morbum ex abundantia humoris aquosi in vasculis dilatatis, tunica cellulosa, vel in cavitatibus corporis: atque constat, nos non posse curare eum morbum, neque sponte evanescere posse sine istius humoris evacuatione visibili, quum tanta habeatur aquosi humoris copia, & tanta virium debilitas in his morbis, ut per insensibilem perspirationem eliminari nequeat. Tria nobis sunt data organa excretoria naturalia, nempe Cutis, Vesica & Alvus: sed quoniam Cutis naturaliter transmittit rorem, & aquæ tanta

V v v v

abun-

abundantia eousque viribus corporis non potest attenuari, emitti ergo debet vel per Vesicam vel Alvum. Utraque hæc via satis accommodata est ad exonerandam aquam, ingens copia enim arteriarum fertur ad intestina, & quæ adit renes, satis magna est. Sanguis itaque lymphæ dives per arterias has vel ad Intestina vel Renes delatus si deponat copiosiores lymphas, valet tandem omnem aquæ abundantiam exantlare sine ulla vasorum ruptione, quod indicare videtur, dum dicit *secundum venas*, per quas, arterias ubique fere intelligere debemus. Id autem generale observamus in hydropicorum aqua, quod sit quasi vehiculum commune, quod per omnia emunctoria eliminari potest, qualis naturæ liquor, neque in ipso pure: hoc enim rarissime cum levamine eliminatur per alvum, sed per sputum vel urinam. Igitur si natura vergat ad Intestina vel ad Renes, hac via utraque, aqua hydropica eliminari potest. Si tali in evacuatione redditur aqua pura inodora, minime corrupta vel acris, signum est, corporis vires valere exonerare istud onus, & vasa non esse corrupta, & sic sæpe sanantur; quæ observatio etiam magni momenti est in propinato purgante vel diuretico; nam si his medicamentis in parva copia datis, magna fit evacuatio aquosi inodori cum detumescencia corporis & virium levamine, magna spes perfectæ curationis affulget. Sed si per magnam dosim parum evacuant, vel emittitur aqua corrupta, post sufficientem evacuationem ægri moriuntur, putrefactis & corruptis visceribus ab incumbente liquore. Imo observavi, fluxu spontaneo oborto in cruribus copioso ægros fuisse liberatos a tumore hydropico, sed post sufficientem extenuationem perierunt; quum excoariatio illa denotabat, aquam hydropicam suscepisse acrimoniam, qua potuit excoariationem facere, & ita simul corrodere interna viscera.

LIB. VI. A P H. XV.

280. **A** *Diuturno alvi profluvio detento, sponte superveniens vomitus, alvi profluvium solvit.*

I.

Non dubito, quin Hipp: observaverit, Vomitu superveniente diuturnam Diarrhœam fuisse sublatam, sed puto tamen hanc observationem non fuisse universalem, ut possimus inde certam prognosin formare, vel hac in re imitari naturam dando vomitorium in diuturna Diarrhœa. Fieri equidem potest, ut inter ventriculi plicas aliquid corruptum viscosum hæreat, quod transeuntia alimenta inficiens generet diuturnam Diarrhœam: vel quod bilis viscosa ex vesicula fellea in duodenum deposita alvi diuturnum fluxum faciat. Hæc scaturigo quamdiu manet, continuare facit Diarrhœam, sed quando valida actione vomendi excutiat ex ventriculo viscosum, vel ex vesicula fellea bilis corrupta, ablata illa causa, cessabit Diarrhœa. Si vero hac vomendi actione non eliminatur ex ventriculo & vesica fellea omne corruptum, Vomitus ille non solvet Alvi profluvium. Quod si Alvi profluvium diuturnum nascatur ex humorum colliquatione per totum corpus, qui continuo deponuntur ad intestina, quod sæpe in praxi observavi, vel ex debilitate intestinorum, qua assumpta sponte permittuntur corrumpi in intestinis, vel a vitiata bile, quæ omnis ex vesica fellea evacuari nequit, vel per ductum hepaticum continuo deponitur, his omnibus in causis & in multis aliis Vomitus si accedat, augebit morbum: minuetur quidem quantitas dejectionis, sed totus ille compositus morbus fiet gravior. Si essent signa indicantia hanc vel illam latentem causam proritare Diarrhœam diuturnam, aliquid certi ex superveniente Vomitu hauriri posset, sed

V v v v 2

quo.

quoniam hæc signa admodum sunt ambigua, nihil certi ex Vomitu superveniente deduci potest.

LIB. VI. APH. XVI.

281. **A** Pleuritide aut a peripneumonia detento diarrhæa superveniens, malum.

I.

Quales morbi dicantur Pleuritis & Peripneumonia, ex antecedentibus (Aph. 109, iv & v) peti potest, iis si detineatur æger, id est si hoc vel illo morbo aliquamdiu laboraverit, & dein corripitur Diarrhœa, ille fluxus malum portendit. Observavi in praxi, a Diarrhœa superveniente sputum in pleuriticis & peripneumonicis præstantissimam evacuationem supprimi, & corpus summo pere debiliari. Paradoxum autem quibusdam videtur, per alvi dejectionem copiosorem fieri non posse criticam evacuationem in pleuriticis & peripneumonicis, cum sit amplissimum emunctorium, per quod in capitis morbis toties observatur fieri levamen, & multi medici ex dato purgante in principio horum morborum egregium quoque levamen percipiunt. Meretur igitur, ut hæc evacuatio in dictis morbis penitus perspiciatur. Constans est observatio, quodcumque organum secretorium & excretorium suum proprium humorem secernere a communi massa sanguinea, ita Renes omnium optime purulentiam ex communi massa auferunt & cum reliqua urina emittunt; Intestina autem materiem biliosam & melancholicam: putrefactum vero & aquosum omnia emunctoria. Vicissim conari evacuationem non procedit: nam etiamsi urina subnigra denotet evacuationem melancholiæ, & fulva aut flava exitum bilis, nisi his morbis fiat alvi evacuatio, nunquam perfecte curantur, sed evacuationes hæc sunt symptomaticæ. Ita etiam puris.

puris evacuatio per alvum, si pus non sit formatum in intestinis, nunquam liberat hominem a morbo suppuratorio, quum intestina non sint organa, quæ valent purulentum separare a tota massa. Si igitur fiat Diarrhœa in Peripneumonia & Pleuritide inflammatoria, quæ abierunt in suppurationem, quod indicatur his verbis, *Pleuritide vel Peripneumonia detento*, signum igitur est, hac via non evacuari pus, sed humorem alium, aliter enim dixisset Auctor alvi egestionem purulentam. Inde colligendum est, morbos istos inflammatorios non abiisse in purulentiam bonam, sed in putrilaginem malam, quæ materia facile potest per intestina eliminari. Quia vero a pectore ad intestina non habetur via particularis, sed putrilago prius est tradenda communi massæ circulatoriæ, antequam ad intestina veniat, concludere possumus, malam fuisse factam commutationem morbi inflammatorii, & materiem corruptam toti massæ esse traditam, a qua difficulter separari potest per intestina tanquam organum excretorium. Dein etiam ex constanti lege comperimus, unam evacuationem impedire alteram, unde alvus fluens non solum dicta mala indicat, verum etiam faciet sputi suppressionem, sine quo peripneumonia & pleuritis non curatur, unde ex materia in pulmonibus collecta generatur difficultas spirandi, cum summo ægri periculo. Ex quibus observationibus clare constat, quam male agunt medici, qui in pectoris morbis inflammatoriis præbent purgantia, quibus sputum supprimunt. In principio autem Pleuritidis & Peripneumoniæ purgantia conceduntur, ut tollant cacochyliam primarum viarum, quæ longiore mora exacerbaretur, & ut temperent nimium motum circulatorium, antequam materia ea per sputum reddi potest, nunquam vero adhibenda purgantia morbo ad coctionem vergente, vel si jam sputum expurgari incipit.

LIB. VI. APH. XVII.

282. **O** *Phthalmia laborantem ab alvi profluvio corripere bonum.*

I.

Veteres phænomenis magis quam causis morborum imposuerunt nomina, & interdum quibusdam in morbis natura diversis, modo phænomena non multum differant, idem morbi nomen retinere, unde in prognosi formanda & in curatione tanta plerumque differentia, ut idem morbus opposita methodo curetur. Hoc evidentissime elucescit in Ophthalmia: varia enim genera morborum qui oculos infestant, modo rubedinem adjunctam habeant, Ophthalmiam vocant, seu Lippitudinem, quod etiam retinetur nomen in palpebrarum morbis. Quoniam hoc in loco absolute ponit Ophthalmiam, innuere vult omnem oculorum morbum, qui adjunctum habet dolorem & rubedinem, sive sit ex humore acri rodente, sive ex Inflammatione, sive ex Erysipelate, eo præprimis scopo, ut demonstraret, in oculorum morbis externis visibilibus, ratione partis conducere Alvi profluvium, quod antea damnaverat in morbis pectoris. Equidem non inter omnes partes æqualis est Consensus, qui enim morbi fiunt in pectore, facillime liberantur per vias urinæ, difficulter per alvum; morbi autem oculorum difficulter per urinam sed commodius per alvum. Quare medicum oportet scire non solum quali causa morbosa laboret æger, sed etiam in quali parte, quum eadem morbosa causa diversis in partibus, sæpe diversam exigit curationem. Inde non sufficit, ut accurate teneat cognitionem curationis cujuscvis causæ morbosæ, sed insuper scire oportet, quid sit mutandum, si cognita causa morbosa hanc vel illam partem aggreditur. Inde in oculorum

rum morbis frequentius ducenda alvus, quam in morbis pectoris, quum natura demonstret, hos morbos oculorum levare alvi fluxu.

LIB. VI. APH. XVIII.

283. **C**ui perfecta est vesica, aut cerebrum, aut cor, aut septum transversum, aut aliquod ex intestinis tenuibus, aut ventriculus, aut hepar, lethale.

I.

Non omnia vulnera, post quæ moritur vulneratus, breviori vel longiori tempore, ob errorem commissum, vel ex inscitia, vel neglectu, vel quodam casu, pronunciantur absolute Lethalia, sed quæ inevitabilem mortem inferunt, etiamsi omnes cautelæ fuerint adhibitæ. Hoc tamen in sensu non accipitur vox θανατώδες, quod etiam supra indicavimus, (Aph. 195. 1) sed quando admodum est periculosum, & sæpe mortem infert. Talia vulnera in hoc Aphorismo citantur, quæ non leviter lædunt dictas partes, sed satis late & profunde; nam διακοπή divisionem, incisionem, præcisionem & separationem indicat, quæ non est levis aut superficialia, sed satis lata, profunda, vel integra. Quoniam variæ partes citantur ab Auctore, quæ non omnes idem periculum inferunt, quamvis omnia illa vulnera dicantur lethalia, videbimus quid sit de his partibus vulneratis sentiendum.

Quæ vulnera dicantur lethalia.

II. Omnia Vesicæ vulnera non esse lethalia, comprobatur calculi sectio, qui educi nequit, nisi plaga facta in vesicæ collo; & post altam dictam operationem Lithotomiæ in vesicæ fundo incisio fuit facta, post quam operationem nonnulli fuere sanati. Ruyschius etiam observavit Vesicæ vulnus sanatum. Non tamen sentiendum est, omnia Vesicæ

Vesica perfecta.

cæ

cæ vulnera non esse lethalia: nam si ejus magna quædam arteria sit abscissa, quoniam medicamentum vel instrumentum adhiberi nequit, ut compescatur hæmorrhagia, inevitabilem mortem intulit: atque vulnera satis lata ita in Vesicæ fundo, ut omnis in vesica colligenda urina effundatur in ventris cavitatem, quæ ibidem sensim majore copia collecta & acrior denique facta, comprimendo & corrumpendo viscera abdominalia, mortem inferunt; parva autem punctura hoc in loco vesicæ, quæ se contrahit, sanata fuit.

Cerebri
vulnera.

III. Multum differt in assignanda lethalitate vulneris, si ve dixerim Cerebri vel *εγνέφαλλε* vulnera, ut habetur in textu, nam per Cerebrum eam solam partem intelligunt Medici in encephalo, quæ in ejus parte anteriore continetur, dura & pia matre tectam, unde nervi motus animalis & sensuum suam originem habent: hac in parte levissima vulnera non attulerunt semper mortem: quæ vero profundiora fuere, absciderunt aliquod vas cruentum, vel læserunt medullam oblongatam, vel cerebellum, illa omnia nullâ arte curari potuere. Antequam ergo pronunciare possumus, num vulnus Encephali sit lethale, scire prius oportet, quænam pars in Encephalo fuerit læsa. Multi putant, omnia vulnera Duræ matris lethalia esse, verum experientia probatur, talia vulnera sæpe fuisse sanata. Nam si sanguis dura matre tectus invenitur post terebrationem cranii, non dubitant Chirurgi pertundere Duram matrem, ut evacuent sanguinem, & ita sanarunt hominem læsione Encephali laborantem. Sæpe etiam Cerebri fungus, qui sine Duræ matris læsione fieri non potuit, curatur, sublata satis magna portione Cerebri. Nimis latam autem conclusionem facere non debemus de his fungis, quasi satis magna portio Medullæ cerebri simul tolleretur, cum arteriæ in cerebri cortice sustentaculo privatae, in satis magnam molem excrescant, ex cujus ablatione non sequitur simul ablatio medullæ; neque fibræ medullofæ istius portionis privantur sanguine circulante, quum arteriæ corticis cerebri tam frequentes faciant anastomoses, ut etiamsi quædam portio tollatur, per

per alias tamen arterias anastomoses facientes suppeditetur sanguis.

IV. Cor constare fibris muscularibus in gyrum decurrentibus, nullus est qui nescit, istud quoque intus habere duas cavitates, quas ventriculos nominant, dextrum scilicet & sinistrum, quibus recipit sanguinem & dein eum extrudit magna vi, dexter nempe ducit in arteriam pulmonalem, & sinister in aörtam. Olim hoc in corde locarunt fontem Calidi innati, quod exstingueretur vulnerato corde, unde ejus vulnera lethalia erant. Hodie vero tribuunt Cordi totam actionem circulatoriam, sine qua etiam vivere nequit animal, & propterea ejus etiam vulnera absolute pronunciantur lethalia. Obstupefacti tamen hærent, si observant in Cadaveribus relictam cicatricem vulneris consolidati in homine, qui satis diu post acceptum istud vulnus vixit. In aliis detexerunt, post vulnus acceptum, quod penetravit cor, locutos fuisse & per aliquod tempus vixisse: & quod captum superat, rana exempto corde saltat & natat, atque partes insectorum dissectæ diu viventes manent toto corde privatae. Quibus adductis experimentis multi hæsitant, num Cor sit in nobis organum tam necessarium, ut sine eo nemo vivere potuisset. Si autem rem ipsam perpendamus, luce meridiana clarius constabit, nos vivere non posse sine motore illo generali, nobis enim unicum Cor est datum, unde inchoamentum totius circumductionis sanguinis, istud enim non solum dat impetum sanguini circulanti, verum etiam suppeditat arteriæ aörtæ sanguinem, qui ducendus est ad omnia organa, ut his suum præbeat requisitum humorem, sine quo functio nulla fit. Sed præterea in arteriis est motus aliquis vitalis, qui receptum a corde sanguinem ulterius propellit, ad quam circulationem continuandam Cor solum est impos. Si ergo Cor ita læditur, ut ejus exstinguatur motus, veluti in abscissione nervorum cardiacorum, Corde non amplius suppeditante aörtæ sanguinem, necessario sequitur mors, sed non statim, dum Cor agere cessat, sed quando arteriæ illæ suo motu vitali suppeditarunt omnem suum sanguinem, nihil amplius ex corde

Cordis vulnera.

recipientes. Hoc etiam fieri potest abscissa arteria coronaria, quo intercipitur sanguinis circulatio per cordis substantiam, quum experimentis constet, nullum musculus operari, cui denegatus est influxus sanguinis per suam arteriam. Quia vero talia vulnera nullum admittunt auxilium & mortem semper inferunt, lethalia absolute sunt pronuntianda, etiamsi vulneratus per aliquod tempus maneat superstes. Experimenta Insectorum hanc observationem dubiam non faciunt, quum non sit necesse in his, ut unicum generalem habeant motorem: atque illa longo tempore jacere possunt omni motu privata, & postea revivescere, quod nobis non est concessum. Alterum genus vulnerum facere potest ex cavis cordis tantam sanguinis effusionem, ut homo talis sanguinis defectu pereat: si autem sensim introducatur sanguinis defectus, mirabile est observatu, hominem vivere posse tunc cum exigua sanguinis copia in arteriis & venis, sed si subito auferatur, quia vasa se tam subito contrahere nequeunt, vel moriuntur tunc defectu sanguinis, qui non amplius propellitur, vel a sanguine effuso ita opprimuntur partes, ut earum actio omnino extinguatur. Talia quoque vulnera absolute sunt lethalia, sive mors cito sive tarde veniat. Denique Cordis levissima vulnera num sint lethalia, vehementer disputant, quum inveniantur cicatrices in corde relictæ. Si Cor potuisset quiescere uti reliqui muscoli motus animalis, vulnus non penetrans in ejus cava, facile consolidari potuisset, quum sit pars carnosae uti reliqui muscoli: sed propter perpetuum suum motum non nisi raro permittit consolidationem, unde fere semper post langas miseras mors obrepit. Quum vero nemo potuit apta medicamina huic vulnere adhibere, si æger post tale acceptum vulnus, etiam post longum tempus, moriatur, istud fuit vulnus absolute lethale. Hoc solum præstare possumus in tali vulnerato, ut minuamus circulationem tantum, quantum fieri potest manente vita, ut ita concedatur hujus partis consolidatio.

Septi. trans-
versum vulne-
re.

V. Quid sit Diaphragma seu septum transversum, satis ex Anatomicis constat: ex quibus discimus, Diaphragma istud esse.

esse sepimentum, quod thoracis cavitatem a ventre inferiore distinguit, istud circumquaque nexum esse extremitatibus costarum, vertebri præprimis lumborum, & parti inferiori ossis sterni; habere figuram convexam versus pectoris cavitatem; in hujus medio habetur locus tenuior tendineus, qui deorsum trahitur & complanatur; si fibræ carnosæ hujus Diaphragmatis operantur. Constrictione muscutorum abdominalium viscera in dicta cavitate contenta satis valide urgentur ad internam hujus convexam superficiem. Vulnere hujus partis ponuntur lethalia. Sed debemus maximam differentiam ponere, quænam pars in Diaphragmate sit læsa, & insuper num solum diaphragma, vel & adjacentia vasa & viscera, quod frequentissime fit: denique a Diaphragmatis vulneribus homines diu manserunt superstites, qui tamen postea post multas miseras passas moriebantur. Si pars carnosæ in ambitu Diaphragmatis lædatur, & vulnus non admodum fuit magnum, tale vulnus non semper attulit mortem, sed coaluit cum visceribus adjacentibus: illa autem consolidatio difficilior fit & tardius, quam in reliqua carne propter motum perpetuum respirationis. Si vero simul alia vasa vel viscera fuerint læsa, incertum est, num Diaphragmatis vel reliquarum partium vulnus mortem intulerit. Sed vulnera penetrantia, præprimis in ejus parte tendinea, si parva sint, lentam, sed tamen certissimam mortem inferunt: pars enim illa tendinea tensione Diaphragmatis sensim magis dehiscet, & si ad locum illum hæreat ventriculus aut intestinum colon, hæ partes membranosæ contractione muscutorum abdominalium continuo pressæ, per dictam aperturam sensim formant speciem herniæ, quæ prominet in cavum pectoris: illa hernia sensim increscens ita implet pectoris cavitatem, ut pro pulmonibus & corde non satis magnum spatium relinquatur, unde tandem ægri sine ullo auxilio pereunt. Talia fuisse facta, testantur dissectiones anatomicæ in cadaveribus, in quibus invenerunt ventriculum vel colon totum pectus fere implens. Quidam ex his ultra annum post inflictum vulnus tandem perierunt post intolerabilem cardialgiam vel colicum dolorem.

Intestino-
rum vulne-
ra.

VI. Intestinorum tenuium non solum, verum etiam crassorum vulnera lethalia esse possunt, & interdum curantur, quare ita absolute lethalia pronunciari non possunt. Quoties enim intestinum aliquod ita est læsum, ut sua contenta ejiciat in ventris cavitatem, & læsum intestinum se ita subducatur, ut cum abdominis integumentis consui non possit & cum iis consolidari, ut e corpore deponat sua contenta, omnia talia vulnera etiam si lentam mortem inferant, sunt tamen lethalia: excrementa enim in cavum ventris effusa, cuncta viscera corrumpentia tandem mortem inferunt. Si vero vulnus sit parvum, quod se contrahere potest, vel & partibus adjacentibus accrescere, talis vulneratus servatus fuit. Si intestinum tenue autem abscissum sit prope pylorum, quo vulnere intercipitur chyli absorptio, etiam si contenta intestinorum ejicerentur extra corpus, tale tamen vulnus inferret mortem post lentam extenuationem, propter chyli ingradientis defectum.

Ventriculi
vulnera.

VII. Ventriculi vulnera ratione periculi multum differunt, nam exigua vulnera, quæ ventriculo vacuo & contracto clauduntur, consolidari possunt, si modo caveamus, ne ventriculus nimis impleatur, & ne alimenta duriora ingerantur. Latiora autem, quæ fundunt recepta sua alimenta in abdominis cavitatem, lentam mortem inferunt, partim defectu alimenti in toto corpore; partim effuso humore in ventris cavo, vel comprimente viscera, vel ea corrumpente recepta putredine. Interdum vero accidit, ut docuerunt observationes chirurgicæ, talia latiora vulnera fuisse consolidata cum abdominis integumentis, emittentia recepta alimenta per apertum vulnus. Quandoque vero perfossis ventriculi vasis majoribus ægri brevi tempore perierunt sanguinis defectu, qui ergo ex ventriculi vulnere brevi tempore moriuntur, ii magis ex sanguinis effusione, quam chyli vel alimenti defectu pereunt.

Hepatis vul-
nera.

VIII. Hepatis magna vulnera percidentia ramos venarum portarum magnos, brevi tempore interficiunt effuso sanguine ex hac vena in ventris cavitatem, & dein post animi deliquium extinguuntur: alia autem minora, quæ simul lædunt

dunt ductum choledochum, inferre solent anxietatem, puncti-
tionem, quæ ad jugulum & scapulas extenditur, vomitum
& dejectionem biliosam, accenditur dein febris cum æstu
ingenti, postquam moriuntur: unde discimus, hepatis affe-
ctiones interdum usque ad jugulum extendi, qui dolor per-
peram pro pleuritide habetur. Vulnera autem exigua non
raro consolidantur, observavi enim, magnam copiam humo-
ris corrupti per aperturam in integumentis abdominis fuisse
evacuata & hominem perfecte curatum fuisse benignitate
naturæ.

L I B. VI. A P H. XIX.

284. **U**bi dissectum fuerit os, aut cartilago, aut ner-
vus, aut genæ pars tenuis, aut præputium,
neque augetur, neque coalescit.

I.

Inter plantas & corpus nostrum illa maxima observatur
differentia, quod ramus arboris amputatus, renascatur,
arbor ex suo trunco novos emittit ramos, nostrum au-
tem corpus si privatur quadam parte, non regenerat no-
vam, si excipiamus pilos & ungues: ideoque in nobis &
aliis animalibus perfectis constantem hanc legem observa-
mus, partem aliquam mutilatam non regenerari. Ergo non
est opus, ut solummodo annumeremus partes a Veteribus
spermaticas dictas: si autem portio media ex carne fuerit
ablata, regenerabitur, & quali modo, infra videbimus. Per
Coalescentiam intelligunt, si duæ partes separatae, sibi mu-
tuo junctæ inter se ita concresecunt, ut verus sine glutine
fiat nexus. Hanc non adstruunt sententiam ex vera ob-
servatione practica, sed ex quadam opinione theoretica, par-
tes scilicet ex semine natas, quales citantur in hoc Apho-
rismo, amplius increescere non posse vel coalescere, quia

Quæ partes
dissectæ,
neque au-
gentur ne-
que coales-
cunt?

deficit materia feminalis ; partes autem sanguineas putant , augeri & minui posse , quia sanguis etiam post nativitatem augetur. Qui autem perspectam habent subtiliorem anatomiam , bene sciunt , inter fabricam membranarum & carnis nullam esse differentiam , nam eloto omni sanguine ex parte carnosa , pars residua mera pars nervosa apparet : & vicissim fortiter vasis arteriosis lymphaticis membranæ impletis , membrana videtur rubra caro : quod etiam sæpissime in morbis occurrit , tunica enim oculi adnata si ophthalmia sit affecta , ita rubet , ut vera caro videatur. Quid autem sit sentiendum de partibus specialibus in Aphorismo citatis , paucis videbimus.

An Os dissectum neque augetur neque coalescit ?

II. Miror sane Galenum , virum longo usu practico exercitatum hanc sententiam adstipulari , contendentem partes ossis fractas postea consolidatas vero nexu non concrescere , sed per callum circumnatum conferruminari , dum hodierna observatio chirurgica constans sit , ita conjuncta ossa vero nexu conferruminari , & quidem tam firme , ut si os bene consolidatum sit , eo in loco firmiorem habere nexum , quam in partibus nondum ruptis. Neque latere potest ossium incrementum , si quædam pars media fuerit ablata : observationes chirurgicæ multæ exstant , in quibus satis notabilis portio ossis fuerit ablata , qui locus dein vero osse fuerit impletus. Portio quoque cranii fuit ablata , & locus dein primo membranosa substantia , dein cartilaginea , ultimo ossea fuit impleta. Quare non possumus diutius dubitare , quin ossa in loco tecto , modo extremitates eorum maneant viventes , possint post nativitatem ulterius incrementum accipere , & consolidari.

An Cartilago ?

III. Tria genera partium in corpore nostro inveniuntur : Durissima sunt Ossa , quæ neque flectuntur neque accurtantur , ut reliquis partibus præbeant firma sustentacula & munimenta : alterum genus , quod permittit flexuram & extensionem & adductionem , & quod extensum se ipsum accurtat , se accommodat extensioni & flexuræ variæ sine integra separatione , ut est caro , membrana , vas : denique tertium genus est , quod permittit flexuram sine ruptione , sed

sed sibi commissum se non accurtat, sed loca, quæ munit, magis expandit, illa pars proprie vocatur Cartilago; in qua id speciale detegimus, quod si flectatur vel per causam aliquam externam, vel per actionem muscularem, quamprimum sit sublata causa flectens, se iterum expandat. Harum ergo partium usus est egregius in locis, ubi canales debent manere aperti & tamen contractiles, quod neque ab osse neque a membrana fieri potuisset, uti in organis respiratoriis. Partes hæ ut reliquæ omnes pari modo cum corporis mole increascunt & augentur, quare idem de Cartilagine sentiendum, quod antea observavimus de ossibus. Aliquis tamen inferre posset, si cartilagine narium fuerint abscissæ, istas non regenerari; rehero autem, quod si hoc experimentum probet, cartilaginem non consolidari vel augeri, tunc nulla pars est in corpore nostro præter ungues & pilos, quæ regeneratur, & tunc una pars præ alia non erit excipienda: nam si membrum aliquod fuerit amputatum, nulla pars in trunco remanente magis excrefcit, sed omnes accurtatæ manent.

IV. Latior Veterum quam Hodiernorum est Nervi significatio: nos enim per Nervum duntaxat intelligimus eam partem organicam, quæ ex medulla oblongata cerebri & medulla spinali oritur, distributa per omnia puncta corporis, ut functionem sensus & motus faciat, sive illa functio concipiatur fieri a fluentibus per istos spiritibus, an vero a fibris suis, hoc in loco non est inquirendum. Veteres autem non solam hanc partem Nervi significatione intellexerunt, verum etiam membranas, fibras, ligamenta, tendines, adeoque omnes partes tenaces, flexiles & albicantes nomine nervi complexi sunt. Inde quando dicit Auctor Nervus dissectus neque augetur neque coalescit, intelligit omnes has partes. Omnes hæ partes admodum tensæ sunt, si modo separentur, quam maximus fit hiatus inter istas, propterea non facile uniri possunt. Experimenta Chirurgica in his sunt consulenda; de membranis id accipi potest, quod superius in vesica, & intestinis notavimus. De Tendine observatum fuit, Tendines consutos coaluisse. De Ner-

vis ipsis, non novi unquam abscissum Nervum coaluisse, sed partem inferiorem semper factam fuisse inutilem, scilicet amisisse sensum & motum.

An Genæ pars tenuis? V. Genas constare epidermide, cute, tunica cellulosa & musculis, ut quævis partes nostri corporis, res ita cognita est anatomicis, ut nemo inficias ire possit. Genam autem percissam neque augeri, neque coalescere, observationibus chirurgicis est adstruendum vel refutandum. Faciei vulnera futuris colligata brevi tempore ita consolidantur uti in aliis partibus corporis, si quis dubitat, perpendeat modo, qualisnam sit curatio Labii leporini, quæ naturalis separatio arte ita curari potest, ut post consolidationem parva duntaxat relinquatur cicatrix. Quia vero inter curationem vulneris faciei & aliarum partium in consolidando nullam invenio differentiam, hanc partem ab aliis non exciperem, nisi quod in curandis vulneribus faciei, quia visui patent, majori cura studendum est pulchritudini cicatricis, quam in partibus reliquis.

An præputium? VI. Quod statim monuimus de consolidatione labiorum oris, idem quoque sentiendum de præputio, quo naturaliter tegitur glans penis, eo enim percisso & dein confuto coalesceret: quia vero in circumcisione non requiritur consolidatio, sed ut præputium abscissum relinquat glandem nudam, inferri inde non potest, eam partem consolidari non posse.

LIB. VI. APH. XX.

285. **S**I in ventrem sanguis effusus fuerit præter naturam, necesse est suppurari.

I.

Suppuratio quid sit. **I**lla morbosa mutatio, qua humores convertuntur actione vitæ in materiem albam, ponderosam, subpinguem, consistentem, vocatur Suppuratio. Quoties enim deest in mor-

morboſo illo humore color albus, vel vocatur Ichor, vel materia lenta, corrupta, glutinoſa, & nunquam puris nomine venit, vel dicitur Pus corruptum. Si humor morboſus natus levior ſit aqua, ut ſupernatet, etiamſi omnes præterea notiones puris præbeat, non tamen nomine puris venit, ſed vel mucus vel pituita aut phlegma vocatur; interdum lac ex mammis ſuppuratis ſtillans vix a pure diſtingui poteſt, niſi quod minus ſit coherens, & ſpecificè levius. Pituitoſi humores intime miſceri poſſunt aquoſis, Pus autem ſubpingue magis renuit miſcelam. Denique niſi illa materia habeat conſiſtentiam mellis, bonum non eſt pus, etiamſi ex pure ſit formata, ſed ad Ichorem convertitur, qui minus ſalubris eſt ulceribus & abſceſſibus. Talem materiem purulentam generari ſola actione vitæ & ex humore gelatiſoſo bono, vel prius commutato in lentorem, ſupra (Aph. 72.) demonſtravimus.

II. Sanguinem manere ſanum & fluorem conſervare in arteriis, venis, cavis cordis & quibuſdam cavernis & thalamiſ, id ſoli circulationi vitali eſt tribuendum, iſdem enim in locis ſtagnans primo concreſcit, & ſi maneat in calore, ut eſt calor noſtri corporis, ſenſim ſuperveniente ſpontanea putredine reſolvitur in liquamen fœtens acre: hoc etiam verum eſt de ſanguine retento in quodam vaſe clauſo, ſi foveatur ſimili calore per aliquod tempus. Itaque ſanguis ex propria ſua natura, ſi ſibi relinquatur, nunquam tranſit in pus, ſed, ſi adjunctam retineat humiditatem, convertitur in putrilaginem: ſi autem parte tenuiore interrim privetur, compingitur in maſſam quaſi ſolidam & nigram. Ex quibus colligimus, Puris confectionem ex ſanguine non eſſe mutationem ſanguinis ſpontaneam, ſed eſſe liquorem productum per actionem vitæ. Si ergo effuſus ſanguis hæreat præter naturam in cavo ventris, pectoris vel capitis, aut alicubi in cavitatibus vi morbi factis, uti in parte contuſa, per propriam mutationem in iſtis locis non poteſt commutari in pus, ſed in ichorem. Hoc etiam experimur, ſi vulneratus effuſum habet ſanguinem in quadam corporis cavitate, nunquam obſervaverunt Chirur-
An ſanguis in cavitatibus effuſus ſemper ſuppuratur?

rurgi, istum sanguinem abiisse in purulentiam, sed semper in humorem corruptum. Quod autem in parte inflammata sanguis abeat in Pus, illa commutatio non fuit facta, postquam fuerit sanguis effusus in eo tumore, sed dum adhuc hærebat in vasculis minimis magis dilatatis & actione vitæ validissime agitatis, quo formato dein Pure vascula disrumpuntur & colligitur Pus in cavitate vi morbi facta. Contrarium autem videtur fieri in pulmonibus post hæmoptysin, quæ dein generat puris sputum. Hæc autem observatio non docet nec evincit, sanguinem in vesiculis pulmonalibus restantem abiisse in pus; sed quia sanguis ibidem stagnando corruptus, ut & vasculum disruptum, formant in eo loco pulmonis vomicam purulentam tectam, qua dein rupta exspuitur pus. Neque magis adstrui potest sanguinis degeneratio in Pus in parte quadam contusa, nam vascula in loco contuso lacerata formant eo in loco ulcus tectum, quod Pus suppeditat. Ex his rationibus adductis consentirem Galeno, vocabulo suppurationis hoc in loco potius accipiendam esse omnem spontaneam sanguinis corruptionem.

LIB. VI. A P H. XXI.

286. **I**nsanientibus, si varices, aut hæmorrhoides supervenerint, insanix solutio fit.

I.

Quæ Insanix species solvitur varicibus aut hæmorrhoidibus?

Varias esse Delirii species, exposuimus in particulari libro, quare non opus ea repetere. Galenus atque alii Commentatores hoc loco existimant, intelligi debere Melancholiam, quoniam supra (*Aph.* 276.) Auctor dixerat, Melancholicis hæmorrhoides supervenientes, bonum. Verum hos duos morbos omnino distinguit Hippocrates (*Aph.* 99, III) Quare credere non possum, perspicacissi-

mum

mum & in arte medica exercitatissimum virum Auctorem nostrum posuisse unum morbum pro alio, sed hoc in loco intellexisse eam Delirii speciem, quam Maniam vocant, minime vero Melancholiam. Neque responderet observationibus practicis, quia melancholia non solvitur Varicibus, sed Hæmorrhoidibus: quia levatur sanguine fluente ex vena portarum, non vero ex vena cava, in cujus ramis nascuntur Varices. Quales autem Varices & Hæmorrhoides hoc loco intelligat, an clausas vel apertas, facile est harrolari. Si enim homo ex sanguinis abundantia & impetu majore ad caput adigatur in Insaniam seu Maniam, multum conferret, si sanguis fluere ex aliqua vena, tam ex vena portarum, quam ex vena cava: sed illæ intumescentiæ venarum, quæ varices & hæmorrhoides etiam vocantur, parum conferre potuissent ad detrahendam tantam sanguinis copiam, quæ sufficeret ad minuendum totius quantitatem vel impetum. Sed si fluant eodem modo, ut iterata venæ sectio, ita valent sistere impetum & derivationem majorem ad caput, ut non amplius ex hac causa turbari possit æquabilis motus cerebri, qui Insanire hujus est causa. Quotiescunque igitur conjicere possumus, Insaniam fieri majore impetu ad caput, nihil præstantius erit, quam secare venam in pedibus, ut non tantum minuat impetus, verum etiam ut fiat derivatio a capite ad partes inferiores.

LIB. VI. A P H. XXII.

287. **Q**Uæ ruptiones ex dorso ad cubitum descendunt, venæ sectio solvit.

I.

VENÆ sectionem in validioribus contusionibus sim-
mopere prævenire doloris incrementum & instantem
suppurationem, res est notissima, quoniam sanguinis
illa evacuatione minuitur nimius impetus ad partem con-
Y y y 2

Quomodo
se vit venæ
sectio rup-
tiones, quæ
ex dorso ad
cubitum
descendunt

tusam, si ergo in hoc loco intelligatur quædam species contusionis vel divulsionis, quod permittit significatio *ρήγματα*, res esset plana. Sed de hujus ambigua significatione admodum disputant Commentatores, & ipse Galenus contendit, Ruptiones descendere non posse ex dorso ad cubitum, propterea mavult hoc loco intelligere Dolores. Pace tantorum virorum ego tamen puto, Rruptionis significationem servari posse, & bonum servari hujus Aphorismi sensum. Quotiescunque enim per causam aliquam distendentem solvitur vel membrana, vel fibra, vel caro musculosa, pars enim talis rupta dicitur. Si igitur in palestra vehementi conatu membrorum quædam fibræ musculi vel tendinis in dorso fuerint ita ruptæ, ut Dolor hujus læsionis usque ad cubitum protendatur, signum est, Dolorem per consensum etiam partes remotiores afficere: ut nunc illa doloris propagatio minuatur, qui ex Rruptione fuit natus, admodum conducit sanguinem mittere, quo compescitur motus ex consensu tali productus. Qualis vena autem sit aperienda, non indicat Auctor, sed quia ad motum majorem compescendum optimum est proximas venas aperire, ut ita eo in loco maxima fieret depletio, non inconveniens videtur, venam istius cubiti esse aperiendam, ad quem dolor descendit. Si vero esset humor tenuis & acer, qui ex dorso descendit ad cubitum, uti in morbis catarrhosis, minus conducere arbitror venæ sectionem, quamvis Commentatores in ea sunt sententia, tunc venæ sectione educi humorem acrem, quum humor acris non latitet in sanguine arterioso, qui rediturus est per ejusdem brachii venam, verum potius in succo nervoso, qui humor non facile evacuari potest sanguine evacuato ex aliqua vena.

LIB. VI. APH. XXIII.

288. **S**I metus & tristitia multo tempore perseverant, melancholicum id ipsum.

I.

AN hoc loco per Melancholiam sit intelligenda illa animi affectio, quam Melancholiam vocare solemus, an vero materia ipsa Atrabiliaria, non consentiunt Commentatores. (vid. Aph. 99, II & Aph. 119, II.) Hujus dictionis est ambigua significatio: nam qui metuunt vel tristes sunt longo tempore ex aliqua evidenti causa, tandem veri fiunt melancholici, id est pertinaciter cum tristitia delirantes. Hinc Metus & Tristitia multo tempore perseverantia Melancholicum est, id est melancholiam inferunt; sic solent medici sæpe exprimere causas morbum aliquem inferentes. Itidem Melancholicum est, quando Metus & Tristitia diu durant sine manifesta causa, hæc tunc animi pathemata declarant, materiem melancholicam esse in corpore. Quomodo autem Tristitia & Metus inferant materiem melancholicam, & quomodo materia melancholica inferat vicissim Tristitiam & Metum, paucis videbimus. Inter animi pathemata & motum particularem venæ portarum, atque motum organi chylopoiëtici maximum consensum detegimus, quoniam sæpe observavi, ex oborto timore vel tristitia vel terrore intestina & ventriculum ita inordinate moveri, ut venter distenderetur flatibus, concitaretur præcordiorum anxietas, colicus dolor, vomitus, & diarrhœa interdum bilis æruginosæ, ipso momento viciens appetentia convertebatur in fastidium, & multa similia signa indicantia turbatum motum peristalticum, quæ symptomata toties exacerbabantur, quoties novum tale ingruerat animi pathema: quare dubitare non possumus, quin mo-

tus vermicularis se accommodet animi pathematibus. Illa igitur pathemata, quæ motum minorem faciunt spirituum, ut Metus & Tristitia, diu perdurantia, tandem etiam faciunt, ut in vena portarum sanguis minus propulsus, integre fere subsistat, atque ita stagnando producat materiem melancholicam, quæ nata ipsam animæ melancholiam inferat: adeo ut illi, qui antea per externam causam erant timentes & tristes, denique sine causa ea, sed ex nata mala dispositione in corpore, manéant melancholici. Quomodo autem ex materia Atrabiliaria sanguini circulanti tradita animæ melancholia formetur, non nisi per analogiam probari potest, quum inveniamus, Opio animam sopiri in his regionibus; Daturam inferre Delirium speciale; Spirituosa inducere Ebrietatem; morsum canis rabidi inferre aquæ timorem: quæ omnia sunt mera observata specialis mutationis mentis ad certam mutationem in humoribus, quamvis nescimus, qualis sit facta specialis mutatio, quæ necessario inferat mentis degenerationem: atque sufficit in scientia medica pervenire ad talem regulam generalem; nam inde scimus, nos non posse emendare Insaniam, nisi tollatur ea materia e corpore. Nemo utique valet aliquem ab ebrietate liberare manente spiritu fermentato in valis; ita non valemus melancholiam curare, quocumque etiam modo ipsi ægri obnituntur, si in corpore maneat materia atrabiliaria. Propterea monemur per hunc Aphorismum, ægros post Metum & Tristitiam perseverantem lapsuros in veram melancholiam, quare dehortandi sunt, ut relinquunt ea animi pathemata, ne in eum morbum incidant: atque scimus, nos debere Melancholiam natam curare evacuando & emendando materiem melancholicam.

L I B. VI. A P H. XXIV.

289. **S***I ex intestinis tenuibus aliquod dissectum fuerit, non coalescit.*

I.

VUlnera tenuium intestinorum neque coalescere neque augeri, supra inter aliarum partium læsiones (*Aph.* 283, *VI.*) annumeravit, quare non opus eandem rem repetere.

L I B. VI. A P H. XXV.

290. **E***Rysipelas foris quidem intro verti, non bonum: intus vero foras, bonum.*

I.

Quidam morbi definiuntur ex causa, alii vero ex phæ- Erysipelatis definitio.
nomenis, sed quoniam causa ut plurimum latet, suis
phænomenis detegenda, non parvi tali in definitione
nascuntur errores: alii vero ex phænomeno appellati, quoni-
am medici ut plurimum unum phænomenon proferunt, multi
morbi idem phænomenon habentes confunduntur, non sine
multo damno scientiæ medicæ. Qui enim dicunt, Erysipe-
las esse Bilem adustam ad aliquam partem depositam, ni-
hil equidem contribuunt cognitioni: nam si tiro medicus vo-
cetur ad ægrum, talis æger neque novit neque indicat, se
laborare bile adusta acri, & si proferat, hoc ex incertis
principiis deducit: neque junior medicus tam firmam ha-
bet memoriam, ut possit statim ex conspectis in ægro sig-
nis

nis ratiocinando invenire, ea signa ex Bile adusta acri provenire; ideoque observat signa, sed nescit, quale sit istius morbi nomen, & propterea non potest consulere Auctores practicos, quid sit in tali morbo agendum. Ideoque magis conducere ad detegendum morbi nomen, solummodo ex phænomenis definire morbum; ut quoties in practicis inquireret tale phænomenon, potuisset invenire morbi nomen. Hac autem in re duplicem detego errorem, nam qui volunt ex unico phænomeno definire morbum, multos morbos natura diversos idem phænomenon habentes, inter se miscent, cum magno ægri damno: alii autem tot phænomena congerunt, quæ vel propria vel accidentaliter sunt, ut onerent memoriam. Id equidem in Erysipelate definiendo comperimus; qui enim dicunt, bilem esse adustam & acrem, herpetem, icterum, febrem biliosam, & multos alios morbos confundunt, & non præbent veram ideam morbi indocto, quod per Definitionem fieri debebat. Qui ex Rubedine vocant Erysipelas, hi nullam faciunt inter Inflammationem, Epiphlogisma, Phlogosin, Maculam rubram, & Erysipelas differentiam. Quare Rubedo debet esse ad flavedinem accedens, late dispersa, ut ita distinguatur a Maculis: quæ cedit rubedo prementi digito, quo distinguitur ab Inflammatione: quæ conjunctam habet intumescientiam aliquam, ut differat a Phlogosi, & Epiphlogismate (Aph. 216, iv) in quo calor est urens, sed non semper rubedo, neque tumoris elevatio. Si ergo conjuncta signa Erysipelatis perpendamus, tunc tandem concludere possumus, tali in parte esse majorem motum vitalem, qui partis calorem auget, impletionem extremitatum arteriarum cruentarum & lymphaticarum, ex qua pars rubet ex sanguine majori copia collecto, & sero in vasis arteriosis lymphaticis retento. Denique ex natura Erysipelatis, quod facile priorem partem relinquat & aliam occupet, colligere possumus, materiem esse acrem stimulantem & meabilem, quæ ex uno loco facile duci potest in alium, & quam partem occupat, eam in tumorem aliquem cum calore & rubedine flavescere attollere.

II. Ma-

II. Materia Erysipelatis generans in quadam parte rube-
 dinem, ardorem & aliquam intumescuntiam, non videtur Erysipelatis
translatio
ad interna,
non bo-
num.
 compingi posse in lentorem immeabilem, neque in materi-
 em purulentam, nam observamus in eo morbo perseveran-
 te, materiem illam stimulantem viribus vitæ instigatam a-
 criorem & tenuiorem fieri, & tandem commutari in te-
 nuem rodentem humorem. Inde hujus materiæ translatio
 est facilis. Si ergo hæserit in vasculis cutaneis, erat in
 loco, ubi evacuari potuit, & in parte, cujus læsio sine mor-
 tis periculo potuit tolerari. Si ergo inde feratur, & ut
 signum, & ut causa malum portendit: loca enim interna
 eliminare nequeunt morbosam materiem; & illarum partium
 functio turbata, vel abolita per materiem hanc in ea col-
 lectam, mortis causa esse potest. Neque sponte valentibus
 vitæ viribus morbosa materia unquam interna petit, sed
 semper ad exteriora truditur: si autem morbosa ma-
 teria intro vertatur, signum est, vitæ vires tam debiles esse,
 ut non valeant aliena pellere ad corporis peripheriam, quod
 in omni morbo periculosum est. Neque laudabile est per
 externa frigida & adstringentia ad interiora trudere Erysi-
 pelatis materiem, ob recensita pericula.

III. Si vero Erysipelatis materia primo occupaverit par- Erysipelatis
translatio
ad externa,
bonum.
 tes interiores, & dein ducatur ad Exteriora, signum est,
 vim vitæ valere, ut se liberet ab eo hoste infesto, & eo
 deducta materia minus nocere potest cutim, quam priores
 partes, atque spes est, tandem totam eliminari, propterea
 valde bonum est, si natura hoc faciat. Inde tamen non li-
 cet argumentari, nos debere in morbo erysipelatoso dare
 calefacientia sudorifera, quæ materiem trudent ad corporis
 ambitum, quum materia erysipelatosa ex altera parte ma-
 gis redditur acris per medicamenta calefacientia. Quare
 non debemus prodesse expellendo & magis nocere acrem
 reddendo materiem, sed refrigerantia & temperantia Dia-
 phoretica conducunt, quæ juvant deductionem ad cutim,
 non faciunt acriorem materiem, sed simul aliquomodo in-
 fringunt acre id biliosum, istudque blande incrassant.

LIB. V. APH. XXVI.

291. **Q**uibus in febre ardente tremores fiunt, delirium solvit.

I.

Unde Tremores in
ardentibus?

Febrem Ardentem (*Aph.* 109, VIII.) habere validum motum circulatorium, quo supra modum pellitur sanguis per arterias, nemo dubitare potest, qui modo semel exploravit pulsum & attendit ad respirationem; hic motus vehementior, ut sæpe observamus fieri in ira vehementi, non solum concutit organum vitale, sed etiam spirituum animalium nervos, ut spiritus per hos non æquali ut solent fluxu, fluant, sed motu quodam perturbato; qui ita fluentes in musculos inæqualem seu trementem motum faciunt. Tremunt enim partes, si muscoli se sine valida contractione contrahunt alterne, nam si valida simul fiat contractio, Convulsio vocatur. Uterque motus fit ab inordinato spirituum influxu in musculos, sed Tremores simul arguunt potius spirituum defectum cum motu inordinato, dum Convulsio simul indicet, spiritus majori impetu pelli in musculos. Si igitur in ardentibus motus vitalis fiat vehemens, ut simul perturbet spirituum fluxum per nervos motus animalis, exinde fit motus perturbatus, Tremor vel Convulsio: sed quando spiritus simul deficiunt, fiunt Tremores: unde Tremores in Acutis & Ardentibus sunt mali ominis, denotantes spirituum defectum cum motu turbato.

Quomodo
Delirium
solvit Tremores in
ardentibus?

II. Ex perspectis Delirii causis (*Aph.* 27, III.) constat, motum cerebri perturbatum Delirium inferre posse. Ergo causa eadem, nempe motus vitalis validior & inæqualis si ipsum cerebrum in consensum trahit, paracopen seu mentis aberrationem inferre potest. Hoc autem fit, si ipsa cerebri

rebri moles inordinate moveatur: sæpe hoc accidit, si principia nervorum inordinate moventur, ubi statuitur animæ sedes in Cerebro, quod nervi ad motum animale destinati, ex eadem cerebri parte provenientes, copiosorem accipiant spirituum influxum, quo Tremor ex defectu spirituum natus, evanescat, aut commutetur in Convulsionem. Ita quidem cessat Tremor superveniente paracope, sed homo non liberatur a toto morbo, ut multi putant. Ergo solvere hic notat cessare Tremorem, non vero commutationem in sanitatem: quum Delirium superveniens non sit bonum, sed potius malum signum.

LIB. VI. APH. XXVII.

292. **Q**ui suppurati aut hydropici uruntur, aut secantur, hi pure aut aqua acervatim effluente, omnino moriuntur.

I.

DUobus modis Veteres solebant pus aut aquam in quadam cavitate collectam evacuare, nempe secando, quæ operatio hodie vocatur Paracentesis, vel urendo, hæc autem nimis crudelis operatio, quum omnes timent ferrum ignitum, rarissime hodie adhibetur, sed ejus loco per corrodens applicatum formatur eschara, post cujus separationem fit apertura transmittens pus vel aquam. Quia vero Auctoris scopus non est hoc loco tradere ipsam operationem, sed quæ mala post institutam operationem sequuntur, igitur scopum Auctoris sequemur, videndo, cur si in Empyematicis acervatim evacuetur Pus, æger utplurimum moriatur. Non debemus ab hac regula excipere spontaneam puris eruptionem, quia non moritur æger, quum sit sectus vel ustus, sed quia acervatim evacuavit pus, quod æque in spontanea eruptione fieri potest, quam post

Cur pus
acervatim
effluens in
suppuratis
mortem in-
fert?

sectionem vel uersionem. Galenus dicit, quia tolluntur opercula arteriarum, unde multi spiritus simul exhalant. Alii autem adstruunt, calorem innatum exhaustum, quum post talem evacuationem corpora summopere refrigerentur, & in animi deliquium incidant. Constat ergo ex hac sententia, non esse abrogandam pectoris perforationem, sed in ea facienda nos non debere permittere omnis puris effluxum. Videtur autem hæc observatio impingere regulæ generali, materiem morbosam cito esse auferendam, ut corpus promte liberetur. Hæc utique regula manet firma, modo per subitanæ evacuationem non inferamus majus malum, quam erat retentio istius humoris, quod in hoc casu fit. Quippe si omne pus affatim evaccio, magnam intus relinquere cavitatem, cujus latera a præcedente pure fuere erosa & macerata: vasa in his lateribus hærentia a pure contento sustentabantur; nunc vero omni illo sustentaculo orbata, ab interno naturali impetu ea vasa distenduntur, atque implentur sanguine, quæ interdum non satis valentia ferre impetum, disrumpuntur, unde loco puris illa iterum cavitates impletur sanguine. Hæc fieri non possunt, quin reliquum corpus suo adhuc bono cruore privetur, qui collectus stagnat vel in vasis supra modum dilatatis, vel effusus in pectoris cavitate: hinc in principio ex sanguinis defectu in reliquis arteriis & venis generatur animi deliquium & corporis refrigeratio. Sanguis ille vel in vasis dilatatis vel cavo pectoris subsistens sensim abit stagnando in corruptelam & format febrem hecticam, ex qua pereunt. Itaque in omni eruptione puris, sive sponte fiat, sive per sectionem, sive per uersionem, cavere debemus, ne nimis magna quantitas unica vice emittatur, sed pedetentim parva portio simul est evacuanda.

Cur aqua 29
cervatum e-
vacuata in
hydropem
mo te in in-
fer?

II. Quid Medici per Hydropem intelligant, notavimus (*Aph.* 273, II) hoc autem loco illa species est concipienda, quam Ascitem vocant, nempe collectionem magnam aquæ in inferiore ventre, quum hac in specie solebant secare & urere, quod aliis in speciebus non erat consuetum. Hanc operationem hodie quoque vocant Para-centesin. Eadem

dem cautio est observanda in perforatione ventris, quæ adhibita fuit in pectoris empyematici paracentesi; imo eruptio spontanea per umbilicum æque quam paracentesis mortem infert, si acervatim permittat evacuationem aquæ. Ratio mortis per dentum sustentaculum a præcedente non differt; sed in hac cavitate possidemus auxilium, quod in pectore adhiberi nequit. Pectus enim costis firmitum externa compressione non potest angustari, venter autem laxus & compressibilis, artificiosa cinctura ita potest adduci, ut post ablatum sustentaculum aquæ, æque sustentari possit, ac si aqua non fuisset evacuata. Felici igitur cum successu, tam in spontanea eruptione aquæ per umbilicum, quam in instituta paracentesi hac artificiosa ventris cinctura sum usus, modo illa statim in principio adhibeatur, nam si sero novum hoc sustentaculum adhibemus, postquam sanguis vel stagnat concretus in vasculis dilatatis, vel effusus in ventris cavitate, cinctura hæc prævenire nequit collectionem & corruptionem sanguinis. Propterea statim dum effluit aqua, laxum abdomen est sustentandum, priusquam sanguinis collectionem fecit, ad prævenienda omnia illa mala. Non tamen per hoc auxilium certam curationem promittere audeo: sæpe enim ita fuere macerata & corrupta ventris viscera, ut, etiamsi sustentetur venter, viscera & humores corrupti mortem inferant. Ex hac observatione judicari potest, quid sit sentiendum de nimia illa evacuatione continuata per purgantia, qualis methodus a multis ita extollitur.

LIB. VI. APH. XXVIII.

293. **E** *Unuchi non laborant podagra, neque calvi fiunt.*

I.

QUoniam his in regionibus nulli inveniuntur Eunuchi, per experientiam observare non datur, num Podagra laborent vel non. Quod autem Hippocratis tempore non, vel rarissime laborarunt Podagra, ex iisdem forsan fuit causis, quibus his temporibus rustici, alique viles homines raro Podagra corripiantur; victus enim parvus & multus labor, etiam si prædispositio podagræ sit in corpore, ejus ulteriorem generationem intercipit; dum vita lauta & otiosa, luxuria, intemperantia, ut & studia severiora Podagræ parentes sint. Observavit itaque Galenus suo etiam tempore, Eunuchos Podagra corripiri. Quare non possumus argumentari, podagricam materiem ex semine formari, cujus generandi potentia Eunuchis omnino est intercepta. Si ex analogia esset ratiocinandum, feminis materia non potest accusari, quum feminæ etiam inveniantur Podagra laborantes, in quibus semen non generatur, nisi quis haberet ovula in ovario nata pro semine, qui liquor a semine virili multum distat. Num Eunuchi fiant Calvi, non videtur mihi tanti momenti, ut mereatur attentionem; multa quidem fiunt in Eunuchis, quæ aliter observantur in perfectis hominibus, sed quoniam nihil faciat ad cognitionem vel curationem morborum, tota hæc sententia omitti potuisset. Miratus sæpe vidi hanc sententiam nullius momenti omnium frequentissime ab Auctoribus fuisse allegatam, & copiosissime expositam, quam ego propter parvum in ea usum sicco pede transibo.

L I B. VI. A P H. XXIX.

294. **M**ulier non laborat podagra, nisi menses ipsi de-
fecerint.

I.

HÆc sententia, si continuata observatione esset probata, majoris esset usus, argueret enim sexus sequioris felicitatem, sed etiam temporibus his, tam mulieres quam viri podagra corripuntur. Multo autem frequentior est viris morbus, quam mulieribus. Videtur hæc sententia arguere quandam latentem podagræ causam, nempe semen præbere podagræ materiem, quod etiam veteres concesserunt feminis, hoc semen corruptum si statis temporibus cum menstruo sanguine eliminaretur, existimarunt, materiem podagricam generari non posse. Tota autem illa doctrina observationibus hujus temporis corrumpitur, quum etiam feminæ eodem morbo laborent. Quod autem post mensium suppressionem frequentius corripiantur, quam dum menses ordinate fluant, constans est observatio; forsan quia acre id podagricum aliquomodo simul expurgetur; vel quia retentis mensibus morbosa illa causa citius propullulet. Fateor, me non ita perspectam habere materiæ podagricæ cognitionem, ut inde argumentari possim, ex quonam humore sano formetur. Invenio quidem in corpore latitare posse sine ullo indicio, sed quando sævire incipit, regulariter primo aggredi ligamenta articuli pollicis pedis cum vehementi dolore, dein quoque invadere ligamenta aliorum articulorum tam pedum quam manuum, denique, si vetustior fiat, aggredi internas partes, ubi loco doloris summam anxietatem inducit; nunquam abire in suppurationem, sed interdum in calculosam concretionem, etiamsi pars simili fere tumore & rubore afficiatur, ac si locali inflammatione

matione fuisset tentata; unumquemque paroxysmum constare ex aliis minoribus, qui omni vesperi magis intendunt solent; tandem, postquam varios articulos occupavit, cessat totus paroxysmus, relinquens debilitatem articuli cum aliquo dolore, si articulus ille movetur; denique, nisi nimis valida fuit podagra, vel frequentius aggressa fuit eundem articulum, perfectam relinquit sanitatem, atque interdum ultra annum durat, priusquam novum paroxysmum format: sed si vetustior fuit, bis terve in anno redit, & in quibusdam non dimittit, nisi æstate media, destruens omnem articulorum usum. Has proprietates visibiles non invenio in ulla alia materia acri, quæ ejus specialem indolem exprimunt, sed ex his intimam materiæ naturam non valeo eruere & ita distinguere a Rheumatismo, Arthritide atque doloribus Catarrhosis, ut aliis hanc materiem depingere valeam. Invenio quidem quasdam visibiles proprietates hunc morbum a ceteris distinguentes, sed ex his elicere velle intimam hujus materiæ naturam, nimis arduum mihi videtur. Hoc autem elicere possum, non esse impossibile inveniri posse antidotum, sed istud a priori invenire non datur, forsan medicaster vel agyrta aliquis periclitando tale inveniet, ut detectum est antidotum febris intermittentis & luis venereæ. Hucusque nulla innotuit hujus materiæ subactio vel extinctio, nisi per vires vitæ moderate agentes: nam si calefacientibus has vires instigamus, Podagra eo magis sævit; si minuamus actionem per refrigerantia & stupefacientia, diutius protrahitur, & majus articulo damnum infert.

LIB. VI. APH. XXX.

295. **P**uer non laborat podagra, ante veneris usum.

I.

EX eodem principio hic etiam videtur deductus Aphorismus, feminis materiem præbere materiem podagricam, quoniam ante pubertatem non formatur materia feminalis in corpore, etiamsi omnia organa sint formata & adferantur omnes humores. Hæc observatio est satis firma, novi tamen Pueros ex podagricis natos, qui ante pubertatem podagra fuere correpti, quare constat, ut supra monuimus in Eunuchis & Mulieribus, liquorem seminalem non esse eum humorem, qui in materiem podagricam degenerat. Hoc magis patere potest, si perpendamus, abstinentes maxime obnoxios esse debere morbis ex semine corrupto provenientius, dum tamen nihil magis promoveat podagram, quam nimia feminis evacuatio. Ergo semen non præbet materiem podagricam, quum major ejus evacuatio provocet podagram, & illi, quibus non generatur semen, tamen a podagra corripiuntur. Textus innuere videtur, veneris usum inferre Podagram, quia puer ante veneris usum podagra non laborat. Si statuitur, ablationem feminis generare podagram, itaque tunc quammaxime Eunuchi & Pueri Podagra laborarent, in quibus major est hujus materiæ defectus. Si contendimus, debilitatem ex feminis profusione natam inferre podagram, certe hoc etiam non responderet experientiæ, quum homines robusti frequentius quam debiles Podagra tententur. Contenti itaque esse debemus pronunciando, nos latere naturam materiæ Podagræ, sed istius esse naturæ, ut vegetos, crapulis & lubricationibus deditos, severiora studia exercentes, divites seu

730 MEDICINA HIPPOCRATICA Aph. 295.
seu laute & otiose viventes, magis afficiat, nosque hoc
solummodo scire constanti observatione practica.

LIB. VI. APH. XXXI.

296. **O**culorum dolores meri potus, aut balneum, aut
fomentum, aut venæ sectio, aut purgatio sol-
vit.

I.

Oculorum
doloris cau-
sa.

Oculus multis ex partibus & humoribus compositus
tot varios præbet morbos, ut apud Ægyptios &
Romanos haberentur Medici oculares, qui solis mor-
bis oculorum medebantur; non solum enim Oculi bulbus
visus organum, verum etiam reliquæ partes auxiliatrices
Oculorum nomine veniunt, quod morborum numerum au-
get. Inde hoc loco non solum bulbi sed & palpebrarum
dolorem intelligere debemus. Quum multæ sint cau-
sæ his partibus dolorem inferentes, nemo mirari potest,
Hippocratem tam varia citasse medicamina, quæ observa-
vit lenimem doloris attulisse. Hæc autem omnia auxilia
simul adhiberi nequeunt, neque omnia sine discrimine attu-
lerunt levamen: quare prudens medicus debet ex præci-
pui his eligere unum vel alterum, quod causæ inventæ
magis respondet: non vero empiricorum more nullo habi-
to respectu causæ, hoc vel istud tentare: si autem
quædam auxilia fuere tentata, priusquam vocatur medicus,
ille poterit ex juvantibus & lædentibus sciscitare, qualisnam
fuerit Doloris causa. Non erit opus quærere Doloris sig-
na, ipse æger enim indicabit sibi dolere oculos, & pete-
re lenimen & curationem; sed magni momenti est inve-
nire istius Doloris causam, quæ suam specialem curatio-
nem exigit: nam etiamsi haberem cuncta medicamina,
quæ dolores oculorum leniunt & curant, illa nullius ef-
ficerent

sunt usus, quamdiu latet causa; tentando enim omnia facile periret visus. Si cunctas perpendimus causas, illæ possunt (1) referri ad causas externas lædentes, sed illæ hoc in loco non sunt perpendendæ, quum tali in casu simul indicari soleat illa manifesta causa lædens. (2) Internæ quia latent suis conjunctis signis sunt distinguendæ. Hæ sunt, vel Tensio vehemens fibrarum nervosarum, vel Compressio, vel Rosio ab aliqua acrimonia. Dolor enim est vehementissima species sensus, qui his modis formatur. Quia vero Auctor varia auxilia profert, inquirendæ sunt ex dictis generibus causæ speciales cum suis signis, quæ hoc vel illo auxilio tolli possunt & debent.

II. Vinum potum suo stimulo spirituofo majorem facere circulationem cum corporis incalescentia, omnibus notum est: talis ergo meri potio valet talem subigere & excutere doloris causam, quæ ex minori circulatione fuit nata, hæc enim materia a majore circulatione agitata & subigitur & expellitur. Hanc autem causam in Oculorum doloribus suis signis detegere, non est facile. Hoc vero constat, acrimoniam ex minori motu natam sensim generari, quia spontaneæ mutationes lente augentur. Acre tale natum infert quidem rosionem, sed vel nullam, vel exiguum incalescentiam inducit, quum proxime accedat ad acrimoniam nitrosam: plerumque simul adjunctam habet viscositatem, quæ ex minori motu generatur. Si ergo aliquis diu laboravit oculis dolentibus sine multa rubedine, quorum oculorum palpebræ levis fordescent, simulque effluunt humores acres frigidi catarrhosi, his imperanda est meri potio, quæ aucta circulatione solvit viscosum & emendat acre spontaneum catarrhosum frigidum: conducere quoque hoc in casu palpebras abluere spiritu vini. Si his adhibentur emollientia, laxantia, anodyna fomenta, fieret quidem doloris levamen, quia his diluitur id acre & ita temperatur, & fibræ motrices fiunt minus agentes ad impingendum id acre; sed augetur his deinceps dolor, quia humoribus concessa diuturniori stagnatione, simul conceditur major acrimonia.

Qualis oculorum dolor curatur meri potio?

Qualis per
balneum?

III. Per Balneum, quo corpus totum incalescit & abluatur, suisque forditatibus purgatur, promoveri insensibilem perspirationem, humoresque tenues magis determinari ad cutim, observavimus in Aphorismis de *Insensibili perspiratione*. Si ergo Oculorum dolores oriantur ab humore acri, qui solitus erat per Insensibilem perspirationem exhalare, sed cohibitus continuo deponitur ad oculos, istis infert dolores: hujusmodi dolores tolluntur reducta materia ad naturale suum organum excretorium, ut per istud educatur. Quia vero his in regionibus nullus est Balneorum usus, in eorum locum substitui possunt Sudorifera & Diaphoretica, vel in pertinaciori malo sudare potest corpus accenso alcohole stragulis tectum. Requiritur in hoc casu, ut non sit vitium locale ex deficiente actione ipsius organi, vel ex stagnante & corrupto humore in partibus oculorum, sed ut sit humor acris per totum corpus dispersus, & dein ad oculos depositus, & natus ex prohibita perspiratione. Si ergo antecesserint causæ prohibentes insensibilem perspirationem, quas in proprio illo libro recensui, & signa adsint humoris acris oberrantis per totum corpus, vel per Balneum, vel ea, quæ promovent perspirationem ille oculorum dolor est curandus.

Qualis per
fomentum?

IV. A Balneo differt fomentum, quod solummodo actuali calore admoveatur parti affectæ, dum Balneum applicetur toti corpori vel parti remotæ. Talia fomenta ex variis medicamentis componi possunt, quæ sunt eligenda secundum causam acrimoniæ lædentis, quod in hoc loco nimis copiosum esset. Quod si inveniamus, oculorum partes admodum tumere, rubere, & dolere, ex quibus conjicimus, sanguinem ferri majore impetu, ad oculos, & ita distentas fibras inferre dolorem calidum pulsantem, admodum conducit per fomenta humida laxantia, & actu calida oculos fovere, ut relaxentur fibræ tensæ, & minuatur impetus.

Qualis per
venæ sectionem?

V. Si autem oculi rubent, tument, dolent, quia sanguis majore impetu feratur ad caput (vid. *Comp. T.* 32, VII. & 46, XIII.) præprimis in juvenibus, plethoricis, opipare
viven-

viventibus, quibus solita sanguinis evacuatio fuit suppressa, præsens est auxilium mittere sanguinem, ut ita minuatur totius quantitas, & temperetur impetus. Hoc in principio solum valet absolvere curationem, sed si diu duraverit, & partes per continuatum impetum fuerint destructæ, talia sunt adhibenda topica, quæ post specialem mutationem inductam usus docuit præstantissima esse.

VI. Hoc loco intelligi alvi ductionem per medicamentum ore datum, nullus dubitat, quomodo autem eo possimus curare Oculi dolorem, non omnes consentiunt. Supra (*Aph.* 282) autem notavimus cum Auctore nostro, alvi profluvium prodesse Ophthalmia laborantibus, quia ab oculis ad alvum conveniens fit derivatio. Hoc etiam in his Oculorum doloribus est tenendum fieri per artificiosam alvi evacuationem. Sed præprimis talia alvum ducentia conveniunt, si simul signa cacochymix habeantur in corpore. Ex purgantibus tunc eligimus refrigerantia, si oculi dolentes simul calent.

Qualis per
purgatio-
nem?

Plura hic potuissent utilia adduci auxilia ad curandos oculorum dolores. ut setacea, fonticuli, vesicatoria, anodyna, emollientia, sed quia Auctoris scopus erat præcipua recensere, quæ observavit sustulisse oculorum dolores, horum expositione quoque contenti esse possumus.

LIB. VI. A P H. xxxii.

297. **B** *Albi longo alvi profluvio maxime corripuntur.*

I.

QUamvis τραυλοῖ proprie notat tales, qui literam T, vel R pronunciare nequeunt, videtur tamen Auctor intellexisse omnes, qui in quavis litera vel syllaba deficiunt, vel in media dictione, uti Balbi, Blæsi, & lingua hæsi.

hæsitantes. De his observavit, istos maxime corripì alvi profluvio longo. Non dubito, quin hoc fuerit ab Hippocrate observatum. Ego quoque multos novi Balbutientes & Blæfos, & inter istos duos fratres, qui vix unam Syllabam articulatam proferre potuere, quibus tamen alvus satis fuit adstricta. Sed tales Balbutientes, qui continuo os plenum habent saliva, ut præ oris humiditate vix articulate loqui potuerint, his erat alvus laxior. Hujusmodi in hominibus non est mirum alvum laxiorem esse propter majorem humorum confluxum; sed qui ex solo defectu linguæ sunt Trauli, Balbutientes vel Blæsi, nulla est ratio, quamobrem alvum haberent laxiorem. Hoc enim linguæ vitium est vitium in musculis motus animalis, quæ actio nihil commune habet cum motu peristaltico intestinorum. Quare hanc observationem inter rariora & incerta locarem, & quæ vix quidquam utile scientiæ medicæ præbent.

LIB. VI. A P H. XXXIII.

298. **A**cidum ructantes non admodum pleuritici sunt.

I.

Acidum ructum, oriri ex liquore vel massa acida in ventriculo hærente, quæ emittit aërem acido imprægnatum, superius delibavimus (*Aph.* 266, ii.) Quibus constitit, talem Ructum formari ex alimentis aculentibus assumtis sponte in acidum abeuntibus: ergo semper arguit debiliorem ventriculi actionem & minorem saponacitatem alcalinam in bile, succo stomachico & pancreatico, quibus aliis affluentibus humoribus cohibetur spontanea assumptorum degeneratio in Acidum. Pleuritis (*Aph.* 109, iv.) autem morborum acutorum species est, quæ

quæ dicitur vera, si ex Inflammatione nascatur (Aph. 109, iv.) Hæc semper majorem vitalem motum arguit, quo omne acidum fermentatione natum exstinguitur, quamvis multi acidum Pleuritidis causam esse statuunt, quod ita impugnat omnibus experimentis, quam quodvis alienissimum. Quibus igitur debilis est organorum chylopoiëticorum motus, raro accidit, ut in reliquis organis ex motu majore generetur morbus. Inter debilitatis hujus signa certissima est Acidus ructus, & Pleuritis ex motu majore nascitur, inde mirum erit, si tales homines Ructu acido laborantes Pleuritide corripiantur. Non tamen hæc observatio ita absolute vera est, ut omnino fieri non posset, quia motus peristalticus & motus vitalis sint duo motus distincti, quorum unus debilis esse posset, dum alter sit nimis valens: atque non omnis dolor lateris ab inflammatione nascitur, humores enim acres in pleuram depositi etiam interdum inferunt Pleuritidem notham, sed multo minus frequens est ille pleuræ dolor, quam qui fit ex Inflammatione.

LIB. VI. A P H. xxxiv.

299. **Q**ui calvi sunt, his varices magni non sunt. Quibus vero dum calvi sunt superveniunt varices, hi capillati sunt.

I.

Tumentia interstitia venarum Varices vocari, ex Chirurgia repurgata nostra 694 colligi potest, ubi causas & curationes simul exposuimus: nondum tamen notavimus hanc mirabilem Hippocratis observationem, qua adstruere vult, Calvis non generari magnos varices, quum in Calvis semper majores detexi, quam in junioribus: senibus enim sive calvi sint, sive solitum colorem capillorum servant, maxime tumentes fiunt Varices, horum enim corpora laxiora facilius magis tumentes venas produ-

An Calvis
non fiunt
varices ma-
gni?

cunt.

cunt. Si vero φαλακροί notat Capillorum defluvium, hoc itaque si fiat ex senectute, non impediret intumescentiam Varicum. Sed si humor morbosus generet Capillorum defluvium, quando ille morbus ex auctoritate Galeni vocandus esset Madarosis, forsitan potuisset impedire Varicum magnitudinem, sed quia in tota mea praxi talem observationem colligere non potui, hanc sententiam Auctoris Auctoritati relinquo. Neque facile credere possum, tale quid frequenter contingere, quia Varices præcipue nascantur ex laxitate venarum, vel impedito reditu sanguinis per istius venæ truncum, quæ causæ non intercipiuntur depositione materiæ versus caput, qua intercipitur capillorum nutrimentum & incrementum.

An Calvi
fiunt capil-
lati a su-
pervenienti-
bus varici-
bus?

II. Hippocratem hic intellexisse capillorum defluvium, patet ex hac altera parte Aphorismi, nam si coloris mutationem intelligere voluisset, dixisset Capillos ad naturalem colorem redituros a varicibus supervenientibus. Videtur in hoc Textu adstruere velle quandam naturalem metastasin humoris, qui delatus ad radices capillorum, istas corroderet, sed ad tunicas venarum, istas tumere faceret, qualem ego nunquam in praxi observare potui; an vero Auctor in sua regione hoc observaverit, negare non possum.

LIB. VI. A P H. xxxv.

300. **H**ædropicis tussis superveniens, malum.

I.

BRevis sed utilis & magni momenti Aphorismus, ex quo colligi potest, quid mali sit expectandum, si morbus morbo superveniat; hoc in loco solummodo dicit malum, sed infra pronuntiabit, lethale esse. Si duos hos mor-

morbos inter se comparemus, facile liquebit, quid sentiendum erit de Tussi superveniente hydropicis. Hydrops enim est morbus ex humorum abundantia, qua vasa lymphatica & cellulæ pinguedinosæ turgent, & simul enervantur & macerantur. Hujus laticis naturalis indoles est blanda, benigna, sola sua abundantia peccans, nullo modo irritans. Tussis autem arguit humorem acrem irritantem laryngem; scimus ergo ex Tussi superveniente, humorem Hydropis jam aliquam suscepisse acrimoniam, quâ vix pejus in Hydrope expectari potest: adest enim humoris abundantia in corpore debilitato, qui nunc suscepit acrimoniam; hæc autem acrimonia ex spontanea corruptione nata, a debili hac actione emendari non potuit, unde hujus acrimonie majorem progressum expectamus. Tussis insuper validissime concutit corpus ita liquore oppletum, cujus vasa macerata vix ferunt aliquem impetum, periculum igitur est, ne conquassatione hac aliquod vas rumpatur, & ita latex hucusque vasculis coercitus, in corporis cava effundatur, & ita augeat morbi periculum. Neque pulmo est organum excretorium, quo eliminari potest illa aqua hydropica: nam tussunt sine memorabili excreatione, atque eunt ægri frustranea conamina, quibus magis debilitantur. Denique signum est, Pulmones ab eo latice obrui, unde intercipitur istius organi actio, quod præparare debebat humores, & libera in respiratione agitari, nunc vero multitudine laticis acrioris obsessi Pulmones, defectu præparationis majorem generant laticis copiam, & tandem totius pulmonis oppressio & corrosio est expectanda. Propterea meretur Tussim superveniëntem maxime damnare, præprimis quum præcipuam curandi indicationem intercipiat: Tussis enim laxantia & mucilaginosæ exigeret ad leniendum, quæ Hydropicis sunt vetita.

LIB. VI. APH. XXXVI.

301. **U**rinæ difficultatem venæ sectio solvit: secunda
vero internæ.

I.

Stranguria, Dysuria, & Ischuria in causis tam parum differunt, ut non mereantur distinctis titulis describi; nam quæ causa Urinæ difficultatem inferre potest, si major fiat, integram suppressionem producere potest; si autem simul guttatim exit urina, Stranguria vocatur. Propterea in his speciebus omnibus videndam erit, num Vena sit secanda. Quoniam hi tres morbi, quod sæpe diximus, oriuntur ex variis causis, quia nomen obtinuerunt ex phænomeno, Venæ sectio prodesse & nocere potest. Quia vero Hipp: observavit Dysuriam curatam fuisse sanguinis missione, hanc observationem inter generales Aphorismos practicos locare voluit, eo fine, ut posterius quoque potuissent tentare hoc auxilii genus, non vero quod existimaverit, venam secandam esse in omni Dysuria. Tali enim modo fere omnes sunt ejus descripti Aphorismi. Sed quoniam non adjecit signa, quibus hanc speciem distinguit a ceteris, æque potest junior Medicus peccare venæ sectione quam prodesse. Multi dubitant, num hic sit genuinus Hippocratis Aphorismus, quia putant, Venæ sectionem nunquam conducere posse, quia frequens dysuria fit senibus (Aph. 110, iv.) catarrhosis, calculosis, quibus non conducit venam secare. His auctoribus omnino est concedendum, Venæ sectionem non conducere; sed observavit etiam noster Auctor ex Intestino recto vel Utero inflammato (Aph. 251.) Stranguriam seu Dysuriam generari, in istis utique casibus quammaxime conducere mittere sanguinem: atque post eum etiam Riverius, Sydenham & nos observavimus frustra.

ſtra tentatis omnibus auxiliis, urinæ ſuppreſſionem & Difficultatem curatam fuiſſe ſanguinis miſſione. Ut nunc ſciat junior Medicus, quali in ſpecie Dyſuriæ mittendus ſit ſanguis, debet ſigna inflammationis applicare ad vaginam, inteſtinum rectum, vel & urethram, ea ſigna ſatis deſignent, ſanguinem eſſe mittendum. Quod autem ſuadeat, internas venas eſſe ſecandas, hoc facile condonari poteſt, quia tunc temporis ex ignorata circulatione, magis quam par erat fecerunt ſelectionem venarum, quæ aperiendæ erant. Si autem dixiſſet, venæ inferiores ſcilicet in pedibus ſunt aperiendæ, non ita recederet a communi obſervatione, neque impugnaret circulationi inventæ, ex cujus doctrina patet, venas proximas eſſe aperiendas, quales ſunt venæ in pedibus ab iliacis provenientes.

L I B. VI. A P H. xxxvii.

302. *A* B angina detento tumorem fieri in collo, bonum: foras enim morbus vertitur.

I.

Generalem regulam tranſlationis (*Aph.* 290) hoc in loco ſpeciali obſervatione conatur firmare: ſed in Metaſtaſis
obſervatio
generalis Tranſlatione ſeu Metaſtaſi ſemper debemus obſervare, ut ſit perfectæ, id eſt, ut omnis materia ex uno loco feratur ita in locum alterum, ut prior pars multum levetur vel integre liberetur. Atque ut bona ſit, materia illa morboſa ferenda eſt a loco, qui utilior eſt vitæ, & qui difficile ejicere poteſt materiem, ad alium locum minus utilem, quique commodius materiem morboſam evacuare poteſt. In obſervatione hac omnino cavendum, ne ſymptoma vel alius morbus ſupervenienti non fiat ex Conſenſu (*Aph.* 258, i.) ſed ex vera Tranſlatione materiæ de loco in locum.

In angina
tumorem
feri in col-
lo, bonum.

II. Quod Angina indicet talem colli morbum, quo difficilior reddatur vel omnino impediatur Deglutitio vel Respiratio, vel utraque simul, superius (Aph. 95, VII.) notavimus. In textu habetur *κονάγχη*, seu species Anginæ, quæ tunc dicitur præiens, si causa illa hæreat in interioribus laryngis, sine signis externis, difficilem & suffocatam respirationem inducens, ac si millo constringeretur collum, & interciperetur respiratio. Periculosissimus est morbus, nam si augeatur tumor in membrana interna laryngis, suffocatur homo: si abeat in suppurationem, generatur pulmó purulentus. In hoc morbo observavit, si externe in Collo tumor oboritur, bonum esse. Hæc autem observatio non est constans: potest enim tumor membranæ internæ Laryngis, latius dispergi etiam ad exteriores partes, sine diminutione partis interioris. Quando designatur morbi augmentum. Sed si interiores partes deponunt ad exteriora colli morbi materiem, valde bonum est, quum partes exteriores tumentes non inferant mortis periculum, fatis enim magnum conceditur spatium tumori. Constat ergo, duo adesse debere requisita, ut talis apparens in Collo tumor sit bonus. Primo ut sit talis morbi materia, quæ metastasin facere potest, uti materia Catarrhosa, & Erysipelatosa, nam Inflammatio & Oedema harum partium non tam facile locum mutant, sed potius, si partes exteriores simul tumere incipiunt, designant morbi augmentum. Alterum est, ut sit perfecta Metastasis, quam conjicimus, si una cum intumescencia externa liberior fieri incipiat Respiratio: nam nisi Respiratio simul fiat liberior, signum est, imperfectam fieri Translationem, quæ semper mala est. Neque bonum erit signum, si novus accedat tumor, manente priore.

LIB. VI. APH. XXXVIII.

303. **Q**uibus occulti cancri fiunt, eos non curare melius est. Curati enim cito pereunt. Non curati vero longius tempus perdurant.

I.

ANtequam pronunciare possumus, num Cancer occultus sit curandus vel relinquendus, constare debet, quid proprie per Cancrum occultum sit intelligendum. Quid sit Cancer occultus. Generalem Cancri Definitionem exhibuimus in Chirurgia repurgata 1484. Quibus constat, speciem esse tumoris, qui fere semper aliquam glandulam occupat, nunquam vero ille tumor abit in veram suppurationem seu purulentiam, sed in humorem ichorosum admodum corrosivum: neque totus humor Cancri ita commutatur, sed relinquit semper partem aliquam tenacem acerrimam, quæ a reliquis partibus firmis separari nequit, atque novum humorem affluentem brevi tempore in similem corruptelam invertit, ut nunquam hujus materiæ finis habeatur, vel ita redditur liquidus, ut omnis exprimi possit. Mira est hujus materiæ corruptæ natura, nam neque est acida, neque alcalina, quum nullo cognito antidoto extinguere possit: an vero unquam invenietur antidotum, vix sperare possumus. Videtur tamen originem habere ex pinguedine nostri corporis, quæ in cellulosis spatiis glandularum hærens, sensim in toxicum hoc acre convertitur. Statim autem in principio non ita sævit, sed compacta hæret materia in glandulæ substantia, quam inæqualiter distendit, ut sit talis glandula aspera, dura, inæqualis, aliquomodo dolens, qui dolor augetur ab omni attactu & pressione. Sed si accedat humiditas, vel admittatur aër nudus, illa materia concreta liquefcere incipit, simulque fit acerrima, unde doloris augmentum, & corrosio

so partium circumjacentium: & quia omnis materia non liquefit, fcaturigo perpetua hujusmodi ichoris in hoc loco manet. Et quod peffimum eft in hoc ichore, fi mifceatur fanguini vel pinguedini bono adjacenti, brevi tempore iftos humores in fimilem corruptelam convertit, fanguinemque nigro colore inficit: Venas igitur & Arterias partium circumjacentium illo inquinato fanguine nigro impletas pro pedibus Cancris veteres habuere. Talis nunc tumor ita in corpore latens, ut figna nulla externe appareant, Occultus eft Cancer: fed fi Cutis perrofa eft, vel externe in cute illa vafa nigra confpiciuntur, Cancer eft apertus vel manifeflus.

An Cancer
occultus
non curan-
dus?

II. Præcipit Auctor, Cancrum occultum non effe curandum, quia curatus citius interit, quam non curatus. Nifi hoc in loco certa fpecies curationis intelligatur, omnino falfa effet monitio. Nam non folum licitum eft per Diætam intercipere Cancris progreflum, qualis Diæta curationis nomine venit apud medicos, fed & valde neceffaria eft. Curatio autem Chirurgica per ablationem tanti eft interdum momenti, ut fi negligatur in Cancro occulto, poftea in Cancro aperto prohibeatur. Nam quoties Cancer alicubi lateat in Mammis, labiis vel & aliis partibus corporis, ubi integre tolli poteft fectione, communi obfervatione chirurgica totus Cancer occultus eft auferendus, & ita perfecte curantur homines, ut teftantur hodiernæ obfervationes chirurgicæ: fed tunc cavendum eft, ne aliqua portio relinquatur. Eadem autem in Cancro aperto raro bene fuccedit, quia tunc utplurimum totus Cancer auferri non poteft: itidem fi plures Cancris fint in eodem corpore, quum uno fublato, reliqui magis fævire foleant. Atque vetatur ablatio, fi Cancro adhæreat arteria, vena, nervus, vel alia pars nobilis, quæ fectionem non permittit. Nam vel totus Cancer tunc tolli nequit, quod malum eft, vel talis pars abfciffa mortem infert. Tandem tertia fpecies fequitur curationis per medicamenta applicata. In hac fpecie quædam medicamenta permittuntur in Cancro occulto, alia vero prohibentur: uti ficcantia, indurantia, quæ Cancris

Cancro progressum inhibent, faciunt, ut Cancer, qui sibi relictus brevi tempore sæviisset, per longum tempus gestari possit sine multo incommodo, quum ablatione humidi corruptio Cancro inhibeat. Sed si applicentur Corrodentia, quæ ex Cancro clauso faciunt apertum; vel Humeſtantia, quæ Cancro materiem liqueſcunt; vel Pingua, quæ suppetant corruptibilem materiem, hæc omnia facient, ut ille Cancer, qui sibi relictus tolerari potuisset, brevi tempore ita furat, ut domari non possit. Hoc sibi proprium habet materia Cancroſa, quod nullis medicamentis emendari possit, nunquam abeat in bonum pus, & nunquam integre evacuetur. Unde Cancer occultus, nisi totus auferri possit secando, est relinquendus, & exſiccandus, non tangendus acris, neque emolliendus humeſtantibus. Si quis talia facit, is inficiet totam massam circulatoriam, faciet ex acris quiescente, acre agens, & ita homo, post multas miseras toleratas, peribit. Tali ergo in sensu curati cito pereunt, & non curati longius tempus perdurant.

L I B. VI. A P H. xxxix.

304. **C**onvulsio fit aut a repletione, aut evacuatione.
Sic quidem etiam singultus.

I.

Duo proponuntur in hoc Aphorismo morbi, qui utriusque oriri possunt ex Repletionem vel Evacuationem: quare isti, quamvis facie externa multum differant, ratione causarum admodum similes esse debent. Ex Convulsionis descriptione (*Aph.* 51, iii. & *Aph.* 194, ii.) satis patet, hoc phænomenon generari ex inordinato influxu spirituum per nervos in aliquem musculum, qui propterea contrahitur. Hoc etiam fieri debet in singultu,
ut

Convulsionis & singultus convenientia,

ut habeatur inter hos morbos quædam similitudo. In Convulsionibus videmus quendam motum in membris, sed in singultu audimus aliquem sonitum aëris per laryngem intrantis, qui introitus in ipso veluti principio intercipitur; dum simul sentiunt ægri, Diaphragma subito & involuntarie contrahi, quasi vi faceret inspirationem, sed tum simul clauditur larynx aëris ingressum intercipiens. Igitur Convulsio & singultus est involuntaria violens nonnallorum musculorum contractio, unde Singultus est quædam species Convulsionis, & quæ fit duntaxat in quadam speciali parte, dum Convulsio varias partes afficere potest, & multas simul.

An Convulsio & singultus a sola repletionis & evacuationis?

II. A Galeno & aliis passim hæc citata invenitur sententia, ut adstruatur, Convulsionem & Singultum ex sola Repletionis vel Evacuationis oriri: & ut hanc tueantur sententiam, multa inania & præpostera afferunt. Solius Galeni ratiocinium delibabimus. Ille eximius vir adducit humiditatem & siccitatem, quibus utrisque experimentis in chordis conatur adstruere hujus sententiæ veritatem. Siccitatem loco Evacuationis adducit, quia chorda exsiccata accurtatur, ut patet, si igni admoveatur. Verum hoc experimentum non probat accurtationem per siccitatem, sed per adurentem ignis calorem, quum partes animalium fibrosæ solo ardenti calore sine humidi amissione corrugentur, ut patet, si caro in aqua coquatur, sine humidi enim defectu contrahuntur fibræ. Neque in corpore vivente tanta inducitur fibræ siccitas, ut inde fieri posset Convulsio vel Singultus, neque inducitur Convulsio defectu humidi sensim acquisito, quum experimur marasmo consumptos raro convelli: sed si subito evacuatione sanguinis (*Aph.* 169.) vel & alia quavis evacuatione largiore destruitur æquilibrium, tunc frequentissime Convulsio vel Singultus generatur. Neque accurtatio per exsiccationem chordarum comparari potest Convulsioni, quum accurtatio illa procedat in rebus mortuis, sed Convulsio est actio dependens a vita, quæ in rebus mortuis imitari nequit. Multo minus appropriatum est experimentum ex chordarum humectatione desumptum

tum. Frangitur quidem chorda humectata tensa facilius, quam modice sicca, sed non accurtatur. Chorda enim in organis musicis ad certum tonum tensa si humectetur, tonum formabit profundiorum, & in machinis physicis experimur, chordas humectatione prolongari, non vero accurtari. Quamvis contraria fierent in hoc experimento, nondum tamen hæc probarent, Exsiccationem vel Humectationem generare in nobis Convulsionem aut Singultum, quoniam sunt morbi ab influxu spirituum vitalium pendentes, quæ actiones comprobari nequeunt experimentis rerum mortuarum. Interim tamen vera manet observatio, nimia evacuatione & repletionem generari Convulsionem & Singultum: inde autem argumentari velle, omnem Convulsionem & Singultum a duabus his duntaxat causis oriri, nimis absurdum mihi videtur, quum in Compendio nostro (Tr. 27. & 30.) multo plures & frequentiores causas assignaverim, quæ nullo modo ad repletionem vel inanitionem referri queunt. Propterea Inanitio & Repletio hoc loco sunt accipienda inter causas Convulsionem & Singultum inferentes, ut passim in aliis Aphorismis, sed nondum ut tales, quæ solæ hos morbos inferre potuissent.

LIB. VI. AP H. XL.

305. **Q**uibus ad hypochondrium dolores fiunt absque inflammatione, his febris superveniens solvit dolorem.

I.

Medici magis quam Literatores in vero loco indicando per voces sunt occupati, quum accurate scire debeant, qualis pars intelligatur, ut unam partem non habeant pro altera. Hypochondrium proprie denotat locum sub cartilagine, & si in singulari ponitur, ut pluri-

Quæ partes
dicuntur
Hypochon-
dria.


num significat in ventre inferiore partem superiorem lateralem & magis anteriorem, quam posteriorem sub cartilaginibus costarum in dextro latere, ubi naturalis est hepatis situs: sed Hypochondria notant tam dextrum quam sinistrum latus. Interdum vero apud Hippocratem tam sinistrum quam dextrum latus intelligitur, uti in hoc loco, ubi mihi videtur, non solum intelligi dextrum, verum etiam sinistrum latus, eo autem sensu, ut assignetur Dolor in sinistro vel dextro latere, non vero in utrisque simul, quod aliter fieri potuisset, si dixisset Hypochondria. Quibusdam Hypochondria & Præcordia significant easdem partes, sed Præcordia proprie notant partem mediam anteriorem inter Hypochondria sub cartilagine ensiformi, ubi præcipue sentiuntur dolores ventriculi, quamobrem hæc loca accurate sunt distinguenda. Quamvis situs externus Hypochondriorum proprie pertineat ad Pectus, quia habetur sub cartilaginibus costarum, referuntur tamen hæc loca ad ventrem inferiorem, quum diaphragma ita sit elevatum, ut contenta viscera in Hypochondriis pertineant ad ventrem inferiorem. In Hypochondrio dextro hæret Hepar, quod etiam ad sinistrum hypochondrium pertingit: in sinistro autem Hypochondrio hæret Lien. Sed utrumque Hypochondrium occupat Intestinum Colon, adeo ut ex naturali situ harum partium facile judicare possimus, quodnam viscus fuerit affectum: & inde quoque cognoscimus, multos dolores pectoris ab affectis his visceribus fieri posse, qui dolores perperam referuntur ad Pleuritidem. Detexi enim in quibusdam cadaveribus, Diaphragma ita fuisse convexum, ut ventris inferioris cavitas altius interne protenderetur, quam est papillæ locus externe in mammis.

Qui dolores
Hypochondriorum sine inflammatione, solvantur febre?


II. Illa Hypochondria sæpe corripuntur Doloribus, sed ut sciamus, num Febris in hujusmodi doloribus malum sit allatura, & num curanda sit, an vero bonum, & permitenda, duas cautelas adjicit Auctor, nempe ut sit sine Inflammatione, & ut Febris superveniat, id est ut Dolor & Febris non incipiant eodem tempore, sed primo Dolor & deinceps Febris. Generalis est observatio Dolorum, omnes dolo-

dolores ab Inflammatione, Erysipelate, & Bile acri natos cum febre incipere; in his, quo febris est vehementior, eo majus est periculum, quum febris illa sit signum eorum morborum, qui eo sunt majores, quo signa sunt vehementiora, ergo ex perduratione hujus febris nihil boni expectare possumus. Sed si febris superveniat, certi sumus, Dolores Hypochondriorum non esse natos ex recensitis morbis, sed ex aliqua causa morborum chronicorum, quæ frequentissima est materia cruda in aliquam corruptionem conversa. Si ergo materia cruda in nobis nata per febrem potest subigi, clare constabit hujus Aphorismi veritas. Talem exposuimus observationem in Convulsionibus. (Aph. 51, v. Aph. 167. i.) In febre Cacochymica. (Aph. 197, i.) Omnis enim materia Cruda, deficiente corporis actione nata, subigitur motu vitali majore, qualis fit in febre superveniente. Unde monemur, nos non debere per refrigerantia vel sanguinis missionem, vel per quædam antidota hanc febrem extinguere, sed eam permittere, aut medicamentis calefacientibus excitare febrem artificialem. Hoc tamen in praxi contrarium a multis fieri observo, qui omni ope conantur hanc febrem refrigerantibus extinguere cum summo ægri detrimento, sed præsentī infideli levamine.

LIB. VI. A P H. XLI.

306.  Uibus suppuratum quid in corpore existens nullum sui signum prodit, his propter crassitudinem puris, aut loci, signum non exhibet.

I.

 Uid sit Pus (Aph. 215, ii) ex qua materia formatur (Aph. 72, iii.) & per quamnam actionem vitæ producitur, (Aph. 72, ii.) superius demonstravi-

Loci vel puris crassitudo suppurationem internam oculi mus. cultat.

mus. Si istud pus sit factum & in quadam parte collectum, necesse est ut exeat: nam si ultra tempus contineatur, exuet suam blandam & mitem indolem in corrodentem acrimoniam. Si ergo lateat profunde, ut vis vitæ non valeat istud per naturalia emunctoria eliminare, vel per morbosam aliquam aperturam factam, necesse est, ut Medicus vel Chirurgus viam pandat. Hæc autem via artificialis fieri non debet, nisi sciamus, num pus eo in loco contineatur. Quod si locus pauca carne & tenuibus integumentis sit tectus, & Pus satis sit fluxile, facile detegi potest tactu, nam alterna pressio concitabit fluctuationem, & intumescentiâ sine multa rubedine tali in loco detegetur, Pus in tali loco contineri. Sed si locus multa carne sit tectus, aut si hæreat in quadam corporis cavitate, tactu non valemus fluctuationem concitare: neque fluctuat, si Pus ipsum nimis spissum est. Si utraque illa simul adsint, peritissimus Chirurgus tactu invenire non poterit, num Pus subtus hæreat. Interim si maneat eo in loco pus, omnes partes adjacentes sensim in putrilaginem convertet, atque denique liquatum Pus venis absorptum, totam massam circulatoriam inficiet: quare admodum conducit ex probabili conjectura rimari, Pus intus latere, & dein ex adjunctis Phænomenis determinare partem, ut possimus ad Purulentiam totam internam curationem dirigere, & Pus latens per factam aperturam elicere. Ut in his obscurissimis coniciamus, Pus intus latitare, varii modi sunt adhibendi. Pus enim colligitur in quadam parte speciali post Inflammationem, quæ abiit in purulentiam, quæ simul non fecit exitum puris per sputum vel urinam. Si ergo constat, antecessisse febrem ardentem inflammatoriam, (*Aph.* 161, II) quæ reddit urinam tenuem & coloratam longo tempore, & dein commutatur in febrem remittentem (*Conf. Comp. Tr.* 47. xvii.) facile erit judicare, materiem phlogisticam abiisse in purulentiam. Corpus autem nostrum ita invenitur creatum, ut valeat Pus sanguini circulanti mistum segregare, istudque eliminare separatum vel per urinam vel sputum, aut alicubi deponere, ut formetur Abscessus ex collecto

lecto tali modo pure, qualis depositio puris a medicis sæpe vocatur metastasis, sed potius Collectio vocanda. Si ergo tali in morbo purulento non invenimus Puris aliquam evacuationem, sed quadam in parte generari dolorem, gravitatem, anxietatem vel tumorem, judicamus, ad partem eam Pus colligi. Simili etiam modo ratiocinamur in Abscessu locali, qui pro magnitudine sua non fundit pus, & evanescere videtur sine critica, id est purulenta evacuatione, dum simul in quavis alia parte dolores, molestias, anxietates & similia symptomata infert, judicandam est, Pus ex priori loco receptum & ad aliam partem translatum esse, quæ mutatio metastasis purulenta vocatur. Denique si alicubi est ulcus, fistula, sinus antea fundens Pus copiosum, nunc vero omnem evacuationem supprimens, judicandum tunc quoque, si in alio loco sentiantur dolores & reliqua signa puris latentis, Pus ad partem eam translatum fuisse. Certius est indicium, ex retento pure fieri metastasin, quam ex alia materia retenta, quum Pus istius sit naturæ, ut nunquam ita assimuletur, ut sub forma sudoris, vel urinæ pellucidæ evacuari possit: quare si pus est intus, semper visibili evacuatione vel puris vel ichoris exire debet: & quoties sub tali forma non exit, judicamus, Pus retineri & ad aliquam partem deponi debere. Quæ tunc pars dolorem, tumorem, molestiam, & gravitatem accipit sine rationali causa, tali in parte judicamus collectum esse pus.

LIB. V. APH. XLII.

307. **I**N ictericis hepar durum fieri, malum.

I.

EX quibus phænomenis cognoscimus Icterus, superius (*Aph.* 172, 1) exhibuimus, ubi dein (*Aph.* 174, 1) demonstravimus, Icterus ex febre cum hypochondrio dextro duro, non bonum esse, quia durities illa significabat, Hepar esse infarctum. Hoc nunc loco demonstrandum est, si in Ictericis Hepar durum fiat, malum esse. Ex textu patet, eum Icterus non esse natus ex Hepate duro, quia Hepatis durities hic notetur tanquam symptoma superveniens: neque ille Icterus nascitur ex Hepatide, quia tunc durities & Icterus eodem tempore generantur, & febris nulla mentio invenitur, quæ in omni hepatide adest. Ergo videndum, ex quibus causis nascitur Hepar durum, dum Icterus est præsens, ut ex assignata causa præsagium malum formare possimus. Icterus tunc semper nascitur, si Bilis naturalis exitus intercipiatur in duodenum, & regurgitare cogatur in venam cavam, ut ita totam massam sanguinis sua flavedine tingat. Igitur vesicæ felleæ est morbus, quæ interdum clauditur a calculo vel spasmodica constrictione, qui morbi non faciunt tumere vel indurescere hepar. Sed si nunc in dextro hypochondrio tumor durus sit, signum est, novum accedere morbum, qui per se satis malus est, & qui sua intumescencia valet exitum Bilis ita sistere, ut omnis exitus sit interclusus, qui reserari nequit manente Hepatis tumore duro. Quia vero omnis durities hepatis curatu est difficilis, igitur nullam fere spem curationis promittere possumus.

LIB. VI. A P H. XLIII.

308. **Q**ui lienosi a dysenteria corripuntur, his longa superveniente dysenteria, hydrops supervenit, aut lenteria, & pereunt.

I.

QUum Veteres ignorarunt Lienis usum, multa præposita Lieni in morbis adscripserunt, adeo ut vix constet, quinam morbus proprie Lienosus sit vocandus: communi autem consensu talis Lienosus est, qui in sinistro hypochondrio laborat tumore aliquo a Liene magis tumente & infarcto. Quum tali in infarctione Splenis cesset omnis ejus functio, & partes adjacentes a tumente Liene premantur, propterea multi fiunt morbi, qui partim pendent a destructo usu Lienis, partim a compressis partibus adjacentibus: unde tam varia citantur in Lienosis symptomata, quæ sæpe magis a compressis partibus vicinis dependent, quam ex abolito Lienis usu. Non melius possumus invenire Lienis usum, quam si examinemus ingredientem & exeuntem sanguinem. Invenimus sanguinem alatum per arteriam splenicam, eandem naturam concrescibilem habere, uti in reliquis arteriis; sed qui exit sanguis, ita invenitur solutus, ut stagnans non concreseat, ille omnis sanguis ita præparatus effunditur in venam portarum transiturus per hepar, ut dein in hepate conficiatur & separetur bilis. Igitur Lienis usus primarius est ita solvere sanguinem, ut in lentissimo motu per venam portarum, quasi stagnando non concreseat, & præbere materiem, ex qua hepar præparare & separare potest Bilem bonam. Si nunc Lien sit infarctus, obstructus & tumens, illa sanguinis solutio fieri perfecte non potest, & propterea manet sanguis venæ portarum magis coagulabilis, qui facile ipsum hepar etiam obstruere potest: neque satis prævia est facta mate-

Lienosi qui dicantur.

materiæ bilis præparatio, unde generatur bilis morbosa, plerumque nigrioris coloris. Hinc functiones a bona bile pendentes depravantur, ut patet ex malo elaborato chylo, & tandem tota massa hac livescente materia inquinata, incute aliquem livorem atque cachecticum colorem præbet. Unde Hypochondrii sinistri tumor, mala alimentorum ingestorum confectio, & color sublividus inter præcipua Lienosi symptomata sunt recensenda.

Cur Dysenteria longa in Lienosis mala?

II. Ex Dysenterici descriptione (Aph. 134, 1) satis constat, si veniat in Lienosis, eam generari ab humore acris ad intestina delato, qui intestina stimulando cogit in perpetuam dejectionem cum ventris torminibus. Sed ut sciamus, num omnis humor ille acris sit ablatus, cessare quoque debet Dysenteria, quæ ab affluxu hujus humoris pendebat. Verum persistit Dysenteria, ergo signum est, non cessare confluxum hujus humoris acris, quare in Liene est perpetua scaturigo cum humorem præbens, quod malum est. Hoc autem malum signum non habetur, si Lienosis Dysenteria superveniat, ut infra constabit. In le in Coacis prænotationibus, (H. a. 567.) *Dysenteria non longa splenicis commoda est, longa vero mala: desinente enim, si Hydrops aut Lienteria fiant, lethale.*

Lienosi dysenteria longa laborantes in hydropem vel lenteriam incidentes, pereunt.

III. Ut Lienis tumor curètur per Dysenteriam, evacuatio ea humoris acrioris debuillet inferre diminutionem tumoris, si vero contra augeatur Lienis tumor, sanationis nulla spes est, nam per talem evacuationem continuatam summopere debilitabitur corpus, omnesque humores boni ejicientur. Si tunc insuper accedat Hydrops vel Lienteria, signum est, increvisse Lienis tumorem, ut etiam reditus lymphæ in sanguinem intercipiatur, & chyli via sit intercepta, quod facile ex anatomicis demonstratur. Omnis enim lymphæ ex ventre inferiore ducitur in cisternam lumbarem, ut redeat per ductum thoracicum in sanguinem circulantem. Si vero Lienis tumor ita increvit, ut cisterna Lumbaris a Liene compressa non transmittat lympham redeuntem, necesse est, ut illa colligatur in ventre inferiore & pedibus, atque producat Hydropem, qui morbi augmen-

mentum declarat: hæc persistens causa comprimens, & simul aucta tantum facit denique compressionem, ut totum lymphæ circuitum intercipiat, & ita tandem mortem inferat. Simile quoque signum est Lienteria (Aph. 101, IX & Aph. 266, I.) nam si tumens Lien premit cisternam lumbarem, quæ transmittere debet chylum in ductum thoracicum, vasa lactea jam chylo turgescencia nihil amplius imbibunt, sed confectum chylum in cavo intestinorum relinquunt per alvum exonerandum: inde copiosa chyli dejectio sine ullo levamine, sed arguens chyli viam esse interceptam. Ex tali denique chyli interceptione necessario peribit homo. Quare illæ Veterum in morbis observationes comprobantur hodiernis anatomicorum inventis, sine quibus ex suo fonte hæc præfagia non potuere intelligi: propterea omnes Commentatores antequam detecta fuit hæc circulatio, ita laborarunt, ut invenirent rationes horum signorum.

LIB. VI. A P H. XLIV.

309. **Q**uibus ex Stranguria ileus supervenit, in septem diebus pereunt, nisi febre superveniente urina abunde fluxerit.

I.

Omnes Commentatores vehementer laborant in expositione hujus Aphorismi, ita quidem Galenus insurgit, ut non credat, hunc morbum unquam visum fuisse ab Hippocrate, sed ab alio quovis hunc Aphorismum intrusum fuisse, quoniam talia fieri non posse dicit, quæ hic Aphorismus complectitur. Hanc litem nostram non faciemus, videbimus duntaxat, quali modo eadem causa, quæ Stranguriam generat, etiam inferre possit Volvulum. Differentiam ponunt inter hunc Aphorismum & alterum, qui continetur in Coacis. (H. a. 568.) Ubi dicitur *In Stranguria.*

Quomodo
ex Strangu-
ria Volvu-
lus?

D d d d d

guria Sed puto eandem esse sententiam, quia In & Ex stranguria eadem est significatio, quum Ex stranguria in hoc loco non designetur, Stranguriam abiisse in Volvulum, quod satis patet, quoniam dum Volvulus nascitur, remaneat stranguria, sed si quis stranguria laborat & insuper corripiatur Volvulo, tunc peribit septem diebus. Utriusque morbi superius dedimus definitionem, & demonstravimus, Stranguriam generari posse ab acrimonia succi ureterum & aliarum viarum urinæ (*Aph.* 110, ix.) Itidem Volvulus (*Aph.* 101, xiv,) generari potest ab acrimonia succi intestinorum. Aut si hæreat in succo nervoso quædam acrimonia, illa si deponatur in urinæ vias, Stranguriam infert, & si feratur ad intestina, fiunt tormina & motus intestinorum inversus, qui morbus vocatur Volvulus, ut motus inversus ventriculi solius, dicitur vomitus. Inde non ita est absurdum, ut, si acrimonia succi nervorum feratur per nervos in vias urinæ, idem ille humor in eodem plexu nervi formatus etiam feratur per alium nervi ramum ad mesenterium & intestina, in quibus etiam & ventriculo naturalem motum peristalticum irritando invertat, quo omnia intestinorum contenta trudentur sursum versus ventriculum, qui dein eadem vomitu ejicit.

Cur septem
diebus pe-
reunt, qui-
bus ex
Stranguria
supervenit
Volvulus?

II. Satis itaque comprobavimus, eandem causam, quæ generat Stranguriam, etiam generare posse Volvulum, sed quoniam causa non est levis, quæ valet intestinis non solum inferre vehementes dolores, verum etiam motum inversum; igitur si Volvulus supervenit, scimus, magnam copiam humoris acrioris esse in corpore, qui nunc etiam ruit ad intestina, ubi evacuari non potest, & in viis urinæ, per quas erat evacuandus, parit evacuationis difficultatem. Igitur retentus ille humor sensim fit acrior, concitans ingentem motum inversum per totum tractum intestinorum & per ventriculum, quo motu valido perturbato, cum ejectione omnium quæ per os ingeruntur, & in intestina atque ventriculum confluent, summa nascitur debilitas exhaustis spiritibus, & defectus humorum continua violenta illa evacuatione. Igitur mirum non est, si homo sit impar ferendi.

ferendi hæc omnia per septem integros dies, ut prius succumbat vehementia morbi. Hinc non dicit Auctor septimo die perire, sed in septem diebus, id est raro persistere possunt ultra septem dies.

III. Eum tamen morbum periculosissimum, qui intra septem dies mortem minabatur, observavit curatum fuisse a febre superveniente & urina abunde fluente. Vix credere possunt, febrem adferre posse levamen, qui statuunt ex sola inflammatione intestinorum generari Volvulum; neque concipere possunt alvi feces obstruentes intestina; vel nodum intestinorum curari posse a febre superveniente, aut per urinam copiose fluentem: sed si statuamus acrimoniam crudam in succo nervoso, tunc talis est frequens in aliis etiam morbis observatio, quum motus vitalis major, qui hucusque non adfuit, accedens, humorem illum acrem subigat & ad naturalia emunctoria ducat. Illa autem febris accedens si simul non faciat copiosam urinæ evacuationem, non curaret dirissimum illum morbum, sed tunc esset solum signum, Volvulum non fuisse natum ex inflammatione intestinorum, cui ab initio adfuisset febris, sed ex materia alia acri, quæ irritando tandem febrem excitat, Volvulum & Stranguriam producta fuisse. Si igitur motus vitalis instigatus hunc succum nervosum acrem commoveat, eamque ducat ad renes, & sub urinæ copiosæ forma eliminat, certe spes est, talem hominem liberari posse ab illa irritante acrimonia. Si medicus tali in casu vocaretur, antequam urina fluere incipit, admodum difficile foret veram invenire indicationem curativam. Puto tamen nos imitari debere monstratam a natura viam, nempe dare medicamenta diuretica calefacientia, quibus concitatur febris & promovetur urinæ fluxus. Id autem observamus, nos non semper idem medicamentis posse præstare, quod natura faciat ad conservationem suam; nam quamvis promoveamus urinæ fluxum, non tamen certo sequitur, eum humorem acrem per urinæ vias eliminari, quod tamen fit, si sponte talem evacuationem molietur. Hoc autem verum est, nos non posse propius accedere ad veram cura-

Quomodo
hi liberan-
tur, si febris
supervenerit
& urina a-
bunde flu-
erit?

tionem, etiamsi semper non ex voto bonum effectum fortiatur.

LIB. VI. APH. XLV.

310. **U**lcera quæcunque annua fiunt, aut longius tempus occupant, necesse est os abscedere, & cicatrices cavas fieri.

I.

Ulcera vetusta.

Quid Medici & Chirurgi Ulcus vocant (*Chir.* 1293) & quot variæ inveniantur species, exposuimus (*Chir.* 1295) ergo restat videre, quando dicantur Ulcera vetusta; & ex quam causa tam diu durare soleant. Omnia Ulcera, quæ simul aliquam consumptionem partium fecere, satis longum tempus exigunt, antequam pars amissa nova carne sit oppleta & cicatrice obducta: hoc autem in unius vel alterius mensis spatio absolvitur: sed si ulcera talia ultra annum vel & diutius aperta maneant, & interdum etiam majora si fiant quam in principio; vel quæ cicatrice obducta, sine læsione externa denudentur iterum & excavantur, talia omnia vocantur Vetusta, & arguunt adesse causam, quæ consolidationem impedit. Tales multæ sunt causæ: nam si stagnans in marginibus humor non convertitur in Pus, sed in Ichorem vel Sorditatem, Ulcus carne impleri nequit, neque cicatrice obduci. Itidem humor morbosus acris ex toto corpore in ulcus confluens bonam consolidationem intercipit. Denique putridus, ichorosus humor in partibus vicinis natus per ulcus evacuandus non solum ulceris consolidationem impedit, verum corrodendo istud magis latum & profundum facit. Quamvis ulcus ex tali causa natum obducatur cicatrice, humor ille interim intus retentus, stagnando acrior factus tale ulcus exasperare facit.

II. Ne-

II. Necessè est, inquit Auctor, Os abscedere. Credo equidem Auctorem hoc sæpe observasse, uti etiam nos, sed videmus etiam ulcera multorum annorum, in quibus os incorruptum mansit: quare non ita absolute pronunciare possumus, os adjacens esse corruptum, si Ulcus habeatur vetustum. Periculum tamen est, Os corrumpi posse ab adjacente Ulcere vetusto. Humor enim ille acris consolidationem impediens facile potest simul corrodere periosteum, quo Os privatum cariem contrahit; potest etiam ille humor corruptus Offi communicari, & ita inficere ejus medullam, ut os corrumpatur. Sed si Os subjacens corruptum sit, tale ulcus tarde ad curationem deducitur, quum Os in suis cellulis rigidis humore corrupto impletum, non facile possit eum evacuare humorem, rigiditas enim illarum partium extrusionem & expulsionem materiæ corruptæ impedit, quæ facilius fieri potest in partibus mollioribus.

Ulcera vetusta an semper os abscedere faciant?

III. Magis autem conveniens est, ut Ulcera vetusta relinquant cavas Cicatrices, & raro perfecta erit curatio in hujusmodi Ulceribus, nisi habeatur excavata Cicatrix. Nam portio ossis carie consumpta non renascitur: inde eo in loco non solum relinquitur in Osse fovea, cui cicatrix firmiter adhæret, verum etiam partes molles in eo loco per diuturnum ulcus consumptæ magis excavatam cicatricem relinquunt. Si vero os simul non fuerit corrosum, multæ tamen fibræ carneæ consumptæ a diuturnitate Ulceris, quæ postea non renatæ, excavatam partem relinquunt.

Cur ulcera vetusta relinquant cicatrices cavas?

LIB. VI. A P H. XLVI.

311. **Q**ui Gibbi ex asthmate, aut tussi fiunt ante pubertatem, pereunt.

I.

Gibbositatem ex spinæ dorsī incurvatione provenire, cuius notum est. Qui cum tali morbo nascuntur, vel deinceps generatur per causam violentem externam, satis diu etiam vivunt, & decrepitam senectutem attingunt, quod communi observatione firmatur: hi autem ut plurimum aliquo pulmonis aut respirationis vitio laborare solent, cum pectoris cavitas male figurata minus amplum pulmonibus spatium relinquat. Quibus autem ex Asthmate vel Tussi ante pubertatem fit Gibbus, hi perire solent ante pubertatem vel non multo postea. Uterque sensus ex Textu elici potest, qui enim dicit, gibbum fieri ex Asthmate vel Tussi, eumque ante pubertatem perire, intelligit mortem fieri, antequam talis gibbosus pubertatem attingit. Si vero dicatur, qui Gibbi ex asthmate vel Tussi fiunt ante pubertatem pereunt, is intelligit, eum hominem perire non diu post adeptam pubertatem. In utrisque ante pubertatem nascitur Gibbus, sed in priore casu ante pubertatem, in posteriore autem paulo post initium pubertatis, quod in sensu non magnam differentiam præbet. Meretur igitur inquirere rationem, cur Gibbus ex his causis præmaturam magis mortem præfagiat, quam si Gibbositas generetur ex nativitate vel per causam externam. Asthma (*Aph.* 101, XIII) & Tussis (*Exerc. de Tussi.*) duo sunt morbi pulmonum, in quorum primo inhibetur seu molestior redditur alterna dilatatio pulmonum, in altero autem pulmo irritatus vehemens ejiciendi conamen edit. Neque ex hoc neque illo morbo patet, spinam dorsī incurvari debere: si autem ante pubertatem ex Asthmate vel Tussi incurvetur spina dorsī, admodum

dum verisimile est, horum morborum in pulmonibus & spina dorsi communem esse causam, eamque tam validam esse, ut valeat sensim perturbare naturalem figuram ossium in spina dorsi, ex qua figura mutata non parum læditur medulla in hac spina contenta. Quoties vero morbi, qui debilitatem arguunt, uti est mala conformatio ossium, circa pubertatem (*Aph.* 70. *Aph.* 107, III.) quando summus vigor esse debebat, admodum increscunt ab interna causa, tale incrementum admodum malum præsagium præbet. Dein mala pectoris conformatio, & pulmonis valida affectio in ætatis eo tempore, quando Phthisi (*Aph.* 202, I.) admodum sunt obnoxii, rarum esset, si eo morbo, ex quo postea moriuntur, non corriperebantur.

L I B. VI. A P H. XLVII.

312. **Q**uibus venæ sectio, aut purgatio conducit, his vere convenit venam secare, aut purgationem facere.

I.

Tres species curationis inveniuntur. Prima est, quæ adhibetur in corporibus sanis, in quibus exspectamus morbum ex inevitabili causa, vel in quo corpore morbus est certo tempore rediturus, quemadmodum in podagricis: quando tunc per certa auxilia prævenimus morbum vel paroxysmum instantem, illa Curatio dicitur Præservatoria vel Prophylactica. Altera est Curatoria, quæ morbum præsentem tollit. Denique in morbis non curabilibus quædam adhibetur Curatio, quæ mitigat urgentia symptomata, morbique progressum inhibet, non vero ipsum morbum tollit, hanc vocant Curam Palliativam. Ex his sola prior in hoc Aphorismo traditur: supponit enim corpus sanum, quod certo anni tempore exspectat morbum, in

Curatio
præservatoria.

in quo vult imperare Alvi ductionem vel Sanguinis missionem, ut instantes morbi præveniantur. Experientia comprobatum est, quosdam morbos venæ sectione, alios autem purgantibus melius præveniri, vel quavis alia medicatione. Ex his solummodo eligit Auctor solos istos morbos instantes, qui solent præveniri Purgatione vel Sanguinis missione, & quoniam hæ curationes variis anni temporibus institui possunt, indicare voluit anni tempus opportunissimum ad eam medicationem faciendam, non ut reliqua tempora excludat, si necessitas urgeat, sed ut indicet, nos eo tempore certiori effectu posse promittere curationem Prophylacticam. Inde quibus, inquit, Venæ sectio aut Purgatio conducit, his vere convenit Venam secare, aut Purgationem facere. Ergo morbi futuri prius sunt determinandi, in quorum Prophylaxi medici solent cum successu adhibere Venæ sectionem vel Purgationem: dein si hoc constat, illa auxilia sunt potius adhibenda vernali, quam alio tempore anni. Igitur videndum, quinam morbi præveniuntur Venæ sectione aut Purgatione, & cur deinde illa auxilia vere sunt adhibenda.

Quibus vere
conducit
venam se-
care?

II. Dum præcedens Hyems aëris frigiditate accumulavit multos in corpore humores, bonos, excrementitios & etiam morbosos, subsequens Ver stagnantes, collectos, & lentescentes, suo calore majore movet, dispergit, & solvit, multi ex hac mutatione inducta nascuntur morbi, (*Aph.* 99) qui præveniri potuissent debita & satis matura adhibita curatione præservatoria, qua tollitur vel abundans, vel corrigitur id alienum, prægressa hyeme collectum, antequam in verum morbum erumpat. Hac ergo Curatione præservatoria præveniuntur morbi vernaes. Itidem, quia subsequitur Æstas, quæ suo majore calore & naturali anni mutatione suos proprios producit morbos (*Aph.* 100) debita adhibita curatione circa finem veris, isti quoque morbi præveniuntur. Omnes autem isti recensiti morbi, neque sola Sanguinis missione, neque sola Purgatione per alvum præveniri nequeunt, sed pro natura sua diversa varium genus auxiliorum exigunt: itaque ex memoratis debemus eligere istos,

istos, qui venæ sectione præveniri debent. Sanguinis missio nihil aliud facit, quam solam minuere copiam massæ communis sanguinis, circulatorii, qui enim educitur per venam sanguis, non est peioris conditionis, quam qui relinquitur. Si ergo sanguis morbosam materiem admistam habet, non valet sanguinis missio elicere solam materiem malam, & relinquere sanguinem bonum, non enim fit separatio boni a malo, dum sanguis ex vena secta fluit. Igitur Venæ sectio solos istos morbos prævenire potest, qui præcedente Vere vel Æstate ex sanguinis abundantia sunt propullulaturi. Si summo Vere sit facienda sanguinis missio, ut curatio præservatoria ex morbis Vernalibus, illi sunt eligendi, qui sanguinis prægressam abundantiam arguunt. Uti Sanguinis fluxiones (Aph. 99, v.) Angina (Aph. 99, vi) Pustulæ ulcerosæ, (Aph. 99, xii.) Phymata. (Aph. 99, xiii.) An autem Articulorum dolores, quos Podagram vocant, uti præcipit etiam Galenus, venæ sectione vernali tempore sint præveniendi, vehementer dubito, quum his temporibus quidem experiamur, a venæ sectione celebrata summo Vere paroxysmum solito tempore non rediisse, sed sequens tunc paroxysmus in corpore ita magis debilitato multo magis productus fuit, & majoris periculi. Neque invenio veram rationem, qua potuisset Venæ sectio tollere materiem podagricam, quum non sit morbus ex sanguinis abundantia, quæ solâ venæ sectione tollitur, sed morbus ex acrimonia speciali, quæ missione sanguinis non tollitur, ut superius monuimus. Hinc Venæ sectio detrahens vires, inhibere potest maturitatem materiæ podagricæ, ut debito tempore non erumpat, sed eadem diutius retenta, & nova simul accumulata, eo magis & gravius deinceps sæviet. Progrediente autem Vere tandem expectamus ex sanguinis abundantia morbos æstivos, uti febres Continuas Ar dentes (Aph. 100, ii.) Ophthalmias siccas, (Aph. 100, vi) & Sudamina, (Aph. 100, x.) Quos omnes conduceret prævenire Venæ sectione, ne sanguis abundans in corruptelam conversus, amplius venæ sectione patiatur emendari. Quibus ergo in corporibus adsunt signa plethoræ,

E e e e e

præ-

An condu-
cat poda-
gricis.

præcessit victus lautus, opiparus, & vita otiosa, quique solent Vere vel initio *Æstatis* hujusmodi morbis corripī, admodum his conducet satis mature celebrare venæ sectionem, ad præveniendos imminentes hos morbos.

Quibus Vere
conducit
alvum du-
cere?

III. Plura observanda sunt in Alvi ductione, quam in memorata missione sanguinis, his enim medicamentis non solum minuere possumus copiam totius massæ, verum etiam eliminantur intestinorum contenta, omnesque humores, uti succus ventriculi, intestinorum, bilis, & forsitan etiam sanguis ex vena portarum, per quos humores evacuatos varii possunt præveniri morbi; atque fit simul derivatio a cute versus intestina. Eligemus igitur ex morbis Vernalibus & *Æstivis* quosdam, in quibus videbimus, quantum conferant purgantia ad dictos morbos evitandos. Mania & Melancholia Vere redeuns (*Aph.* 99, iii) evacuatione facta per alvum materiæ in vena portarum prius collectæ, sæpe prævenitur. Epilepsia autem (*Aph.* 99, iv) raro his præveniri potest, quum ut plurimum vitio nervorum inducatur, quorum morbi alvi ductione intendi solent. Sanguinis fluxiones (*Aph.* 99, v) ratione generalis diminutionis uti per sanguinis missionem præveniuntur. Angina (*Aph.* 99, vi.) tam ex diminutione generali, quam ex derivatione ad intestina a purgante dato ut plurimum prævenitur. Gravedines (*Aph.* 99, vii) potius largiore perspiratione & dato sudorifero præveniuntur, quam per purgans, si oriantur ex prohibita perspiratione, ut fere semper fit. Raucedines & Tusses (*Aph.* 99, viii) a dato purgante magis aggravantur, quum morbi pectoris alvi fluxu intendi soleant, & sistatur sputi excretio, quæ utilissima est in his, sed diuretica magis convenirent. Lepram (*Aph.* 99, ix) Impetiginem (*Aph.* 99, x.) Vitiliginem. (*Aph.* 99, xi) Pustulas ulcerosas (*Aph.* 99, xii.) & Phymata (*Aph.* 99, xiii.) purgantibus præprimis mercurialibus junctis præveniri, citatis locis indicavi. Iisdem quoque purgantibus conati sunt Arthritidem & Podagram Vere redeuntem prævenire multi. Hos autem morbos ita inter se convenientes inveniri, ut a quibusdam confundantur, probant practicum libri, istos autem

An condu-
cant Arthri-
ticis & po-
dagria-

autem in natura materiæ differre, demonstravi supra (*Aph.* 294.) Experientia didici, Arthriticos dolores aliquomodo præveniri posse datis purgantibus vernali tempore, multo autem melius per Diaphoretica, quæ humores istos acres per cutim eliminant. Sæpe etiam idem tentatum fuit in Podagricis, & experti sunt præsens levamen, sed nos sicut magnus ille Sydenham experti sumus, materiem Podagricam per intestina eliminari non posse, paroxysmum quidem eo tempore non fuisse obortum, sed deinceps eo graviore paroxysmo plectabatur non sine discrimine vitæ, atque magis erat æger ille cachecticus & œdematosus: igitur nemini Auctor esse volo, ut suadeat in Podagricis alvum esse ducendam ad præveniendam Podagram. Morbi autem multi æstivi, qui proveniunt ex cacochylia, vel bile corrupta, vel ex materia melancholica retenta, calore movenda (*Aph.* 100.) uti tertianæ plurimæ, quartanæ æstivæ, vomitus, alvi fluxus, ut plurimum præveniuntur repetita alvi ductione, qua materia illa corrumpenda aut corruptela suscepta e corpore eliminantur.

LIB. VI. APH. XLVIII.

313. **L**ienosis dysenteria superveniens, bonum.

I.

Hic Aphorismus contrarius videtur priori (*Aph.* 308) ubi tradit, si superveniat dein Hydrops aut Lienteria, ægrum perire: sed illa tamen habetur differentia, quod in hoc loco agat de Dysenteria superveniente, quæ levamen adfert, & in priore de Dysenteria continuata. Si enim quædam fiat evacuatio cum tumoris vel morbi diminutione, signum est, morbi materiem hac via evacuari: sed si eadem evacuatio perseveret sine præcedentis mali le-

vamine, signum est, in priore loco esse scaturiginem perpetuam, quæ tandem omnes corporis bonos humores & vires exhauriet. Ita etiam Dysenteria, id est alvi copiosior egestio cum dolore, notat fieri evacuationem humoris acris: qui si ex Liene veniat & non relinquat Lienem corruptum, evacuato omni illo humore sponte cessabit ille alvi fluor & dolor, & potest ita restitui perfecta sanitas. Secus vero si ille fluxus continuetur, ut supra exposuimus, solummodo illa difficultas restare videtur, per quam viam humor ex Lienosis per alvum possit exonerari, quum nulla inveniatur via ex Liene ad intestina, sed naturalis sit via versus hepar. Concedendum utique est, in sanis sanguinem semper talem servare cursum, & nullam esse viam naturalem ex Liene ad Intestina tendentem; sed in morbis non semper humores solitum servant cursum, non raro per idem vas motu retrogrado urgentur: ita ex ventriculo ad intestina, ex iis versus anum naturalis est contentorum directio, sed in vomitu & volvulo contrarium experimur. Ita etiam vena portarum valvulis carens accipit sanguinem ex venis meseraicis & ducit eum per hepar: sed si hæ venæ Melancholica materia turgent, non raro motu retrogrado receptum sanguinem urgent ad venas hæmorrhoidales & meseraicas in intestinis, ubi contentum sanguinem evomunt. Hac via igitur motu inverso non est absurdum humorem acrem in Liene confectum, ad venam portarum prius delatum exonerari posse, & quia acris est, dejectionem dolorosam infert. An vero ex hac naturæ directione monemur, nos debere in Lienosis dare purgantia, non sine ratione statuitur, quia natura nobis demonstrat viam. Id autem discriminis est, quod natura tunc molitur, si sibi apertam paravit viam, sed dum datur purgans, hanc simul non possumus expeditam nobis viam comparare. Verum hoc egregium inde habemus, nos non debere diu continuare in usu purgantium, cum dysenteria talis continuata hydropem inferat & mortem.

LIB. VI. APH. XLIX.

314. **Q**ui podagrici morbi fiunt, hi sedata inflammatione in quadraginta diebus decedunt.

I.

UT semina plantarum singularia suum proprium servant tempus germinandi, crescendi & florendi, qui terminus temporis non omnibus seminibus est communis, ita etiam semina morborum sua specialia tempora crescendi & agendi servant; ut non valeamus ex periodo morborum inflammatoriorum cujusvis morbi tempora limitare. Habet quidem Podagra multa communia inflammationi, sed in sua natura a morbo inflammatorio maxime distat: nunquam enim observare potui, Podagram etiam sævissimam abiisse in purulentiam, quæ commutatio inflammatoriis est frequentissima: neque vidi, particularem inflammationem abiisse in calculosam articulorum excrescentiam, quæ concretio tamen nodosæ Podagræ dedit nomen. Quare morbus Podagricus est morbus specialis ab omnibus morbis distinctus, & non necesse est, ut dies suos criticos faciat eodem tempore cum morbis acutis, quorum ultimus terminus statuitur quadraginta dies. Ex hac forsitan doctrina Auctor, & qui eum secuti sunt, deduxerunt hunc temporis terminum. Debemus autem ex ipsa observatione Podagricorum hoc tempus terminandi desumere. Si propriam praxin consulo & Sydenhamum, qui non ex hypothese accepta, sed ex observatis in ægris nobis reliquit monumenta, invenio in levissima podagra, quæ prima vice occupat articulum pollicis pedis, in corpore ceteroquin sano & robusto, dolorem abiisse intra triduum, quibusdam intra septimanam, relicta quadam molestia in motu, quæ sensim quoque evanescit. Quos vero sæpe aggressa fuit

Quo tempore finiuntur morbi podagrici?

Podagra, hi jam in hoc, jam in illo articulo vexantur dolore, ut totus ille paroxysmus, ex multis minoribus quasi congregatus, ultra mensem unum vel alterum extendatur. Denique in vetustissima Podagra, quæ corpora admodum debilitavit, minuitur quidem sævities doloris, sed longitudine compensatur, ut isti per integrum interdum annum vel leviori vel graviore tormento doloris, vel anxietatis vexentur, nisi quod quidam mensibus æstivis, utcunque valetudinarii & misere vivant, destructis fere omnibus articulis. Igitur terminus temporis ab Auctore propositus non admodum respondet hodiernis observatis, sed desumendus est ex propria morbi historia, quæ præcedentia a nobis allata dicitur.

LIB. VI. APH. I.

315. **Q**uibus perscissum fuerit cerebrum, his necesse est febrem, & bilis vomitum supervenire.

I.

Ex Cerebri
vulnere fe-
bris & bilis
vomitum,

Superius notavimus cum Auctore, Cerebri seu Encephali vulnera lethalia esse (*Aph.* 283, III) & hujus rationem dedimus: hoc nunc loco duo symptomata notat, quæ fere semper nascuntur ex Cerebro læso, nempe Febrem & Bilis vomitum. Hæc autem symptomata seorsim perpenſa non sunt talia criteria, ut quoties habeantur, indicent mortem esse expectandam: observaverunt enim Chirurghi & etiam Ruyschius, homines fuisse servatos post capitis concussiones, quibus supervenerunt hæc symptomata; neque omnis Vomitus Bilis cum febre indicant semper, læsum esse Cerebrum. Meretur ergo inquirere causas hæc symptomata inducentes, ut inde aliquid certi deducere possimus; & præterea inquirere, num omnis Cerebri læsio hæc semper symptomata inferat. Nunquam a causa externa

terna secante lædi potest Cerebrum, quin simul perfcindantur Meninges, quarum læsio simili modo, ut læsiones aliarum membranarum in principio paulo majorem motum faciunt ex laceratione hac, dein sensim ille motus fit violentior, ut pars illa læsa circumquaque inflammetur: perseverante illa causa sensim totum organum motus vitalis in consensum trahitur, ut se validius movere incipiat: quare ex omni læsione membranarum sequitur motus circulatorius major, qui a causa tali concitatus vocatur Febris. Hoc quam maxime fit in læsis & irritatis meningibus, quia est membrana, cui omnes nervorum capsulæ sunt continuatæ: & quoniam meningum agitatione non solum totum organum vitale in consensum trahitur, veluti reliquæ etiam membranæ inflammatae, verum adjacens Cerebrum & Cerebellum ab inflammatione meningum magis, quam inflammatione aliarum membranarum, agitur, ut inde major sit ratio motus circulatorii aucti, quam ex Inflammatione aliarum membranarum. Inde consuetum est in vulneribus encephali, ut post unum alterumve diem accendatur febris. Interdum vero validiore meningum agitatione generatur Convulsio vel Delirium, dum nempe ita Cerebrum commoveatur, ut omnis æquabilis circulatio Cerebri turbetur: vel si simul a meningibus nimis constrictis vel compressis sistatur spirituum effluxus, non raro generatur sopor, apoplexia, vel paralyxis. Inde Febris unum est ex symptomatibus læsi Cerebri, sed & possunt multa quoque alia accedere symptomata, quæ hoc loco noluit recitare Auctor. Bilis autem vomitus non ita necessario sequi videtur, quoniam fit a motu inverso ventriculi, organi alicujus remoti a Cerebro. Sed inter motum vermicularem ventriculi & Cerebrum tantus observatur consensus, ut ex læsione Cerebri tanquam pathognomicum signum habeatur bilis Vomitus. Ad Bilis vomitum duo requiruntur: primo ut vesica fellea se exoneret in duodenum, non ex pressione ventriculi pleni, sed per motum in propriis suis fibris; & alterum est, ut ventriculus & intestinum duodenum simul laborent motu inverso; nam ita extruditur Bilis

ex Vesica fellea in duodenum, ducitur in cavum ventriculi, & dein vomitu redditur. Igitur nihil aliud est hoc loco demonstrandum, quam quod ex læso Cerebro fieri possit motus inversus harum partium. Hoc autem facillime ex nervorum cursu demonstrari potuisset, sed quoniam nulla est corporis pars, quin nervos habeat ex encephalo, non possumus hanc theoriam huic parti magis, quam cuivis aliæ applicare. Sed quoniam invenimus, nullam partem tam facile consentire, quam ventriculus & vesica fellea læso Cerebro, hanc observationem inter specialia criteria Cerebri læsi locare possumus. Interim tamen ille Bilis vomitus non tam absolute est capiendus, ac si non potuisset fieri ab ulla alia causa, quum omnes causæ reliquæ, quæ motum inversum his partibus inducere possunt, quæ multæ sunt, etiam Bilis vomitum inferre soleant. Summum dubium aliis videtur nasci, cur Bilis & non pituitæ vel aliorum humorum generetur. Vomitus. Hoc autem mihi non multum momenti videtur; Bilis enim suo colore flavo se manifestat magis, quam reliqui humores pellucidi, qui simul ejiciuntur; Bilis satis magna copia collecta invenitur in vesica fellea, qualis locus nullus humoribus invenitur; nullus etiam humor tanta copia secernitur, quam Bilis, qui in ventriculum potuisset fundi & per vomitum reddi, totum enim Hepar magnum Bilis secretioni est destinatum. Hinc in principio vomendi redduntur ventriculi contenta, succus stomachicus & pancreaticus, pergentes tandem vomitu, qui humores parva quantitate respectu Bilis interim secernuntur, & qui secreti sunt, Bilis flavedine tinguntur, quidquid redditur postea, mera Bilis videtur. Possumus ergo ex his omnibus colligere, Febrem & Bilis vomitum numeranda esse inter Cerebri læsi signa, sed quæ etiam possunt ab aliis causis generari, atque multo plura quoque fieri posse symptomata a læso Cerebro provenientia, ut non sit uni alterive signo confidendum, sed plura conjungenda sunt, priusquam certi sumus, Cerebrum esse læsum.

LIB. VI. A P H. LI.

316. **Q**uibus sanis dolores derepente fiunt in capite, & statim muti fiunt ac stertunt, in septem diebus pereunt, nisi febris apprehenderit.

I.

Capitis dolorem ex variis causis oriri posse, supra (Aph. 275.) observavimus, præterea ex ebrietate prægressa aliquis relinquitur capitis dolor: ut ergo certam speciem doloris definiat, duo criteria adjicit, antequam ex subsequentiis symptomatibus conclusionem formet. Primum est, ut corripiat hominem sanum, scilicet talem, in quo non detegitur ante doloris invasionem aliquis morbus, atque talem, qui non laborat crapula. Alterum est, ut fiat derepente, sine ulla prophasi vel cognita aliqua causa. Ergo talis debet esse causa interna Dolorem capitis inferens, quæ non solum recensito modo adoriri potest, sed quæ insuper Aphoniam & Stertorem producere potest. Talem non possumus invenire causam, nisi prius constet, quomodo & ex qua causa formatur Aphonia & Stertor. Qui loqui non possunt, id habent ex musculis vocem formantibus convulsis vel paralyti correptis, quum rima glottidis ita debeat angustari per suos musculos, ut transeuns aer sonum formet, quæ requisita angustia in convulsis & paralyticis musculis impeditur. Itidem Stertor oritur a transeunte aëre inter respirandum, dum palatum mobile ad posteriora foramina narium a transeunte aëre concussum, aliquem sonum obscurum faciat: observatur ille Stertor in apoplecticis, soporosis, & dormientibus, nimis laxatis & paralyticis musculis hoc Palatum moventibus; vel in iisdem convulsis, uti in epilepticis & hystericis. Igitur causa harum apparitionum est Paralysis vel Convulsio musculorum

Ex qua causa
sa vocis defectus &
stertor post
Capitis dolores derepente natos
in sanis?

lorum in faucibus, qui muscoli nervos habent ex medulla oblongata cerebri. Quia vero causa Doloris & Convulsionis sæpe est eadem, sed raro ab eadem causa fit Paralysis & Dolor; itaque verisimile est, Aphoniam & Stertorem nasci ex Convulsione eorum musculorum. Atque talia quoque subito fiunt, si aliquid acre applicetur principiis illorum nervorum, qui ad musculos faucium tendunt. Ex quibus omnibus comparatis colligi potest, humorem acrem aliquem deponi ad medullam oblongatam cerebri inferentem Dolorem capitis, quæ causa aucta tandem infert Convulsionem musculorum faucium, ut inde fiat Aphonia, & Stertor.

Cur hi mori-
untur in-
tra septem
dies, nisi
febris ap-
prehende-
rit?

II. Ex textu concludi potest, istum Capitis Dolorem cum subsequente Aphonia & Stertore non oriri ex causa febrili, quum dicat, si febris apprehenderit, id est postea veniat. Ergo id acre Dolorem capitis inferens & reliqua symptomata ex Convulsione nata, est materia Catarrhosa cruda. Illa autem materia si Convulsionem inferat, ut monuimus (*Aph.* 167.) subigi potest a motu febrili subigente & expellente, quum Spasmus aut Tetanus ex hac causa natus a febre superveniente tollatur. (*Aph.* 51, v.) Sed si maneat, non concitata febre, sensim majori copia collectus, totam medullam oblongatam premens, mortem infert. Eandem quoque observationem habet in Convulsis ex ebrietate, qui simul muti fiunt. (*Aph.* 198.) Ut aliquem temporis terminum adderet, dicit intra septem dies, quia si diu manent illa symptomata, major est facta accumulatio humoris prementis, quam ut viribus vitæ possint discuti humores; & signum vires vitæ ab accumulato humore suppressi, alias enim multo prius vis vitæ irritata concitasset febrem. An vero tali ex observatione possimus elicere certam regulam curationis, meretur attentionem. Febris si non veniat, moritur homo, si veniat, sæpe servatur, interim tam certa non est prognosis ex superveniente febre, ut possimus curationem certam promittere; observavit quidem Auctor a febre superveniente hominem fuisse servatum, sed non dicit semper servari: sensus enim est, nisi febris superveniat, peribit, sed hoc non indicat, semper a febre.

bre superveniente servari. Interim hoc ad curationem elicere possumus, nos debere per medicamenta calefacientia concitare febrem artificialem, quia natura demonstrat, se tali modo interdum servare.

L I B. VI. A P H. LII.

317. **C**onsiderare vero etiam oportet oculorum subtus apparentia in somnis. Si enim albi quid, palpebris commissis, subtus appareat, cui id non ex alvi profluvio est, aut ex potione purgante, prævum signum, & valde lethale.

I.

Nulla est corporis pars, nullusque evacuandus humor in corpore, quin præbere possit indicia causæ latentis, quare medici præpostere agunt, qui sola signa petunt ex urina vel pulsu, aut alio speciali signorum genere, cum omnia sint perpendenda, quia morbi diversi non semper in uno genere signorum sua indicia præbent, sed jam in hoc, jam vero in illo signorum genere; ita sunt morbi periculosissimi, qui interdum neque in urina, neque pulsu ullum indicium præbent, ut propterea coacti simus alia in corpore phænomena consulere. Neque contenti esse debemus signo unico, quod a multis causis pendere potest, sed semper debemus omnia consulere phænomena, eaque inter se comparare, ut eo certiores simus in assignanda causa, ejusque periculo. Sæpe tamen Auctor hoc vel istud signum ponit, & inde format præsiagium, quum observaverit post tale signum semper aliquid mali vel boni fuisse secutum: qui autem cum vera fide signis uti vult, non unicum sed omnia simul perpendere debet. Inter illa nunc signa numerat inspectionem oculorum & quidem in somno, quoniam in dormientibus omnes actiones anima-

Oculi in
somno ob-
servandi.

les cessant, & palpebræ tunc non moventur ad arbitrium, sed naturaliter in dormientibus debent esse clausæ; si ergo palpebræ non bene commissæ sunt, hoc certe dependet ab aliqua morbosa causa. Excipiuntur ergo omnes, qui sani palpebris non bene commissis obdormiunt, quod etiam monet, si quis in ventrem decumbat, non consuetus, aliqujus causæ signum est; ita qui non consuetus oculis conniventibus dormiat, si tamen istud morbo pressus faciat, aliquam causam internam latentem indicat.

Ex qua causa oculi conniventes in somno?

II. Ob duas præcipue rationes Deus voluit, ut in dormientibus oculi bulbus a palpebris esset tectus: ut nempe ita interciperetur agitatio radiorum lucis supra retinam, qua turbaretur somnus æqualis, & præcipue ut impediretur corneæ exsiccatio, quæ exsiccata amitteret pelluciditatem, sed vero a palpebris clausis retinetur humida & munitur contra injurias externas. An vero claudantur palpebræ dormientium defectu actionis musculorum, ut reliqua membra in dormientibus laxantur, an vero speciali contractione muscoli claudentis palpebras, ex aliis morbis est desumendum. Experimur in moribundis, leipothymia, & convulsis, palpebras raro clausas esse, sed fere semper quandam portionem albi oculorum inter palpebras conniventes videri posse. Ergo perfecte cessante actione musculorum non clauduntur palpebræ, sed sæpe manent apertæ. Qui ergo morbo oppressus dormit & habet conniventes palpebras, huic manent palpebræ conniventes vel propter summam debilitatem vel propter convulsionem.

Cur oculi conniventes sine alvi fluxu vel ductione prægressa, lethale?

III. Observavit Auctor in ægris, quando propter debilitatem videbantur dormire, si palpebræ non bene commissæ servantur, ut in somno naturali fieri solet, istum somnum non esse somnum naturalem, sed abolitionem sensuum defectu spirituum, & inde ægros plerumque mori: adeo ut palpebræ ita conniventes arguant tantam debilitatem, quæ a morte non multum distat. Hæc autem debilitas inducta si fuit per copiosorem evacuationem, non est tanti periculi, quam si fiat a degeneratione humorum, subito enim facta evacuatio, valet ita minuere sanguinis fluxum ad cerebrum.

brum, ut homo sensibus privetur, sed sensim contractis magis vasis iterum ducitur sanguis ad cerebrum, & homines servantur, quod fieri non potest, si ex degeneratis spiritibus illa debilitas inducta fuerit. Inde oculi ita in dormientibus conniventes post quamcunque largiorem evacuationem, non magnum periculum portendunt, ut inde mortis præfagium faciant. Quod autem Auctor dixerit post Alvi fluxum & Alvi ductiorem, non vero post quamcunque evacuationem, inde est, quia, quod observavit, posteritati reliquit, & quia forsan non ita detexit oculos conniventes in ægris post alias evacuationes, noluit hanc sententiam generalem pronunciare. Ego autem in praxi detexi hoc etiam post hæmorrhagias largiores, & inde magis generalem regulam de oculis conniventibus formare possumus.

LIB. VI. APH. LIII.

318. **D**eliria cum risu accidentia, securiora: cum studio vero periculosa.

I.

Delirii definitionem & generales causas exhibuimus, (Aph. 27.) ex quibus colligi potest, Deliria minusque periculosa esse, secundum causas Deliria inferentes: atque variæ quoque sunt Delirii species cum risu, studio, audacia, timore, aliisque animi pathematibus. Observavit Auctor & hodierna experientia confirmatur, majoris periculi esse Delirium cum studio vel audacia, quam cum risu; istud autem periculum est desumendum vel ex causa hanc speciem Delirii faciente, vel ex ipso ita dicto animi pathemate. Invenimus humores corruptos varios non semper eandem Delirii speciem inferre, quod etiam invenimus in philtris datis. Si ergo observatum fuit per praxin, eum humorem alienum, qui infert Delirium cum risu,

facilius subigi & expelli posse viribus vitæ, quam genera reliqua, ex hac observatione constante inferri potest deinceps talia Deliria securiora esse, etiamsi nos lateat reliqua natura istius causæ. Vel majus minusque periculum desumi potest ex adjuncto animi pathemate, quum ridentes ex causa quadam risum movente, non vero ex convulsione, uti in Risu Sardonio, nihil mali meditantur, & dictis facile obtemperant, ut quævis auxilia adhiberi possint, & tali in lætitia minus consumuntur spiritus: si vero cum studio fiat, quasi semper profunde meditantur, hi homines non tam securi sunt, minas enim secum meditantur; atque illa mentis agitatio in sanis etiam spiritus magis consumit, neque ita patiuntur duci in recta curatione, sed proprium quasi ingenium sequuntur. Periculosissima autem sunt Deliria cum furore, quia nemini obtemperant, sibi aliisque damnum inferunt, neque noctu neque de die sibi quietem vel somnum concedunt.

LIB. VI. APH. LIV.

319. **I**N acutis affectionibus, quæ cum febre sunt, luescæ respirationes, malæ.

I.

QUænam dicantur Acutæ affectiones, exposuimus (Aph. 24, III) in quibus quædam sunt sine febre, aliæ autem cum febre, uti in hoc loco indicantur. Omnibus hisvitalis motus est validior propellens sanguinem; quare majore potentia urgetur sanguis ex ventriculo etiam dextro cordis per arteriam pulmonalem in Pulmones. Si sanguis non inultum ex sua natura degeneraverit, compactusque fuerit, & vires satis valeant ad faciendam respirationem, tunc tanto frequentior & profundior fit Respiratio, quanto majori vi urgetur sanguis ex corde per arteriam pulmonalem, quod

quod etiam experimur in sanis corpus suum moventibus, motu majore musculari. Ergo in Acutis affectionibus ex ratione est, ut intendatur Respiratio: sed propterea non debet esse Lucida κλαυθμώδεις, id est respiratio gementium, plorantium, quæ quasi in media actione subsistit & renovatur. Hujusmodi Respirationes fiunt ab animi pathemate in sanis, quæ aliquam spasmodicam constrictionem arguunt. Hippocrates igitur in antecedentibus (Aph. 178, 1) dixit, Spiritum offendentem indicare Convulsionem: & quoniam Convulsio feбри superveniens (Aph. 51, vi.) periculum portendit, hoc in Aphorismo per constantem observationem pronunciare potuit, malum esse.

LIB. V. APH. LV.

320. **P**odagrici morbi vere & autumno moventur ut plurimum.

I.

Materiem Podagricam diu in corpore posse latitare, ut semina mala, quæ matura facta propullulant, observavimus (Aph. 294.) Mirabilis est hujus materiæ proprietas, quod ita in nobis latitare possit, ut in nulla functione, vel secretionem aliquis detegere posset aliquod vitium, hoc autem morbosum tandem lævire incipit, & iterum post toleratos dolores evanescit, sæpe sine ulla visibili evacuatione. Mirantur multi, febres tempore apyrexie corpus quoad signa externa relinquere perfecte sanum, sed hoc etiam observatur in Podagricis & Epilepticis, nisi adsit paroxysmus, istud corpus observatur perfecte sanum. Hoc autem proprium est materiæ Podagricæ, quod prima vice adoriri soleat Februario mense (Aph. 314, 1) ex communi observatione; si autem adolevit, Vere & Autumno redire solet. An vero ille reditus seu exacerbatio dependeat ex propria natura materiæ, an vero ex anni
mu.

mutatione, mihi videtur nimis subtilis quæstio, & parum fructuosa. Detegimus autem, vitam intemperatam provocare paroxysmum, quare maxime cavere debent, ne temporibus his præprimis indulgeant computationibus, vel committant errores in diæta, & ut his temporibus, antequam paroxysmus ingruit, istis utantur medicamentis, quæ usus docuit excellere in prævenienda Podagra.

LIB. VI. APH. LVI.

321. **M**orbis melancholicis ad hæc periculosi sunt humorum decubitus, aut corporis fiderationem, aut convulsionem, aut insaniam, aut cæcitatem significant.

I.

Morbis melancholicis
periculosi
decubitus
humorum.

SI ex signis constet, in corpore esse materiem melancholicam, (Aph. 132, II) illa, si quacunque in parte decumbat seu colligatur, semper periculum infert: imo si sursum vel deorsum erumpat, morbis quibuscunque incipientibus, lethale pronuntiatur. (Aph. 132.) Materia enim illa, neque sponte, neque viribus vitæ ita immutari potest, ut sanis assimiletur, semper servat suam propriam naturam, sensimque, si retineatur, redditur acrior. Quamdiu autem retinetur in vena portarum, non multum mali facit, nisi reddatur acerrima, vel nimia copia accumulatur; potest tunc per hæmorrhoides evacuari, vel deposita per venas meseraicas in intestina, modo non possideat nimis magnam acrimoniam, eliminata fuit. Sed si venæ cavæ fuerit tradita, & ita tandem in aliqua corporis parte decumbat, periculosos infert morbos. Ubicunque enim hæret, non potest emendari, sua tenacitate adhærente non facile illam partem relinquit, & acrimonia sua, atque qualitate aliena, functio.

functiones illarum partium miris modis perturbat, unde recensiti in textu morbi & multi alii fiunt.

II. Nomine Apoplexiæ intelligi abolitionem sensus & motus animalis, remanente actione vitali, superius (*Aph.* 67, 1) notavimus; hoc autem loco dicitur Apoplexia seu Sideratio corporis, igitur videtur hæc species differre a generali Apoplexia. Invenitur etiam apud Nostrum Auctorem Apoplexia alicujus partis. Necesse ergo erit ex phænomenis colligere, qualis corporis affectio per Apoplexiam intelligatur. Generalis Apoplexia tunc vocatur, si homo privetur omni sensu interno, externo, & motu animali: inde Apoplexia corporis erit, si solus sensus externus & motus animalis extinguatur per totum corpus, remanente motu vitali, sensibus internis, sive mens constans maneat, sive simul deliret homo. Apoplexia ergo alicujus partis tunc vocatur, si sensus & motus animalis istius partis abolentur subito, ac si haberetur in quadam parte paralyxis cum insensibilitate. Constat per experimenta, ex Cerebro oriri nervos ad sensum externum & motum animale destinatos, hos solos nervos affici posse sine mentis perturbatione; nervos autem motus vitalis oriri ex Cerebello; si ergo materia Melancholica tenax sine acrimonia opprimat in encephalo istos nervos, qui ad sensum externum & motum animale sunt destinati, habetur in toto corpore Insensibilitas & Paralyxis, qualis morbus vocatur in hoc loco Apoplexia corporis. Talis autem morbus ex materiæ Melancholicæ decubitu natus non caret periculo, quia nascitur ex materia a vi vitæ non superabili, quæ occupat principia nervorum, quæque propter tenacitatem non facile discuti potest, quæque sæpe majore copia collecta etiam motum vitalem extinguere potest, ut ita pereat æger.

Ex Melancholia Apoplexia corporis.

III. Si autem eadem nervorum principia in encephalo tangantur a materia Melancholica acriore, quod sæpe fit, corpus diris convulsionibus epilepticis agitatur. *Airabiliarum etiam comitiali morbo corripitur plerumque solent.* (H. a. 823.) Qualis etiam morbus ob allegatas rationes periculosissimus est: nam non facile superatur, & si augeatur copia vel a-

Ex Melancholia Convulsio.

crimonia materiæ melancholicæ, etiam motus vitalis turbatur, aut exstinguitur.

Mania.

IV. Ex Cerebro oriri nervos ad motum animale & sensus externos, constanti observatione ex experimentis deducta ita est confirmatum, ut nullus hodie dubitare possit: simili etiam modo ex Cerebri compressione & agitatione constat mentis actiones exstingui vel perverti. Si ergo illa materia Melancholica acris ad eam cerebri partem feratur, quæ naturaliter agitatur a sensibus internis, talis homo delirat, seu insania corripitur, quæ mentis abalienatio tam diu durat, ac illa materia hanc partem agit: quia vero materia ea admodum simul est tenax, non facile depellenda, mania melancholicorum pertinacissima esse solet, & sæpe recurrens.

Cæcitas.

V. Inter sensus externos etiam numeratur visus, qui autem per specialem nervum ex cerebro natum exercetur: quoties ergo Nervus Opticus a materia Melancholica ita opprimitur, uti supra exposuimus in nervis Tactus, talis tunc æger Visu privatur. Veteres existimarunt, nigredinem materiæ suffocare transitum radiorum luminis ad mentem, sed quoniam hodie satis demonstratum fuit, omnem causam ita comprimentem vel implentem nervos opticos, ut liber spirituum fluxus ex cerebro per nervum opticum ad oculum intercipiatur, visum exstinguere, non erit opus ex nigredine materiæ melancholicæ Visus privationem deducere.

Curatio.

VI. Egregium quidem est omnes hos morbos in melancholicis præfagire posse, & ex conspectis his cognoscere causam mirabilium effectuum: præstantius autem foret hos morbos tollere posse. Quare in his omnibus, quamvis facie admodum diversa conspiciuntur hi morbi, talem facere oportet curationem, qualis a nobis in Medicina Dogmatica, Titulo Delirii, tradita est.

LIB. VI. APH. LVII.

322. **A** Poplectici autem fiunt maxime, ætate ab anno quadragesimo usque ad sexagesimum.

I.

IN præcedente Aphorismo quosdam morbos citavit nomine distinctos, a Melancholia tamen unica natos, ex quibus per praxin detexit, illam Apoplexiam raro fieri nisi inter quadragesimum & sexagesimum ætatis annum; sed propterea non excludit reliquos morbos ex Melancholia natos; solummodo enim indicare voluit, se expertum esse eo ætatis tempore talem Apoplexiam generari. Duo in hoc loco notanda sunt; primum, hic agi de Apoplexia corporis ex Melancholia; alterum, hanc Apoplexiam frequentius eo ætatis tempore generari, quam reliqui morbi ex Melancholia nati. Omnes causæ, quæ ita possunt comprimere cerebrum, ut liber spirituum fluxus inhibeatur per nervos ad sensum & motum destinatos, omnesque causæ, quæ ita invertunt spirituum indolem, ut inepti fiant ad istas functiones peragendas, illæ omnes Apoplexiam inducere valent; quia vero multæ sunt causæ, quæ talem mutationem inducunt, & unaquæque suam propriam naturam servat, inde necesse erat simul indicare materiem, quæ apoplexiam inducebat, hoc fecit per particulam δὲ, ne cogeretur priorem sententiam repetere, & dein solam Apoplexiam excipere. Quævis ætas suos quasi proprios habet morbos, uti Rhachitis in Infantibus, Pueris Variolæ, Juvenibus Phthisis, Senibus Catarrhus, ita materia Melancholica præcipue generatur inter quadragesimum & sexagesimum ætatis annum. & si aliis ætatibus generetur, non ita solet Apoplexiam inferre. Quare dictum Hippocratis pura est singularis observatio practica, quod etiam dici potest de præcedentibus morbis cuicumque ætati propriis.

Apoplexia
ex Melan-
cholia quo
ætatis tem-
pore præci-
pue genera-
tur?

LIB. VI. APH. LVIII.

323. **S***i omentum exciderit, necesse est putrescere.*

I.

In ventris
vulneribus
omentum
prolapsum
cur citius
putrescit?

Constat ex Anatomicis, Omentum antè obtegere intestina, pendulum hæere a ventriculo & intestino colo in anteriore abdominis parte, inter intestina & superficiem internam peritonæi locatum, magis minusve protendi ad pubem, prout majore vel minore pinguedinis copia fuerit impletum, ita ut in macilentis vix attingat umbilicum, sed in obesis usque in pelvim abdominis descendat, ut observaverunt in Epiplocele. Hoc Omentum paucis componitur vasis & membranis, sed ingenti pinguedinis copia impletum est: igitur in eo debilissimus esse potest motus vitalis, quia ille habetur in partibus firmis, non vero in pinguedine. Si ergo in Ventris vulneribus accidit, ut portio Omenti prolabatur cum vel sine intestinis, Omentum multo citius mortificatum erit, quam intestinum prolapsum, in quo motus vitalis validior. Quia vero in parte vivente non fit putredo, sed in parte mortua, inde in Omento, cujus actio vitalis citius & a leviori causa extinguatur, multo citior fit Putredo, quam in partibus reliquis. Prudentes ergo debent esse Chirurgi in repositione Omenti, nam si mortificatum fuit, & dein reponitur, vita parti repositæ non redibit, & perget Putredo in cavo abdominis, unde multa mala: neque in reponendo duriter tractare debent Omentum, quod valde lacerabile est, nam si inter reponendum videatur vividum, sed interim laceratum fuit, post repositionem tamen corrumpetur. Ut sciat Chirurgus, num Omentum prolapsum sit mortificatum, ad sequentia hæc attendere debet. (1.) Si novit, Omentum ali-

aliquamdiu fuisse prolapsum, aërique frigido & exsiccanti expositum, conjicere potest ex debili cognita actione vitali in Omento, & concrescibili pinguedine, portionem eam prolapsam mortificatam esse. (2) Hoc magis firmatur, si inveniat partem amisisse naturalem colorem, eumque commutatum esse in lividum vel nigrum, quem acquisivit ex concreto in vasculis sanguine & incipiente putredine. Talia si detegit, non erit tutum reponere in ventrem eam portionem Omenti, nam pars ea mortificata, etiamsi fuerit reposita, non recuperabit vitam, sed in malignam corruptionem commutabitur. Conducit ergo tali in casu abscindere partem eam, ut nihil mortui remaneat, antequam reponitur: si vero magnum aliquod vas in ea parte detegitur, præstantius erit in parte adhuc vivente ligare Omentum, & tunc quidquid mortuum est abscindere, ante repositionem: postquam repositio fuit facta, fili ligantis portio extra vulnus pendere debet, ut hujus ope portio ligaturâ intercepta, & dein mortua educi possit per vulnus, quod interim turunda filo alligata servandum est apertum. Ut distinguamus filum turundæ a filo ligaturæ, adhibenda sunt fila coloris diversi. Ex dictis patet, non semper Omentum putrescere si exciderit, sed si aliquamdiu prolapsum fuerit, quali modo hic Aphorismus est intelligendus, ne aliquis in recenti prolapsu abscissionem suadeat. Inanis incessit timor quibusdam, Omento ablato impediri ventriculi & intestinorum coctionem, quum existent exempla contrarium probantia. Hoc autem verum est, Omentum locatum inter intestina & peritonæum faciliorem permittere harum partium motum, quæ partes alias motu peristaltico agitatae, tangentes peritonæum nudum, majorem attritum faciunt, quo aliquomodo inhibetur harum partium actio. Conducit ergo, si fieri potest, relinquere Omentum integrum, ut intestina humectet, suppeditet pinguitudinem venæ portarum, pro bilis confectione, & se interponat inter partes terentes ad evitandum attritum.

LIB. VI. APH. LIX.

324. **Q**uibus a diuturno coxendicis morbo vexatis coxa excidit, & rursus incidit, his mucus innascitur.

I.

Quinam dicatur Coxæ morbus.

Nullibi in toto corpore invenitur articulus major, quam in Coxa, profundissime enim recipitur non solum femoris caput in Coxæ acetabulo, verum etiam præter ligamentum cingens, aliis etiam articulis commune, per aliud teres & tenax in media hujus cavitate femoris os colligitur & retinetur in sua sede: invenerunt quoque Anatomici satis magnam glandulam in hoc articulo, quæ mucum naturalem deponit, ut non solum hic articulus lubricetur a transudante medulla, sed etiam a mucositate hoc naturali medullæ misto. Humores hi actione articuli vel diuturniore mora attenuati iterum absorbentur, concedentes locum novo affluenti humori, ut hoc in articulo perpetua maneat lubricitas. Hoc in articulo magis quam in reliquis generatur Dolor, qui proprio nomine vocatur *ἰσχυρὰς*, & hoc loco vocant Coxæ morbum. Ille autem Dolor generatur a dolentibus dictis ligamentis, vel si Mucus ille naturalis aliquid acre contineat, vel si glandula in eo acetabulo locata tumeat & doleat. Omnes autem hi morbi non permittunt os femoris excidere & incidere: nam dolentia ligamenta tantam prolongationem non permetterent, ut os femoris excidere posset: & glandula tumens extrusionem faciens, reditum impediret. Sed acetabulum mucositate oppletum excidere & incidere permittet articulum, quod paucis videbimus.

Unde muci abundantia in Coxæ articulo, & quid faciat.

II. Coxæ morbus diuturnus non significat, omni tempore adesse dolorem, sed quando dolor aut molestia quævis diu vel continuo, vel per intervalla vexavit illum articulum.

Liga-

Ligamenta illa articulum neſtentia per tam longum tempus vexata morbo tandem amittunt contractilitatem, quod etiam in aliis articulis verum eſt: ſed ſola laxitate ligamentorum non excideret os femoris ex hoc acetabulo, cingitur enim caput offis femoris ligamento, quod omnem ingreſſum liquoris externi intercipit. Conſtat experimentis phyſicis, ſi quis haberet cavitatem firmam acetabulo coxæ ſimilem, corpore rotundo impletam, ut implet caput offis femoris hoc acetabulum, exterius circumquaque obductam accurate impervia membrana, ut ligamenta hunc articulum cingunt, fieri debere validam vim tendentem, antequam quis potuiſſet dictum corpus rotundum ex cavitate ea extrahere; tanta enim deberet fieri tenſio, quæ valeret ſpatium vacuum formare in ea cavitate. Igitur non eſt conceptu facile, ſi maneat illa cavitas vacua, manentibus ligamentis integris, quod tam facile excidere & incidere poſſit ille articulus. Sed ſi haberet ſimilem machinam, aquâ vel alio liquore plenam, qui liquor contineretur in loco eo a laxa ambiente membrana, facile potuiſſet iſtud corpus excidere & incidere: nam ſi excideret corpus iſtud ſeu caput offis femoris, cavitas, ſeu acetabulum coxæ impleretur illo ambiente liquore, & ſi rediret, cederet iterum ille contentus humor in loca vicina, quod minima vi fieri poſteſt. Recte igitur ratiocinatur Auctor, quando concipit acetabulum muco impletum eſſe, ſi offis femoris caput tam facile incidere & excidere poſſit: quum ſine liquoris huius præſentia hoc phænomenon non facile demonſtrari poſteſt, & quia ille humor, qui tunc eo in acetabulo continetur, eſt mucus naturalis vel in morboſam indolem converſus.

LIB. VI. APH. LX.

325 **Q**Uibus a diuturno coxendicis morbo vexatis coxa excidit, his crus tabescit, & claudicant, nisi usti fuerint.

I.

Quomodo
claudicatio
& tabes cru-
ris in spontanea coxæ
luxatione?

DUm diuturna illa causa implens acetabulum Coxæ & laxans ligamenta fecit spontaneam Coxæ luxationem, non est mirum, quod nervus adjacens etiam relaxetur & mucosus oppleatur, quo spirituum fluxus ad musculos moventes crus, & eorum, qui destinati sunt ad actionem nutritionis, aliquomodo retardetur, ut inde hæ actiones fiant languidiores, seu fiat claudicatio in motu animali, & defectus nutritionis in motu vitali. hoc etiam fieri potest prolongato nimis illo nervo & arteria, ut inde minor influxus spirituum & sanguinis habeatur ad eum pedem, quum vasa prolongata simul fiant angustiora.

An hi usti-
one curen-
tur?

II. Vehementer dubito, an uisione illa mala possint præveniri, vel præsentia tolli: nam si urendo aperiretur capsula ligamentosa articuli, ut collectus mucus potuisset effluere, continuum haberetur stillicidium, & ligamenta ita usta deinceps non facile consolidarentur: neque accuratio ligamentorum uisione nata relinqueret eam partem vitalem. Quamobrem satius esse existimo per medicamenta resolventia & discutientia tentare curationem, quam subire truculentam operationem Ustionis.

M E D I C I N A H I P P O C R A T I C A ,

E X P O N E N S .

A P H O R I S M O R U M

H I P P O C R A T I S

L I B R U M S E P T I M U M .

A P H. I.

326. **I**N morbis acutis extremarum partium frigus ,
malum.

I.



Observavimus (*Aph.* 24, III) Acutos morbos absolute positos denotare morbum brevem , vehementem , periculosum , cum adjuncta febre continua calida. Tali in morbo si Extremarum partium frigiditas observatur , malum est , inquit Auctor. Per partes Extremas intelligunt manus & pedes cum suis digitis , tota etiam membra , atque nares & aures , quæ nempe partes remotissimæ sunt a corde , & ipsum truncum corporis non constituunt : hæ partes quoniam magis expositæ sunt aëri externo , citius refrigerantur quam truncus ipse , si causa naturalis calefaciens , id est motus vitalis sit debilis. Ut intelligatur , ex qua ratione frigus extremarum partium sit malum signum in Acutis , perpendendum est , omnes morbos Acutos febri-

H h h h h

les

les habere vehementem circulationem per totum corpus; quare omnes partes inveniuntur calidissimæ seu urentes. Tali ergo in motu vitali aucto per totum corpus frigus extremarum fieri nequit, nisi istis in partibus diminuatur vitalis actio ultra modum; nam si minuatur causa morbi Acuti, extrema quidem magis temperatum calorem acquirunt, sed nunquam eo usque minuitur, ut dici possit frigus; atque in hoc casu calor totius corporis simul minuitur, quando non dicitur frigus Extremarum. Hæc igitur phrasis notat, Exrema fieri frigida non cessante calore in trunco, & frigus fieri sine diminutione morbi. Hoc inquam est periculosissimum: nam si maneat morbi causa, & minuatur circulatio in extremis, quod ex refrigeratione cognoscitur, signum est vires vitæ a morbi materia validissime irritatas tam debiles esse, ut non valeant in partibus extremis proportionatam servare circulationem, quod fieri nequit sine virium summa debilitate. Si nunc hæc duo inter se conferantur, morbus nempe validus & vires corporis debiles, rarum erit, si æger emergat; ergo hoc signum satis magnum periculum portendit.

LIB. VII. A P H. II.

327. **E**X osse ægrotante caro livida, malum.

I.

UT intelligamus, ex qua ratione dicatur malum, si Caro livida fiat ex Osse ægrotante, constare debet, qualis ossium ægritudo intelligatur, & dein quæ sit hujus Livoris causa in carne, ut ex causa perspecta & comperta ad propositum morbum formare possimus malum præsagium. Os ægrotat variis morbis, ut exposuimus in Chirurgia repurgata, hoc autem in loco talis capiendus est

est morbus ossis, qui aliquam corruptionem vel cariem in osse format, ut ex morbo eo Caro circumjacens ita afficiatur, ut suum colorem naturalem commutet in livorem. Carnis autem naturalis color in Livorem commutatur, si sanguis ruber in vasis contentus concreascit: hoc experimur etiam in tubulis minimis vitreis sanguine calenti impletis; nam si sanguis ille diu hæsit in illo tubulo, donec globuli rubri sanguinis soluti in massam concreverint, dimittentes liquorem pellucidum non concrescibilem, color antea ruber in livorem commutabitur sponte. Carnis quoque color ruber livescit, imo tandem nigrescit, si superveniente putredine corrumpatur. Ergo Livor in adjacente carne signum est, sanguinem stagnantem esse concretum, & ita esse ineptum circulationi; talis autem fieri nequit, nisi tantus sit defectus in circulatione, ut sanguis fluidus servari nequeat: itaque Livor est signum defectus virium vitalium, & concretionis sanguinis. Verum talis status diu durare nequit, quin pars ea moriatur, & in putrilaginem abeat, unde tunc formatur ulcus sordidum cacoëthes. Neque minoris momenti est, si Livor oriatur ex sanguine corrupto, quia nunquam corrumpitur, nisi partis vitalis actio sit extincta aut nimis debilitata. Igitur si ex Osse ægrotante talis fiat caro, sive quod Os corruptum ita inficiat Carnem, sive quod Caro adjacens ita sponte moriatur, in utroque casu malum est, nempe generabitur ulcus sordidum Cacoëthes ex carne corrupta, & osse mortificato, vel carioso, qualia ulcera difficulter curari possunt. Ipsa Caro Livida facile præfagire potest etiam Ossis corruptionem; nam quia significat, ea in parte subsistere circulationem, periosteum ex carne accipiens vasa circulatoria, privabitur etiam motu vitali, quare os subiectum, quod ex periosteo hoc vitales humores accipit, defectu ejus morietur, & ita lenta carie consumetur.

LIB. VII. APH. III.

328. **A** Vomitu singultus, & oculi rubri, malum.

I.

DUO numerat symptomata conjuncta, quæ si vomitui superveniant naturali, vel a vomitorio excitentur, malum præfagium præbent, quæ autem sejuncte a Celso proponuntur. Utraque sententia est vera, sed pejus est, si duo mala symptomata superveniant, quam si unum accedat, imo si insuper accedat Delirium, lethale est signum. Hippocratis tempore in consuetudine erat sæpius propinare Vomitorium, ut quoque monuimus supra de purgantibus, quam consuetudinem ab Ægyptiis acceperunt; & inde magis necesse erat necessarias cautelas adjicere, quam hoc tempore, quando rarus Vomitoriorum est usus. Olim enim magnum auxilium in Vomitu locarunt, sed sine ratione, quum vix quidquam boni præstet Vomitorium, nisi exonerare ventriculi contenta, vel etiam interdum bilem corruptam; sed si vitium hæreat in ventriculi lateribus, vel dispersum, Vomitorium malignum illum humorem eliminare nequit, sed potius irritat crabrones. Egregie summus vir in praxi medica Sydenham observavit in diversa constitutione epidemica, Dysenteriam præveniri posse dato vomitorio, si nempe oriatur a bile corrupta relicta, sed alio tempore augeri periculum, si similia signa adsint, sed ex Erysipelate vel Inflammatione ventriculi. Ex signis in hoc Aphorismo traditis de malo illo eventu Vomitus facile judicare possumus: nam si esset humor morbosus, qui concitavit Vomitum, eo evacuato, cessaret non solum vomendi conatus, sed & corpus liberatum ab illo alieno, sentiret se liberatum. Ita etiam a Vomitorio dato, si omne me-

dica;

dicamentum fuerit exantlatum, nullamque ventriculo læsionem intulerit, neque Singultus, neque Oculi rubicundi remanebunt. Sed si in Vomitu a natura excitato non fuit materia morbi expulsa, aut si Vomitorium læsionem ventriculo intulerit, quædam symptomata relinquuntur, inter quæ numerat Singultum & Oculos rubicundos, quæ malum præsagium proferunt. Si enim superveniat Singultus, inducitur species Convulsionis (Aph. 304, 1.) hic ut signum & ut causa malum infert. Quippe singultus fatigationem inducit sine levamine mali; & signum est, vel nimiam fuisse factam evacuationem, ut monuimus etiam in Purgatione (Aph. 197) & sanguinis fluxu (Aph. 196.) vel vomitorium intulisse læsionem, ut notavimus in Helleboro (Aph. 194.) vel ipsum ventriculum fuisse inflammatum vel erysipelate tentatum, quæ omnia si Singultum post vomitum inferant, augmentum mali declarant. Oculi rubicundi fere semper fiunt in valide vomentibus, sed debet rubedo illa brevi postea cessare: si autem rubicundi manent Oculi, indicantes sanguinem urgeri in tunicam adnatam oculi per motum auctum in encephalo, facile fieri potuit, ut ex cerebro læso ille Vomitus fuerit concitatus (Aph. 315, 1.) quod pessimum est signum, quum vomitus talis nunquam adferat levamen, sed magis urgeat sanguinem ad caput, & cerebrum magis opprimat.

LIB. VII. A P H. IV.

329. **A** Sudore horror, non bonum.

I.

NUlla frequentiore evacuatione eliminatur morbi materia, quam sub forma Sudoris, est enim evacuatio totius corporis, quæ per totum corporis ambitum eliminat humorem. Sed ut sudor sit bonus, debet

quantitate conveniens esse, ut ita eliminat omnem morbi materiem, & tamen non tanta copia, ut pariat bonorum humorum defectum; fieri debet a prævalentibus viribus vitæ, nam si fiat vi morbi, non eliminabitur materia morbi, sed potius humor sanus; si fiat ex colliquatione, bonus & malus humor sine prægressa separatione evacuatur, & ita liberare non potest corpus a materia morbi. Quod si fiat Sudor criticus auferens morbi materiem, & non nimis magna quantitate, corpus tale se levatum sentiet alieno humore liberatum. Si vero omnis materia non fuit evacuata, aut si Sudor sit colliquativus, vel vi morbi expulsus, materia remanens Horrorem inducit, quum omne alienum nervis applicatum Horrorem inferat. Ergo si post sudorem nascatur Horror, unum ex his antecedentibus significat in corpore. Verum periculum non est idem in omnibus his designatis causis; id autem commune est omnibus, nihil ex his bonum esse: nam si omnis materia non sit eliminata, subsequente sudore eliminari potest, ergo non valde magnum malum: sed si ex Colliquatione Sudor fiat, Horror subsequens absolute malus esset dicendus. Quare Auctor non potuit secundum experientiam dicere, Malum, sed dicere debuit Non bonum, quum pro diversitate causarum talis Horror post Sudorem majus & minus malum præfagiat.

LIB. VII. APH. v.

330. **A** *B* *Insania dysenteria, aut hydrops, aut mentis emotio, bonum.*

I.

Ex mania
Dysenteria
bonum.

Hippocratem per maniam intelligere Delirium vehemens sine febre (*Aph.* 99, III.) & per Dysenteriam alvi copiosam egestionem & frequentem cum ventris torminibus (*Aph.* 135, I) supra observavimus.

Ex

Ex quibus colligere possumus, utrumque morbum generari posse ab humore acris, qui in encephalo inæqualem cerebri motum facit, & ita maniam inducit, sed in intestinis dolorem & ejectionem copiosam. Si ergo præcedat Dysenteria & dein mania, significare potest, materiem illam acrem ferri ex intestinis ad caput, quod pessimum signum; sed si feratur a cerebro ad intestina, inter quas partes maximus est consensus, valde bonum est, quia fertur materia acris a parte magis principi & ex qua non potuit evacuari ad partem minus principem, & ubi satis commode evacuari potest. Ex hac observatione actionis naturæ monemur, nos debere in mania, si nascatur ex humore acris, sollicitare alvum medicamentis purgantibus, ut eo derivetur humor & evacuetur.

II. Observavit etiam Auctor, Hydropem supervenientem sustulisse maniam. Non videtur ille morbus (*Aph. 273, 1*) ullam convenientiam habere cum mania, Hydrops enim est morbus ex abundantia lymphæ, cum motu partium firmarum languidiore, laxitate solidorum, dum vero in mania habetur humor acris stimulans, vires corporis ingentes, motus circulatorius major. Si tamen nascatur Hydrops, ille morbus significare nequit humoris acris translationem, quam in Dysenteria observavimus, & propterea bonum præsagium dedimus. Sciendum autem est in praxi, omnem mutationem morbi non fieri per materiæ translationem; sæpe etiam mutatur materia in sua indole, & quando signa docent bonam fuisse factam mutationem, ea tunc quoque signa bona dicuntur; ita apparentia signa suppurationis in morbis inflammatoriis dicuntur bona, quia bonam mutationem materiæ morbi indicant. Tali etiam modo Hydrops ex mania bonus dicitur, quia notat acre stimulans Maniam faciens fuisse mutatum in vappam, quum Hydrops generari non possit, quamdiu manet id acre stimulans, quod non permetteret tam languidum motum vitalem, & lymphæ collectionem. Ergo quoties ea signa, quæ ab Hydrope separari nequeunt, apparent, toties quoque ex istis colligere possumus, id acre subactum esse.

Ex mania
hydrops bonus
num.

esse. Disputant autem practici, num sit ea mutatio bona dicenda, quum Hydrops sit morbus non minus periculosus & difficilis quam mania. Fatendum est, quasdam Hydropis species non minus periculosas inveniri, sed qui Hydrops generatur ex sola laxitate fibrarum & motu languidiore, ut sæpe experti sumus finitis morbis sine relictâ obstructione vel induratione aliqua partis, ea Hydropis species sæpe sponte evanescit, vel facillime cedit diureticis & roborantibus. Quia vero talis species Hydropis sequitur Maniam, inde recte bonum est dicendum.

A mania
Ecstasis,
bonum.

III. Tres species in Ecstasi distinguunt Veteres; (1) qui nihil loquuntur, neque movent sua membra uti fanatici, quasi alta meditatione abrepti & attoniti hærentes: (2) qui etiam nihil loquuntur, sed tamen inquieti sunt, continuo locum mutantes, ut ne quidem per momentum in eodem loco quieti manere possint, quod melancholicis frequens est: (3) qui furiosi sunt, continuo loquentes & inquieti, uti in phrenitide. Qualem autem speciem ex his intelligat Auctor, facile conjicere possumus: nam signum debet esse, materiem acrem irritantem mitescere, minusque agitare cerebrum: igitur crederem, in hoc loco intelligi speciem primam, quia mania majorem cerebri agitationem significat, quam observatur in prima illa specie Ecstasis. Adeoque ea mutatio facta in mentis alienatione, quæ declarat minorem acrimoniam materiæ, bonum signum est, quum præbeat spem perfectæ curationis.

LIB. VII. A P H. VI.

331. **I**N morbo diuturno, appetitus prostratus, & meracæ dejectiones, malum.

I.

In Chronicis
Apositia,
malum.

Generalis morborum divisio ex duratione est, in morbos Acutos (*Aph.* 24, III) qui ita dicuntur usque ad quadraginta dies, & in Chronicos, qui ultra terminum

terminum istius temporis excurrunt. Πολυχρόνιος ergo est morbus, qui istud tempus multum superat. Hujusmodi morbi Chronici sibi similes sunt a principio usque ad tam longum tempus; vel subierunt aliquam mutationem, ut si materia cruda, vel pituitosa transeat in corruptelam, ita ut ex una specie morbi Chronici fiat altera: vel morbus Acutus interdum transit in morbum Chronicum. Omnibus his in morbis Chronicis habetur corruptio spontanea, nam si vires vitæ valent, intra quadraginta dies materia morbi vel est superata vel expulsa: si autem vitæ vires sunt debiliores, vel morbi materia tenacior, vel copiosior, quam ut viribus vitæ superari possit, ultra istud tempus protrahitur morbus, & materia illa retenta sensim in spontaneam corruptelam magis vergit, quia vitæ vires non valere bonos servare humores, neque emendare alienos. His nunc in morbis, qui habent humores spontanea mutatione corruptos, cum virium debilitate, pronunciat Apositiam, malum esse. Antequam hoc possumus intelligere, repetenda sunt ea, quæ exposuimus in Exercitatione nostra de fame; famem nobis datam esse, ut indicaret, num defectus esset alimenti in nostro corpore; eam fieri posse minorem, abolitam, & cum fastidio, quales species vocant ἀνορεξίαν, ἀπρωσίτιαν & ἀσιτίαν, a multis causis; victum tenuem non convenire Chronicis (Aph. 4, vi.); omnem causam minuentem & abolentem malam esse. Igitur Apositia ut signum & causa malum portendit. Denotat enim, corruptos esse humores in corpore, qui in ventriculum confluentes appetitum naturalem extinguunt, & inde, licet ingerantur alimenta, ea corruptis mista non commutantur in bonum chylum: & quia debita quantitas alimentorum requiritur, ut sustententur vires in tam longo morbo, illa quantitas suppeditari nequit, propter inappetentiam vel fastidium; aut si ægri ingerant, ingesta non convertantur in bonum succum. Itaque in Convalescentibus & morbis Chronicis tuti non sumus, quamdiu appetitus naturalis non redeat, quia est Cacochyliæ signum. (Aph. 127, ii.)

Et meracæ
dejectiones,
malum.

II. Num duo hæc symptomata Apositia & ejectiones Meracæ sint jungenda in Chronicis, ut malum prænuncient, non consentiunt Commentatores. Ego vero puto separatim & conjunctim præfagire malum, sed ex generali regula majus malum est, si duo mala signa jungantur, quam si unicum habeatur. Hippocrates passim inculcat, Meracas dejectiones malas esse, sive sint pituitosæ, biliosæ, melancholicæ, vel sanguineæ, quia recrementa alimentorum fecibus mista faciunt, ut nunquam meracæ conspiciantur nisi ex morbosa causa. Quod autem in Chronicis cum Apositia conspiciantur Meracæ dejectiones, illæ notant, tantam esse morbosorum humorum copiam in intestinis, ut ne quidem recrementa alimentorum conspici possint: vel quod ingesta alimenta, antequam deponunt sua recrementa, ita fuere corrupta, ut exhibeant massam pul-taceam corruptam ubique sibi similem. Ergo malum est signum, sive respiciamus ad multitudinem materiæ morbosæ, sive ad corruptelam inductam.

LIB. VII. APH. VII.

332. **A** Multo potu rigor, & delirium, malum.

I.

Vitia & mores sui temporis non parum perstringit multis locis, Græci enim excelluerunt potationibus, lucubrationibus, & ut mala ex his nata tollerent, frequens fuit vomitorii & purgantis usus: his in omnibus annumerat mala, simulque tradit cautelas. Hoc in loco indicat mala, quæ observavit provenire ex multa potatione; cogitandum est hic intelligi potum vini vel spiritus inebriantis, ex cujus potionis abusu his etiam temporibus observavimus Rigorem & Delirium fuisse nata, istaque

istaque mala perseverasse usque ad mortem, in aliis autem diu perstitisse, qui postea convaluere. Ut strenui illi bibitores intelligant, se non semper impune corpus implere, scire debent, spiritum fermentatum ita interdum obruere cerebrum, istudque perturbare, ut vel brevi tempore apoplectici pereant, vel convulsione extinguantur, (*Aph.* 198, II) vel per longum tempus stolidi, & paralytici maneant, quod etiam nimis frequenter observavi. Hoc autem loco duntaxat videndum, quomodo Rigor & Delirium ex nimio meri potu possit generari, & cur sentiat malum. Mirantur multi mustum destillatum vappam exhibere, & potum non inducere ebrietatem, sed post fermentationem præbere destillando spiritum ardentem, atque tunc potum inebriare: qui autem assequitur experimenta Chemica, ille facile hanc mutationem concipit, quia oleum vegetabile fermentando redditur volatile, exuit suam non miscibilem naturam in liquorem aquosis miscibilem, & tunc demum assumptum inducit ebrietatem; adeo ut oleum vegetabile fermentatione mutatum, tandem hanc specificam virtutem acquirat, atque non differt, ex quovis succo vegetabili formatur; imo decocta eodem modo fermentata similem spiritum producant, ut patet in Zytho & etiam in Hydromele. Igitur oleum vegetabile fermentatione attenuatum istud est, quod potum ebrietatem inducit. Regula ergo est generalis, Rigorem & Delirium nata a majore ingestione spiritus fermentati, esse malum. Dum istud spirituosum mediocri copia fuit ingestum, suo stimulo calefacit; sed si majore copia ingeritur, vis vitæ ab hoc alieno ita obruitur, ut Rigorem (*Aph.* 156, II) inferat: quod periculo non caret, fieri enim interdum observatur, vim vitæ suppressam eluctari non posse. Igitur malum est signum Rigor, quia notat, alienum esse applicatum nervis, & simul vires corporis opprimi. Huic si accedat Delirium, mali indicium augetur, nam tunc non solum agitatum & oppressum est organum vitale & motus animalis, verum etiam ita simul est deturbatum cerebrum, ut mens

non amplius constet. Hinc omnes encephali functiones sunt turbatae, quod non nisi valida fieri potest causa, quam superare interdum actio vitalis non valet.

LIB. VII. APH. VIII.

333. **A** Tumoris intus ruptione, exsolutio, vomitus & animi deliquium.

I.

Ex qua causa tumor intus rumpitur.

Tumor seu Tuberculum, græcis dicitur $\phi\upsilon\mu\alpha$, præprie si pus contineatur in quodam sacco vi morbi facto: est ergo Abscessus purulentus quadam in parte corporis, qui lapsu temporis rumpi potest interne vel externe, id est Pus in eo sacco membranaceo contentum ruptis repagulis effunditur in loca vicina minus resistentia. Dum enim pus continetur in quadam parte dilatata, ille saccus ab omni ambitu non æqualiter sustentatur, unde contentum pus more omnium humorum ea latera, quæ minus firma sunt & minus fulta, distendit, unde sensim dehiscuntibus fibris eam partem constituentibus, magis magisque secedunt, admittuntque puris ingressum in earum interstitia; quod liquecendo & corrumpendo, tandem quasdam fibras solvit, & ita sibi viam exitui pandit: quod si ad loca interiora minor sit firmitas hujus sacci, vel minor sustentatio, pus ad interiora erumpit funditurque in cava quædam naturalia, uti in pectoris, ventris, ventriculi cavitates. Ita quidem homo liberatur a dolore eo, qui ex tensione producebatur, & ita videtur levare, sed quia pus non emittit, id stagnando magis corrumpitur, & accedente novo pure, ille locus magis impletus nova inducit mala; hoc ut sciamus, quædam observavit Auctor phænomena, quæ monent, talem abscessum vel tumorem intus rumpi.

II. Quia

II. Quia Tumor intus disrumpens sæpe externe nulla dat signa ruptionis, necesse est, ut ex aliis inductis mutationibus cognoscamus, num talis interna ruptio sit facta; ex multis aliis primo numerat *ἐκλυσιν*, quod Exsolutio exponitur, refertur in hoc loco ad actiones animales & vitales, quando homo hucusque vix quiescere potuit, nunc quasi viribus privatus languidus decumbit; cujus pulsus ex irritamento erat satis valens, invenitur languidior & debiliior: tensio enim illa in lateribus tumoris, rupta illo, prompte cessat, unde cessante illo irritamento omnia quiescunt sed infideli signo, quæ antea agitata se validissime movebant. Alterum signum est Vomitus, qui a multis causis concitari potest, ut passim observavimus. omnes autem hæ causæ non agebant immediate in ventriculum ipsum, sed interdum etiam in remotioribus partibus, modo ex causis istis generaretur motus ventriculi inversus tam validus, qui potest musculos abdominales in consensum trahere, ut ita conspirantibus his binis actionibus, contenta ventriculi reddantur per os; nam neque solus inversus ventriculi motus, neque sola musculorum abdominis constrictio Vomitus facere potest, sed his binis coöperantibus. Hoc quidem signum interdum provenit ex rupto abscessu ad interiora, sed inconstans est; sæpe enim observavi ruptionem internam sine Vomitu superveniente: nam qui in empyema incidunt ex rupta Vomica pulmonis vel pleuræ, raro a vomitu vexantur: quare si accedat, significare potest, tumorem fuisse ruptum circa vel in ventriculo. Denique sequitur Animi deliquium, *λειποψυχία* ex intus rupto tumore, quando ita minuitur sensus & motus animalis, ut homo vix mente constet, & totus fere motus vitalis cesset. Hoc quidem fieri potest nimia facta evacuatione, qua vasa cingentia tumorem sustentaculo orbata, tantam in se recipiunt sanguinis copiam, ut in reliquo corpore non remaneat sufficiens ad circulationem continuandam. Raro autem istud fit a rupto interno abscessu purulento, sed si intus fuerit Varix aut Aneurysma, horum ruptione, quia ita effun-

A tumore
intus rupto
Exsolutio,
Vomitus, &
Animi deli-
quium.

ditur sanguinis ingens copia, facile fieri potest Lipothymia & etiam Syncope.

L I B. VII. A P H. IX.

334. **A** *Sanguinis fluxu delirium, aut etiam convulsio, malum.*

I.

Nisi experientia constaret, homines ex nimio sanguinis fluxu incidere in Delirium & Convelli, plane videretur negari debere, quum in Delirio & Convulsione major videatur esse corporis actio, quam in sanis, quæ actio semper debilitatur sanguinis fluxu: atque constans est mos in Dilirantibus multum sanguinis detrahere, ut minuat ille impetus. Observatio tamen practica Hippocratis dicta confirmat & sæpe etiam in praxi observavi, præcipue post lochiorum profluvium in puerperis, quæ interdum per longum tempus delirarunt, aut convellebantur. Quomodo ex nimio sanguinis fluxu generatur Convulsio superius (*Aph.* 196.) exposui, quare hoc loco videndum, quali modo generatur Delirium. Ut mens in nobis constet, boni spiritus esse debent in cerebro, & qui moventur æquabili fluxu, nam si spiritus modo inficiantur per quædam assumpta, vel morbosam materiem, uti in Melancholicis experimur, generatur Delirium; & solo motu cerebri turbato, quemadmodum in capitis læsionibus & meningum inflammatione detegimus, mens quoque delirat. Igitur solus motus turbatus si fieri potest per nimiam sanguinis evacuationem, ille valet Delirium generare. Verum quoties ita destruitur æquilibrium in viventibus, toties turbatur etiam motus, & inde mirum est, quod non frequentius Delirium generetur post copiosam evacuationem. Hoc boni inde habemus,

mus, ut reddamur cautiores in imperanda venæ sectione, sed ut inde discamus, nos debere per analeptica & roborantia restaurare vires, ut ita compescamus Delirium.

LIB. VII. APH. X.

335. **A**B ilco vomitus, aut singultus, aut convulsio, aut delirium, malum.

I.

Vehementem Intestinorum tenuium dolorem, in quo flatus veluti circumvolvuntur & urgentur sursum, vocari Ileon seu Volvulum, supra observavimus (*Aph.* 101, xiv.) Hujus causæ multæ sunt, sed semper validissimæ, ut nunquam vel rarissime aliquid deponatur per anum, sed omnia urgeantur sursum, imo suppositoria & clysmata injecta. Ergo non est necesse, ut contenta rejiciantur per os, quemadmodum multi statuunt. Hoc satis ex Textu constat, nam dicit Auctor, si Volvulo Vomitus superveniat, malum. Si enim Vomitus perpetuo adesset, non esset signum malum, neque supervenire posset. Nunc autem Vomitus superveniens propterea malum signum præbet, quia indicat non solum Intestina in motum inversum cieri, sed & ipsum etiam ventriculum, quare ab ano ad Oesophagum motus peristalticus habetur inversus cum dirissimis doloribus, quod pejus est, quam si sola Intestina fuissent affecta: atque Vomitus ille intercipit omnem applicationem medicamentorum, quæ ad Volvulum curandum ore dantur, nam statim ac ingesta fuere, Vomitu tunc rejiciuntur, ut istis nihil efficere valeamus. Inde Vomitus est malus & ut signum, & quia intercipit curationem necessariam.

II. Singultum fieri ab affectione Oesophagi, quando diaphragma spasmodice inde trahatur deorsum, supra (*Aph.* 304, 1.)

Ab Ileo Vomitus, malum.

Ab Ileo Singultus, malum.

304, 1.) notavimus. Si ergo motus inversus intestinorum non solum propagetur ad ventriculum, sed etiam ad oesophagum, signum adhuc est pejus, quam si solus Vomitus adesset, quia latius dispersus est morbus, plures partes in consensum trahit & inducere incipit Convulsionem, ut nobis ex Singultu patet, qui species Convulsionis est.

Ab Ileo
Convulsio,
malum.

III. Singultus quidem est species Convulsionis, sed qui a leviori causa generatur, quam Convulsio totius corporis, & qui ex affectis tenuibus intestinis facilius per consensum potest generari, propter continuitatem membranarum, quam Convulsio totius corporis: propterea si superveniat Convulsio, majus significatur malum, quam prædici potest ex superveniente Singultu.

LIB. VII. APH. XI.

336. *A* Pleuritide peripneumonia, malum.

I.

Translatio
triplex.

Pleuritidis (*Aph.* 109, iv) & Peripneumoniæ (*Aph.* 109, v.) definitionem dedimus, ex quibus colligitur, Auctorem, si absolute hos morbos ponat, intelligere Pleuritidem & Peripneumoniam inflammatoriam vel erysipelatofam. Tribus modis a Pleuritide fieri potest Peripneumonia. (1) Si valida sit Pleuritis, quæ sensim aucta etiam in consensum trahit Pulmones, ut diximus, singultum & convulsionem fieri ex Ileo. Tunc manent æque valida & interdum validiora symptomata Pleuritidis, & insuper accedunt signa Peripneumoniæ: quod pessimum est, quia tunc æger laborat duobus morbis simul, quorum accedens periculosior est præcedente. (2) Si materia inflammatoria vel erysipelatosa imperfectam translationem faciat ex Pleura in Pulmonem: levatur tunc quidem aliquomodo

a dolore lateris, sed magis aggravatur in respiratione & anxietate. Hæc mutatio quidem minus est periculosa, sed tamen pejor, quam si non accessisset Peripneumonia, quum omnis imperfecta metastasis sit mala, & majus malum est, pulmones esse affectos quam pleuram. (3) Si vero perfecta fiat materiæ translatio ex pleura in pulmones, ut æger integre liberetur a lateris dolore, sed aggravetur in respiratione & anxietate, neque illa perfecta metastasis laudabilis est, quia fertur materia a parte magis principi & minus utili ad partem magis principem & vitæ utilissimam. Galenus dicit quibusdam in exemplaribus, malum adjectum inveniri, eo scopo ut solummodo indicaretur unus morbi in alterum commutatio; sed sive istud malum inveniatur adjectum sive non, ex data descriptione semper tamen malum est signum, in quocunque casu accipiat. Multi autem disputant, fieri non posse ex pleura in pulmones translationem, quum sint duæ partes distinctæ, at illi nesciverunt, arteriam bronchiale plerumque ex intercostalibus oriri, & quia arteriæ valvulis carent, facile esse, partes utrasque ex eodem trunco arterias habentes communi morbo laborare posse: neque attendunt, omnem sanguinem totius corporis per pulmones ferri debere, quare pulmones facilius, quam quævis alia pars, eo morbo corripipi possunt.

LIB. VII. APH. XII.

337. **A** Peripneumonia phrenitis, malum.

I.

QUod statim observavimus de translatione materiæ ex Pleura in Pulmones, hoc etiam est observandum de translatione ex Pulmonibus ad Encephalum, ut
 K k k k k ibi

ibi faciat Phrenitidem. (*Aph.* 109, vii.) Videtur tamen obflare, Pulmones æque esse organum vitæ necessarium, quam partes in Encephalo: verum si quædam fuerit morbi materia collecta in Pulmonibus, illa tamen potest reddi per sputum: dum vero ex Encephalo vix datur locus pro exitu. Est etiam inter Metastasis regulas receptum, omnem translationem ex loco, ubi evacuari potuit, ad locum ubi non potest evacuari materies, esse malam; neque laudanda translatio ab inferioribus ad superiora. Neque per Phrenitidem supervenientem constat, totam Peripneumoniam fuisse sublatam, quum raro inter has partes perfecta habeatur metastasis. Denique si soli pulmones sint affecti, æger mente constans, & morigerus permittit, ut omnia auxilia adhiberi possint; sed si in Phrenitide mente sit captus, non solum periculosior morbus ex recensita metastasi, verum etiam æger respuet omnia auxilia adhibenda, neque concedit quietem corpori, ut morbi materia ad maturitatem deduci possit, atque continua corporis agitatione admodum consumit spiritus. Recte igitur dixisset Auctor, pessimum est signum. Hanc autem translationem adscribere cum Galeno & ejus Affectis, vaporibus ex pulmonibus elevatis, cerebrum opplentibus, observationibus anatomicis non respondet. Hoc autem istis est condonandum, quibus circulatio sanguinis per arterias, & communis nervorum & membranarum consensus non satis fuit cognitus. Sed materia Inflammatoria vel Erysipelatosa, quæ aggreditur pulmones, ea etiam potest per alias arterias ferri ad Encephalum, ut partium contentarum motum perturbet; vel ita agitare nervum, ut alter cohærens, sed ad aliam partem tendens, in consensum trahatur, quod passim in his operibus observavimus.

LIB. VII. APH. XIII.

338. **A** *B ardoribus vehementibus convulsio, aut tetanus, malum.*

I.

L Item nostram non facimus, num Ardor καῦμα vel Vulnus τραῦμα, sit legendum, quum utraque sententia sit vera. Duntaxat observaturi, quomodo ex Ardore vehementi dicta mala generari possint. Tribus modis vehemens Calor corpori conciliatur, actu calidis, vel potentia calidis applicatis, vel ab interna causa morbose. Hanc ultimam speciem Auctorem hoc loco intelligere autumo, quum versetur in tradendis regulis, quæ indicant mala, si unus morbus alteri superveniat. Videndum ergo erit, quomodo causa interna possit inducere Ardorem vehementem. Constanti observatione comperimur, causam circulationem facientem pari passu cum aucta circulatione augere calorem: omnis enim causa, quæ auget circulationem, ea quoque auget Calorem nostri corporis naturalem, & vicissim ex languidiore circulatione generatur corporis frigiditas. Hoc autem loco non est concipienda sola velocitas, quum motus circulatorius validus esse possit cum parva velocitate, quando ad extrema arteriarum simul habeatur fluxus impedimentum. Quare hic accipiendus est impetus, quo urgetur sanguis, ut transeat per vasa, non vero ipsa velocitas, qua pergit. Et quod memorabile est, eadem causa pellens cumposito impedimento ad extremitates, majorem calorem faciet, quam si libere perfluere possit. Arteriæ enim tunc magis sanguine turgentes faciunt, ut earum fibræ motu vitali agitatæ, cum majori applicatione ad se invicem compressæ, validiorem attritum faciant. Igitur ex solo motu vitali validiore, vel ex sola resistantia ad extre-

mas arteriarum majore intenditur corporis Calor, sed fit vehemens, si utræque hæ causæ simul operantur. Si autem solum obstaculum sit causa, tandem nimis magna copia sanguinis collecti in arteriis opprimuntur vires: quando calor major convertitur in frigiditatem. Sed si motus vitalis intenditur sine impedimento ad extremitates arteriarum, is motus sensim majorem Calorem concitabit, qui tamdiu continuabitur, donec consumti sint spiritus, vel sanguis ita compactus, ut transitui sit ineptus; quod in febribus Ardentibus sæpe experimur. Constat ergo ex his, Ardorem vehementem semper exigere vim vitæ instigatam per stimulum quodcunque. Si nunc tandem ex Vehementibus Ardoribus generetur Convulsio aut Tetanus, qui morbi generantur ex motu animali involuntarie validius agente, signum est, stimulum istud non solum agitare motum vitalem, qui facile a stimulo quovis movetur, verum etiam motum animale, qui non nisi ex valida causa contra voluntatem nostram patitur moveri. Ergo ex Convulsione & Tetano superveniente, quoniam illa actio non tollit stimulantem causam, & quia designat illam causam admodum esse magnam, atque motum animale in consensum trahi, hæc symptomata supervenientia malum præsagium præbere debent.

LIB. VII. APH. XIV.

339. **A** *Plaga in caput, stupor, aut delirium, malum.*

I.

EX Anatomicis constat, in cranio contineri Cerebrum & Cerebellum molle, pulposum, multis vasis tenerrimis intertextum, ex quibus partibus incipiunt omnes canaliculi nervosi ad sensum & motum destinati: invenerunt accuratissimi hodierni Anatomici, canaliculos nervo-
fos

fos ad motum destinatos, duriores & tenaciores esse, quam qui sensibus inserviunt; quare hi canaliculi nervosi, qui ad sensum sunt destinati, facilius destrui & turbari possunt a causa externa concutiente, quam qui ad motum pertinent. Si ergo concutiatur Caput, sive sit simplex concussio, sive Contusio, sive Vulnus, fieri facile potest, ut Encephali contenta perturbentur, aut vasculum aliquod dirumpatur, ut contentum sanguinem evomat. Unde ex Capitis plaga multa fiunt mala, ut etiam levissima plaga capitis sit periculosior, quam magna contusio vel vulnus aliarum partium: inter hæc mala symptomata multa, quæ indicare possunt, contentum Cerebrum esse læsum, citat Stuporem & Delirium: non quod plura accedere nequeant signa mala, sed quia observavit ex his supervenientibus, ægrum post plagam periisse. Stupor *ἐκπληξίς* tunc dicitur præsens, si organa sentientia affecta non faciant, ut mens nostra illam affectionem percipiat. Talis Stupor est universalis per totum corpus in omnibus sensibus simul, vel est particularis in quodam organo, vel quadam corporis parte, quando diversa accipit nomina, uti surditas, cæcitas, adipisia, dolorem non sentire &c: Hoc autem loco intelligi debet privatio omnium sensuum, ut ægri apertis oculis jaceant non videntes, nec audiant strepitum, neque vellicati sentiant, sed tamen moveant vel movere possint musculos motus animalis. Signum ergo est, eam partem cerebri vel esse compressam vel turbatam, ex qua oriuntur nervi ad sensum destinati. Homo autem Delirat, quando per nervos sensuum externorum adferantur motiones, quæ non fuere concitatae in organo sentiente, sed alibi, & mens tunc simul ratiocinatur ex his alienis perceptis, quod tunc quoque fit, si illa pars cerebri afficiatur, cui mens nostra consentit. Ideoque tam in stupore generali quam in Delirio tali, videtur eadem cerebri pars affecta, nempe ea, cui Deus voluit ut mens nostra consentiret: sed in Stupore omnis communicatio per canaliculos medullosos vel nervosos videtur intercepta; in Delirio autem eadem partes inordinate ab interna causa videntur agitatae. Sive er-

go hic vel ille modus fumatur, semper signum est, aliquam Cerebri partem esse affectam: & quia certe scire non possumus, num causa illa comprimens vel turbans superari possit, ea signa supervenientia post plagam capitis periculosissima sunt.

L I B. VII. A P H. xv.

340. **A** *Sanguinis sputo puris sputum, malum.*

I.

Sanguis ruber ita coarceetur in suis vasis cruentis, ut in statu sano ne guttula exeat, si ergo expuitur sanguis, signum est, vel fines arteriarum aut venarum ita esse dilatatos, ut sanguinem transmittant, vel aliquod vas arteriosum aut venosum fuisse ruptum. Experimur omnibus in partibus, si modo excipiamus pulmones, sanguinem emissum per vascula dilatata, non relinquere ulcus, nam vasculis constriictis iterum recuperatur perfecta sanitas illa in parte. Si autem ex vasculis ruptis exstillet sanguis, istud vulnusculum plerumque purulentiam aliquam producit, cujus auxilio partes illæ separatæ consolidantur. Quoties ergo post sanguinis emissionem generatur Pus, signum est eam evacuationem fuisse factam per vasorum læsionem, quæ vasa tempus consolidandi exigunt, quod semper pejus est, quam ex vasis solis dilatatis. In pulmonibus autem ut diximus hoc non semper procedit, quia sanguis in pulmonibus effusus sponte effluere nequit, uti ex partibus reliquis; sed quia attollendus est contra naturalem gravitatem, subsistens in bronchiis & vesiculis pulmonum corrumpitur, qui dein sanguis acris factus, corrodens adjacentes partes, ulcus format, quod pus exhibet; hoc autem non ita verendum in aliis partibus, nam si proveniat
ex

ex naribus, vel faucibus sine vasorum læsione, ut & in ventriculo & intestinis, istis in locis non tamdiu stagnabit, ut suscepta corruptela ulcus formare possit. Si autem in his partibus sanguis manat ex vasculis ruptis, tunc tandem pus formatur & ejici potest, quod interdum quoque observavi in sanguinis sputo ex faucibus per læsionem vasorum. Ergo generaliter verum est, a sanguinis sputo puris sputum esse malum, quia designat relictum fuisse ulcus purulentum in partibus internis, vel sanguinem ex pulmonibus fuisse evacuatum, ubi pessima fit sanguinis effusio ex ratione superius data. Quia vero omnium maxime post sanguinis sputum ex pulmonibus exspuitur pus, inde ex hoc phænomeno apparente malum præfagire possumus, nam nullibi ulcera difficilius curantur, quam in pulmonibus, quia non conceditur quies ad consolidationem, & pus confectum difficulter sursum expurgari potest.

LIB. VII. A P H. xvi.

341. **A** *Puris sputo, tabes, & fluxus. Postquam vero sputum retinetur, moriuntur.*

I.

PUS per os ejici nequit, nisi intus lateat aliquod ulcus, quod in se Pus format, & dein mittit versus os, ut ita ejiciatur. Istud autem ulcus hæere potest in pulmonibus, ventriculo, faucibus & aliis locis & sinibus internis, qui confectam morbosam materiem in fauces deponere possunt. Semper ergo puris exspuitio significat internum latens ulcus. Si autem hujusmodi puris exspuitio continuetur, ut hic indicatur, notat ulcus istud internum perseverare, quando tandem continuata puris confectio corpus debilitatur, sed præcipue in omnibus ulceribus internis id fit, quod pus ita confectum bonis misceatur humori-

A Puris
sputo, ta-
bes, &
fluxus.

moribus, & istos inquinet. Hoc speciale in Pure est observandum, quod, etiamsi sit humor ex morboſis optimus, & ſemper laudetur in abſceſſibus, ulceribus, & vulneribus, nunquam tamen, ſi retineatur in corpore, per actiones vitæ ita poſſit aſſimulari, ut bonum præbeat nutrititium humorem, vel ita attenuari, ut inviſibiliter exeat, ſed retentum tandem convertatur in humorem ichoroſum acrem rodentem, raro autem in materiem ſpiſſam concretam. Si ergo quadam in corporis parte ſit ulcus vel abſceſſus Pus generans, plerumque ejus puris quædam portio retenta in Ichorem converſa, abſorpta, maſſam circulatoriam inquinat, unde tunc generatur febris hecetica, qua ſenſim exſtinguitur naturalis coharendi potentia in humoribus, pinguedo liqueſcit, ſic ſenſim emaciatur corpus (*Aph.* 89, III) quando vocatur Phthiſis. Denique vero ita liqueſcunt & degenerant humores, ut qua data porta effluant. Sæpe autem pereunt alvi fluxu & capillorum defluvio (*Aph.* 205, I.) ut & ſudoribus colliquativis. His enim evacuationibus in corpore emaciato tanta demitur humoris copia, ut id quod remanet, non ſufficiat ad vitam ſuſtentandam; atque ſignum eſt, ita eſſe ſolutos humores per corruptelam, ut inepti ſint ad ſolita munera præſtanda. Igitur per Tabem in hoc loco intelligitur emaciatio ingens & morboſa, & per Fluxum omnis illa copioſior evacuatio colliquatorum humorum, quæ utraque generantur a pure corrupto ſanguini circulanti miſto.

Sputum re-
tentum in
his mortem
inſtare ſig-
nificat.

II. Recenſita illa mala Phthiſis & Fluxus generabantur a pure corrupto ſanguini miſto: quamdiu autem ſatis libere pergebat Puris rejectio, parva tantum portio puris miſcebatur ſanguini, quæ concitabat febrem heceticam, reliqua vero pars puris nati emittebatur: ſi vero tandem hæc etiam emiſſio ſubſiſtit & minuitur, non ex minori puris generatione, quod bonum eſſet, ſed ex impedita evacuatione, illa materia viribus vitæ non ſuperanda retenta ſenſim in maligniorem indolem convertitur, qua & copia majore tandem pars integre corrumpitur & deſtruitur, atque multitudine opprimitur. Igitur ſedulo attendendum in

in Puris minuta evacuatione & suppressione, num fiat ex minori Puris generatione, an vero ex confecti Puris retentione. Optimum equidem est in Ulceribus & Abscessibus, si sensim puris copia minuatur ex bona causa, nam subito illa generatio nunquam ex bona causa subsistit; sed si minuatur vel sistatur non ex minori generatione, sed ex facta retentione, plerumque mortem instare expertus sum in ulceribus internis.

LIB. VII. A P H. XVII.

342. **A** B hepatis inflammatione singultus, malum.

I.

SUPERIUS (Aph. 251, iv.) cum Auctore observavimus, Hepati inflammato Singultum supervenire, ubi supposuimus, illam Inflammationem esse cognitam: hoc autem loco, quia præsagium malum est formandum, ex singultu superveniente (Aph. 304.) per phænomena primo constare debet, num æger ille laboret Hepatis inflammatione, quia ægri hoc non indicant, sed a medicis inflammatio latens est eruenda; dein videndum, ex qua ratione malum elicitur præsagium ex Singultu superveniente. Theoretica contemplatio facile suggerere videtur signa Hepatis inflammati, modo enim generalia signa Inflammationis applicentur ad Hepar, in promptu videtur, juniorem medicum eam inflammationem cognoscere posse. Si vero hi ad praxin veniant, non parum ipsis hæret aqua, præcipua enim characteristica signa Inflammationis non apparent, quum lateat hoc viscus sub integumentis & musculis abdominis, quo absconduntur omnia signa, quæ oculis deteguntur in externarum partium inflammatione: atque pulsus frequentior & durior, omnium internarum inflammatio-

num perpetuus comes, in Hepatis inflammatione reddi solet mollis & debilis: neque tantus dolor in Hepate quam aliis partibus inflammatis detegitur: denique partes adjacentes & ipsum Hepar affectum multa anomala signa inferunt. Quare non facile est determinare, num Hepar sit inflammatum. Præcipua sunt, febris continua, anxietas hypochondriorum, color ictericus per corpus, tumor in dextro præcipue hypochondrio, cum pulsatione hac in parte. Et quoniam Hepar magnum est viscus, si ejus pars sima inflammata sit, ventriculus maxime consentit, ut cibus descendens ventrem torquere videatur, ægri sint nauseosi & vomituri cum anxietate summa. Sed si pars gibba superior magis affecta sit, diaphragma & respiratio magis afficitur simul, dolorque usque ad jugulum extenditur. Si ergo ex his signis nobis constat Hepar esse inflammatum, Singultus certe malum præsagium afferre debet. Demonstravimus enim, Singultum esse speciem convulsionis: (*Aph.* 304.) ergo signum est, diaphragma & œsophagum consentire, seu latius extendi morbum, & scimus motu illo intendi inflammationem, atque per illum motum materiem morbi evacuari non posse. Sed si veniat Singultus, non raro simul inducit suffocationem.

LIB. VII. A P H. XVIII.

343. **A** *Vigilia convulsio, aut delirium, malum.*

I.

Vigilia *αγρυπνία* non simpliciter significat vigilantem hominem, sed uti in hoc loco si æger morbo correptus per longum tempus dormire non potest. Quia in sanitate somnus & vigilia se alterne excipiunt, quando ergo homo debito tempore dormire non potest, signum

signum est, aliquam adesse morbosam causam, quæ somnum intercipit. In morbis Chronicis rarum est, quod homines post diuturnas vigilias vel convelluntur vel delirant: adeoque hoc symptoma est accipiendum in Acutis. In morbis autem Acutis intercipitur somnus, si sanguis feratur majore impetu ad caput, vel materia biliosa acris ad encephalon delata perturbet motum æquabilem, qui ad somnum capefcendum requiritur. Eadem etiam causæ sed validiores & majores generant Convulsionem (Aph 214, II) & Delirium: quando nempe partes in Encephalo motu validiore ita agitantur, ut spiritus inordinate & cum impetu commoti, Convulsionem aut Delirium generent. Quia ergo illa symptomata indicant majorem perturbatum motum, necessario malum præbent signum.

LIB. VII. AP H. XIX.

344. **A**B ossis denudatione erysipelas, malum.

I.

Non semper Ossi denudato supervenire Erysipelas (Aph. 290, I) quotidie experimur in chirurgicis, si autem superveniat, malum erit signum, tam quoad causam, quam effectum. Tunc enim præprimis accedit Erysipelas, si humor ichorosus ex osse nudo effluens ad partes molliores applicatus, istas irritat, tumere & rubere facit, qualis rubedo a multis imperitis pro Inflammatione accipitur: sed quoniam talis tumor ruber magis est pruriens, & non convertitur in pus sed in Ichorem, atque exigit medicamenta, quæ Erysipelati adhiberi solent, & respuit laxantia, & humida, quæ egregie opitulantur inflammationis, necesse erit, ut hanc rubedinem supervenientem vocemus Erysipelas. Hoc autem generatur, si medulla os-

sis corrumpi incipit, ergo signum est malum, quum sit corruptionis indicium. Et mala quoque est causa, nam si putrescat medulla, Os nudatum non solum in loco denudato peribit, sed etiam pars reliqua a medulla corrupta inficietur: atque medulla corrupta intercipiet omnem consolidationem, quia materiem purulentam, quæ alias consolidationem promovet, commutabit in Ichorem rodentem, solventem omnes affluentes humores in putrilaginem.

LIB. VII. APH. xx.

345. *AB Erysipelate putredo, aut suppuratio, malum.*

I.

Erysipelatis materiem esse tenuem, acrem, & calefacientem, nemo dubitare potest, qui superius dicta (*Aph.* 290.) perpendit. Optimum est, si materia ea per insensibilem perspirationem exeat, relinquens partem prius obsessam sanam; istius enim detegitur naturæ, ut nunquam sanis assimilari possit, vel in pus commutari, sed retenta sensim reddatur acrior: propterea tanto cum successu adhibent Chirurgi sicca & siccantia atque absorbentia ad Erysipelatis curationem, quibus id tenue auferunt. Si vero illa materia relinquatur in loco calido, & humiditate diluta, prompta est ejus mutatio in Putrilaginem, qua non solum boni affluentes humores liquecunt, verum ipsæ etiam partes firmæ, & præcipue pinguedo: tunc non amplius sufficit insensibilis exhalatio, verum, quod ita per Putredinem fuit mutatum, simul debet auferri. Quare morbi status peior est post conceptam illam putredinem, quum declaret causæ augmentum, & promittat difficiliorem & tardio rem curationem. Igitur cavendum est, ne pars Erysipelate affecta disponatur ad Putre-

Putredinem. Atque malum est, si Erysipelas abeat in Suppurationem. (*Aph.* 285.) Videtur ex hac observatione nostra sententia destrui, qua statuimus materiem Erysipelatosam nunquam abire in purulentiam; sed re penitus inspecta clare constabit, materiem Erysipelatosam semper abire in Ichorem si non evacuetur, nunquam vero in Purulentiam. Eodem modo de hac materia est ratiocinandum, ut superius (*Aph.* 285, II) fecimus de sanguine effuso. Dum enim acris materia Erysipelatosa irritat partes adjacentes, in his generat localem Inflammationem, quæ pus producit, adeo ut in eo loco habeatur materia Erysipelatosa irritans, & materia purulenta, qualis morbus a veteribus dicebatur Erysipelas Phlegmonodes. Mirum videri alicui potest, quod praxis constanter doceat, mutationem Inflammationis in suppurationem esse bonam, dum tamen Inflammatio ex Erysipelate nata si transeat in purulentiam in hoc loco dicatur malum. Sed si pura simplex adfuit Inflammatio, quæ commutatur in suppurationem, pus confectum erit blandum & consolidans: sed si ex Erysipelate adjuncta materia illa biliosa acris admisceatur Puri, istud tunc Pus non manet blandum & consolidans, atque hoc ichorosum Erysipelatosum, non desinet irritare, novamque Inflammationem in ambitu concitare, ideoque malum est, & semper evitandum a chirurgis, ne Erysipelas maturantibus convertant in purulentiam.

LIB. VII. A P H. XXI.

346. **A** Forti pulsu in ulceribus, sanguinis eruptio, malum.

I.

Observavit Auctor & quidem nos in quotidiana praxi Chirurgica, sanguinis fluxum ex ulceribus non semper magnum malum portendere, cum vascula in ulceribus

bus semicorrofa & minus sustentata facile eructent sanguinem: sed si prægrediatur fortis pulsus, id est Pulsatio in ulcere, ubi in sanis non sentitur arteriarum agitatio, tunc sanguinis eruptio facta non caret periculo. Hoc ut ex suis fundamentis intelligatur, præsciendum erit ex quam causa generetur illa Pulsatio in ulceribus; dein videndum quodnam malum indicat. Omnes arteriæ non solum moventur a sanguine implente propulso actione cordis, verum etiam in suis fibris muscularibus donatæ sunt motu vitali, quod demonstravimus in particulari exercitatione De Motu Vitali. Ille autem motus vitalis per omnes arterias in sanis corporibus tam moderatus est, ut nullibi, nisi in quibusdam partibus, ubi arteria satis magna nudus hæret, sentiatur. Sed si quidam Arteriæ ramus, cujus motus antea percipi non potuit, validius moveri incipit, tunc tali in loco non consueto, sentitur motus aliquis pulsui respondens, qui hoc loco Pulsus Fortis vocatur, sed a nobis Pulsatio, ut distinguatur a pulsu forti, qui in locis consuetis manu medici exploratur. Hanc Pulsationem fere omnes deducunt ex obstructione, quum arteria ligata supra vinculum validius vibret: ego autem talem causam in his ulceribus invenire nequeo, quia omnia minus in ulceribus sunt sustentata, & experimur omne irritamentum & læsionem inferre posse pulsationem, in quibus ne vestigium obstructionis potest concipi. Quare mihi indicium est, hoc in ramo arteriæ per irritamentum factum fuisse motum majorem, quem innuimus (*Aph.* 249.) qui ita exagitat arteriam, ut nunc in loco non consueto sensibilem pulsationem faciat. Hoc fundamentum positum evidentissime demonstrabit, Pulsus Fortem in Ulceribus producere posse sanguinis malam eruptionem. Ipsa enim pulsatio fortis indicat, vel quod acre irritans habeatur in ulcere, vel partem inchoasse novam inflammationem, quæ utræque causæ exasperabunt ulcus: & quia pulsus fortis indicat magnum arteriæ ramum ita agitari, non erit mirum, si ex illo impetu, quem accipit sanguis in eo ramo arteriæ contentus, diffringantur rami arteriosi in ulcere minus sustentati, atque

atque ita evomant sanguinem. Sed si ex tam magno ramo arteriæ, quod nobis constat ex Pulsu Forti, ejicitur sanguis, non ita erit in potestate Medici vel Chirurgi hanc compescere hæmorrhagiam, est enim tunc in ulcere ac si aliquod aneurysma fuisset ruptum. Recte ergo monet Auctor malum esse, si post fortem pulsum in ulceribus sanguis erumpat, quia non potuit semper compescere illam hæmorrhagiam, atque illa evacuatio sanguinis non conducebat consolidationi ulceris: antea enim potuit per balsamica applicata promovere ulceris consolidationem, & modice sustentare partem, nunc vero applicanda sunt styptica ad compescendam hæmorrhagiam, & firmior adhibenda est cinctura, atque ita retardatur ulceris curatio, & relinquitur timor recrudescentiæ hæmorrhagiæ.

LIB. VII. A P H. XXII.

347. **A** *Dolore diurno partium circa ventrem, suppuratio malum.*

I.

DOlores diuturniores tandem desinere in suppurationem, sæpe etiam in praxi observavi, sed & multi passi fuere diuturnos dolores sine subsequente suppuratione: quare non est constans observatio, omnem Dolorem diuturnum abire in suppurationem. Neque hoc indicare voluit Hippocrates: ita passim profert singularia observata, quæ ab ejus Commentatoribus reducuntur ad regulas generales, unde praxin exercentes sæpe falluntur in præfagiendo. Inveniuntur enim humores acres & tenues per annos dolorem inferentes, uti dolores catatrhusi & rheumatici, qui nunquam in suppurationem convertuntur. Sed si doloris causa irritando inferat inflammationem, hæc tunc tandem in suppurationem abeuns purulentiam

tiam exhibet: hoc etiam fit, si ex corrosione materiæ acris fiat vasorum destructio, & ita ulcus internum, hoc tunc pus generat. Quare non est judicandum eandem materiem, quæ tam longum dolorem fecit, abiisse in purulentiam, sed pus natum esse ex superveniente inflammatione vel ulcere. Hanc nunc suppurationem pronunciat malum esse, quoniam signum est, materiem dolorem inferentem tam acrem esse, quæ potuit destruere partem. Neque suppuratio facta tollit præcedentem morbum, & raro exhibebit bonum pus, nam corrodens istud puri mistum, invertet puris blandam indolem in ichorem rodentem. Ut enim ex prægressa inflammatione producat bonum Pus, intra viginti & ad summum quadraginta dies Suppuratio pus effundere debet: sed si ex alia causa natus fuit Dolor diuturnior, ut monuimus, & dein Abscessus vel Ulcus pus præbens, complicatus est morbus: si vero Dolor diuturnior natus fuit ex Inflammatione, ex qua non nisi post diuturnum tempus prodit pus, certi sumus quidem multo prius pus fuisse natum, sed quia non fuit evacuatum, diuturniori illa mora Pus erit corruptum, & in ichorem rodentem conversum, qui circumjacentes partes corrodit, atque ita post eruptionem relinquet Abscessum vel Ulcus sordidum. Hæc omnia mala esse, non est opus adstruere. Hæc ergo observatio est generalis ubique in corpore, sed Auctor quia hoc observavit factum in partibus circa Ventrem, locum simul adjecit.

LIB. VII. A P H. XXIII.

348. **A** Meraca dejectione Dysenteria malum.

I.

QUando dicantur Meracæ Dejectiones (*Aph.* 331, II. & *Comp.* T. 90, LXI.) & qualis morbus sit Dysenteria (*Aph.* 134, I) ex locis citatis colligi potest: hoc loco videndum, cur sæpe post meracam Dejectionem generetur Dysenteria, & cur hoc sit malum. Meracæ fieri nequeunt dejectiones, nisi unicus humor tanta copia confluat ad intestina, & dein evacuetur, ut in Excrementis reliqua ciborum recrementa non appareant. Hinc Dysenteria ab atra bile incipiens, lethale. (*Aph.* 134, II) Ita alvi egestio viscosa meraca aut alba, mala est. Spumosæ Meracæ; Biliosæ Meracæ; Sanguineæ Meracæ; passim observatæ sunt ab Hippocrate & omnibus Practicis. In his omnibus copiosissima fuit alicujus humoris depositio, vel vasis ruptis vel dilatatis, vel natura stimolata ad faciendam copiosorem secretionem. Verum raro accidit, ut in continuato tali fluxu non adsit quædam acrimonia, vel non superveniat; hinc sæpissime post continuatam eam Dejectionem ab humoris acrimonia sensim incipiunt intestina corrodi & instigari ad frequentiore dejectionem, qualis morbus vocatur Dysenteria. Hæc vero si veniat, malum est signum, nam quamdiu aberat dolor in copiosiore dejectione, signum erat, eum humorem non possidere acrimoniam, sed ex Dolore superveniente cognoscimus, istos humores insuper acrimoniam accepisse, quod malum est: atque eadem acrimonia vellicantur magis intestina, ut copiosorem dejectionem faciant, quam antea. Ergo ut signum & ut causa malum est, si Dysenteria superveniat.

M m m m m

LIB.

LIB. VII. A P H. XXIV.

349. **A** B osse percisso delirium, si in vacuum penetra-
verit.

I.

HUcque Aphorismis addiderunt Malum, quod brevitas gratia Hippocrates non adjecerat: quamobrem etiam huic non addatur, nullam invenio rationem, nam etiam in sequentibus Auctor pergit citare symptomata supervenientia mala & lethalia: atque sensus hujus Aphorismi hoc exigit; nam si ossa cranii ita fuere percissa, ut scissura ad interiora encephali, id est in vacuum penetret, Delirium tunc superveniens, malum est signum, quod hodierna observatione chirurgica confirmatur. Auctorem intelligere hoc loco ossa Cranii, nullus dubitare potest, nam reliqua ossa fracta vel percissa usque in cavum, quod medullam continet, rarissime Delirium inferunt, sed si vulneratur Cranium, ut simul lædantur contenta Encephali, sæpe Delirium generatur. Qui pro vacuo accipiunt sinus frontales, vel & Diplöen, maxime errant, quia hæ partes non magis inferunt Delirium, quam reliquæ ossis cavitates medullares læsæ. Omne autem vulnus in cavum cranii penetrans Delirium non infert, nam nisi simul afficiantur meninges, quæ suo tunc motu inordinato Delirare faciunt hominem, sæpe fit, ut homo mente maneat constans, quod constat multiplici experientia chirurgorum in Cranii fracturis. Sed si Delirium superveniat, periculosissimum est symptoma, indicans partes encephali esse læsas, & motu perturbato agitari.

L I B. VII. A P H. XXV.

350. **A** *Purgantis potione convulsio, lethale.*

I.

Medicamenta Purgantia, vel majore evacuatione (*Aph.* 196, I) vel sua virulentia (*Aph.* 126, III. (*Aph.* 194, I.) periculosas Convulsiones inducere, exposuimus, quare non opus repetere.

L I B. VII. A P H. XXVI.

351. **A** *Dolore vehementi partium, circa ventrem, extremarum frigus, malum.*

I.

Quæ dicuntur Partes Extremæ (*Aph.* 326, I) & Partes circa ventrem (*Aph.* 347, I) exposuimus: ubi simul notavimus, hanc particularem observationem generaliter accipi posse, quod etiam hoc loco est faciendum; nam siue vehemens Dolor corripit partes circa ventrem siue quamvis aliam partem, modo superveniat frigus extremarum partium, malum erit signum. Quod autem Auctor hic posuit casum particularem, non vero generalem, inde est, quia inventores a particularibus tandem ad generalia pervenire possunt: sed si continuata observatione etiam in aliis partibus idem experimur, tandem ex multis specialibus unicam regulam generalem deducimus. Hoc autem hodie facere possumus, quoniam edocti sumus, cujus-

M m m m m 2

cunque

cunque partis dolori vehementi si superveniat frigus extremarum, malum esse. Multi putant hoc loco intelligi Dolorum Inflammatorium, qui, si abeat in frigiditatem, indicaret commutationem Inflammationis in sphacelum. Sed tunc non tantum esset signum malum, verum lethale, quia non novi aliquem supervixisse, cujus interna viscera inflammata abierunt in sphacelum: atque tunc Dolor ventris & frigus extremarum non habentur simul, sed tunc evanescit dolor sine ratione. Itaque hoc loco intelligendus est Dolor Vehemens, qui sua vehementia inducit Extremarum frigiditatem, non vero ex commutatione in sphacelum. Hujusmodi Dolores sæpe observavimus, & nobis quoque semper fuere suspecti. Invenimus enim in nobis viventibus illam legem generalem, omnia irritantia, dolorem facientia in consensum trahere motum vitalem circulatorium, ut inde fiat circulatio & calor major per totum corpus, cum pulsu frequentiore & duriore. Unam autem speciem Doloris detexi in Praxi, qui quo magis intenditur, eo magis minuit motum vitalem & naturalem corporis calorem, quem sentio oriri ex Acrimonia nitrosa frigida (Vid *Persp. Cap. vii*, §. xxii.) Utraque species, nempe Dolor Calorem inferens, & Frigiditatem produciens, si sit vehemens cum extremarum frigiditate, malum est signum. Nam si Dolores, qui calorem inferre solent, faciant Extremarum frigiditatem, signum est, vim vitæ superari magnitudine morbi, & anceps est status, num vires dein instigatæ magis hanc magnam causam superabunt, quod sæpe tamen experimur in paroxysmis febrilibus, qui cum frigore incipiunt: atque perseverans frigus non superabit Doloris causam, quum illa superanda sit actione vitali, quæ exercetur in majore, non vero in minore circulatione. Igitur frigus in hujusmodi doloribus vel periculum vel longitudinem portendit. In altera autem specie doloris, qui semper adjunctum frigus habet, quo major est dolor, & majus extremarum frigus, eo majorem copiam acrimoniæ quoque declarat, quod etiam malum est.

L I B. VII. A P H. XXVII.

352. **M**ulier in utero gerenti, tenesmus superveniens,
abortire facit.

I.

DUm concepit mulier, naturale est, ut tamdiu ejus os uteri maneat clausum & foetum retineat viventem, donec omnia ejus membra sint perfecta, ut possit alimentis ore sumtis proprium suum nutrimentum conficere, & in lucem prodiens respirare: raro ante septimum mensem ad eam perfectionem venit foetus humanus: si ergo prius in lucem prodeat, quam ut illa organa habeat perfecta, sive foetus ita prodeus sit vivens vel mortuus, illa exclusio vocatur Abortus, qui est partus maturior quam quo potest vitalis manere infans. Si vero post istud tempus, usque ad legitimum partus tempus excludatur foetus sive vivens sive mortuus, potius illa exclusio vocatur Partus praematurus, quo tempore exclusus foetus omnia membra eousque habet perfecta, ut potuisset a matre separatus vivere. De tali ergo exclusione hoc loco agit Auctor, quæ fit ante tempus, quo potuisset foetus exclusus a matre separatus, manere vitalis. Multæ sunt causæ talem Abortum facientes, quæ nimis copiosæ sunt, quam ut hoc loco recenseantur, sed solus Tenesmus hic assignatur, qui Abortum minatur. Quare in Gravidis si adveniat, Abortum prædicere possumus. Meretur hoc loco examinare, quali modo Tenesmus Abortum facere possit. Si intestinum rectum a quavis causa irritatur, in ejus fibris muscularibus aliquis concitatur motus, qui contenta non solum etiam hujus sed intestini coli determinat versus anum, & ita ejicit: & ut hæc ejectio validiore potentia peragatur, naturali lege muscoli abdominis in consensum

trahuntur, qui non solum tunc quasi contra voluntatem nostram constringuntur, sed etiam faciunt motum determinantem deorsum: præterea cogimur facta summa inspiratione retinere animam, ut diaphragma magis complanatum posset recessum visceris sursum impedire, quo maiore potentia urgentur contenta intestinorum versus anum. Si tunc adsunt feces intestinorum, illæ ejiciuntur, quando vocatur Alvi egestio. Sed si in intestinis nullæ restent feces, & hoc tamen intestinum ab aliqua causa irritatur, eadem fiunt conamina sine dejectione fecum, nisi quod violenta illa compressione extrudatur aliquid mucosi ex lacunis intestini recti. Hic conatus sæpe redeuns sine dejectione fecum vocatur Tenesmus, seu crebra cupiditas egerendi alvum. Intestinum rectum ad talem ejectionem instigatur vel a causa irritante ipsum intestinum, vel ita movetur per consensum, uti experimur in calculosis, si calculus hæreat ad urethræ orificium, & in stranguria virorum. In feminis autem, quia uterus intestino recto adjacet, ab eo affecto etiam intestinum rectum consentire potest, quando tunc non amplius in recto intestino sunt feces, illa foemina laborabit Tenesmo. Igitur feminam gravidam Tenesmo laborat, ex causa irritante intestinum rectum, vel per consensum cum utero seu vagina. In utroque casu Abortus instat, si fiat ante legitimum pariendi tempus. Si enim causa illa instigans in utero vel vagina hæreat, nemini mirum esse potest, quod tunc per validissimum conatum, uti in parturientibus, foetus immaturus excludatur. Si fiat autem per irritationem ipsius Intestini, non solum conatus in Tenesmo valide urget contenta uteri, ut ejus internum orificium aperiatur & ita excludantur; verum ipse uterus tandem etiam in consensum trahitur, ut se accingat quemadmodum in parturientibus profundere contentum immaturum foetum. Ex his satis constat, quam cauti esse debeant medici in propinandis purgantibus, indandis suppositoriis vel glandibus, & injiciendis clystratibus, feminis gravidis; atque summa cura prompte curare debent feminis gravidis Tenesmum &

& Dysenteriam, ne subsequatur iterato conamine egerendi Abortus.

L I B. VII. A P H. XXVIII.

353. **Q**uodcumque os, aut cartilago, aut nervus in corpore dissectus fuerit, neque augetur, neque coalescit.

I.

Totum hunc Aphorismum superius (*Aph.* 284.) explicatum invenire poteris.

L I B. VII. A P H. XXIX.

354. **S**i a Leucoplegmatia detento vehemens diarrhœa superveniat, morbum solvit.

I.

Antequam definire valeamus, quomodo vehemens Diarrhœa superveniens solvere possit Leucophlegmatiam, constare debet, qualis sit Hydropis species (*Aph.* 101, vi.) & ex qua causa nasci soleat. Qui homines per totam cutim laborant tumore albo molli, æquali, frigido, qui foveam impressi digiti diu retinet, hi dicuntur Leucophlegmatici: habent ergo hi in cutis substantia & tunica cellulosa subiecta, magnam humoris viscosi, & albi coloris copiam, quo implentur vascula minima & cellulæ: talis autem tumor in quadam speciali parte apparens rectius vocatur Oedema: si color pallidus commutetur in quemcumque alium, tunc ad Cachexiam refertur: si absit viscositas, potius generale nomen Hydropis retinet.

retinet. Idea igitur hujus morbi formatur, si concipitur cutis substantia laxior, & minori motu vitali donata, in qua tunc colligitur humor sanus aquosus, seu potius gelatinosus concrescibilis, qui stagnans vel minus propulsus, sic dictam pituitam vel phlegma præbet. Ex loco sæpe vocatur Anasarca & Hypofarca, atque aqua inter cutem. Quando itaque collecto humori accedat paulo major motus vitalis, tunc vascula hunc humorem continentia, magis moventia viscosum eum humorem in fluorem redigent, quum duntaxat cohæreant, quia minus moventur: eodemque motu protrudentur alias stagnantes, in venas & circumducuntur cum aliis. Ita si veniant ad intestina, generabitur vehemens id est copiosissima evacuatio per alvum, quæ auferet abundantem illam nunc lympham, & restituet corpori sanitatem, quod etiam supra notavimus (*Aph.* 279.) Etiam si experimur in hac specie Hydropis, solutionem fieri vehementi Diarrhœa, hoc autem non procedit in reliquis Hydropis speciebus: nam si Pituitosum Hydropicorum abeuns in putrilaginem vehementem Diarrhœam faciat, post liquoris evacuationem peribunt ægri: itidem Diarrhœa nata ex obstructis glandulis mesenterii vel cisterna lumbari transitum lymphæ per ductum thoracicum intercipientem, quo fit copiosior, eo citius moriantur ægri. Neque semper procedit in particulari hydrope, qui oriri potest ex hac vel illa vena compressa, quod fieri nequit in generali Leucophlegmatia, talis enim obstructio vel compressio non semper tollitur alvi fluxu superveniente. Neque præbet constantem regulam, omnem Hydropem vel Leucophlegmatiam curandam esse purgantibus; variæ enim sunt Hydropis causæ, quarum quædam respuunt purgantia; & quando in Leucophlegmatia non prius fuit solutus humor per alvum educendus, per purgans elicietur humor bonus & fluxilis, relicto viscoso in tunica cellulosa & cute, qui ad intestina venire nequit.

LIB. VII. AP H. XXX.

355. **Q**uibus spumosa egestionibus in alvi profluviiis, his de capite pituita defluit.

I.

EX experimentorum defectu multa præpostera protulerunt Veteres de Egestionibus spumosis, quæ eorum sequaces non solum amplexi sunt, sed & multis alienis sententiis ornarunt. Si vero rimamur solummodo, quæ nobis experimenta suggerunt, multa egregia & scitu necessaria petere possumus ex his spumosis Egestionibus. Constat experimentis, aërem in intestinis & ventriculo collectum motu vermiculari æquabili ita uniri humoribus, ut plane evanescere videatur; sed motu inordinato earum partium, etiamsi nihil aëris ingeratur, tantam aëris copiam generari, seu potius separari ab adhærentibus humoribus, ut non solum intestina & ventriculus turgeant, verum etiam totum abdomen instar tympani tendatur; &, quamvis multi ructus & crepitus emittantur, venter tamen non subsideat, quasi generationis aëris nunquam esset finis. Generatur etiam in intestinis aër, uti extra corpus nostrum ex fermentatione vel putrescentia contentorum, si ventriculi & intestinorum actio debilior non valeat spontaneam hanc mutationem arcere. Tali modo natus aër si viscosus, vel pinguibus humoribus misceatur, exhibet liquorem spumumum; sed aquosis meris mistus statim se extricans non producit spumantem liquorem. Ut igitur spumosa Egestionibus fiant in alvi profluviiis, requiritur præsentia humoris subpinguis, saponacei, vel glutinosi, qui aëris bullulas retinere potest, atque intestinorum motus inordinatus, qui aërem producit, ut monuimus, & qui simul copiosiores dejectionem facit; nam in tali motu aucto concipi

cipi nequit fieri posse, vel fermentationem, vel putredinem spontaneam ex deficiente motu intestinorum. Spumosæ ergo Egestiones semper significant motum intestinorum perturbatum, sed prout color, odor, & consistencia variat, ita est humor morbosus diversus, qui ex aëre admisto spumantem Egestionem præbet. Nunquam in praxi observare potui, spumosam Egestionem dedisse bonum præsagium, quia semper indicat motum perturbatum, & corruptionem humorum.

An spumosa Egestiones ex pituita a capite defluente?

II. Quum Auctor accuset Pituitam, inde concludere possumus, eum hoc loco intelligere feces albicantes, seu pallidas & spumosas, quas etiam sæpe observavimus emissas esse cum capitis dolore. Hoc etiam cum observaverit Hippocrates, existimavit eam pituitam spumosam, quam conspexit egestam per alvum, natam esse in capite, & inde cum impetu delatam ad intestina & ita ejectam. Multi, nescio quibus rationibus sed absurdis adstruere hanc sententiam conati sunt; alii vero eandem ob magnam absurditatem repudiarunt, inferentes talem pituitam spumantem cum impetu ferri non posse ex capite ad intestina, obstare pulmones, diaphragma, & intestina, quæ exterius in se nihil recipiunt: adeoque judicarunt hanc observationem esse falsam. Nos autem aliquoties experti sumus in capitis doloribus hujusmodi factas fuisse Egestiones spumosas, quas puto provenire a succo nervoso acriori præprimis in Encephalo nato, & capsulis nervorum, sensim secundum nervorum cursum ad intestina delato, ibi præbere humorem dictum pituitosum, qualis observatur in gravedine. Si hic humor in cavum intestinorum depositus fuerit, simulque intestina vellicat, motu tunc inordinato intestinorum, non solum generatur aër copiosior, verum etiam eodem motu ita miscetur huic Pituitæ, ut præbeat recensitas alvi Egestiones spumosas, cum multis ventris torminibus.

LIB. VII. APH. XXXI.

356. **Q**uibus febricitantibus, in urina subsidentiae sunt crassiori farinae similes, longam infirmitatem significant.

I.

SI in fundo uroscopii, quod continet urinam in quiete refrigeratam, detegitur materia albicans instar farinae non exacte molitæ, tale subsidens vocatur Sedimentum farinosum, quod non multum distat a sedimento albo & bono in febribus, quoad externum conspectum, nisi quod illæ partes sint majores, minusque æqualiter distributæ, quam in sedimento albo. Quoniam hæ partes farinosæ non apparent in calente urina, neque tam magnæ ire possunt per tubulos renales, certe constat, istas formari in refrigerata urina. Illa ergo materia hoc Sedimentum formans possidet majorem concrescendi potentiam, quam quæ observatur in Sedimento albo æquali, qua concrescit in grumulos. Quum vero omnis materia Sedimentum formans sit materia morbi, quia illa in sanorum urina non apparet, concludere possumus, tali in febre morbi materiem in corpore adhuc oberrantem pronam esse ad concretionem, & inde viribus vitæ non facile separari posse. Per febres intelligere solet Febres continuas, vel quæ non intermittunt, alias enim dici solet in Intermittentibus: quare hoc in loco præsagium sumendum ex Urinæ inspectione, ut promittamus longam Infirmitatem. Hoc Auctor noster non desumpsit ex speculatione theoretica, sed quia observavit in ægris febricitantibus, si talis prodiret urina, longam mansisse infirmitatem, quod etiam nos sæpissime observavimus. Quamobrem non omnino inutilis est urinæ inspectio, ut multi ignorantes urinæ arcana rimari

Urinæ sedimentum farinosum longam infirmitatem significat in febribus.

Urinæ inspectione cessante.

contendunt, neque soli urinæ inspectioni, uti agyrtæ & impostores, est fidendum, nam idem Urinæ signum in omni morbo non præbet idem præsignum. Propterea addit Auctor hoc loco in febribus: nam materia febris continuæ salubriter evacuari solet sub forma sedimenti albi & æqualis, quod sedimentum tantum valet in febribus, ut dicatur criticum. Si vero referat farinam crassiorē in febribus significat, materiem phlogisticā, ex majori motu febrili natam, non abiisse in materiem subpurulentam albam & æqualem, quæ a natura facile eliminatur, sed in materiem talem tenaciorem, quæ non facile ope renū a tota massa segregari potest; & inde in corpore manens morbum protrahit: aut si postea deficientibus viribus per spontaneam supervenientem corruptelam immutetur, frequentissime novum morbum Chronicum producit. Quamobrem ex tali conspecta urina non solum cum respondente effectu prædixi morbi Longitudinem, verum etiam ejus commutationem in alium morbum Chronicum.

LIB. VII. A P H. xxxii.

357. **Q**uibus autem biliosæ subsidentiae, superne tennes, acutum morbum significant.

I.

Urina superne tenuis cum bilioso sedimento, in febribus, acutum morbum significat.

Liquorem colorem flavum exhibentem, etiamsi non sit vera Bilis, a Veteribus vocari Biliosum, tam frequens occurrit, ut nullus dubitare possit: ita enim omnia excrementa & humores morbofi flavescentes dicuntur Biliosi, quia non ex omnibus Bilis proprietatibus hoc nomen invenitur impositum, sed ex solo apparente colore. Itaque si id, quod ad fundum uroscopii in urina refrigerata fertur, habet colorem flavum, hoc loco Hypostasis biliosa vocatur. De tali Urina superne Tenui.

Tenui maxime disputant Commentatores, etiam ante Galeni tempora, quidam *ὑπερθε* superne, retulerunt ad Tempus, alii ad Locum, quod ultimum ego amplector, quoniam in exercitatione practica talem sæpe conspexi urinam, quæ postea exhibuit morbum Acutum, id est validum & vehementem. Si modo Commentatores propriam praxin seu observationes in morbis consuluissent, facile potuissent sensum & veritatem Antecessoris nostri intelligere & confirmare: nam quod posuit Hippocrates, id non ex suo cerebro finxit, sed ex experientia medica desumfit, quod etiam deinceps a nobis praxin exercentibus observari potest, ut est illa urina in parte superiore tenuis in fundo sedimentum flavum biliosum habens, post quam conspectam febris vehemens Acuta sequi solet. Si rimamur materiem hanc urinam præbentem, facile erit conceptu, morbum Acutum sequi debere. Materia est Biliosa, id est materia ichorosa flavescens, nata ex materia purulenta vel inflammatoria corrupta, est enim gravior reliquâ urinæ massâ, quia fundum petit, qualis major specifica gravitas non invenitur in Bile, quæ supernataret. Ergo signum est in febribus materiem febrilem non mutatam esse in materiem albicantem criticam, sed in ichorosum acrem & stimulantem humorem, qui in corpore remanens, (nam omnis non ita per urinam emittitur), stimulo suo febrem intendet. Quia vero separatur a reliqua massa urinæ, signum est, hanc materiem Biliosam non ita miscibilem esse communi vehiculo humorum aquoso, unde difficilius eliminari in posterum poterit. Urinæ superne tennes non significant urinam aquosam, sed pellucidam & etiam coloratam, nam æque inveniuntur urinæ tennes coloratæ quam decolores: &, quam ego vidi in hujusmodi morbis urinam, illa erat colorata flavescens, & superne pellucida, indicans, in communi illa massa nihil de materia morbosa contineri.

LIB. VII. A P H. XXXIII.

358. **Q**uibus autem urinæ distantes fiunt, iis vehemens est in corpore turbatio.

I.

Urina inæqualis in febris vehementem turbationem significat.

Quæ mutationes in corpore nostro latentes fiunt, non nisi per phænomena externa detegi possunt; illa autem ita sunt tradenda, ut nulla de sensu phænomeni restet ambiguitas. Brevitas autem sententiarum, & variâ significatio verborum non parvam sæpe parit obscuritatem, quæ totam prædictionem incertam facit. Assumo, hoc in loco agi de urinæ inspectione, quæ reddita fuit ab ægro febricitante, quod ex nexu hujus cum præcedentibus Aphorismis desumo, de quo nullus dubitare potest. Sed quæ dicantur urinæ distantes διεσπώτα τὰ ὄρα, non consentiunt Auctores. Significationem hujus vocis Literatoribus relinquo, ego autem quod in praxi observavi, & per hanc vocem exprimi potest, proferam. Si Urina in febricitantibus emissâ, refrigerata conspicitur, & invenitur quædam materia ruditer & inæqualiter concreta, dispersa per totam urinæ massam, talem ego vocarem Urinam Distantem, Divulsam, Separatam & Inæqualem in hoc loco. Alia autem habetur etiam species urinæ inæqualis ratione temporis, sed tunc potius dicitur urina varia aut inconstans. Talis definita Urina Distans notat, morbi materiem cum reliqua massa urinæ emissâ inæqualiter per totam massam esse distributam: & quia urina declarare solet naturam miscelæ materiæ morbi cum humoribus circulatoriis, quod raro in urinæ inspectione fallit, ut passim sumus demonstraturi, tuto concludere possumus ex Urinæ inspectione, qualis sit materiæ morbi status in corpore; nempe morbi materia turbata est & mixta humoribus circulantibus, quæ nunc viribus instigatis, vi quasi

quasi ante debitam coctionem extruditur, nunquam enim cruda nisi valida vi extruduntur. Quoties ergo talis divulsa emittitur urina, inter certissima signa magnæ turbationis accipi potest. Hoc ulterius manifestabitur ex pulsu, anxietate, & inquietudine ægri. Et scimus talem urinam non præbere bonum prælagium, quum cruda emissa non levent.

LIB. VII. APH. XXXIV.

359. **Q**uibus vero, in urinis bullæ superstant, renum affectiones significant, & longam fore invale-
tudinem.

I.

URina per urethram emissa, vasculo recepta, si sit perfecte sana, aerem, quem descendens urina secum duxit, promte dimittit, ut fere instar aquæ puræ effusæ vix bullas vel spumam per minimum tempus retineat: aër enim cum urina descendens sub recipientis urinæ superficiem se in guttulas urina leviores colligens, sursum adscendit, formatque in urinæ superficie bullulas vel spumam non diu persistentem: eodem modo etiam aër conquassando urinæ si misceatur. Si vero illæ enatæ Bullæ vel Spuma per longum tempus persistent, copiosius generentur, vel omnino non evanescant, talis dicitur Urina spumosa, vel cui Bullæ superstant. Experimenta docent, aquam etiam spumofam tali modo fieri admisto glutinoso, vel sapo-
naceo, atque Urina stagnando corrupta, conquassata, etiam magis spumosa redditur. Igitur Urina spumosa evacuatur, si in itinere corrumpatur, si ei admisceatur viscosum, aut si proveniat ex putrefactis nostri corporis humoribus: inde tam frequens in febribus colliquativis, putridis, hæcticis, phthisi, & omni nimia emaciatione corporis, calculosis,
omni-

Ex qua cau-
sa urina spu-
mosa?

omnibusque morbis, qui faciunt exire liquefactam pinguedinem e corpore nostro. Adeoque multo plures sunt morbi in quibus invenitur Urina spumosa, quam qui ab Auctore citantur, quod juniores Medicos decipit, existimantes, Hippocratem in Aphorismis omnes morbos citasse, quibus redditur Urina spumosa: sed ita solitus est Auctor loqui, si unum alterumve casum expertus sit, istos absolute ponere, non quod non haberentur plures, sed quia istos in praxi detexit. Ego autem ex cunctis locis Auctoris collectis, & ex propria experientia multo plures causas inveni, quam quæ hic ab Auctore citantur, quas omnes pertractare nimis extra scopum excurreret. Talis igitur urina viscosa, saponacea, vel pinguetudine imprægnata, permittit quidem bululas aëris urina leviores adscendere, sed hæc si ad superficiem venerint, totam non relinquunt massam, sed obteguntur tenui expansa pellicula ex tali urina facta, quæ semper indicat aliquam in urina esse tenacitatem: atque quo spuma est copiosior, diutiusque persistens, eo majorem tenacitatem in urina arguit. Quare non solum ex urina spumante præcedentia dignoscere possumus, verum etiam magnitudinem & parvitatem mali.

Urina spumosa cor-
renum affe-
ctiones fig-
nificat?

II. Talis urina cum & sine febre evacuari potest, ut observavi in Acutis & Chronicis morbis, sed quoniam observavit Auctor sæpe reddi in affectis renibus, inde ex conspecta tali urina quoque intulit, significari Renum affectiones. Si enim aliquis renum calculo laborat, duplici ex causa urinam spumantem reddit. Calculus enim semper affluente urina perfusus speciem corruptionis inducit, quare calculosi etiam reddunt urinam foetentem, hoc putrefactum urinam spumofam facit, uti patet ex urina sana dein putrefacta. Calculus etiam continuo terendo abradit naturalem viarum mucilaginem, quæ urinæ mista & simul exeuns, urinam magis glutinosam facit & inde magis spumantem: inde etiam Calculosi reddere solent urinam crassiores & contentis saturam. Si vero pinguedo in corpore liquefacta & acrior reddita per urinæ vias emittitur, in suo transitu quoque dolorem renibus inferre potest, omnibusque

nibusque viis urinæ, quibus abradit seu abstergit mucilaginem has vias naturaliter tegentem: ita illa urina ex sua natura acrior, nudas tangens partes, dolores nephriticos infert, quod sæpe in febribus putridis observatur.

III. Si quis febre laborans reddere incipit Urinam spumofam, semper ego quoque in praxi observavi, istos ægros tarde recuperasse pristinam sanitatem: quod etiam rationibus est conveniens, nam omnis febris commutatio in putredinem morbum prolongat, quum vis vitæ nesciat putrefactum emendare, & caremus organo putrefactum separante a bono; hinc diu durat, priusquam omne putrefactum fuit evacuatum: quod alio modo fit in materia purulenta & critica, quam natura novit eliminare. Hinc per nullum emunctorium invenimus humorem corruptum evacuatum fuisse criticum: imo ulcera quamdiu putrefacta emittunt, non consolidantur. Quia vero spumosa urina significat mutationem materiæ febrilis in putrilaginem, ex generali lege putrefacti longa est expectanda invaletudo.

Cur longam fore invaletudinem significat?

LIB. VII. A P H. xxxv.

360. **Q**uibus autem pingue est & confertum quod supernatat, his affectiones nephriticas, & acutas significat.

I.

Alterum phænomenon, quod in febricitantium urinæ superficie conspicitur, est Pingue & Confertum, *ἄθρον*, in unum collectum, coacervatum; si nempe brevi tempore in urinæ emissæ superficie formatur collectio pinguedinis, neque guttatim, neque instar telæ aranearum, neque in modum spumæ, sed confertim, satis dense stipatum & collectum. Hoc fit, si ipsa pura nostri corporis

Unde pingue & confertum supernatans?

O o o o o

pin-

pinguedo cum urina exeat sine prægressa putredine: nam pinguis urinæ mista quia leviora supernatabunt instar cremoris lactis, & obtegent brevi tempore totam urinæ superficiem; sed si putrefacta sint, & ita aquosis miscibilia, spumantem faciunt urinam, & non separantur a reliqua urinæ massa. Talis ergo Urina signum est, veram pinguedinem in corpore liquatam cum urina reddi.

Cur talis urina significat affectiones nephriticas & acutas?

II. Pinguedinem corporis in tunica cellulosa collectam, a vehementi calore liquatam, & circulatione aucta propulsam, sanguini primo venoso mistam, & ita ad cor delatam, non solum in subito superveniente febre acuta ardente, verum etiam in motu musculari validiore, præprimis in obesitas, observarunt multi Medici: ex Calore aucto enim fit pinguedo fluxilis, naturalis ei est via ex cellulis in venas, ut docet Anatome, & aucta circulatione hæc promovetur protrusio. Igitur non est mirum in ardentibus Acutis morbis, ut pinguedo sanguini misceatur magna copia. Sed ex aucta illa circulatione sequitur, Pinguedinem receptam evacuari cum urina: nisi enim motus particularis renum major simul accedat, recepta pinguedo in sanguine cum urina evacuari nequit, ut sæpe observamus in Ardentibus. Ut illa ergo pinguedo exeat, neque sola circulatio major cum ardore sufficit, quia his non generatur pinguedinis transitus per Renes; neque sola actio renum valet talem producere Urinam, quia si cum sanguine arterioso copia pinguedinis non adferatur, renes eam excernere nequeunt. Recte igitur observavit Auctor has duas conjunctas affectiones, nempe Nephriticas & Acutas. Quod opponunt in Marasmo & Phthisi non est alicujus momenti, quod hi non reddant talem Urinam, etiamsi pinguedo totius corporis consumatur: his enim pinguedo non consumitur forma pinguedinis, sed quando Pinguedo in his corrupta fuit & degenerata evacuatur. Quamobrem his frequentior est urina spumosa, quam quæ habet Pingue confertum supernatans.

L I B. VII. A P H. XXXVI.

361. **Q**uibus vero nephriticis existentibus, prædicta signa accidunt, & dolores circa musculos spinales fiunt, si quidem ad exteriora loca fiunt, abscessum expecta futurum extrorsum. Si vero dolores fiant magis ad interna loca, etiam abscessum magis introrsum fore expecta.

I.

Non omnes Nephriticas affectiones (Aph. 110, VI.) oriri a renum calculo, imo ipsos renes interdum immunes esse, supra observavimus. (Aph. 276, II.) Istud etiam in hoc loco est tenendum, nam qui renum calculo laborant, nunquam reddunt urinam, cui pingue confertum supernatat, sed urinam fœtentem, sabulosam, purulentam, vel & merum sanguinem mingunt. Quare Nephritis hoc loco est generaliter accipienda pro lumborum dolore, eo circiter loco ubi Renes hærent. Nulla est in toto corpore pars dolens, quæ ingenia etiam peritissimorum magis fatigat, ad designandam partem affectam, quam Dolor lumborum, ipsa enim medulla spinalis ejusque membranæ cingentes, & nervi inde nati, mesenterium annexum, renes accumbentes, musculi spinam moventes, si doleant, eodem in loco doloris sensum faciunt, sed in effectibus toto cœlo differunt: inde tam difficile est a priori definire, num Lumborum dolor fiat a renum calculo, vel quavis alia causa. Noster quidem Auctor tanquam Divino ingenio præditus retinuit quidem Nephritidis nomen, sed bene intellexit hunc dolorem non generari ex Calculo, sed voluit ex perseverante Lumborum dolore præfagire Abscessum, vel internum, vel externum, qualem quoque casum in quodam etiam viro observavimus, ut de

Nephriticis, urina, cui pingue confertum supernatat, & dolores circa musculos spinales, superveniencia, abscessum præfagit.

veritate hujus observationis minime sit dubitandum, sed potius mirandum, Nostrum senem in rimandis phænomenis, ut ex iis formaret prælagium, neminem habuisse parem. Equidem fateor, etiamsi similem tractavi casum, me non potuisse, nisi ab Auctore monitum, talem formare prædictionem. Ponit Auctor aliquem, qui diu Lumborum dolore laboravit, sed nullam mentionem calculi vel difficultatis urinæ mentionem facit, qualia quoque in casu nostro non fuere observata; potuit ergo illa doloris causa hæere in partibus lumborum circa renes. Quando illa materia acris ibidem satis diu hæsit, tandem aucta acredine circumjacentes partes magis vellicare incipit, ut inde circa locum hunc concitetur inflammatio: hucusque incerti sumus, quænam sit pars dolens, & quid sit expectandum; multæ tunc a medicis fiunt conjecturæ, sed obstupescunt ab eo dolore non reddi calculum, neque urinæ difficultatem fieri, vel reddi cum urina quædam aliena. Hoc nunc in ambiguo statu si concitatur febris acuta, & redditur urina, cui pingue & confertum supernatat ex monitu Auctoris, certum prælagium formare possumus, circa hunc locum futurum esse abscessum, vel externum vel internum. Nam si doloris exacerbatio tactu externo non exasperatur, verendus est Abscessus internus, quia tunc inflammatio altius latet: sed si attactu levi intendatur dolor, spes est, externe fieri posse Abscessum, quia locus inflammatus cuti propior est. Istud nunc acre circa lumbos hærens inflammationem localem faciens, per consensum generat febrem Inflammatoriam ardentem per totum corpus, uti aliæ magnæ inflammationes locales, qua febre ardente, ut superius monuimus, liquefcit pinguedo & traditur circulanti sanguini. Et quoniam Renes proxime adjacent, ab eodem stimulo etiam agitantur, ut non solum urinam copiosius extrudant, sed & etiam pinguedinem transmittant. Quando igitur post Dolores lumborum diuturniores accedat Dolor circa Musculos spinales, febris ardens per totum corpus, & cum tali descripta urina, signum est, acre id tamdiu latitans, in partibus adjacentibus concitasse validam

dam inflammationem localem, quæ in abscessum desinere debet: nam si causa inflammationem produciens manet, ut fit in hoc humore acri, concitata Inflammatio semper abi-
re debet in purulentiam, & nunquam critiche resolvi potest. Pus dein factum in hoc Abscessu nato per renes reddi ne-
quit, quia extra renis substantiam fuit formatum; si vero ipsi Renes inflammentur, sæpe redditur cum urina pus, quod in hoc casu fieri nequit. Inde sequitur necessario puris collectio vel in parte cellulosa externa peritonæi, quando dicitur Abscessus internus; vel in tunica cellulosa sub cute, quod melius, quando formatur abscessus externus. Fieri etiam potest, ut pus colligatur in tunica cellulosa inter musculos lumborum, quod rarius. Hujusmodi abscessus interni periculosissimi sunt, siue maneant in sacco dilatato peritonæi, & se exonerent per longam fistulam externe, quod etiam observavi, siue interne rumpantur, fundentes pus in ventris cavitatem, ubi dein Tympanitidem produ-
cunt. Nam fistula talis inter musculos decurrens difficile aperta servari potest, & clausa relinquit pus intus; & quamvis aperta maneat, faccus internus formatus vix de-
purari poterit, suppeditans continuam Puris] vel Ichoris scaturiginem.

LIB. VII. A P H. xxxvii.

362. **Q**ui sanguinem vomunt, si quidem sine febre, sa-
lutare; si vero cum febre, malum. Curandum
autem refrigerantibus & adstringentibus.

I.

TAntam fidem & candorem in Auctore nostro passim
detegimus, ut nullibi observationem practicam po-
nat, quin eam in ægris detexerit, in theoreticis au-
tem hinc inde a veritate decedit, non vero malo animo, sed
O o o o o 3 quia

An sangui-
nis vomitus
sine febre,
salutare?

quia præcepta theoretica defectu experimentorum non satis fuere eruta. Quamvis igitur paradoxum videatur, Vomitus cruentum esse salutarem, si fiat sine febre, quum superius (*Aph.* 135, II) dixerit, malum esse omnem sanguinem sursum emissum, non tamen credo, hanc sententiam posuisse sine salubri detecto effectu: quod nempe homo abundantia sanguinis laborans per vomitus cruentum supervenientem fuerit liberatus ab istis urgentibus symptomatibus. Verum hujusmodi casus tam rari sunt, ut vomitus cruentus sine febre contingens, non mereatur salutaris dici. Sed si comparetur ad hæmoptysin, censendus est minus periculosus, quia sanguis in Ventriculo restans commodius per inferiora etiam potest emitte, quam sursum ex Pulmonibus; atque satis longa quies ad consolidandum concedi potest Ventriculo, quæ Pulmonibus non est concessa. Neque tam absolute hic Vomitus salutaris potest dici ex mente Auctoris, quum in fine addit curationem cohibentem ulteriorem Vomitus cruentum.

Sanguinis
vomitus
cum febre,
malum.

II. Sanguinis fluxum curare febrem (*Aph.* 170, II) & prævenire abscessum (*Aph.* 184, II.) demonstravimus, quod autem idem sanguis per Vomitus redditus in febribus malum significet, ex aliqua accedente ratione venire debet. Qui enim sanguinem in febre vomunt, his signum est, impetum ferri ad interiora viscera, quod malum est, dein conatu vomendi, ex quo nullum fit levamen, & agitatione febrili simul fatigatur; denique portio sanguinis in Ventriculo restitans, calore febrili promte in corruptelam convertitur, quæ nova ingesta etiam corrumpere valet. Igitur etiam si salutaris sit hæmorrhagia narium in febribus, Vomitus tamen cruentus ratione organi & accidentium rerum, malus esse solet.

Sanguinis
vomitus an
adstringen-
tibus & re-
frigeranti-
bus curan-
dus?

III. Generalem curationem in sanguinis Vomitu hoc loco proponit, quia non determinat, an sit adhibenda in vomitu illo cum vel sine febre. Absolute ergo monet, adhibenda esse adstringentia & refrigerantia, qualis curatio adhiberi solet in omni sanguinis profluvio; atque invenio, omnes quoque præcticos hanc Methodum sequi. Postquam vero
bene

bene omnia ponderaveram, quæ in tali Vomitu cruento fiunt, & experiebar hanc methodum non bene procedere, ob graves aliquas rationes eam methodum in meis ægris repudiavi, & aliam institui, quam reticere in publicum commodum nolui. Si ab acribus allumtis generetur sanguinis Vomitus, ne aliquid de eo acri restaret in ventriculo, danda est potio diluens, quæ Vomitu rejecta id acre simul aufert, sed si fiat a causa interna, vomendi conatus compescendus parva quantitate vini rhenani diluti cum citri succo & laudano liquido, cavendum ab omni adstringente & coagulante: hæc enim sanguini in ventriculo effuso mista, eum in thrombum contrahent, qui vomitu difficile potest reddi & sua duritie, & tandem acrimonia laceffet ventriculum, & ad novum vomitum instigabit, dum interim coagulans datum contentis ventriculi, ut & sanguini mistum, ad contrahendum vasculum apertum sanguinem fundens nihil præstare possit. Quare adstringentia magis obsunt quam profunt in sanguinis Vomitu: sed retentus Ventriculus vacuus ita contrahet vasculum antea apertum, ut sponte sistatur sine damno effluens sanguis, & ita adducta vasculi latera inter se consolidantur. Quare præcipua curationis pars est facere & servare ventriculum quantum fieri potest vacuum, per aliquot dies, ingerenda alimenta liquida tam parva copia & partitis vicibus, ut vita servari possit, evitando omnia duriora acria & copiosiora. Quibus continuatis sponte cessabit sanguinis Vomitus, quod Adstringentibus facile fieri non potuit.

LIB. VII. A P H. XXXVIII.

363. **D**estillationes in ventrem supernum, in viginti diebus suppurantur.

I.

Destillatio-
nes in pe-
ctus quo
tempore
suppuran-
tur?

Catarrhorum theoriam omnium maxime invenio intricatam & multis obscuritatibus obrutam, tam ratione originis, quam exitus & cursus. Maxima pars medicorum Catarrhos e capite provenire & in eo generari contendit, uti in organo destillatorio condensatur aquæ vapor frigiditate capitelli, quum cerebrum frigidius assurgentes vapores condenset & dein destillare faciat: hæc autem sententia per demonstrationes anatomicas diu refutata fuit, quia assurgentes ex ventriculo per œsophagum, & ex pulmonibus per tracheam, vapores ad cerebrum pertingere nequeant. Neque conveniunt de exitu Catarrhorum, arteriæ enim oppositum cursum servant, & venæ materiem omnem ducerent ad cor, sed non cogitarunt, nervos quoque ex Cerebro oriri & varias adire partes. Si igitur in eo succo, qui humectat & nutrit partes encephali, aliqua generatur acrimonia, illa capsulis nervorum a dura & pia matre mutuatis ad varias partes duci porest. Quare de origine & cursu Catharrorum nulla obstat via, quin duci possit ad varias corporis partes, & ita etiam ad Ventrem superiorem seu Pectus, qualis pars hoc loco intelligitur. Sed tunc illa restat summa difficultas, quomodo materia Catarrhosa acris lymphatica possit in Suppurationem commutari, quoniam experimur, catarrhos in nares vel fauces, vel pulmones descendentes raro purulentiam proferre, sed mucum aut tenuem humorem corrodentem, vel magis spissum, uti experimur in Coryza, Branchio, & Tussi ex Catarrho natis: nisi velimus per suppurationem hoc loco intelligere materiæ hu-
jus

jus tenuioris degenerationem in materiem crassio rem & albicantem, qualem mutationem frequentissime in Catarrhis observamus, non vero commutationem in verum Pus. Materia enim acris & tenuis nullibi in verum pus commutatur, sed in materiem albam tenaciorem, quæ quoad aspectum non multum a pure differt. Quod autem partes Catarrho vexatæ tandem verum pus proferant, istud non fit ex mutata materia catarrhosa in Purulentiam, sed si ista materia corroserit partem & ulcus formaverit, quod pus fundit, sicuti etiam superius in materia Erysipelatosa (*Aph.* 345.) observavimus. Igitur deducerem ex hac observatione, quod etiam praxi respondet, materiem Catarrhosam in Ventrem superiorem destillantem, intra viginti dies commutari in materiem albam magis cohærentem, seu concoqui.

L I B. VII. A P H. xxxix.

364. **S**I quis sanguinem & grumos mingat, & stranguariam habeat, & dolor incidat ad perinæum, & anum ventrem, & pectinem, partes circa vesicam laborare significat.

I.

Totus hic superius (*Aph.* 190.) invenitur, quare non opus repetere.

L I B. VII. A P H. xl.

365. **S**I lingua ex improvise impotens fiat, aut aliqua corporis pars siderata, melancholicum hoc ipsum fit.

I.

Materia morbosa in corpore hærens, uti est Melancholica (*Aph.* 119, II), quædam constantia infert symptomata seu phænomena, ex quibus detectis

P p p p p

ccgref

Ex melan-
cholia lin-
guæ impo-
tentia, &
partis apo-
plexia.

cognoscimus, illam materiem intus latere: alia autem interdum superveniunt, interdum vero non conspiciuntur; hæc adduci possunt ad majorem firmitatem, uti hoc loco Linguae impotentia, & pars corporis apoplectica: cognoscimus hæc symptomata ex melancholia venire, si homo melancholia laborans, & nullo alio morbo, ex improvise corripitur Linguae impotentia & Apoplexia partis. Illa autem observatio videtur inutilis, quia jam constabat ægrum laborare melancholia, & propterea non opus esse ex reliquis advenientibus symptomatibus, hanc detectionem causæ adstruere. Alio autem modo fit in exercitatione practica, si enim inscius sim, Linguae impotentiam & Apoplexiam partis oriri posse a materia melancholica, & consular de his duabus simul subito obortis symptomatibus, quæ curanda sunt ablatione causæ, incertus hæreo, quid sit prælagendum & faciendum, nisi sciam monitus, hæc oriri posse ex materia Melancholica. Sed si monitus fuero per hanc observationem, ulterius inquirere valeo, num characteristicæ melancholiæ signa (*Aph.* 288, I) adsint, quæ si invenero, hæc symptomata ut morbum melancholicum curare (*Aph.* 119, III) debeo. De his ergo symptomatibus statim pronunciare valeo, periculum esse, quia omnis materiæ melancholicæ decubitus periculosus est. (*Aph.* 321. I) Nam Linguae impotentia ἀκρατής notat debiliorem & minus validum motum, quam qui ad loquelam formandam requiritur. Illa autem linguae impotentia, qua delirantes absurda effutiunt, species delirii est, in quo sensu hic non videtur accipi, quia addit Apoplexiam alicujus partis (*Aph.* 321, II) quod notat defectum sensus & motus animalis in quadam parte. Quia vero superius demonstravimus (*Aph.* 321) materiem melancholicam in encephalo ad principia nervorum applicatam, interdum earum partium, ad quas tendunt hi nervi, extinguere vel turbare motum & sensum animale, eodem etiam modo hæc duo symptomata ex melancholia nata sunt intelligenda.

LIB. VII. APH. XLI.

366. **S***I senioribus nimium purgatis singultus superveniat, non bonum.*

I.

EX Hypercatharsi (*Aph.* 197,) & ex Helleboro (*Aph.* 194.) Singultum esse malum demonstravimus. Hoc autem loco determinat ætatem, quod in præcedentibus non fecit, forsan quia detexerat in Senioribus malum fuisse, si Singultus superveniat, & postea detexit hoc omni ætati competere. Obstare videtur, quod hic Aphorismus serius veniat & inde fundamentum prioris esse non potuerit. Verum Aphorismi non sunt eo ordine temporis scripti, uti observationes serie temporis fuere factæ: collectionem horum aphorismorum fecit Auctor in summa senectute ex iis, quæ multo antea fuere observata, quare forsan posterior Aphorismus multo prius fuit inventus, quam Aphorismus prior. Hoc solummodo addere possumus, omnes species Convulsionis, ut est singultus, periculosiores esse in Senioribus, quam Junioribus, & omnium minime periculosas in Infantibus & Pueris.

LIB. VII. APH. XLII.

367. **S***I febris, quæ non est a bile, detineat, aquâ multâ, & calidâ in caput affusâ, febris solutio fit.*

I.

INter omnes morbos Febrim, propter apparitionum & causarum multitudinem, omnium difficillime definiri posse, superius (*Aph.* 153. 1.) demonstravimus. Inter
Qualis Febris non ex bile nascitur?
istas
 P p p p p 2

istas omnes debet esse una species, quæ ex Bile generatur, & itidem altera, quæ non generatur ex Bile. Ut igitur cognoscamus, num multa aqua calida in caput sit affundenda ad curationem, scire oportet, qualis Febris nascatur ex Bile, ut in ea hanc medendi methodum evitemus. Multo certior & evidentior fuisset curatio, si non per denegationem, sed per positionem causæ proposuisset speciem febris: nam fieri potuisset, quod esset etiam alia febris species non ex Bile nata, quæ quoque hoc auxilium non admitteret, quod demonstrare conabor in sequentibus. Omnes febres, quæ ex humore acri tenui & calefaciente in corpore nato, generantur, dicuntur apud Veteres a Bile oriri, inter quas febris tertiana intermittens primas partes tenet: an vero febris ardens, putrida, hectica, & symptomatica ex Bile nascatur, non consentiunt. Igitur incertus sum, num in memoratis febribus, atque in quotidiana & quartana, quæ dicuntur oriri ex pituita & melancholia, caput perfundendum sit multa aqua calida, ad curationem. Proinde incerta hoc loco proponitur curatio. Credo igitur, Auctorem observasse quandam speciem febris egregie solvi hac aqua calida perfusa, sed & expertum esse, in Febribus Biliosis nocuisse.

Qualis febris solvitur multa aqua calida in caput affusa?

II. Quæcumque pars nostri corporis multa aqua calida fovetur & abluitur, ab actuali illo calore paulo magis eo tempore incalescit, atque liberatur a sorditatibus cuti adherentibus, simulque laxatur & humectatur: sed si desinat ille calor actualis, relinquitur pars frigidior & laxior, quam erat ante foturam vel affusionem eam. Si vero illa pars ultra modum incalescat & sicca sit ante hanc affusionem, ut experimur in partibus inflammatis, ab affusione hac lenietur urens calor, humectabitur pars, & tensio laxabitur. Facile ergo erit ex his conjicere, quamam in specie febris hæc methodus valeat: nempe si ex insolatione caput incalescit & siccatum fuit, siccitas enim, & humor tenuis acer ex insolatione natus, humectabitur, atque concedetur liber exitus humori illo, & qui restitabat in poris, simul auferetur. Aut si quis ex laboribus durioribus propter expulsionem humoris

ris tenuioris & compactum sanguinis febricitet, hac capitis ablutione calida, ejus humores compacti resolventur, supeditabitur mitis & tenuis humor aquosus, & solida contracta sicca humectabuntur & laxabuntur. Denique quibus ob aëris frigiditatem vel ventum prohibita fuit perspiratio, & materia illa retenta febriculam concitat, his per aquam affusam calidam liberior conceditur perspiratio, qua id, quod febrem excitat, eliminatur e corpore. His ergo in febribus conducit aqua multa calida in caput affusa: sed si materia sit biliosa, uti experimur in morbis erysipelatosi, per affusionem calidam his augebitur bilis corruptio.

LIB. VII. APH. XLIII.

368. **M**ulier ambidextra non fit.

I.

Miror sane rem nullius momenti in arte medica, & quæ quotidiana observatione comprobari & refutari potest, tot verbis & auctoritatibus agitatam fuisse ab Auctoribus, quod fieri possit vel non, & an sit vera vel falsa. In re omnibus obvia non est opus uti auctoritate, siue enim Veteres hoc dixerint siue negaverint, perinde habetur; quotidiana observatio comprobat, multas mulieres uti etiam viros utrisque manibus sua opera absolvere posse, & tot invenimus mulieres sinistra manu promptiores, quam viros; ideoque dubitare possum, an ab Auctore nostro, qui res magni momenti posteritati relinquere voluit, hic aphorismus sit relictus.

LIB. VII. APH. XLIV.

369. **Q**ui suppurati uruntur, aut secantur, si quidem purum effluat pus, & album, evadunt. Si vero subcruentum, & cænosum, ac graveolens, pereunt.

I.

Puris boni
& mali si-
gna.

Quid sit Pus, ex iis quæ antea exposuimus (*Aph.* 215, II, & 285, I) satis colligi potest. Constat ex iis, esse certum specialem humorem morbosum, sed ex omnibus mitissimum, qui suo fotu & blanda indole promovet consolidationem, quique sanguini mistus facillime vel cum urina emittitur vel per sputum redditur: inde omnia vulnera, ulcera & aliæ læsiones non consolidantur, nisi bonum pus sit præsens. Hoc loco duntaxat duæ notiones boni Puris proferuntur, nempe Purum, & Album, reliquas dedimus. (*Aph.* 285 I.) *Purum* id est sincerum, merum, nullis aliis humoribus mistum, tunc enim notat, tali in abscessu vel cavitate corporis omne alienum in Pus fuisse conversum, non affluere ulterius humores in Pus commutandos; neque Pus ibidem tam diu fuisse collectum, ut abiisset in ichorem: nam sive sit immaturum, sive aliis humoribus mistum, sive in putrilaginem fuerit conversum, exeuns Pus non erit purum. Alterum est ut sit *Album*, quibus addi potest ut sit *Inodorum*, quod alibi notavit Hippocrates, & nos quoque per praxin experti sumus. Uti cuivis humori suus naturalis est color, ita quoque Puri, quod nisi sit Album, nunquam est bonum; ita sanguis debet esse ruber, bilis flava, qui colores sunt inter notiones bonitatis. Unde autem ille color dependeat, non litigo, in posterum forsan opportunior dabitur disputandi locus. Hoc autem asserere audeo contra multos, albedinem eam non pendere ab acido oleosis misto. *Inodorum* necessario debet esse, quia foetoris præsentia declarat corruptionem.

nem. Contraria vero numerantur tria signa, licet plura sint quæ Puris malignitatem declarant. *Subcruentum* ὑφαίμουν, non est valde malum signum in Pure, si appareat in sputo tus-
siendo emisso, aut in effluente pure ex aliquo abscessu, signum enim est, vasculum aliquod exiguum adhuc esse a-
pertum sanguinem fundens: sed si pus collectum fuit in cavo pectoris, malum est signum, quia designat pus tunc corrodendo læsionem vasorum intulisse, quia hic hæret in naturali, non vero in cavitate vi morbi facta, ubi natura-
le est, ut quædam vascula sint aperta. *Cænosum* βαρλοῦ-
δες, tunc dicitur, si loco puris albi, æqualis, & puri, redda-
tur materia purulenta sordida, lutosa, limosa, quæ partim est crassa, partim tenuis, coloris alieni; talis nascitur quan-
do sanguis reliquique humores Puri admisti non per vim vitæ convertuntur in materiem purulentam, sed per corrup-
telam convertuntur in talem materiem partim spissam, & partim tenuem: signum ergo est, spontaneam corruptelam prævalere, quæ nunquam aliquid boni portendere potest. *Graveolens* δυσώδης Pus, licet omnes reliquas boni Puris no-
tiones habeat, semper censetur malum, quoniam indicium est, vel ipsum Pus esse putrefactum, vel ei putrefactos hu-
mores esse mistos; quo vero fœtor est gravior, minusque tolerabilis, eo pejus est indicium, quia significat eo majorem puris corruptionem.

II. Sive Suppurati ἔμπυροι sint homines pus continentes in cavo pectoris, qualis est communis significatio, sive in quavis alia naturali corporis cavitate, vel in cavitate vi morbi facta, quando Abscessus appellari solet, si Pus spon-
te, solutis integumentis, vel facta sectione aut unctione, evacuetur, ex ejus qualitate judicare possumus, num fanitas vel mors sit expectanda. Ex descriptione Auctoris patet, istis temporibus secando & urendo fieri aperturam, hodie autem, si sponte non aperiatur abscessus, vel erumpat ex cavitate naturali Pus, nunquam ferro ignito aperturam faciunt, sed secando vel applicatione corrodentis viam parant exitui Puris. His autem omnibus modis & sponte si exeuns Pus sit malum, ipsa evacuatio tandem mor-

Suppuratis
sectis vel u-
ctis ex pure
peti potest
præfagium.

mortem infert. Supra (Aph. 292.) notaverat in similibus casibus mortem instare a pure acervatim effluente, hoc nunc loco prognosin petit ex Puris qualitate, & detexit, si Pus bonum exeat, sanitatem expectari, sed si Pus malum conspicitur, instare mortem. Pus enim exeuns nobis non solum præbet indicium Puris remanentis, verum etiam partium circumjacentium, quæ pus sustentant. Quod si Pus bonum exeat, signum est ex puris qualitate aliena nihil verendum esse, partes ambientes ab attactu hujus puris facile consolidari posse, ergo in tali casu nihil est verendum ex pure, nisi quod possit nimis magna quantitate evacuari, quod evitari debet & potest, vel quod ejus evacuatio intercipiatur, quando stagnando corrumpetur, quare sedulo cavendum, ne boni Puris exitus intercipiatur, ejus enim est naturæ (Aph. 341, I.) ut nunquam assimiletur bonis humoribus, vel invisibiliter evanescat. Sed si exeuns Pus sit Malum, residuum intercipiet consolidationem, inficiet bonos circulantes humores, & corrumpet partes firmas cingentes: postquam satis diu fatigavit hominem febre hectica, & consumptione humorum, homo corruptis tandem omnibus humoribus, & privatus viribus peribit.

LIB. VII. APH. XLV.

370. **Q**ui ad hepar suppuratum uruntur, aut secantur, si quidem purum effluat pus & album, superstites evadunt: ipsis enim pus est in tunica. Si vero effluat velut amurca, pereunt.

I.

Ex Hepatis
abcessu pus
bonum salu-
tarem por-
tendit.

HEpar duplicem exercet functionem, habet enim arteriam hepaticam motu vitali donatam, ut omnes corporis partes; atque exercet motum particularem ad

ad Bilis confectionem & secretionem. Observamus regulariter ab actione vitali generari inflammationem & produci purulentiam ubique in corpore, sed an quævis organorum specialis actio etiam conficiat pus, non satis per praxim confirmatum est: invenimus quidem organa speciali motu donata suppurari, sed invenimus etiam frequentius abire in putrilaginem si afficiantur, quam partes reliquæ, in quibus peculiaris non detegitur motus. Si ergo in parte externa hepatis, ubi præprimis ludunt rami arteriæ hepaticæ, abscessus generatur, is saccum formare potest inter communem a peritonæo tunicam & propriam hepatis, quod etiam observavit Auctor; ipsis enim, inquit pus est in tunica. Si pus ex sacco eo per exteriora corporis integumenta fundatur, quod etiam sponte, ut ego etiam observavi, vel incisione, aut unctione, fieri potest, exeuns pus est observandum, nam si sit bonum (*Aph.* 369, 1) æger æque quam ex abscessibus aliorum locorum servari potest.

II. Sed si Abscessus altius penetrat in Hepatis substantia, ut portio ipsius organi destruat, formatur materia partim ex Pure, partim ex partibus firmis organi cholepoietici & sanguine venæ portarum atque bile. Inde materia illa ita mista, quia refert recrementum olivæ, vocatur Amurca. Quoties ergo Pus velut Amurca exit, signum est, ipsam Hepatis substantiam consumi; &, quoniam Hepar parvo motu vitali donatum est, se non facile potest liberare, atque humor alienus Puri mistus consolidationem impedit: quare lenta tabe cum flavo vel subluteo colore ægri consumti tandem pereunt. Talem autem abscessum in dextro hypochondrio perruptum vidi sanatum in quadam Matrona; sed hæc exempla tam rara sunt, ut, si observamus talem Abscessum, pronunciare possimus, si non sit lethale, tamen esse periculosissimum.

Pus velut Amurca mortem præla-
git.

LIB. VII. A P H. XLVI.

371. **I**N doloribus oculorum, postquam merum bibendum dederis, & multâ calîda laveris, venam secato.

I.

Verba hujus & Aphorismi præcedentis (*Aph.* 296.) vix inter se differunt, sed tamen sensus est diversus, quia in præcedente varia genera auxiliorum tentanda proposuit, in hoc autem auxiliorum ordinem proponit. Quibusnam in causis ad Oculorum Dolores varia illa auxilia sunt adhibenda, dicto loco exposuimus, sed si deberem certam aliquam causam dolorem oculorum inferentem proferre, eandem darem cum Galeno responsionem. Si quis nos docere possit affectionem, cui tria hæc remedia sint opus, ei profecto gratiam habituri sumus. Quamdiu autem Aphorismum ut germanum, & legitimum recipient, & explicabunt, nec quænam ea sit affectio docebunt, non facile eorum expositionibus fidem adhibebimus.

LIB. VII. A P H. XLVII.

372. **H**ædropicum si tussis habeat, desperatus est.

I.

Totum hunc Aphorismum & ejus explicationem invenies, (*Aph.* 300.) ut non sit opus repetere.

LIB. VII. APH. XLVIII.

373. **U**rinæ stillicidium, & urinæ difficultatem vini potus, & venæ sectio solvit. Secundæ vero internæ venæ.

I.

Stranguriam venæ sectione solvi, & secandas esse internas venas, supra (*Aph.* 301.) exposuimus. Restat ergo hoc loco videre, quomodo vini potione, *ῥώρησι*, curari potest Stranguria & Dysuria. Stranguriæ (*Aph.* 110, iv.) definitionem dedimus, & ab ea non multum distat Dysuria, quando cum difficultate vel dolore urina reddi debet. Ex his colligi potest, utrumque morbum generari posse ex variis causis, & propterea curari non posse eodem genere auxilii. Hoc etiam expertus est Auctor, quia duo diversa auxilia tradit, quæ observavit levamen attulisse, nempe Venæ sectionem, quæ minuit motum, & Vini potionem, quæ auget corporis calorem. Si ergo junior medicus utroque genere auxiliorum uti vellet, tantum noceret, quantum prodesset: ne igitur in posterum faciamus periculum, videndum est, num ex motu languidiore generetur Stranguria, & Dysuria, tunc largior Vini potatio est concedenda: sed si experimur adesse ardorem, signa febris vel inflammationis, a Vini potu abstinendum, sed Vena secanda est.

Stranguria
& Dysuria
solvitur vini
potu.

LIB. VII. APH. XLIX.

374. **A**ngina detento tumor & rubor in pectore superveniens, bonum: foras enim vertitur morbus.

I.

Sensus hujus sententiæ expositus est. (*Aph.* 302.)

LIB. VII. APH. I.

375. **Q**uibus cerebrum sphacelo fuerit affectum, in tribus diebus pereunt: si vero hos effugerint, sani fiunt.

I.

Sphacelus
quid sit.

Priusquam prognosin formare possumus, constare debet, quid per Sphacelum sit intelligendum, perspicuus autem auctores & ipsum Galenum optimum Hippocratis interpretem, tot invenio tricas & ambiguas significationes, ut vix constet, qualis morbus per Sphacelum sit intelligendus; Foësius multa loca collexit, ex quibus patet Sphacelum indicare Ossis siderationem; omnium partium corruptionem seu siderationem; vitiatam carnem in ulcere; partis internecionem inchoatam sed non firmatam; Inflammationem tendentem in corruptionem; immoderatum & vehementem dolorem; convulsionem ex nervorum inflammatione; fortem tensionem; putredinem & multa alia mala. Dolendum utique est, tot res diversas eodem vocabulo indicari, quia tunc semper dubii hæremus, qualis morbus sit intelligendus. Nos autem ad omnem ambiguitatem evitandam, in *Chirurgia Repurgata* (623) per Sphacelum intelleximus universalem mortificationem alicujus partis, & distinctionem fecimus inter Sphacelum, Gangrænam & Escharam, quam significationem ubique teneo, ut semper constet, qualem morbum intelligo per Sphacelum. Nostra autem significatio hoc loco admitti nequit, quum dicat Auctor si triduum effugerint sani fiunt, dum pars Sphacelata nunquam in vitam redeat, & si Cerebrum tali Sphacelo esset correptum, nullus servaretur. Igitur plane alium morbum Hippocrates hoc loco intellexit, quem potuit æger superare, ut redeat in sanitatem.

II. Ob.

II. Observavit Hippocrates. (H. a. 344.) Si æstas sicca existat, & borealis, sequens vero autumnus pluviosus & australis, capitis dolores ad hyemem expectare convenit, & cerebri corruptiones, ampliusque raucedines, gravedines & tusses, aliquibus etiam tabes. Ex tali tempestatum vicissitudine generari humorem crudum & acrem, demonstravimus (Aph. 92.) qui hoc loco encephali sphacelum inducit. In Coacis H. a. 538. Cerebro corrupto alii in tribus diebus, alii in septem moriuntur. Has vero si effugerint, servantur. Has Auctor deduxit generales regulas ex Libro de Morbis: nam (H. b. 39.) Si cerebrum, inquit, corruptum fuerit, dolor ex capite spinam occupat, & ad cor animi deliquium procedit, & sudor est, & somni expers est, & ex naribus sanguis fluit. Sape etiam sanguinem vomit. Infra addit. Hic tertia aut quinta die plerumque perit. Atque H. b. 51. Si Cerebrum corruptum fuerit, dolor ex cervicis nervo ad spinam tendit, & ad cor frigus descendit, & derepente novus sudor adest, & per nares sanguis fluit. Vomunt quoque multi. Hic triduo moritur. Si vero septem dies transgrediatur. &c. Pauci hujusmodi morbum effugiunt. Dein H. b. 98. Si cerebrum corruptum fuerit, dolor caput tenet, & per collum procedit ad spinam, & ager non audit, & frigus ad caput devenit, & totus intumescit, & derepente privatur voce, & ex naribus sanguis fluit, & lividus fit. Quod si morbus leviter corripiat, ubi sanguis discessit, melius habet. Si vero vehementer correptus fuerit, cito perit. Huic sternutationes per odorata inducito, & alvum purgato &c. Præter hos morbos internos Ossis corruptionem indicat σφάκελος ἐγκεφάλῳ; nam si corruptio, inquit (H. b. 53.) Cerebrum invaserit, dolor tenet maxime anteriorem capitis partem, paulatim etiam intumescit, & livida fit: & febris & rigor apprehendit. Quum ita habuerit, secare oportet qua parte intumuit, & perpurgato osse, ipsum radere, donec ad secundam laminam perveniat: deinde velut fracturam curare. Ex istis locis allegatis possumus deducere Causam, Phænomena, Moriendi & Sanitatis tempus atque Curationem. Nam per Autumnum pluviosum & australem, materia, præcedente æstate sicca compacta, retenta sensim hyeme fuit facta acrior, atque ita induxit

Ex qua
Cerebri
Sphacelo
post tridu-
um sani fieri
possunt

morbos catarrhosos acres, quæ materia ad pulmones magis deposita inducebat Tussim; ad membranam pituitariam delata Gravedines; sed ad interiora encephali deposita Cerebri corruptionem: nempe ab hac materia partes in Encephalo compressæ & corrosæ mortem intulerunt; sed etiam superari & expelli potuit non tamen sine periculo. materia ea, quia nonnulli ita affecti superstites manserunt, uti ex hoc Aphorismo & locis allegatis constat. Unde legitime concludere possumus perfectam non semper intelligi ab Auctore mortificationem alicujus partis, uti hodie per sphacelum intelligimus, sed aliquam dispositionem, quæ in mortificationem abire potest. Phænomena hujus materiæ delatæ ad Encephalon sunt Capitis dolor, ad spinam descendens, Vigilæ, Cordis frigus & Animi deliquium, Sudor derepente obortus, Auditus & Vocis privatio, Capitis frigus & intumescencia, sanguis fluit ex naribus & sanguinem vomunt, ex quo videntur levare, qui vehementia hæc habent symptomata, cito pereunt, sed leviter affecti diutius vivunt & servantur. In una specie Auctor laudat irritantia, in altera autem refrigerantia. Ex quibus collectis judicare possumus, materiem illam acrem crudam retentam ad interiora capitis delatam magis minusque esse calefacientem, & acrem corrodentem. Constat ergo Cerebri Corruptionem his locis vocari ab Hippocrate, si materia acris, quæ occupare potest internam laryngis membranam, vel pituitariam narium, occupet Duram matrem & ejus prolongationem per medullam spinalem, non vero hujus partis mortificationem. Hoc probant etiam omnia phænomena: nam si materia illa feratur ad nares, sternutamentum facit cum refrigeratione totius corporis & quadam febricula, atque effluit in principio humor copiosus tenuis, irritans nares & labia; interdum etiam hæmorrhagiam patiuntur. Si vero ad interiora laryngis feratur, fit etiam ex irritatione Tussis, qua multum muci ejicitur, atque tumente ea membrana fit difficilior respiratio; per totum reliquum corpus refrigeratio, horripulatio, febricula. Eadem nunc materia ad Duram matrem delata, si Dura mater

mater eandem exerceret actionem uti partes recensitæ, eadem quoque fierent phænomena, sed ex ejus loco & usu diverso alia omnino symptomata conspiciuntur. Nam tumente & irritata illa membrana homines vigilant, vel compresso aliquomodo nervo acustico æger non audit, & quia illa materia partibus membranosis applicata sensum frigoris inducit, hinc frigus ad caput devenit, atque dolet: continuata illa membrana per medullam spinalem, huic parti etiam infert dolorem & refrigerationem. Si etiam ad posteriora Encephali veniat, ubi locatum est cerebellum, id aliquomodo a tumente membrana compressum, facit, ut cor se minus moveat, id est languidiore motu refrigeretur, & denique per tempus subsistat, qualis morbus vocatur Animi deliquium. Quomodo autem sanguinis fluxus fiat per Nares facile intelligitur, quia in Coryza hoc quoque observatur, sed sanguinem vomere majoris videtur difficultatis: verum quia sæpe fit, si in faucibus sanguis fluat, quod talis homo deglutitum sanguinem rejiciat, credibile mihi videtur, hoc etiam fieri in nominato morbo. Quemadmodum in reliquis catarrhorum speciebus levamen fit, non vero curatio per hæmorrhagiam, hoc etiam fieri observavit Auctor in Cerebri Sphacelo: propterea non monet venam esse secandam, sed potius esse cohibendum sanguinis fluxum. Si vero, inquit, *plus justo sanguinem vomere tibi videatur, aut ex naribus ipsi fluat, a vomitu quidem bibat farinam trimestris tritici in aquam inspersam: si vero ex naribus fluat, venas & in brachiis & in temporibus splenis suppositis deligato. At si neutrum horum ipsi adfuerit, dolet autem cervicis nervum & collum, & spinam, & frigus ad cor processerit, cum ervo pectora, & dorsum, & cervicis nervum, & collum calefacito. Nam his factis maximam utilitatem capere poterit.* (H. b. 51.) Quibus patet cohibere velle sanguinem fluentem, & calefacientibus absorbentibus conari ablationem humoris istius crudi & acris. Ergo certe constat hæc symptomata in Cerebri corruptione non oriri ab inflammatione tendente in sphacelum verum, sed provenire ab acri crudo irritante meninges, cujus acrimonia si sit valida &

copia.

copia magna cerebrum ita opprimitur, ut æger moriatur vel post tres, quinque vel septem dies. Sed si ille humor reddi incipit per nares vel sputum vel urinam, ægri liberari solent.

LIB. VII. A P H. LI.

376. **S**ternutatio fit ex capite, percalefacto cerebro, aut perhumectato, quod est in capite, vacuo. Aer enim, qui intus est supra modum (i. e. vi) foras effunditur. Strepit autem, quia per angustum ipsi est transitus.

I.

Sternutatio.
eius causa.

IN nobis viventibus ex irritatione facta in cavis narium fit quidam motus involuntarius validus convulsivus, quo aer pulmonibus receptus vi truditur in superiora faucium, palatum mobile & cava narium, exeuns partim per os, partim per nares cum sibulo. Ut illa actio maiore robore fiat, atque maiorem aeris copiam trajiciat, antequam inchoatur, pectus, quantum fieri potest, dilatatur & ore aperto magnam aeris copiam recipit; dein facta violenta constrictione omnium muscutorum, tam abdominalium, quam aliorum, qui angustare possunt pectoris cavitationem, receptus ille aer magna vi extruditur per laryngem ampliatam: ita ruit in fauces, tonsillas, palatum mobile, basin cranii, posteriora narium foramina, exitum sinuum, qui obteguntur membrana pituitaria, & cava narium, ut ita cum sibulo exeat. Hac aeris concussione & valido transitu omnes hæ partes quatuntur, & mucus, qui in earum lacunis hæret, excutitur, aut si externe aliquid adhæreat abripitur, & una cum aëre exeunte sæpe extruditur, ut id irritans, vel in lacunis hærens auferatur, quemadmodum tussiendo excluditur alienum in trachea hærens.

Hæc

Hæc actio involuntaria tussendi mechanice concitari potest quavis irritatione facta ad membranam interna narium vestientem per plumelam, pilum, evulsionem vibrissarum, attractionem pulverum vel vaporum stimulantium cum aëre: sine manifesta causa tamen simili modo generatur ab humore acri hic stagnante vel huc confluyente ex sinibus se hoc loco exonerantibus. Ergo Causa sternutationis est irritans hanc membranam, sive sit externa sive interna.

II. Facile intelligitur, Hippocratem hoc loco tradere vel le causas Sternutamenti ex causa interna, sine ulla cognita causa externa, ut possent medici ex Sternutamento in morbis veniente præfagire, quid sit sentiendum ex oborto hoc phænomeno, & quid esset agendum. Primam causam dicit esse Cerebrum percalefactum, id est, si motus vitalis in encephali partibus validior nimium calorem concitavit, arteriæ in membrana pituitaria magis agitatae, sua actione stimulantur faciunt tale irritamentum in hac membrana, uti fit a calefacientibus pulveribus vel vaporibus naribus attractis, qua commota membrana naturali lege concitatur Sternutamentum. Inde in impetu majore sanguinis ad caput toties generatur Sternutamentum, quod iterata concussione tandem sanguinem extrudit, aut illa vascula disrumpit, atque facit hæmorrhagiam narium, quâ illa vasa deplentur, & minuitur impetus, in quo casu Sternutamentum est præfagium bonæ hæmorrhagiæ. Sed si ab inflammationis meningibus per consensum pituitaria membrana agitur, vel si ipsa membrana inflammetur, molesta, fatigans, & iterata fit Sternutatio, sine hæmorrhagia subsequente, qua agitatione pars inflammata magis exasperatur. Inde intelligitur, cur in quibusdam morbis acutis atque epidemicis interdum salutaris, aut interdum lethalis observatur sternutatio. Altera causa erat perhumectatum, quod est in capite, vacuum. Veteres, in Anatomicis non satis periti, existimarunt humores in capitis vacuo spatio, id est, in Cerebri ventriculis, collectos expurgari per nares, quæ sententia diu fuit firmata; sed postquam Anatomici demonstrarant, nullam ex ventriculis cerebri ad nares

Sternutatio
fit ex capite,
percalefacto
cerebro, aut
perhume-
ctato, quod
est in capi-
te, vacuo.

esse viam, hæc sententia omnino fuit repudiata. Observatio autem practica eam viam adstruere videtur, quum Cerebrum humiditate, uti videtur, oppressum, liberetur copiosiore evacuatione muci per nares, & gravitas Cerebri levetur Sternutamento, quo multum muci elicitur: verum si membrana pituitaria multo mucositate sit oppleta, aggravatur etiam caput, & ille potest facile per nares expurgari. Quamvis autem demonstrari possit per aliam viam fieri posse talem evacuationem, hoc tamen non demonstrat, fieri non posse evacuationem ex encephalo. Qui contendunt duram matrem accurate obtegere Os Ethmoidem, ut nihil humidi perfluere possit ex encephalo ad nares, illi non concipiunt, nervos Olfactorios ire per hoc os ad cava narium, in quo transitu negari nequit, aliquid etiam humidi permeare posse. Sive ergo concipiatur, in sinibus frontalibus vel ephippii hæere mucum, qui in cavum narium destillat, sive concipiatur humiditatem encephali secundum Olfactoriorum cursum in nares descendere, in utroque casu homo sentiet Cerebrum seu caput aggravatum, quæ gravitas minuetur humidi evacuatione per nares. Si hic mucus vel humor tenuior sit mitis, non concitabit Sternutamentum, sed si quædam acrimonia adest, illa vellicans internam narium membranam Sternutamentum concitat, quo elicitur ex hac membrana, quæ & interne vestit sinus recessitos, muci abundantia, cujus evacuatione tollitur ille humor aggravans.

Aer intus vi
foras effun-
ditur.

III. Rationem reddere satagens Autor, quomodo Cerebro calefacto, ex spatio vacuo, tanta vi extrudatur in sternutantibus aer, putat humidum in ventriculis cerebri contentum a Cerebri caliditate commutari in vaporem, uti aqua in lebetes vel vase clauso ab igne substrato, si tunc alicubi formatur apertura, exhibet aer cum impetu. Experimentum utique est verum, sed falsa est facta analogia, nunquam enim cerebrum ita incalcescit, ut est ignis gradus, qui aquam ebullire facit & in vaporem convertere, neque via tam patula, per quam potuisset ille vapor per nares emitti. Atque ille aer qui in Sternutantibus

tibus exit, non venit ex encephalo sed ex pulmonibus.

IV. Vera est observatio, Aërem vi per angustum actum edere strepitum, nam aër ex pulmonibus pulsus magno conamine in nares angustiores strepitum edit: sed concipere illum strepitum fieri ab aëre in ventriculis cerebri hærente & expanso, omnino anatomicis observationibus repugnat. Hoc autem existimarunt Veteres, quoniam videbant tantam simul humiditatem ejici, sed non conceperunt, illam humiditatem ibi prius collectam fuisse, & nunc cum aëre ex pulmonibus veniente protrudi.

Aer strepit
quia per angustum ipsi
est transitus.

LIB. VII. A P H. LII.

377. **Q**uibus hepar circumcirca dolet, his febris superveniens dolorem solvit.

I.

Hic Aphorismus verbis multum videtur distare a præcedente (*Aph.* 305.) sed sensu tam parum differunt, ut præcedens illa explicatio etiam ad hunc applicari possit, modo Hepar circumcirca dolens, & Hypochondriorum dolor, idem denotet, uti revera hæc sunt accipienda; nam si Hepar circumcirca doleat, ille dolor in hypochondriis, ubi Hepar hæret, sentitur, & æque per hypochondrii dextri dolorem internum intelligimus Hepatis dolorem, ac si verbis ipsis exprimeretur. In præcedente Aphorismo hi dolores dicuntur fieri sine inflammatione, antequam febris supervenit: sed & hoc loco idem intelligitur, aliter non addidisset Auctor, si febris superveniat. Quare totus sensus ex allegato Aphorismo desumi potest.

Vehemens
hepatis dolor solvitur
superveniente febre.

LIB. VII. APH. LIII.

378. **Q**uibus sanguinem de venis auferre conducit, his vere venam secare oportet.

I.

Totam hanc sententiam supra (*Aph.* 312. II.) exposuimus.

LIB. VII. APH. LIV.

379. **Q**uibus inter septum transversum, & ventrem pituita concluditur, & dolorem exhibet, in neutrum ventrem habens transitum, his per venas in vesicam pituita versâ, morbi solutio fit.

I.

Hydrops omenti solvitur urina multa.

Inter Auctores non constat, qualis locus hic ab Hippocrate intelligatur; sed nullam partem huic loco magis convenientem invenire potui, quam Omentum, quod etiam pituita sæpe oppletur, uti observavi sæpissime in praxi. Istud enim Omentum sub Diaphragmate locatum est & non semper attingit fumen, quod pituita oppletum in parte superiore ventris inferioris sub pectore tumorem pituitosum & mollem format. Diutissime hic hæere posse pituitam sine ullo dolore, & sine mutatione coloris in facie, aliquoties observavi, tandem vero sensim acriore facta pituita dolor generabatur. Quod si cellulis ruptis effundatur pituita, Ascites formatur: si vero sensim magis increascit, ita premit adjacentia viscera, ut ad munera sua peragenda incapacia fiant, & ita lentam mortem inferant. Talem

lem nunc collectionem Pituitæ observavit Auctor curatam fuisse per urinam multam. Quod verum esse nos quoque experti sumus, etiam si multi negant viam. Sed quando per venam epiploicam in venam portarum, & ita in venam cavam conceditur lymphæ transitus, nulla restat obscuritas viarum, per quas illa lymp̃ha antea collecta potuisset venire ad renes & ita nomine urinæ evacuari. Experimur quoque, omnem nimiam humiditatem sanguini circulanti mistam, commodissime eliminari per renes, quare nullam invenio difficultatem, cur etiam hæc lymp̃ha, ita sanguini tradita, non eliminaretur. Quia vero hanc novimus naturalem solutionem, arte hoc etiam tentandum est, ut primo resolventibus & frictionibus tentemus pituitæ stagnantis solutionem & propulsionem, atque dein per diuretica promoveamus educationem.

LIB. VII. APH. LV.

380. **Q**uibus hepar aqua repletum ad omentum eruperit, his venter aquâ impletur, & moriuntur.

I.

Forsan detexit Hippocrates in cadaveribus eorum, qui ex Ascite perierunt, magnam fuisse lymphæ collectionem in ventris cavitate, atque simul Hepatis superficiem hydatidibus, quibusdam integris & quibusdam ruptis, scatere, ex quibus inventis hunc aphorismum composuit. Hoc autem in viventibus cognoscere & præfigire non tam facile est. Nam si Hepar aqua repletum fuerit, simul etiam totus inferior venter tumere incipiet, quia via non satis libera per Hepar concessa, lymp̃ha non potens ire per Hepar, colligitur in vena portarum & in tota ventris cavitate: sed tunc simul aliquis cachecticus vel ictericus

Ex hepatis
hydrope
ventris hy-
drops lethalis.

cuius color aderit ex vitiata bilis confectione, vel ejus impedita excretionem, tument tunc hypochondria in naturali Hepatis loco. Si tanta sit Hepatis obstructio, ut inde impleatur venter inferior, vix ulla spes supererit: nam etiam si ex umbilico tumente & rupto, aut etiam ex scroto collecta lymphæ exoneraretur, vel per paracentesin aufereretur, quia relinquitur in hepate novæ collectionis causa, talis lymphæ ablatio ut plurimum mortem accelerat. Hydatides in vasis lymphaticis nascuntur, quia truncus istius vasis se exonerare nequit, si ergo ex hydatidibus ruptis effunditur lymphæ, nunquam erit stillicidii finis, atque ita tandem corpus continuo privatum lymphæ, moritur.

LIB. VII. APH. LVI.

381. **A** *Nxietatem, oscitationem, horrorem, vinum par pari aqua potum, solvit morbum.*

I.

Vino aquâ
diluto sol-
vitur anxie-
tas.

PAssim monui, Auctorem nostrum ut & Practicos detexisse summum levamen in hoc vel illo medicamento dato in morbis, qui nomen ex phænomeno habent, quod auxilium postea datum, nihil valet: unde admodum incerta habetur curatio. Hoc etiam experimur in hoc Aphorismo, quidam enim Anxii a potu vini aqua diluti statim levantur, atque inveni me Vino rhenano aqua temperato, cum adjecto succo Citri, egregie Anxietatem levare potuisse. Alii autem multo melius curabantur spirituosus aromaticis. Nonnulli liberabantur vomitu & alii iterum alvi fluxu, aut hæmorrhagia. Hæc autem auxilia non sine discrimine levamen attulerunt, sed prout erat causa varia anxietatem inferens. Igitur ex sola Anxietate non est petendum remedium, sed ex causa Anxietatem inferente. Experimur, causas Anxietatis &
Doloris

Doloris non multum differre, sed si causa dolorem inferens, quæ agebat in nervos sentientes, applicetur ad nervos motus particularis, uti ad pulmones, ventriculum, intestina, loco doloris Anxietatem infert. Omnes causas Anxietatem inducentes non est hujus loci agitare, ea sola est perscrutanda, quæ vino diluto curatur. Quod si in ventriculo aliquid putrefactum hærens anxietatem infert, istud tali misto vino acescente dilutum, non amplius anxietatem & fastidium inducit: si autem bilis corrupta in ventriculum delata anxietatem induceret, magis conferret eam materiem vomitorio, vel purgante dato eliminare.

II. Quod statim notavimus in Anxietate, hoc etiam observandum est in Oscitatione, quæ fit, dum homo instigatur ut valide & lente aperiat os, hauriatque aërem copiosorem pulmonibus, ut actione ea lentius moti humores constrictione musculorum os aperientium, atque majore pulmonis dilatatione per musculos motus animalis, propellantur, quod in lethargicis, somnolentis, principio febrium, & ventriculi impletionem est frequens; qui etiam evigilant hac actione Oscitandi propellunt lente a somno progredientes humores. Si stagnantes in ventriculo humores in spontaneam corruptelam abire incipiant, & frequentem Oscitationem faciant, hujusmodi Oscitationes egregie minuuntur tali poto vino diluto, quod simul ventriculi motus blande instigatur; sed inde non sequitur, omnem Oscitationem hac potione curari.

III. Levis contremiscentia cum frigoris sensu vocatur Horror, qui frequens fit a materia cruda partibus nervosis applicata, vel a materia perspirabili retenta: hoc in casu si bibendum detur vinum aqua dilutum & calefactum, id crudum & perspirabile retentum, egregie diluitur & per insensibilem perspirationem eliminatur, qua materia expulsa, cessat etiam illa causa irritans.

Solvitur oscitatio.

Solvitur horror.

LIB. VII. A P H. LVII.

382. **Q**uibus in urinaria fistula tuberculum fit, his suppurato eo & perrupto, solutio fit.

I.

Idem Aphorismus superius (Aph. 192.) invenitur.

LIB. VII. A P H. LVIII.

383. **Q**uibus cerebrum concussum fuerit ab aliqua causa, necesse est, eos statim mutos fieri.

I.

Ex cerebri
concussione
aphonia;

Dum aër pulmonibus receptus, constrictione pectoris urgetur per angustatam glottidis rimulam, formatur sonus, ut transeuns aër per fistulam pneumaticam, ille dein aër in cavitatem oris veniens, varia figura palati, & dentium, atque modulatione linguae & labiorum varias voces format. Tota hæc actio est voluntaria seu peragitur musculis, qui voluntate nostra moventur. Quoties ergo influxus spirituum ex ea parte cerebri in nervos, ad istos musculos tendentes, intercipitur, tota hæc actio voluntaria cessat. Hoc fieri potest, si cerebrum molle ita concutiatur, ut destruatur ejus medullosa substantia, quæ est horum nervorum principium. Naturale autem est in omni valida Cerebri concussione, ut æger ejulet, vociferet, vel alium sonum edat præ nimio dolore ex concussione nato; si vero mutus maneat, signum certissimum est, Cerebrum esse destructum eo in loco, ubi oriun-

oriuntur nervi ad vocis organa tendentes. Eadem autem concussio in alia Cerebri parte surditatem, vel cœcitatem facere potest: quare omnis Cerebri concussio, quæ tollit vel sensum vel motum animale, illa est periculosissima, quia semper denotat Cerebri destructionem vel compressionem.

LIB. VII. A P H. LIX.

384. **C**orporibus humidis carnes habentibus, famem inducere oportet: fames enim siccatur corpora.

I.

Nostrum corpus tali modo a summo Creatore est creatum, ut sua actione, quamdiu vivit, semper aliquid expellat per naturalia emunctoria, & ne fieret humidi defectus, nobis concessit desiderium hauriendi humidum, sub forma cibi vel potionis. Desiderium exigens cibum proprie vocatur Fames, quod autem petit liquidum, proprie dicitur Sitis. Quamvis *λμός* proprie designat alimentorum desiderium, credo tamen hoc loco potius concipiendum esse desiderium potionis, quum abstinencia a potu magis siccatur, quam cibi penuria. Naturalis famis sensus non siccatur, sed abstinencia a cibo humido, igitur hoc loco non est ille sensus intelligendus, sed abstinencia a cibo liquido vel potione. Hoc enim defectu non suppeditatur tantum liquidi, quantum naturali exhalatione & excretionem eliminatur. Quare per abstinenciam diu continuatam generatur humidi defectus in corpore, seu corpus per talem Famem exsiccatur, quum partes firmæ non tam cito pereant, quam aufertur humiditas.

Fames corpora siccatur.

II. Quæ medicamenta Famem deletam excitant, hoc loco intelligi nequeunt, quia non tollunt nimiam carnis humiditatem, sed talia, quæ naturaliter Famem & Sitem faciunt, uti abstinencia major a cibo & potu, atque corpora

Famem inducere oportet corporibus humidis carnes habentibus.

ris frequens exercitatio, quibus suppeditatur minor copia humidi & promovetur ejus exhalatio. Hæc sunt faciendæ, si quædam morboſa humida conſtitutio habetur in toto corpore, uti in leucophlegmaticis, hydropicis. Caro enim tunc dicitur humida, ſi ſit laxior, ſucculenta, & multa humiditate perfuſa: tales partes frequentiore muſculorum actione fiunt duriores, ut omnes partes firmæ exercitatæ occalleſcunt, atque eodem motu exprimitur id tenue, quod inter fibras in tunica cellulosa per quietem colligitur; ſic caro humido tenui privata fit durior & ſiccior. Hoc etiam verum eſt in detractiōe cibi & potionis, nam pergens inſenſibilis perſpiratio & urinæ emiſſio, ſine additione humidi novi, fit ablatio humidi ex partibus firmis. Hanc ablationem humidi tenuioris faciendam eſſe, monet non cuiſvis, ſed cui Carnes ſunt humidæ, quum ablatione tenuioris in corporibus ſanis generaretur morbus ex Siccitate.

LIB. VII. APH. LX.

385. **U**Bi in toto corpore mutationes, & corpus perfrigeretur & rursus caleſcat, aut color alius ex alio permutetur, longitudinem morbi ſignificat.

I.

EAndem ſententiam ſuperius (*Aph.* 150.) invenies.

LIB. VII. APH. LXI.

386. **S**Udor multus, calidus aut frigidus, semper fluens, humidi redundantiam habere significat. Educere igitur oportet, robusto quidem superne, debili vero inferne.

I.

AUdor supra (Aph. 152.) ex Sudore multo, frigido aut calido formavit prædictionem majoris & minoris morbi: hoc autem loco dicit indicare Humidi abundantiam; uti etiam (Aph. 166, iv.) in febribus Sudor superveniens, febre non deficiente, multam significabat humiditatem. Hoc quoque loco tradit Sudorem semper fluentem, & non facit mentionem febris, igitur hic intelligit Sudorem semper fluentem sine febre prægressa vel conjuncta. Hujusmodi Sudores copiosiores sæpe observavimus in valetudinariis, & iis, qui nimis magnam alimenterum copiam ingerunt cum corporis nimia quiete. Valetudinarii enim defectu virium ingesta non potentes compingere in bonos humores, neque extrudere per insensibilem perspirationem, illam tamen abundantiam evacuant vel per urinam copiosiore vel per Sudorem semper fluentem. Corpora enim sana, viribus valentibus, assumpta alimenta compingunt in sanguinem crassiorum, & quod compingi nequit, per urinam sed præcipue per insensibilem perspirationem eliminant: at deficiente hac actione, minus compingitur & perspiratur, quare horum loco generatur Sudor copiosior, quo corpora ea tamen servantur in eodem pondere. Recte itaque ex Humidi abundantia Sudor ille copiosior & semper fluens generatur. Corpora autem sana & satis valentia si habeant Sudorem copiosiorum & semper fluentem, hæc plus assumunt, quam ut

Sudor multus, calidus aut frigidus, semper fluens, humidi redundantiam significat.

possint solita actione vitæ subigere & expellere per diaphoresin: igitur in his notat Abundantiam humidi ex assumptis natam. Denique invenitur in Valetudinariis quidam morbus colliquativus sine febre, in quo sine notabili vitio boni & concrecibiles humores liquecunt in humorem tenuem, qui exit sub forma sudoris copiosioris, cum corporis emaciatione. In duobus præcedentibus casibus idem fere manebat corporis pondus, quamvis semper copiose sudabant; sed in ultimo casu generatur emaciatio, quæ vocatur a multis Phthisis nervosa (Aph. 32, III.)

An hæc abundantia educenda?

II. Quoniam Sudor hic copiosior & semper fluens generetur deficiente actione vitæ cum mediocri ingestione; ex ingestione copiosiore; & ex deliquatione humorum, curatio in omnibus eadem esse nequit. Qui enim utcumque sani sunt & ex mediocri alimentorum ingestione copiose sudant sine corporis emaciatione, signum erit, assumpta alimenta non satis præparari: his conducit cacochyliam in primis viis relictam per amarum purgans eliminare, sed dein stomachicis roborantibus promovere ventriculi actionem, atque corporis moderata exercitatione in reliquo corpore præparare humores atque eliminare per diaphoresin: quod indicare videtur Auctor his verbis, *Debili vero inferne*. Quibus vero robustis ex assumptorum abundantia generatur Sudor, quum hi solent saburram colligere in ventriculo, his conduceret dare Vomitorium, & deinceps se abstinere ab ingluvie. Sed si corpus simul extenuetur colliquatis humoribus, hoc corpus neque ferret purgans neque vomitorium, sed per stomachica amara & antiseptica tota curatio esset absolvenda, qui enim in colliquatis humoribus dat evacuans, bonum & malum simul educet, & non emendabit tali medicamento humoris corruptionem, verum majorem debilitatem inducet, quæ colliquationem promovebit.

LIB. VII. APH. LXII.

387. **F**ebres non intermittentes si per tertium diem
vehementiores fiant, periculosæ. Quocunque
autem modo intermittant, significat periculi esse expertes.

I.

Eundem Aphorismum exposuimus. (*Aph.* 153.)

LIB. VII. APH. LXIII.

388. **Q**uibus febres longæ sunt, his aut tubercula,
aut ad articulos dolores fiunt.

I.

Hunc etiam explicavimus. (*Aph.* 154.)

LIB. VII. APH. LXIV.

389. **Q**uibus tubercula diutina, aut ad articulos dolo-
res ex febris fiunt, hi cibis utuntur copio-
sioribus.

I.

Atque hunc Aphorismum invenies. (*Aph.* 155.)

SSSSS 3

LIB.

LIB. VII. APH. LXV.

390. **S***I quis febricitanti cibum det, convalescenti quidem robur, ægrotanti vero morbus fit.*

I.

SCopus Auctoris est hoc loco indicare, quando corpora febre vexata sunt nutrienda; atque triplex hic poni potest casus. (1) In febre ipsa, dum adhuc non dat signa finis. (2) Dum desinere incipit, sed corpus tamen adhuc ægrotat. (3) Si vero febris desiit, sed corpus tamen convalescens non satis sit firmatum. In prioribus duobus dicit Cibum augere morbum, sed in posterioribus augere robur. Per Cibum dare non intelligit exhibitionem cibi facilioris digestionis & in parva quantitate, quod debemus facere in omnibus febricitantibus, sicuti satis copiose exposuimus in secundo libro Aphorismorum, sed intelligit Cibum solitum & in tanta quantitate, qualis exhibetur sanis hominibus. (Conf. *Aph.* 35, III.) Qualis autem Refectio debeat fieri post Acutos (*Aph.* 32, IV) & post Chronicos (*Aph.* 32, V) exposuimus. Corpora febre adhuc vexata a solito cibo dato aggravari, demonstravimus (*Aph.* 42, III.) Convalescentium duplex est status: si enim febris desinit, sed relinquit multas impuritates, quæ solitam nutritionem respuunt (*Aph.* 35, IV.) quia corpora impura non sunt nutrienda, pauciora alimenta & levis digestionis sunt ingerenda. Sed Convalescentia corpora pura (*Aph.* 42, IV.) quæ valent cibum assumptum in bonum chylum convertere, paulo largiorem cibum postulant, tali modo ut citato loco indicavi: si enim his corporibus dares tam parvam quantitatem & levis nutritionis alimenta, uti in febricitantibus, vel corporibus impuris, convalescentes non potuissent defectu alimenti recuperare vires.

LIB. VII. APH. LXVI.

391. **P**er vesicam prodeuntia inspicere oportet, an sint qualia sanis prodeunt. Quæ igitur minime his similia, ea morbosiora. Sanis vero similia, minime morbosa.

I.

Cuncta, quæ ex Vesica per urethram emittuntur, Urinæ nomine recipi nequeunt, qualia hic ab Hippocrate traduntur, ita calculus, vermes, sanguis & quæcumque aliena quamvis ex Vesica veniunt, nunquam Urina vocantur. Qui tamen de Urina tradunt regulas, hæc etiam aliena complectuntur. Igitur, quæ per Vesicam prodeunt, in duo genera distingui possunt; nempe aliena ex urethra prodeuntia, & quæ urinæ nomine veniunt. Aliena semper esse observanda nullus dubitat, sed de iis, quæ urinam constituunt, maxime disputant. Invenio enim impostores miracula prædicentes ex conspecta urina, atque medicos omnem urinæ inspectionem irridentes, non verentes publice profiteri, nihil certi ex inspecta urina cognosci & prædici posse, solummodo inspicere ad fallendum: sed ego miror illorum stupiditatem, & contendo artem non habere osorem nisi ignorantem, quod sæpissime huiusmodi cavillatoribus demonstravi. Hoc autem scio, impostores sine ullo fundamento, signa & præfagia formare ex urinæ inspectione, sed id quoque scio, me nullam in tota scientia medica invenisse luculentiorum signorum classem quam in uromantia: & contra istos, qui cum omni industria explorant pulsus, regeo, urinæ maiorem quam pulsui habendam esse fidem, & multa plura & certiora præbere signa. Hoc autem exemplis adstruere nimis longum foret, quare cum Auctore nostro duntaxat contendo, urinam

Urinæ in
spectio ne-
cessaria.

urinam in omni morbo esse inspiciendam. Quali autem modo inspectio debet fieri non consentiunt, quidam ex impostoribus ne quidem dubitant degustare Urinam ad majorem fidem conciliandam, quasi plura gustu quam visu ex Urina peti potuissent: alii urinam coquunt; alii ex magna altitudine eam in aliud vasculum fundunt: denique quidam urinæ admiscent quædam sic dicta arcana. Medici autem solent inspicere urinam in quiete refrigeratam, uroscopio receptam, ut ita videant, quamnam mutationem urina subiit. Ego soleo colligere urinam calentem in vase vitreo conico, eamque calentem primo & dein refrigeratam in quiete examinare: si morbus per paroxysmos lævit, urinam diversis temporibus emissam variis vasculis receptam simul examino, vel quando morbus aliquam subit mutationem, ut ita ex illa urina diversa possim judicium formare, quod mihi ad cognitionem & prædictionem multi momenti fuit. Igitur omnes moneo, ne vilipendeant Urinæ inspectionem, vel repudient, quia ab agyrtis hæc pars signorum quoque cum fallacia exercetur, sed ut cuncta, quæ in urinis detegunt, sedulo notent, istaque conferant cum iis, quæ ab Hippocrate traduntur: hoc si faciant, nullus dubito, quin summis encomiis Urinæ inspectionem laudabunt, tanquam signorum classem utilissimam.

Videndum
an urina sit
sanis similis
vel dissimi-
lis.

II. Vix valemus exacte sanam describere urinam in quavis ætate & vitæ genere, nam intenditur ejus color in robustis exercitatis, parum bibentibus; minuitur autem in debilibus, pueris, feminis, otiosis, multum bibentibus; augetur ejus quantitas in parum perspirantibus & multum bibentibus; sed minuitur in parciori potu, largiore perspiratione & quavis alia evacuatione copiosiore; & tamen illa omnis urina est sana. Sed si in oppositis causis, ætate, & viribus corporis, talis redditur urina, eadem quæ antea dicenda erat sana, nunc habetur morbosa; modice enim colorata in pueris est morbosa; pallida & aquosa uti in pueris, a robustis viris reddita, iterum est morbosa, quia non respondet viribus naturalibus istius corporis. Hinc sciendum, quibus diversis in corporibus sanis urina sit emissæ,

missa, ut sit sanis similis: sæpe enim accidit, ut corpora sana sibi non convenientem reddant urinam, sed tunc fruuntur instabili sanitate, quod ex inspecta urina videri potest, quæ tunc dicitur sanæ urinæ dissimilis, quamvis nulla morbosa notio adsit, nisi quod subjecto non respondeat. In morbis etiam redditur urina sana & morbosa, quum omnes morbi particulares materiem morbi in affecta parte retinentes, atque morbi, quorum materia est invisibilis, nullam morbi notionem in urina proferant. Talis ergo urina in morbis conspecta hoc vel illud indicat. Sed in morbis cum materia, ut loquuntur Veteres, si redditur urina sana, valde malum est signum, quia declarat morbi materiem retineri, sine cujus evacuatione recuperari non potuit sanitas.

III. Obstare autem videtur dictum Hippocratis, qui statuit Urinam sanis similem minime morbosam esse; atque sanis dissimilem esse morbosiorum: verum si vero sensu accipiatur hæc sententia, puram veritatem ponit & nobis non repugnat. In sanis enim, ut supra notavimus, urina respondere debebat ætati, viribus, & victui; itidem in morbis urina respondere debet morbo prævalenti, ut eadem urina optime cocta, cum similibus signis in alio morbo dicatur cruda. Inde urina in colore, consistentia, & quantitate respondens corpori proposito sano, & quæ convenit dein etiam morbo, illa minime morbosa est: quæ autem est dissimilis tam in sanis quam morbo laborantibus, illa semper mala seu morbosa est censenda: quum in sanis infirmam sanitatem declaret, & in morbis tali urinâ non evacuetur morbi causa.

Urina sanis
dissimilis,
morbosa: sa-
nis vero si-
milis mini-
me morbo-
sa.

LIB. VII. A P H. LXVII.

392. **E**T quibus, egestionibus, si stare permiseris, & non moveris, subsident veluti ramenta: & si pauca fuerint, parvus fit morbus: si vero multa, magnus. His confert alvum inferne purgari. Si autem non purgatâ alvo sorbitiones dederis, quanto plures dederis, eo magis lædes.

I.

Copia ramentorum in alvi excrementis magnitudinem morbi declarat.

Multi Commentatores, inter quos excellit Galenus, dubitant, num germanus sit hic Hippocratis Aphorismus, multasque adducunt rationes: sed fere similem textum invenio in Libro de Judicationibus, his verbis. *Alvi egestionibus si in idem concedere ac consistere permiseris, velut ramenta subsident: si pauca, modicus est morbus: si multa, magnus: his infusum per clysterem adhibere conducit.* (H, a, 443.) Constat ergo, dictionem esse Hippocraticam, nisi negare velimus, eum etiam Librum non esse Germanum. Neque ita opus est auctoritate litigare, ipsa observatio practica veritatem docet, qua constat, Ramenta seu Strigmenta interdum inveniri in alvi excrementis, quæ in alvi egestionibus liquidis & ita quiescentibus fundum petunt & concresecunt, aut in excrementis durioribus externe reliqua excrementa obducunt. Quia vero Auctor monet, stare debere in quiete Excrementa, facile concipitur, eum intelligere Excrementa liquida, qualia in Cholera, Diarrhœa & Dysenteria emittuntur, quando intestinorum mucus utcumque liquidus cum Excrementis exeuns, dein refrigeratus concresecit; & quoniam mucī specifica gravitas est major, dum Excrementa sunt liquida, ad fundum vasis descendit, & ibi stagnando refrigeratus concresecit in Ramenta seu Strigmenta, quæ effusis excrementis in fundo vasis conspi-

conspiciuntur. Hujusmodi Strigmenta in Dysentericis sæpe observavi, ut & alii practici. Igitur de veritate hujus nullus amplius ambigere potest. Ex hoc nunc invento signo majorem & minorem morbi magnitudinem deducit, quod experientiæ respondet. Naturale enim est in Alvi egestionibus, ut ille mucus non exeat, ergo quo major hujus est mucii evacuatio, eo major est morbus, quod verum est in omni evacuatione humorum præternaturalium: atque tanta abrasio & emissio mucii facit, ut intestinum rectum omni mucio privatum, tangatur ab excrementis, quæ tunc magnum dolorem concitant, & dejectiones augent.

II. Duobus modis Alvum inferne ducere solemus, vel per medicamenta ore data, quæ proprie dicuntur purgantia, vel per ea, quæ per anum injiciuntur, aut indantur. His confert alvum inferne purgari. Experti sumus quoties in mucro intestinorum hæret acrimonia, instigans intestina ad frequentem dejectionem, nos non posse curare irritamentum, nisi ille mucus acris auferatur. Quamobrem ita in Dysenteria laudantur purgantia, non solum ore data, verum etiam per clysterem injecta, quibus ille mucus acrior abluatur & expellitur: & ut nuda intestina minus vellicarentur, atque in motu concitata ad quietem ducerentur, post exhibitum purgans propinamus anodynum mucilaginosum molle; vel post ejectionem clysteris, injicimus novum liquorem mollem, mucilaginosum, anodynum. Quod si vero non evacuato illo mucro sortitiones dederis, augebitur morbus, quia illa ingesta, mucro corrupto mista, augebunt corruptelam.

LIB. VII. APH. LXVIII.

393. **Q**Uæ cruda deorsum secedunt, ab atra bile sunt :
si plura, major : si pauciora, minor est mor-
bus.

I.

Cruda ex-
 crementa ab
 atra bile.

QUamobrem hic Aphorismus ut præcedens non sentia-
 tur germanus, videre nequeo, quum etiam Hipp:
 Lib. de Judicationibus hæc verba habet. *Quibus ve-*
ro in egestionem inferne bilis atra subsidet, si copiosior, major est
morbis; si paucior, minor (H. a. 443.). Facile est ex com-
 paratione locorum colligere, qualem cruditatem Hippocra-
 tes intelligat, nempe materiem nigram melancholicam.
 Hæc materia reliquis excrementis gravior, si exacte non
 misceatur, & excrementa sint liquida, fundum vasis petit.
 Quomodo autem hæc Nigra dici possunt Cruda, paucis e-
 narrabimus. Cruditatis nomen multas diversas res desig-
 nat; nam alimenta in ventriculo & intestinis bene præpa-
 rata si vel per vomitum vel secessum deponuntur, cruda
 vocantur. Ita boni confluentes ad dicta loca humores,
 destinati ad alimentorum præparationem, si egeruntur, cru-
 da faciunt Excrementa. Denique humores corrupti & a-
 lienæ egesti etiam crudi dicuntur. Inter hos omnes hu-
 mores gravissimus est, qui vocatur Atra bilis, quamobrem
 etiam fundum vasis petit. Ex copia nunc materiæ Crudæ
 vel Atræ bilis format magnitudinem morbi. Quia Atra
 bilis est humor morbosus, de ejus copia majore & mino-
 re egesta ratiocinari possumus, ut jam fecimus de muco
 intestinorum; quo enim major copia egeritur, eo majorem
 quoque collectionem arguit. Quid autem sit sentiendum
 de egestionem Atræ bilis, superius (Aph. 131, 132, 133,
 134,) satis exposuimus.

LIB. VII. APH. LXIX.

394. **E**Xcreationes, in febribus non intermittentibus, lividæ, & cruentæ, & biliosæ, & graveolentes, omnes malæ sunt. At rite secedentes, bonæ. Sic etiam per alvum, & vesicam, & ubicunque quid secedens restiterit non purgatum, malum.

I.

Totus hic Aphorismus superius etiam (*Aph.* 157.) invenitur.

LIB. VII. APH. LXX.

395. **C**orpora oportet, ubi quis purgare vult, facile fluentia reddere. Et si quidem velit efficere facile fluentia sursum, alvum sistere: si vero deorsum, humectare.

I.

DUplex est in hoc Aphorismo scopus. Primus docere, quali modo corpus sit præparandum, antequam exhibetur medicamentum purgans, hoc absolvimus, (*Aph.* 34.) Alter tradere præparationem corporis, si Vomitus sit concitandus, hoc exposuimus. (*Aph.* 123. iv.) ubi traditur præparatio ante exhibitionem Ellebori, hoc autem loco mentionem facit de omnibus Vomitoriis, & præcipit Alvum sistendam esse, quod in præcedentibus non fuit factum. Tenendæ sunt superius traditæ regulæ, si Vomitorium sit exhibendum, sed ut vomitus majore efficacia

Vomitus
præparatio.

cia fiat, & reddatur copia contentorum major per Vomitum, recte monet Alvum esse sistendam. Duplex enim habetur motus directio in intestinis & ventriculo; nempe deorsum, quæ promovet Egestionem, & minuit vel sistit Vomitum; & sursum, quæ sistit alvum & auget Vomitum. Recte ergo præcipit Auctor, alvum esse sistendam, ne motu peristaltico aucto deorsum inhibeatur Vomitus, & convertatur in alvi fluxum.

LIB. VII. A P H. LXXI.

396. **S**omnus, vigilia, utraque modum excedentia, morbus.

I.

Naturalis
actio aucta
vel minuta
etiam mor-
bus est.

INter hunc & superius traditum Aphorismum (*Aph.* 28.) nulla invenitur differentia, nisi quod ibidem in fine dicatur malum, hoc autem loco Morbus. Tota ergo explicatio ex allegato loco peti potest. Quod autem dicatur morbus, innuit excessum alicujus rei bonæ ab Auctoribus etiam morbum vocari, ut non sit opus, habeatur semper novum phænomenon, quod in sanitate non conspicitur, ad designandum morbum. Equidem non parvus est morbus semper vigilare vel dormire, quamvis vigilia & somnus moderatus in sanitate requiruntur. Quali autem modo hi morbi sunt curandi, non est hujus loci exponere.

LIB. VII. A P H. LXXII.

397. **I**N non intermittentibus febribus, si externa quidem sint frigida, interna vero urantur, & sitim habeant, lethale.

I.

Eundem Aphorismum invenies. (*Aph.* 158.)

LIB.

LIB. VII. APH. LXXIII.

398. **I**N febre non intermittente, si labium, aut nasus, aut oculus, aut supercilium distorqueatur, si non videat, si non audiat jam debilis existens: quicquid horum fiat, lethale.

I.

ATque hunc Aphorismum invenies. (*Aph.* 159.)

LIB. VII. APH. LXXIV.

399. **L**Euco-phlegmatiae hydrops supervenit.

I.

LEuco-phlegmatiae (*Aph.* 354.) & Hydropis (*Aph.* 273, 1) definitionem dedimus, ex quibus morbis comparatis constare potest, Leuco-phlegmatiam esse speciem Hydropis, quando humor viscosus seu pituitosus lentus & frigidus hæreat in cutis substantia & tunica cellulosa: sed quando absolute ponitur Hydrops, Hippocrates intelligere solet Ascitem seu ventris inferioris hydropem. Quomodo autem ex Leuco-phlegmatia generatur Ascites, paucis videndum. Ex Leuco-phlegmatiae descriptione (*Aph.* 354.) constat, motum vitalem languidiorem & solidorum laxitatem retinere humores aquosos in vasculis cutaneis, qui ibidem stagnantes & minus moti inviscantur. Quando talis morbus diu durat, tandem etiam motus vitalis peritonæi & contentorum viscerum in eo languet, quemadmodum.

modum etiam reliquæ corporis partes, quo impediatur effusi humoris ex cavo peritonæi absorptio; sic sensim ex depositis humoribus, non iterum absorptis, generatur in ventre inferiore Ascites. Sine motu vitali in nobis nullam fieri absorptionem, & cum eo languidiore motu, minui absorptionem, infinitis experimentis adstrui potest, quod hoc loco suppono, alio in loco a nobis satis demonstratum; ex anatomicis & physiologicis constat, continuo in omnes cavitates corporis aliquem deponi liquorem, qui continuo etiam absorbetur in sanis: quoties ergo illa minuitur vel sistitur absorptio, uti in Leucophlegmaticis, sæpe fit, ut in quadam corporis parte colligatur lymphæ, quæ in ventre collecta producit Ascitem. Si talis morbus superveniat, malum est signum, & tunc plerumque moriuntur Leucophlegmatici, quippe non generatur, nisi laxitas solidorum, & inertia ita increvit, ut viscera ventris quoque in sua actione deficient. Si vero supervenisset Diarrhœa, qua eliminatur aqua illa, solveretur morbus (*Aph.* 354.) Igitur non ita sibi permittenda est Leucophlegmatia, ac si esset morbus nullius periculi, sed statim ejus curatio est tentanda per evacuantia & roborantia, priusquam in Ascitem degeneraverit.

LIB. VII. APH. LXXV.

400. **A** *Diarrhœa Dysenteria.*

I.

Quomodo ex meraca dejectione generatur Dysenteria, exposuimus (*Aph.* 348.) Hoc loco tradit Auctor, ex quavis Diarrhœa generari posse Dysenteriam. Ad certiores prognosin & majorem usum addere possumus, hic intelligi Diarrhœam diuturnam, atque si tunc veniat

niat Dysenteria, malum esse signum. Observamus enim in praxi, raro venire Dysenteriam post Diarrhœam, nisi diu duraverit. Omnis enim Diarrhœa diu durans denotat constantem esse causam, quæ facit, ut humor perpetuo stillet in cavum intestinorum, & intestina instiget ad propellenda contenta. Tale perpetuum stillicidium, uti ubique in corpore, loca, quæ tangit, excoriat & exulcerare facit, ex quibus dein etiam corrosis locis sensim quoque stillare incipit ichor acrior, qui tangens partes nudas vellicat, atque ita dolorem infert cum augmento ejectionis materiæ variæ, qualis morbus tunc vocatur Dysenteria. Hæc veniens malum est signum, nam inde non minuetur præcedens morbus, & demonstrat malorum augmentum, ut patet ex accedente Dolore, Egestionem copiosiore, & exitu malignorum humorum, vel & etiam sanguinis, corrosis vasibus.

L I B. VII. A P H. LXXVI.

401. **A** *Dysenteria Lienteria.*

I.

Quid sit Dysenteria (Aph. 134, 1) & Lienteria (Aph. 266, 1.) exposuimus. Galenus contendit hunc Aphorismum esse partem præcedentis (Aph. 308.) sed rationem non invenio. Ibidem enim agitur de Lienosis, qui corripuntur longa superveniente Dysenteria aut Lienteria & ita pereunt: hoc autem loco agitur de iis, qui Dysenteria laborantes corripuntur Lienteria. Verum non addit, num sit bonum vel malum signum. Ex comparatione autem cum prioribus conjicere possumus, hic innui malum esse signum, quod paucis videbimus. Homo Dysenteria laborans multum humoris, tam utilis, quam inutilis,

tilis, ejicit, ut igitur vires corporis permaneant, necesse erit, ut corpori etiam suppeditetur nutrimentum in ventriculo & intestinis tenuibus præparatum, & vasis lacteis traditum; ita enim valet fatis diu hanc ferre ejectionem. Si autem accedat Lienteria, quæ denotat eam materiem chylosam una cum reliquis ejici, certi esse possumus, corpus istud suo nutrimento privari & inde impar fieri ferendis his copiosioribus evacuationibus. Videtur tamen æger a superveniente Lienteria doloribus levari, quia materia chylosa blandior, reliquos humores acriores diluens, minus vellicat intestina: sed infideles sunt induciæ, quum utplurimum talis æger viribus exhaustis, pereat. Multi putant propter inductas cicatrices per præcedentem Dysenteriam chylum non amplius absorberi posse: verum nullam video veritatis similitudinem, quia humor acrior in Dysenteria transeuns, sensim latiore excoarctationem facit, & nullam consolidationem in cicatricem permittit. Verum intestina tam diu agitata stimulo Dysentericæ ita fatigantur, ut tandem deficientibus viribus non amplius valeant receptum chylum trudere in vasa lactea, sed permittant, ut ad inferiora devolvatur & una cum corruptis humoribus exeat. Ex hoc observato phænomeno multi fuere decepti medici, existimantes propter levamen doloris, & dejectionem humoris minus corrupti, ægrum esse in vado, dum tamen experiuntur ægrum brevi postea perire.

L I B. VII. A P H. LXXVII.

402. **A** *Sphacelo abscessus ossis.*

I.

Variam Sphaceli significationem dedimus (*Aph.* 375, 1.) & quid sit Ossis abscessus, ex supra traditis (*Aph.* 310, 11.) colligi potest. Quomodo autem ex partibus

tis mollioris mortificatione profunda, uti fit in Sphacelo, Os etiam pereat, & Os mortificatum separari debeat, facile concipitur. Os enim se ipsum non nutrit & manet vitale sine partibus ambientibus, sed ex istis in suo periosteo accipit vasa vitalia, quæ adducunt & reducunt sanguinem, ex quo periosteum & Os sua vasa vitalia accipit. Quoties igitur in partibus mollibus ambientibus sphacelatis fit extincta circulatio, ipsum Os circulatione hac privata mori debet. Os quidem tali in statu satis diu manebit firmum & stabile, etiamsi vita sit privata, quia ejus durities diu persistere potest, antequam spontanea corruptione liquefcit, quod brevi tempore fit in partibus mollioribus: attamen nunquam manere potest superstes, lapsu temporis tandem secedere debet. Quamobrem in sphacelo profundo monent semper Chirurghi totam partem esse amputandam, etiamsi Os satis videatur stabile, quia didicerunt post longum tempus istud Os semper fuisse mortificatum. Ne ergo æger inani spe lactaretur, Os servari posse post profundum Sphacelum, hunc Aphorismum nobis reliquit Auctor.

L I B. VII. A P H. LXXVIII.

403. **A** Sanguinis vomitu tabes, & puris purgatio sursum.

A Tabe, fluxus ex capite.

A fluxu alvi profluvium.

Ab alvi profluvio inhibitio purgationis sursum.

Ab inhibitione mors.

A sanguinis sputo, puris sputum, & fluxio. Postquam autem sputum inhibetur, moriuntur.

I.

V Idetur hic Aphorismus ex multis aliis prægressis conflatus, ut habeatur continuatus successus inorborum, qui morbi antea sigillatim sunt propositi. Id ergo

solummodo a nobis est faciendum, ut indicemus loca, ex quibus hic Aphorismus desumptus est.

A sanguinis sputo puris sputum (Aph. 340.)

A puris sputo tabes, & fluxus a capite. (Aph. 341, I)

A tabe detento alvi profluvium superveniens, lethale. (Aph. 207.)

Postquam sputum retinetur, moriuntur. (Aph. 341, II)

Sola ratio cur sputum in Tabidis supprimitur, videtur restare, verum eam supra dedimus. (Aph. 207.) Quod autem præterea adjectum invenitur, est solummodo repetitio prioris, ut indicaretur hoc loco non intelligi Vomitum cruentum, sed hæmoptysin.

LIB. VII. APH. LXXIX.

404. **Q**ualia etiam in his quæ per vesicam, & in his quæ per alvum sunt egestiones, & in his quæ per carnes, & sicubi aliâ naturæ via corpus exeat: si parum, parvus morbus fit: si multum, magnus: si admodum multum, hoc ipsum lethale.

I.

Evacuatio-
nis quanti-
tas æstima-
da ad præ-
dictionem.

Non solum qualitas, tempus & locus Evacuationis sunt in sanis & ægris observanda, verum etiam cujusvis Evacuationis quantitas. Quatuor præcipuas Evacuationes numerat. (1) Urinam, (2) Alvi egestionem, (3) sudorem, (4) humores per præternaturales vias, uti per ulcera emissos. In his omnibus monet quantitatem esse considerandam. Particulares observationes ho-
rum

rum omnium passim exhibuimus. Si per hoc vel istud E-
mundatorium materia morboſa exit, quantitas continuo exe-
uns notabit quantitatem etiam relictam in corpore, seu
magnitudinem morbi. Sæpe quidem accidit, ut nihil vel
parum exeat, dum tamen magna sit copia humorum mor-
boſorum in corpore, quia via est intercluſa, vel vires de-
ficiunt ad expellendum: verum ſupponuntur viæ apertæ
& vitæ vires ſatis valentes, tunc poſſumus judicare ex
quantitate exeuntis magnitudinem morbi. Ut ſi quis red-
dat urinam cum magna copia ſedimenti, talis urina ſæpe
tollit morbum, ſed tamen magnitudinem morbi declarat;
ſi idem morbus adeſſet in alio ægro ſed lenior ſeu minor,
urina quoque minorem copiam ſedimenti haberet, & illa
notaret quoque morbum minorem. In morbis Chronicis
multi laudant ſedimenti copiam in urina, ſed expertus ſum
eam copiam majorem declarare quoque morbi magnitu-
dinem. Hoc etiam verum eſt in Alvi Egeſtionibus, ſi
multa excrementa aliena emittuntur, pejus eſt, quam ſi pa-
rum exeat, atque copia major periculum portendit, quod
ex parva quantitate non ita eſt exſpectandum. Sudor ro-
ridus, calidus, & ſatis copioſus ſæpe tollit febrem, ſed
continuo fluens magna copia, malignitatem arguit: qui
enim continuo & perpetuo ſudant, magnam copiam hu-
morum morboſorum in corpore habent. Denique Puris
vel Ichoris ex Ulceribus copioſus effluxus magnitudinem
morbi declarat. Igitur generalis eſt regula in evacuatio-
bus humorum morboſorum, quo evacuatio eſt copioſior,
eo major eſt morbus. Parva ergo evacuatio, quia arguit
non multum intus eſſe, parvum morbum & parvum peri-
culum portendit, modo non cohibeatur effluxus, ut monui.
Multum fluere majorem copiam arguit, & inde majorem
morbum. Si vero valde multam effluat, ſignificat, omnes
fere humores corruptos eſſe, & propterea magnum quo-
que imminet periculum.

APHORISMI INTERJECTI.

405. **Q**ui supra quadraginta annos phrenitici fiunt, non admodum sanantur. Minus enim periclitantur, quorum naturæ, & ætati, morbus similis fuerit.

I.

Multi omnes sequentes Aphorismos, omittunt; alii quosdam citant; neque idem servatur ordo; Theodorus Janssonius ab Almeloveen, cujus ordinem & interpretationem secuti sumus, Librum octavum ex istis fecit; Fœsius paucos ex istis elegit, istos spurios seu notos vocat. Incertum itaque est, num ab Hippocrate sint conscripti, vel ab aliis interjecti. Quia vero Veteres numero septenario maxime fuere addicti, satius erit credere, hunc Librum Octavum ab Hippocrate non fuisse conscriptum. Quia vero noster scopus fuit sine auctoritate aliqujus res obscuriores in arte medica nostris commentariis explicare, nostra non refert, siue Hippocrates, siue quis alius sequentes Aphorismos posteritati reliquit: hoc solummodo observaturi sumus, ut ex istis eligamus, qui in antecedentibus aphorismis non sunt expositi.

Qui supra
quadraginta
annos phre-
nitici fiunt,
non admo-
dum sanan-
tur.

II. Phrenitis (*Aph.* 109, vii) vario ætatis tempore fieri potest, sed non omni eo tempore æquale periculum infert, quod etiam verum est aliis morbis: experimur enim hodie adultos ex variolis & convulsionibus magis periclitari quam pueros. Hoc deducendum est ex morbi natura comparata ad naturalem ætatis mutationem, qua eadem morbi causa majus periculum infert. Phrenitis est morbus inflammatorius febrilis continuus, qui valide agitando cerebrum, perpetuum & constans Delirium cum febre facit. In morbis inflammatoriis secundum ætates hoc generale observamus, istos ante quadagesimum annum sæpe

sæpe finiri hæmorrhagia, & in juvenibus ex levissima causa generari; in senioribus autem plerumque abire in abscessum, & non nisi ex magna causa generari. (Aph. 14, VI) Ergo Phrenitis in tali ætate magnam causam arguit, quod periculum est, & si abeat illa meningum inflammatio in suppurationem, hoc quoque periculo non caret, quum pus in encephalo collectum difficulter evacuari possit.

III. Auctor rationem majoris periculi ex Ætate & natura ægri deducit, quod supra (Aph. 59.) pro generali regula posuit, ubi etiam habitus & tempus simul annumerantur. Quomodo autem ex hac regula generali periculum in Phrenitide deducatur, paucis videndum. In recentissima ætate, ut monuimus, non nisi ex magna causa generatur phrenitis, & si nata fuit, plerumque abit in periculofam suppurationem: ergo etiamsi in ea ætate sæpe fiat Phrenitis, (Aph. 109, VII.) quia plerumque mortem infert, periculosa habetur, uti sanguinis spuitiones, & phthises in juvenibus (Aph. 108.) Idem quoque sentiendum est de Natura ægri (Aph. 59, II.) nam si corpora frigida, hydropica, debilia, tententur Phrenitide, majus erit periculum, quia ea fieri in his nequit nisi a magna admodum causa.

Minus periclitantur, quorum ætate, & natura, morbus similis fuerit.

406. **Q**uibus in febribus quartanis existentibus sanguis ex naribus fluxerit, malum.

I.

OMnis illa evacuatio est mala, quæ neque tollit, neque minuit morbi causam, & quæ disponit corpus ad graviores morbum, nam si inferat interdum mortem, lethale solet dici. Si demonstrari possit, Hæmorrhagiam narium neque minuere neque tollere causam febris quartanæ, verum corpus disponere ad alios suscipiendos

In febribus quartanis hæmorrhagia variam, malum.

dos morbos, recte pronunciari potest, malum esse, si hæmorrhagia superveniat. Si in memoriam revoco, quæ observavi in constitutionibus epidemicis, nunquam memini me observasse, febrem quartanam vel hæmorrhagiis vel venæ sectione fuisse sublatam, sed qui multum sanguinis effuderunt, facti fuere Leucophlegmatici vel hydropici, habuerunt quidem illi paroxysmos mitiores, verum simul diutius durantes, & magis periculosos, ut febris illa vehemens videretur commutata in mitiorem, sed malignam. Si secundum nostram sententiam febris quartanæ materia ponatur in succo illo arteriarum, qui latera arteriarum intus obtegit, quæque materia, uti semina malæ herbæ, ad maturitatem veniens febris paroxysmum concitat, facile concipi potest, neque hæmorrhagiam, neque venæ sectionem tollere posse hanc febrem, sed corpus disponere ad suscipiendos morbos ex debilitate vitrium & defectu sanguinis nascendos. Si enim sanguis fluit vel sponte vel arte, ille secum non educit succum arteriarum, qui febris materiem continet, sed sanguinem purum & bonum, per arterias & venas fluentem. Qui morbi impetu majore sua mala producant, ut morbi inflammatorii, hi evacuatione sanguinis egregie compescuntur, sed febris quartana vel simplex vel duplicata, non infert mala majore circulatione, verum summo inducto potius frigore, & non minuitur cum diminuta quantitate sanguinis, uti morbi inflammatorii. Igitur nunquam ex sanguinis fluxu in Quartanis curatio est speranda. Atque post talem spontaneam vel artificialem sanguinis evacuationem destruitur æquilibrium, humores liquefcunt, solida laxantur, atque ita sæpe fiunt Leucophlegmatici vel Hydropici, quod sæpe in praxi observavimus, sub quibus dein morbis febris quartana latitat. Monemur ergo, non sine gravi ratione in febre Quartana venam esse secandam.

407. **S**udores in diebus criticis oborientes, vehementes & veloces, periculosi: & qui expelluntur ex fronte, velut guttæ, & aquæ salientes, & frigidi valde, ac multi. Necesse enim est talem sudorem prodire cum violentia, & laboris excessu, & expressione diuturna.

I.

Generalis est regula, Sudores criticis diebus (Aph. 146.) venientes esse bonos, morbosque judicare, sed opposuit citato loco sudores in quantitate & qualitate bonos, hoc autem loco docere vult, laudabiles istos Sudores, ex tempore solo judicatos, tamen malos esse posse. Propterea primo videndum, quamobrem Sudores criticis diebus venientes boni censeantur. Constanti observatione in morbis acutis comperimur, morbi materiem viribus vitæ subactam debito id est Critico tempore omnium optime e corpore sub sudoris forma eliminari: nam quoties eadem materia tempore alio eliminatur, nunquam tam bonum & securum præbet signum, quod ex allegato loco colligi potest.

II. Hi autem Sudores, ex tempore boni censendi, interdum mali esse possunt ex aliquo alio vitio accedente. Hoc vero loco non numerantur omnes malæ qualitates, sed solummodo si sint Vehementes & Veloces, id est si Sudores aliquo die critico subito oboriuntur & magna quantitate fluunt, tunc dicuntur periculosi, quod Auctor per experientiam practicam observavit, quia invenit post tales Sudores ægros non fuisse levatos, sed in pejus ruisse. Hæc observatio rationi etiam est conveniens; quippe unico momento tanta non est præparata morbi materia, quæ posset tam copiosum & subito protrusum sudorem exhibere, sensim enim præparatur materia & expellitur, sed non acervatim. Hoc etiam invenimus in urina, quæ si

Sudor diebus criticis oborientes, vehementes, & veloces, periculosi.

Sudores in diebus criticis oborientes, vehementes, & veloces, periculosi.

X x x x x

subito

subito magnam copiam sedimenti præbeat, non habetur laudabile signum, quia tanta copia materiæ morbi tam cito adesse nequit. Ergo Sudores vehementes & veloces designant, malos & bonos humores simul nimia copia evacuari, qualis evacuatio semper debilitat. Hujusmodi Sudores prodire cum violentia, laboris excessu & expressione diuturna recte putat Auctor, quoniam illa evacuatio boni & mali fieri nequit, nisi viribus vitæ nimium instigatis, quæ quemcunque humorem ad organa excretoria venientem expellunt. Hinc ob duas rationes periculum imminet, primo quia evacuatur id, quod retinendum erat, dein a viribus ita instigatis maximum fit spirituum dispendium, quo vires deinceps languentes non valent materiem morbi reliquam præparare & expellere.

Sudores in diebus criticis ex fronte velut guttæ, & aquæ salientes, & frigidi valde, ac multi, periculosi.

III. Alteram speciem Sudoris periculosi diebus criticis his verbis exprimit, qui ex fronte velut guttæ, & aquæ salientes, & frigidi valde, ac multi veniunt, ut inculcet non solum sudores copiosos calidos diebus criticis esse periculosos, verum etiam frigidos ex fronte guttatim, & copiose venientes. Cuncta hæc sudoris phænomena si seorsim examinantur, & dein inter se conferantur, certissimum periculum portendent. Qui *sudores ex fronte* copiosi profluunt, indicant, præcipuam morbi materiem hæere in capite: nam in qua corporis parte est sudor, ibi morbum esse significat (Aph. 148.) Verum nulla pars corporis majus periculum portendit, quam caput morbi materiem recipiens. *Guttatim* instar aquæ salientis *frigidi* multi sudores notant, adesse materiem colliquatam copiosam, cum relaxatis poris cutaneis, atque defectum virium vitalium; profluunt enim tales sudores, quia non satis constrictis poris cutaneis retineri nequeunt, ut experimur in moribundis & syncopiticis, atque frigidi fiunt, quia motus vitalis corpus nostrum calefaciens, deficit: in quo motu deficiente non extruditur materia sola morbosa, sed effluit quidquid ad poros cutaneos allabatur.

408. **E**X morbo diuturno alvi defluxus, malum.

I.

OMnes morbos ultra quadraginta dies durantes Chronicos vocari, observavimus. (Aph. 331, 1.) In istis, dicit Auctor, Alvi defluxum esse malum, quod primo intuitu praxi hodiernæ non videtur respondere; in his enim morbis alvi egestio copiosior cacochyliam in intestinis collectam tollit, summumque levamen adfert, & purgantia cum magno effectû propinantur. Verum Alvi defluxus hoc loco non significat solam evacuationem contentorum ex intestinis, qua tollitur cacochylia, sed copiosiorrem & continuatam dejectionem, quæ arguit non solum evacuari ea contenta, verum etiam omnes humores bonos in intestina confluentes. Omnis ergo Diarrhœa, Dysenteria, Cholera & Lienteria, quæ Alvi defluxus denominari possunt, in morbis Chronicis damnantur ob sequentes rationes. Si continuo ingens copia corruptorum humorum ejicitur, signum est, magnam etiam intus esse malorum humorum collectionem, quod malum præbet signum. Si vero hujusmodi corrupti humores ejiciuntur, quia boni humores in intestina confluentes cito convertuntur in corruptelam, hoc etiam malum est, nam ita est timor, ne omnes reliqui boni humores in corruptelam convertantur. Si vero boni humores continuo emittuntur, uti in Lienteria & interdum in Diarrhœa, bonorum nimia evacuatione corpus debilitabitur, in Cachexiam vel Leucophlegmatiam incidet, vel exhaustis humoribus emaciabitur & tabe atque febre hæctica consumetur. Conducit ergo in Chronicis, ut alvus liquescens reddat Cacochyliam, sed fluxus non debet continuari: conducit etiam semel aut bis alvum ducere, ut corrupta ex cavo intestinorum & ventriculi elimi-

Ex morbo
chronico
alvi defluxus, malum.

mentur, sed damnanda est ea methodus, qua contendunt continuo datis purgantibus totum corpus depurare.

409. **Q**uæ medicamenta non sanant, ea ferrum sanat. Quæ ferrum non sanat, ea ignis sanat. Quæ vero ignis non sanat, insanabilia existimare oportet.

I.

Curationis
ordo.

Omnis morbus in corpore vivente hærens sui ablationem exigit, quæ res est a sanitate perfectâ distincta; illa ablatio variis auxiliis absolvitur: Vitæ enim actiones ita sunt creatæ, ut, quidquid alienum vel morbosum est, subigere & expellere conentur. Verum interdum morbosa causa vel tam pertinax vel copiosa est, ut viribus vitæ superari & expelli non possit; aut per aliquas causas impediuntur vires vitæ, ut morbi causam expugnare non possint; in quo casu quædam auxilia sunt adhibenda, quæ mediantibus viribus vitæ vel absolute morbi causam aut subigunt aut expellunt. Prima ergo medicatio fit solis viribus vitæ, si vero sint impedimenta, quæ vitæ actionem impedire potuissent, illa secundum experientiam medicam sunt tollenda. Altera est, ut per auxilia instigantia vel minuentia actionem vitæ talem concitemus motum, qualis experientia didicit omnium optimum esse: hæc vocatur methodica curatio, quæ tamen sola vitæ actione absolvitur & tutissima est in morbis, qui motu eo superari possunt. Tertia est, quæ per Antidota morbi causam exstinguit, quæ dicitur Empirica; sed quia contra omnes causas non habemus certa antidota, pauci sunt morbi, qui hac methodo curari possunt: non multum ab his distant Evacuantia; sed quia non satis detecta sunt Evacuantia omnem & solam materiem morbi educunt, atque non omnes morbi ab humoribus dependent, hæc etiam sæpe frustra adhibetur. Denique accedimus ad auxilia

xilia validiora, quæ dicuntur Chirurgica, nempe tollenda est morbi causa, vel & tota pars affecta secando vel urendo, quæ operationes non exigunt vitæ actiones, sed fieri possunt etiam reluctante natura.

II. Per Ferrum hoc loco intelligere debemus Sectionem, qua pars quædam clausa referatur, vel quædam pars præscinditur. Recte monet Auctor ab hac truculenta operatione non esse incipiendum, sed tum demum, si per medicamenta adjuvantibus viribus vitæ non possumus curationem obtinere. Non tamen semper præmittenda sunt medicamenta in morbis, de quibus scimus per medicamenta nihil præstari posse, sed statim tunc ad sectionem est accedendum, priusquam morbus incassum adhibitis medicamentis, pejor factus, etiam sectione non potuisset tolli. In exemplis res clarior erit. Si aliquis laborat Abscessu vel Empyemate pus continente, primo adhibenda sunt medicamenta, quæ maturationem & ruptionem Abscessus promonent: his si obtinetur Abscessus ruptio, illa erit in convenientissimo utplurimum loco; si autem non rumpatur, tunc secando pertundenda sunt repagula, ut puri concilietur exitus. Itidem in sphacelo incipiente medicamenta primo sunt adhibenda, quibus sæpe obtinetur curatio, si pars non perfecte fuit mortificata: si autem medicamentis servari nequit, tunc tandem pars mortua ferro amputanda est. In Cancro autem sine prægressis medicamentis applicatis ad Sectionem pervenimus, quia nullum est medicamentum cognitum, quod Canceri malignitatem extinguere valet, & ea malignitas medicando sensim fit deterior. Si autem locus vel magnitudo Canceri ablationem totam vetat, curatione palliativa medicamentis est cohibendus Cancer, ne nimis glisecat.

III. Quæ morbi causa neque medicamentis, neque sectione potest tolli, ad eam adhibebant Veteres Urentia, quibus destruitur naturalis partium firmarum cohæsiō, & ita mutantur humores, ut priorem omnino naturam exuant. Hæc Urentia distinguuntur in Actualia & Potentialia. Actualia illa habentur, quæ in se magnam ignis copiam

Quæ medicamenta non sanant, ea ferrum sanat.

Quæ ferrum non sanat, ea ignis sanat.

collectam habent, ut ferrum vel alia metalla ignita, atque omnia liquida & solida ferventia. Hæc tam in cadaveribus quam viventibus suam operationem exercent. Potentialia vero non possident ita ignem collectum, neque ad thermometer majorem caloris gradum exhibent, neque in cadaveribus partem, cui applicantur, comburunt; sed in viventibus cum sensu ardoris escharam formant. Actualia hoc loco ab Auëtoze intelligi confido, quia potentialia sæpe adhibentur, priusquam sectio instituitur, aut si æger sectionem timeat. Sed Actualia Urentia non nisi in rebus desperatis adhibentur, vel quando aliis auxiliis curatio obtineri nequit. Ut si aliquis a venenato animali fuerit morsus, partem læsam urunt, ut ita exstinguatur omnis communicatio cum corpore reliquo, & invertatur venenatum communicatum. Comburendo etiam, venenum pestilentielle in aëre exstinguitur.

Quæ ignis non sanat, ea insanabilia existimare oportet.

IV. Quum etiam vehementissima & omnia invertentia auxilia fuere adhibita ad tollendum morbum, qui tamen his non auscultat, certe nulla spes superesse potest, eum morbum unquam superari posse. Multi quidem sunt morbi, qui per ignem non possunt curari, qui tamen sunt sanabiles, uti omnes species febrium; sed quoniam auëtor sensim adscendit ad validiora auxilia, concipit etiam præcedentia auxilia etiam frustra fuisse adhibita: atque hoc loco magis attendit ad morbos externos, qui a Chirurgis tractantur, quam ad internos, qui Medicis committuntur.

410. **L**ingua nigra atque cruenta, si quid horum signorum abest, non valde malum: morbum enim minorem declarat.

I.

Lingua in omnibus inspicenda.

A pud omnes fere practicos hanc generalem regulam invenio inculcatam, omnibus in morbis linguam esse inspiciendam, quia egregie statum humorum declarat:

declarat : sed apud paucos ex proposito inveni Linguae signa ita descripta, ut junior medicus ex conspectis in lingua phaenominis possit judicare, quid sit sentiendum ex conspecta mutatione. Certum quidem est quodcumque phaenomenon in Lingua detectum ex sua constanti causa oriri, ex qua inventa formanda est prognosis & dirigenda curatio. Omnes etiam indocti, & qui nunquam medicinam exercuere, facile videre possunt in Lingua mutationes, sed ex istis eruere latentem causam, hoc opus, hic labor; & adhuc majoris est doctrinae, ex detecta causa formare praesagium & methodum medendi: talis enim versatissimus non solum esse debet in eruenda causa ex phaenomenis, verum etiam ita ipsi cognita debet esse causa detecta cum omnibus suis mutationibus, ut nihil deficiat, quam cognitionem pauci possident medici, ex longa experientia in aegris ipsis eruendam, antequam aliquid certi pronunciare possint, vel ex arte aliquid agere. Si locus hic esset, ex Collectaneis nostris, quaecumque ex Linguae inspectione possunt peti, hic congerere potuissem, sed quoniam Auctor duntaxat proponat Linguam nigram & cruentam, extra scopum esset reliqua omnia, quae de inspectione Linguae sunt proferenda, hic enarrare, forsan in posterum opportunior de his agendi occasio.

II. Non solum practici praesagia formare solent ex praesentibus phaenomenis, verum etiam saepissime, si hoc vel istud phaenomenon non conspicitur, ita ex urina sana, corpore bene colorato, siti temperata, respiratione libera, & multis aliis, quae declarant hanc vel illam causam non adesse, egregia signa delumunt. Ita etiam in hoc Aphorismo adducit Auctor Linguam nigram & cruentam tanquam frequens & malum signum, ex cujus absentia concludit morbum esse mitiorem. Meretur ergo videre, ex qua causa fiat talis Lingua in morbis. Dum inspicimus Linguae superficiem & invenimus ejus colorem mutatum in nigredinem, vel rubedinem, ille color provenit ab ipsa linguae substantia, vel quia quadam colorata mucagine est tecta. Substantia autem Linguae nigra esse nequit, quin sit sphacelo correpta

Lingua nigra & cruenta quid notet.

repta & sic sensu omni privata, quod etiam verum est in aliis corporis partibus. Fieri autem potest, ut a liquore colore atro tingente inficiatur linguæ superficies nigredine, sed hoc nec bonum nec malum signum præbet. Sed si mucus naturalis linguæ & palati atque faucium nigrum colorem induerit & tam tenax sit, ut a Lingua colluendo auferri nequeat, signum est, morbi materiem abiisse in sphacelum vel malignam corruptionem; unde etiam urina & alvi excrementa nigra ex hac causa damnantur. In leviori autem malo mucus supra linguam hærens stagnando corruptus interdum aliquam nigredinem inducit. Cuncta ergo hæc malam latentem causam indicant, & quando illa nigredo abest, certi sumus, istas malas causas non adesse, atque ita in morbis absentia nigredinis est mitioris morbi signum. Lingua Cruenta provenit ex ejus affecta substantia, quia non scimus confluere in os humorem, qui stagnando rubedinem acquirit; ipse enim sanguis ruber si tegeret Linguam, colorem nigrum acquireret stagnando. Ergo hoc signum denotat, Linguam esse inflammata vel erysipellate affectam, quod in Angina & Dysenteria pessimum est signum. Hujus ergo absentia in dictis morbis minus periculum arguit.

411. **T** *Estis dexter frigidus & convulsus, lethale.*

I.

Observavit Hippocrates, Testes & pudenda revulsa, malum significare H. a. 571. atque ita revulsa dolores fortes significare, & periculum lethale. H. a. 454 Hoc autem loco huic sententiæ addit Dextrum testem frigidum. Tota hæc sententia in observationibus practicis fundata est, & a Veteribus propter ignorantiam anatomie explicari non satis potuit. Duo phænomena citat Auctor, nempe Frigiditatem & Convulsionem, quæ ab eodem organo non dependent: nam Calor corporis naturalis

ralis ab actione vitali dependet, qua languidiore vel extincta, generatur tali in parte frigiditas, quod in Exercitatione nostra de Motu Vitali satis fuse exposuimus. Igitur Frigus Testis dextri in acutis morbis idem designat, quod notavit frigus cujuscumque partis (*Aph.* 149, II. *Aph.* 158, III. *Aph.* 351, I.) nempe defectum motus vitalis in ea parte. Convulsio autem, qua Testis revellitur ad inguines, in organo vitali esse nequit, vasa enim spermatica ad testem tendentia motu vitali donata tam longa sunt, uti demonstrant hodierni Anatomici, ut si eorum fibræ nectentes solvantur, longitudinem aliquot ulnarum superent: hæc ergo vasa in funiculo spermatico & corpore pyramidalis testis ita intorte locata, si convellerentur, non tamen potuissent ad inguines elevare Testem. Sed musculus Cremaster ab annulo musculorum abdominalium supra pubem enatus, cingens funiculum spermaticum & pyramidale corpus, ad exteriorem testis superficiem desinens, si convellitur, potest ei annexum Testem attollere & ita ad suum punctum fixum seu dictum annulum elevare. Quamvis Cremaster inter musculos numeratur, non tamen est ex iis, qui voluntati obtemperant, nullus enim homo pro arbitrio Testem movere potest, nisi forsan unus aut alter, quod observasse dicunt Auctores: verum tam rara sunt exempla, ut nullus Anatomicorum huic musculo motum animale tribuat. Constat tamen hic musculus, ut reliqui, ex fibris, in quibus neque motus animalis, neque vitalis exercetur. Si solummodo destinatus fuisset ad sustentandum Testem, natura potius usa fuisset Ligamento, non vero fabrica musculari. Quare hic musculus destinatus videtur ad peragendum motum particularem in funiculo spermatico, corpore pyramidalis, teste & epididymide, ut specialis in his partibus habeatur motus ad conficiendum semen & propellendum ad vesiculas seminales. Revulsio ergo Testis ad inguines significat, Convulsionem fieri in musculo motus alicujus particularis, quod in morbis acutis magnum periculum arguit (Conf. *Aph.* 51, VI, *Aph.* 338, I.) Duo propterea mala signa si jungantur, Lethalia dici possunt.

sunt. Quod autem Dextrum Testem nominat, multi quæ-
siverunt arcanum, quasi fieri non potuisset in sinistro. An
vero hæc differentia semper observetur, per observationes
præcticas detegere non potui. Hoc solum inveni, sinistrum
Testem magis pendulum hæere quam Dextrum; sinistrum
etiam frequentius tumore corripitur, sed in dextro inguine
frequentiores inveniri hernias.

412. **U**ngues nigri, & digiti manuum & pedum
frigidi, contracti vel remissi, mortem in pro-
pinquo esse ostendunt.

I.

Ungues ni-
gri quando
lethale fig-
num?

Ungues corpora esse tenacia elastica & pellucida sum-
mitatibus digitorum adnata, omni fere colore ca-
rentia, norunt omnes: hi varios videntur accipere
colores a liquoribus coloratis, qui sub unguibus hærent, &
per pellucidos ungues videri possunt. Nigri igitur Ungues
inde fiunt in morbis, si sub unguibus colligitur humor ni-
ger. Experimenta docent, sanguinem in finibus arteriarum
& principiis venarum collectum stagnantem, corpore pel-
lucido tectum præbere colorem Lividum vel Nigrum, qua-
lis color hic traditur. Quoties ergo Ungues livent vel ni-
gri fiunt subito in morbis acutis, quorum signa in his A-
phorismis traduntur, designat ille color, sanguinem sub un-
guibus subsistere & concreescere. Hoc si fiat in principio
paroxysmi febris quartanæ, non valde periculosum est si-
gnum, nam subsequens calor stagnantem sanguinem in a-
ctum ducet: sed si fiat in febre acuta continua, tunc no-
tat tantum defectum virium, ut sanguis non amplius per
vasa circulatoria duci possit, & quia tunc non possumus
expectare incrementum caloris, qui stagnantem sanguinem
movebit, vis vitæ sensim debilior facta permittit, ut tan-
dem tota circulatio subsistat & homo moriatur.

II. Quod

II. Quod alibi (*Aph.* 326. & 351.) Auctor generali nomine pronunciavit de frigiditate Extremarum, id hic ad solos digitos manuum & pedum applicat, qui sunt partes omnium maxime extremæ: quoniam vero istis locis rationem dedimus, cur frigus tam periculosum habetur, non erit opus hoc loco eandem rem repetere. Si præterea *Digit*i sunt contracti vel remissi, quæ phænomena indicant, vitam & circulationem omnino in digitis cessare, antecedentem prognosim confirmant, & denuntiant mortem instare, quod etiam in multis, qui perierunt, observavi.

*Digit*i frigi-
di contracti
vel remissi,
lethale.

413. **L** *Abia livida, aut etiam resoluta & inversa, & frigida lethalia.*

I.

PRæfens hic Aphorismus vix a præcedente differt, nam quæ hic phænomena tribuuntur Labiis, idem significant, quod supra in unguibus & digitis, quum epithelium tegens prolabia, tenerrimum sit, vasculaque admodum pellucida, quæ transluentem sanguinem coarcent, optime declarare possunt humorum transluentium colores. Si in his vasis subsistat sanguis ruber, lividus semper apparebit color, & in majori concretione fit color niger. Interdum etiam ita livescunt labia, si reditus sanguinis per venam jugularem intercipitur, quod interdum in angina & tumore colli observatur; sed tunc cum livore tument Labia: quando autem ex deficiente actione subsistit sanguis, Labia simul resolvuntur, id est, amittunt omnem movendi actionem, & ita etiam invertuntur. Ex his igitur colligere possumus, vitalem & animale actionem esse extinctam, & ita homo morti proximus est.

414. **A** Ures frigidae , pellucidae , contractae , lethales sunt.

I.

AUrium nomine illa duntaxat auris pars intelligitur, quæ extra caput eminet, & visui patet, quæ plerumque Auricula appellatur, quoniam Anatomici Auris nomine plerumque intelligunt totum Auditus organum. Illa Auriculâ a causa interna frigida notat, uti reliquæ partes externæ, cessare in iis motum vitalem; sed si tales fiant auriculæ refrigeratæ ab ambiente aëre frigido, nihil boni vel mali indicant. Constant auriculæ cartilagine albicante, quæ cute tenera tegitur, in qua paucissima sunt vascula cruenta: quando tam parva fit circulatio, ut hæc minima vascula cruenta fiant inania, Auriculæ non solum defectu sanguinis pallent, sed & pellucidæ & contractæ fiunt. Hoc etiam verum est in omnibus membranis, si sanguis earum ruber eluatur, fiunt pellucidæ, & quia vascula depleta contrahuntur, tota quoque membrana redditur contracta. Ergo tales Auriculæ significant sanguinem per arterias non amplius adduci, qui impleret vasa cruenta & rubedinem ipsis præberet. Hoc si fiat in morbis acutis, in quibus ex sua natura validissima esse debebat circulatio, mortem instare denotat: in febribus autem hecticis & marasmo est etiam lethale signum, sed non ita prope mors instat, uti in Acutis.

415. **E***t tenebricosa vertigine laborans, & lucem a-*
versans, & somno ac ardore multo detentus,
desperatus.

I.

Post signa in partibus externis tandem pergit Auctor ad signa interna, quæ relatione ægri duntaxat cognoscuntur: inter illa numerat Vertiginem tenebricosam, de qua æger conqueritur morbo acuto decumbens. Hoc signum Medicus suis sensibus detegere non potuisset, sed æger dicit, sibi omnia ante oculos in gyrum verti, simulque ejus visum obtenebrari, qualis morbus *σκοτόδιος* vocatur, ut exposuimus in nostra *Medicina Dogmatica Cap. 2.* Duæ ad hunc morbum producendum concurrunt causæ internæ, nempe motus inordinatus spirituum, quo omnia circumverti videntur, & minor spirituum influxus in nervos opticos, quo omnia obtenebrantur, quum sine spirituum in hos nervos influxu nullus fiat visus, quod citato loco demonstravi. Si ergo ex hoc signo nempe Vertigine tenebricosa nobis constet, spirituum esse defectum & motum inordinatum in morbis acutis, facile erit ex hac posita causa formare prædictionem. In morbi acuti principio & vigore quando vehemens est circulatio, si observetur Vertigo tenebricosa, signum est, sanguinem tanto impetu ferri ad encephalon, ut nervi optici majore copia pressi non permittant satis copiose fluere spiritus per dictos nervos ad oculos, & qui fluunt, non pergant æquabili requisito fluxu, sed motu inordinato: ergo omnia mala ex hoc signo præfagienda, quæ ex sanguinis majore impetu ad caput deduci solent, quæ omnia hic recenseri nequeunt. Si autem circa finem Acutorum veniat Vertigo tenebricosa cum pulsu debiliore & diminutis viribus, tunc arguit summum spirituum defectum. Quando mortem instare declarat.

Vertigo tenebricosa
 in Acutis.

Lucem a-
versans in a-
cutis.

II. Alterum phænomenon in oculis dicitur Lucis averfatio, dum ægri ferre nequeunt ullam lucis agitationem supra oculi retinam, quin inde summopere lædantur. Experimur semper oculorum inflammatione laborantes vel qui admodum sunt debilitati, ferre non posse, ut oculi tunica retina a luce agitetur; quum in oculis inflammatis a retinæ agitatione intendatur dolor, atque in debilitatis, quia spiritus ad visum exercendum nimis consumuntur. Ex hoc igitur veluti ex præcedente phænomeno in Acutis ratiocinari possumus, nam ex impetu majore ad caput in vigore morbi acuti oculi bulbus in suis arteriis nimis impletus, non sine molestia hanc agitationem ferre potest, atque in fine Acutorum summum spirituum defectum arguit. Ergo in Acutis Lucis averfatio valde malum est signum.

Somno &
Ardore
multo de-
tentus in A-
cutis, de-
speratus.

III. Somnus exigit æquabilem spirituum motum per cerebrum, & Ardor multus validam circulationem arguit, duo autem hæc simul stare nequeunt: necesse igitur est, ut Somnus ille non sit naturalis ab æquabili & tardo spirituum fluxu dependens, quod ex Nostra Exercitatione *De Somno & Vigilia* colligi potest, sed productus ab illa circulatione valida in encephalo, quæ habetur in Acutis cum summo ardore. Si sanguis feratur magno impetu ad capitis interiora, quia cranium durum cedere nequit, sæpe fit, ut eo in loco, ex majore collecta copia ita opprimatur cerebrum, quo spirituum fluxus intercipitur ad organa sensus & motus animalis, atque tali modo homo sopitus jacet, qui Sopor quoad signa externa vix differt a somno naturali, sed quoad causam maxime differt. Nam si ex cerebro ita compresso homo cum febre acuta & ardore summo sopitus jacet, in magno versatur periculo, illa enim si parum augeatur causa comprimens, supprime- tur omnis spirituum fluxus, & ita perit æger. Omnia itaque recensita symptomata quoniam magnum periculum portendunt, si simul conspiciuntur, non erit incongruum, talem ægrum in desperato statu versari.

416. **E**T qui in rabiem actus furit intrepide, & non agnoscit, & neque audit, neque intelligit, jam moribundus est.

I.

Delirium vehemens in Acutis hoc loco tradit, quod semper in mortem desinit: non habetur enim vehementius Delirium, quam furere intrepide, designans cerebrum a morboſa cauſa validiſſime agitari, & quidem ita, ut non concedatur ullum mentis imperium, aut perceptio, nam neque audiunt, neque vident, neque intelligunt, quum cerebrum a morbo ita agitur, ut nulla fieri poſſit ſenſuum perceptio. Hujusmodi autem Furores in maniacis & melancholicis ſæpe obſervantur, qui tamen ſuperſtites manent diu, atque interdum ad ſe redeunt. Sed ſi morbus Acutus febrilis talem Rabiem inducit, mors inſtat. Similis agitatio in quavis parte alia deſineret in Sphacelum ſeu totius deſtructionem, quæ ſi fiat in Cerebro, ubi habetur origo omnis motus, homo ſuperſtes manere nequit, ſed ex cerebro deſtructo perit. Aliis autem in cauſis, quæ non ita ſphacelum vel cerebri corruptionem inferunt, fieri poteſt, ut ablata illa cauſa homo ad ſe redeat, quod maniacis, melancholicis, & in furore ex ebrietate ſæpe experimur.

417. **M**orituris ſigna hæc magis fiunt manifeſta, & ventres attolluntur, atque inflantur.

I.

Quo recensita ſigna in Acutis magis fiunt manifeſta, eo cauſa eſt validior & major, & quoniam homines hi moriuntur ex magnitudine cauſæ, inde quo illa ſigna ſunt magis manifeſta, eo certius mors eſt exſpectan.
In morituris ventris inflatio,

spectanda: tandem etiam Ventres inflantur & attolluntur, quoniam si quis ex morbo Acuto pereat, morbus ille prius in sphacelum degenerare solet, qui si fiat in visceribus internis, ille transit quoque in putredinem, quæ producit multum aëris artificialis, ex cuius collectione & accumulatione in multis generatur Ventris elevatio & tumor. Non autem censendum, omnem ventris inflationem instantem mortem indicare, quia sæpe ventres inflantur in morbis chronicis, qui postea subsident, & homines servantur; atque tympanitici diu tumente ventre laborant, antequam pereunt. Sed quando ex morbo Acuto sphacelus fuit natus, qui superveniente putredine ventres attollit, nullus servari potest, & talis intumescencia breve ante mortem fieri solet.

418. **T**erminus vero mortis est, si animæ calor supra umbilicum ad locum septo transverso superiorem ascenderit, & omne humidum fuerit combustum. Postquam pulmo & cor humorem amiserint, calore in mortiferis locis coacervato, caloris spiritus confertim exhalat, unde totum cum toto constitit. Rursus partim quidem per carnes, partim vero per spiracula in capite, unde vivere dicimus, relinquens anima corporis tabernaculum, & frigidum, & mortale simulacrum, unà cum bile, & sanguine & pituitâ, & carne, deditione tradit.

I.

Quomodo
mors ex a-
curis.

Pincipia a Deo creata, quæ ex motu seu actione continuere nomen, omnium difficillime definiri possunt, & de his variæ proferuntur sententiæ, hoc patet in descriptione Attractionis, Electricitatis, Gravitatis, & Motus corporum, ex quibusdam visibilibus proprietatibus, non vero ex intima cognita natura harum rerum fieri potest descriptio & definitio: hoc etiam de Vita & Morte dicendum est, etiamsi Vita nobis sit omnibus, atque aliis animalibus &

& plantis, atque cuivis satis notum sit, differentiam esse inter res viventes & mortuas: si tamen rogamus, quid sit proprie Vita & quid Mors, & qualis inter duplicem hunc statum in corpore eodem sit differentia, vix duo Auctores consentiunt. Ne omnes & varias proferamus sententias, solummodo Auctoris & nostram sententiam expositori sumus. Auctor, uti ex textu patet, existimat, vitam esse animæ calorem, qui sustentari & nutriri debet quodam humido; quando igitur ille animæ calor consumserit istud humidum vel istud combusserit, ut sit ineptum factum ad nutriendum & sustentandum eum calorem, sensim ille Calor se magis recipit ad Cor & Pulmones, & si his in locis quoque istud humidum sit consumptum, tunc ille Calor se recipit in istis destructis partibus, quæ ad Calorem conservandum sunt ineptæ, & eum Calorem conservare nequeunt: hinc Animæ calor exit partim per spiracula, quæ sunt in capite, & partim per poros cutaneos, atque ita corpus Animæ calore privatum, est cadaver. Ex quibus constat, Vitam haberi tanquam rem corpoream, quia exhalare debet, atque consistere in Calore. Quantum a vero hæc recedit sententia, non proferam, unicuique liberam philosophandi potentiam relinquens, sed ad firmiorem firmandam doctrinam proferemus nostram sententiam, quali modo judicamus morbos acutos Vitam extinguere. Inter corpora viventia & mortua illam invenio differentiam, quod in viventibus inveniat aliquod principium movens a Deo creatum, quod etiam aliquamdiu sine motu aliquo manere potest superstes, ut patet hyeme in Insectis & Plantis, ex cujus præsentia arcentur illæ mutationes spontaneæ, quæ in rebus mortuis sponte fiunt, uti sunt omnes species corruptionis; & cujus actione multa fiunt in istis corporibus, quæ nulla arte imitari possunt. Hoc principium vitale in quibusdam simul concitat Calorem, uti in nobis viventibus & reliquis animalibus perfectis, in aliis autem, uti in piscibus & plantis, nullam indicium caloris præbet. Calor ergo non est Vita ipsa, neque talis est vitæ proprietas, sine qua Vita existere non potuisset. In nobis autem ceterisque animalibus

perfectis invenimus, quod quo vitæ principium magis est agens, eo quoque major generatur in nobis calor. Hoc Vitæ principium ut agat, exigit organa & humores aptos, quibus destructis, nimis mutatis, vel minutis, ipsa vita simul exstinguitur, seu istud principium vitale a Deo creatum, a nemine mortalium revocari potest. Quoniam infinitis modis organa & humores mutari possunt, ut fiant inepta ad vitæ munera perficienda, infinitæ etiam sunt causæ, quæ vitam exstinguere possunt. Inter has nunc est Morbus Acutus, quem videbimus quomodo Vitam exstinguit. Omnes morbi acuti febriles semper habent circulationem validam cum corporis ardore vehementi, principium vitæ a causa irritante morbosa instigatum validam tunc exercet actionem, quam actionem exercet in spiritus fluentes per nervos ad motum vitalem destinatos. Ut igitur motus vitalis circulatorius fiat major, spiritus hi copiosius fluere debent per nervos ad dicta organa, quæ tam valide moventur. Si aliquamdiu ille motus continuetur, ita privatur corpus spiritibus his, qui agendo consumuntur, ut ex defectu horum corpus spiritibus exhaustis ineptum reddatur ad vitæ munera præstanda, atque ita moritur. Vel valida hac actione ita degenerant humores, ut fiant circulationi inepti, & non amplius suppeditare possint spiritibus materiem, atque ita etiam moritur corpus. Vel eadem hac actione, aut destruuntur organa, aut humores ita in organorum vasculis infarciuntur, ut organa ad vitæ munera subeunda inepta fiant: qualis morbus in parte vocatur sphacelus, & in organo principali vel toto corpore mors. Unum vel alterum vel omne simul fieri potest ex morbo acuto febrili, atque ita perit homo. Si quis nunc quærit, ubi Vita manet; vel per quæ spiracula exit, inanem & absurdam quæstionem proponit, quia sola est actio, quæ cessat, de qua dici non potest ubi manet, quoniam non est res corporea. Hæc erant, quæ dicenda erant de Magni Hippocratis Aphorismis, quæ si vergant in Artis Medicæ incrementum, & solamen ægrorum, scopo meo satisfactum erit.

F I N I S.

I N-

INDEX.

*Prior numerus Aphorismum, alter ejusdem
Paragraphum indicat.*

A.

A Bortus frequentior quali ve-
re? 91, IV.

..... an fit ex uteri coty-
ledonibus, mucro plenis? 238, I.

..... periculum in gravidis
cur ab alvi fluxu inducitur?
227, I.

..... cur præfagitur ex
mammis ex improvise gracilef-
centibus? 230, II.

Abcessus quomodo convalescen-
tibus? 142, I.

..... recipit locus dolens.
142, II.

..... qualem febrem finit?
161, II.

..... in febribus longitudi-
nem præfagiens. 161, III.

..... prædicatur ex lassitudi-
ne per febres. 141, II.

..... hepatis si pus bonum
profert, salutem portendit. 370, I.

..... præfagitur nephriticis
ex urina, cui pingue confertum
supernatat, & doloribus circa
musculos spinales supervenien-
tibus. 361, I.

..... offis a sphacelo. 402.

Abundantia an evacuatione im-

modica minuenda? 3, IX.

..... muci in coxæ articu-
lo unde? & quid faciat. 324, II.

..... quibus morbum facit?
3, VI.

..... evacuationem exigit.
3, VII.

Acidum ructantes non admodum
pleuritici fiunt. 298.

Acidus ructus in henteria diutur-
na bonum signum. 266, II.

Actio naturalis aucta vel minuta
morbus est. 396, I.

Acutæ febres juvenibus. 108, IV.
..... cur in aëris siccita-
tibus? 86, II.

..... post autumnum sic-
cum & aquilonarem. 93, VI.

Acuti morbi extenuationem indu-
centes. 133, III.

..... quando eodem die
purgandi? 120, I.

..... quatuordecim diebus
judicantur. 48, II.

Acutis affectionibus, quæ cum fe-
bre fiunt, si adsint luctuosæ re-
spirationes, male. 319.

..... febribus convulsiones &
circa viscera dolores vehemen-
tes, malum. 176, I.

..... morbis si extremarum par-
tium

I N D E X

- tium frigus adsit, malum. 326
 qualis diata? 4, VII. 7, I.
Acutissimi morbi cur in autumno?
 88, IV.
 qui dicantur.
 88, II.
Acutorum duplex est genus. II, I.
 resectio 32, IV.
 prædictiones non omni-
 no certæ. 44, III.
Acutus morbus cur difficilem pro-
gnosin faciat? 44, V.
 vid *morbus acutus.*
Adolescenciæ tempus. 106, I.
 qui morbi hoc tem-
 pore fiunt. 106, II.
Adstantium officium. I, IX.
Adulti quinam dicantur. 109, I.
Adultorum naturalis mutatio &
morbi. 109, II.
Æger quomodo se gerere debeat.
 I, X.
Ægri facilius potu quam cibo re-
ficiuntur. 36, IV.
Aer intus in capite vi foras effun-
ditur. 376, III.
 strepit, quia per angustum
 ipsi est transitus. 376, IV.
 respirando a nobis consumi-
 tur 80, II.
 pluviosus quales morbos pro-
 ducit? 95, I.
 siccus quid faciat. 95, VIII.
Aeris humiditas quid faciat in cor-
poribus sanis. 94, III.
 siccitates pluviosis sunt salu-
 bres & minus lethales. 94, V.
- Aeris siccitas quid faciat.** 86, I.
 siccitas quid faciat in corpo-
 ribus sanis. 94, II.
 vicissitudo crebra cur pro-
 ducit morbos autumnales? 83,
 II.
Æstas quibus morbis facilis vel
difficilis? 82, III.
 pauciora fert alimenta. 18,
 II.
 quali naturæ inimica? 81,
 IV.
 veri similis quid faciat. 85, I.
 cur tunc multus sudor?
 85, II.
 quando faciat febres acu-
 tas? &c. 90, IV.
 sicca & aquilonia quid fa-
 ciat. 92, II.
 quid dein autumnus pluvi-
 osus & australis faciat. 91, III.
Æstate an vomendum? 114, II.
 fiunt multi morbi. 100, II.
 cur nonnulli fiant morbi
 vernaes? 100, I.
 alvum ducens evitandum.
 117, IV.
Æstatis & senum convenientia.
 97, III.
Ætas quid faciat ad cognitionem
evacuationis 2, X.
 determinat assumptionem ali-
 mentorum. 17, VII.
Ætatis divisio. 103, II.
 mediæ & hyemis conve-
 nientia. 97, IV.
Ætate quamam sit phthisis? 202, I.

Æta-

- Ætatibus tempora magis minusve
convenientia. 82, IV.
..... victus magis minusve con-
veniens. 82, v.
..... regio magis minusque
conveniens. 82, v.
Affectionibus acutis, quæ cum fe-
bre fiunt, si adsint luctuosæ re-
spirationes, malæ. 319.
Agyrtarum periculosa Medicina.
126, II.
ἄλγῃς quid notet. 121, II.
Alimenta nimia. 5, III.
Alimento multo quæ corpora e-
gent? 14, IV.
Alimenta ad interiora determinant.
8, IV.
..... quantâ copiâ assumenda?
17, III.
..... quoties capienda? 17, II.
..... jucunda an melioribus
præstantiora? 63, IV.
..... ingrata an deterioribus
magis noxia? 63, v.
..... celeriter nutrientia, cele-
res egestionem faciunt. 43, III.
..... qualem usum præbent?
43, IV.
..... meliora & deteriora quæ
dicantur. 63, II.
..... jucunda & ingrata quæ
dicantur. 63, III.
..... quanta copia danda in
morbis? 9, II.
..... ex symptomatum
vehementia. 9, v.
..... copiosiora humectant.
114, III.
- 123, v.
Alimentorum defectus in ætate.
13, I.
..... assumptio terminatur
ex consuetudine. 17, IV.
..... ex tempestate. 17, v.
..... ex regione. 17, VI.
..... ex ætate. 17, VII.
..... ex ætate. 18, II.
..... ex autumno. 18, III.
..... ex hyeme. 18, IV.
..... ex vere. 18, v.
Alimentis multis an egeat somnus?
15, III.
Alvi ficcioris naturalis causa. 45, II.
..... humidioris naturalis causa.
45, III.
..... mutatio in siccam 45, IV.
& VI.
..... ficcioris in humidam muta-
tio. 45, v.
..... defluxus ex morbo chronico,
malum. 408, I.
..... dejectiones nigræ unde? 131, II.
..... pessimæ. 131, III.
..... minus malæ a
purgantibus. 131, IV.
..... coloris varii pe-
jores. 131, v.
..... dejectio nigra in principio
morbi mala. 131, I.
..... ductio an hyeme facienda?
114, III.

I N D E X

Alvi ductio sub cane & ante canem difficilis. 115, III.

... egestio quamdiu permittenda? 2, XIV.

... excrementorum mutatio in alvi profluvio critico. 39, II.

... in alvi profluvio morbofo. 39, III.

... excrementa longitudinem & brevitatem morbi præfagientia. 12, XI.

... excrementa biliosa in tuberculis. 40, IV.

... biliosa excrementa in faucium morbis. 40, II.

... fluxus cur fiat æstate? 100, V.

... quinam sistendus? 112, III.

... biliosus qualem tollit furditatem? 138, III.

... in tabidis lethale. 205, I. & 207, I.

... in gravidis cur periculum abortus infert? 227, I.

... fluxiones in pluviosis. 95, III.

... profluvia diuturna adultis. 109, IX.

... dentientibus. 104, V.

... profluvium longum maxime corripit balbos. 297.

... profluvium si corripit ophthalmia laborantem, bonum. 282.

... profluvium diuturnum solvitur vomitu aut alvi profluvio sponte supervenientibus. 280.

Alvi profluvium aut vomitus sponte supervenientia a diuturno alvi profluvio detento, solvit morbum. 280.

... ductio an conveniat sanis? 62, III.

... humectationem præfagit lumborum dolor. 183, II.

... humiditas senibus. 110, XI.

Alvum ducens evitandum æstate. 117, IV.

... ægre vomentibus conceditur. 117, II.

... ducere in mediocriter carnosus. 117, III.

... quibus conducit vere? 312, III.

... an conducit arthriticis & podagricis? 312, III.

... ducentia, qualia evacuare debent? 112, II.

... ducere quando eodem die in acutis? 120, I.

... siccant aquiloniæ constitutiones? 96, VII.

Alvus exturbata quando solvit febrem? 170, III.

... humectatur sanguinis eruptione. 137, II.

... sicca vel humida quæ sit præferenda. 78, II.

Amaritudo oris cacochyliæ signum. 127, V.

Ambidextra non fit mulier. 368.

Anginæ autumno. 101, XII.

... in pluviosis. 95, VII.

Angina Cynanche ex metastasi febris.

I N D E X.

- febris. 144, II.
- Synanche ex metastasi
lethalis. 145, I.
- difficilem deglutitionem fa-
ciens. 145, II.
- colli inversionem inferens.
145, III.
- synanche cur lethalis? 145,
IV.
- quomodo generat peri-
pneumoniam? 203, II.
- quænam post septimum
diem generat suppurationem?
203, III.
- Anginæ fiunt vere. 99, VI.
- Anginosus si tumor fiat in collo,
bonum. 302, II.
- Animi deliquia a calidorum fre-
quentiore usu. 209, VIII.
- deliquium quid sit. 66, I.
- exolutio & vom-
itus a tumore intus rupto. 333,
II.
- Antidota an in principio danda?
54, IV.
- Anxietas solvitur vino aqua di-
luto. 381, I.
- Aphonia ex cerebri concussione.
383, I.
- Aphthæ puerorum morbus. 103,
IV.
- Apoplexiæ definitio. 67, I.
- cur periculosior syn-
cope? 67, II.
- Apoplexia partis & linguæ impo-
tentia ex melancholia. 365, I.
- in pluviosis. 95, VI.
- Apoplexia ex melancholia quo æ-
tatis tempore præcipue gene-
ratur? 322, I.
- corporis ex melanco-
lia. 321, II.
- fit hyeme. 101, VII.
- senibus 110, VIII.
- Apoplexiæ cui impossibilis vel
difficilis curatio? 67, IV.
- ἀποπλῖα qualis morbus? 127, II.
- Apositiæ in longis dysenteriis, ma-
lum. 268, I.
- &
cum febre pejus. 268, II.
- Apositia in chronicis, malum.
331, I.
- Appetentia vel inappetentia quæ
præstantior in morbis? 57, II.
- convalescentibus.
57, III.
- Appetentes circa finem morbi cur
melius liberantur? 57, VI.
- cur ad finem morbi
ut plurimum non appetunt? 57,
V.
- Apſychia quid sit. 66, I.
- Aqua quænam levissima? 219, I.
- . . . si secundum venas in alvum
fluxerit, hydropis solutio fit.
279.
- . . . acervatim evacuata in hy-
dropicis cur mortem infert?
292, II.
- Aquilo quos morbos parit? 84, IV.
- Aquiloniæ constitutiones corpora
compingunt, & multa alia præ-
stant. 96, II.

Ardens

Ardens febris quid sit. 168, I.
 quando solvitur a
 rigore superveniente? 168, II.
 Ardentes febres adultis. 109, VIII.
 cur fiant æsta-
 te? 100, II.
 Ardentis febris constans sympto-
 ma, sitis. 164, I.
 Ardentibus febribus tussis siccæ
 paululum irritantes unde fiant?
 164, II.
 febribus tussis siccæ
 minuunt sitim. 164, III.
 Articulorum abscessum qualis uri-
 na liberat? 184, I.
 Ardores vehementes si producant
 convulsionem aut tetanum, ma-
 lum. 338.
 Ardor internarum partium in re-
 mittentibus febribus. 158, II.
 ventris in febribus unde o-
 riatur. 175, I.
 Ardore multo & somno detentus
 in acutis, desperatus. 415, III.
 Aridura quid sit. 32, III.
 Aromatum suffitus muliebria ducit.
 221, I.
 Ars longa. I, III.
 Arthritides in siccitatibus. 95, X.
 Arthriticis & podagricis an con-
 ducit vere alvum ducere? 312,
 III.
 Articulorum dolores senibus. 110,
 V.
 fiunt vere.
 99, XIV.
 Ascarides pueris frequentes. 105,

VI.
 Asphyxia quid sit. 66, I.
 Asthmata autumnis. 101, XIII.
 frequentia pueris. 105,
 IV.
 adultis. 109, III.
 Athletæ cur egent plurimo ali-
 mento? 15, V.
 Athletis cur facienda evacuatio?
 3, XI.
 ἀθρόως quid significat? 43, II.
 Atrophia quid sit. 32, III.
 Auditus gravis ab Austro 84, III.
 gravitas in senibus. 110,
 XIV.
 Aures frigidaë pellucidaë, contra-
 ctæ lethales sunt. 414.
 Aurium dolores cur fiant æstate?
 100, VII.
 humiditates in pueris.
 103, X.
 Auster ventus quos morbos parit?
 84, III.
 Austrinaë constitutiones quid fa-
 ciant. 96, X.
 Autumnales morbi qui dicantur.
 83, I.
 cur ex crebra
 aeris vicissitudine? 83, II.
 Autumnalium morborum natura.
 83, III.
 Autumnus tabidis malus. 89, VI.
 difficilius fert alimen-
 ta. 18, III.
 siccus & aquilonaris quid
 faciat post similem æstatem? 93,
 II.

Autum-

I N D E X.

- Autumnus cur humidis & mulie-
ribus commodus? 93, III.
- quid biliosis & ficcis
faciat? 93, IV.
- pluviosus australis post
æstatem siccam aquiloniam quid
faciat. 92, III.
- Autumno & vere ut plurimum mo-
ventur dolores podagrici. 320.
- cur acutissimi morbi? 88,
IV.
- pernitiosissimi morbi?
88, V.
- quinam morbi fiant. 101,
II.
- B.
- B** Albi longo alvi profluvio maxi-
me corripuntur. 297.
- Bauneum qualem oculorum dolo-
rem curat? 296, III.
- Bilis vomitus & febris ex cerebri
læsione. 315, I.
- Biliosis cur fiunt Ophthalmiæ sic-
cæ? 91, VII.
- Biliosas dejectiones habentibus num
lac malum? 257, VI.
- Biliosum sedimentum in urina su-
perne tenui, in febribus acu-
tum morbum significat. 257, I.
- Bubonis significatio. 165, I.
- C.
- C** Achexia senibus. 110, IX.
- Cacochylia quid sit & ejus phæno-
mena. 130.
- eget purgante. 130,
I.
- exigit vomitorium.
127, I.
- ejus signa traduntur.
121, I.
- producit ventris tor-
men. 130, II.
- Cacochymica febris describitur.
179, I.
- Calculorum generatio pueris fre-
quens. 105, V.
- Calculus urinæ an cognoscatur ex
urinæ subsidentia arenosa? 189,
II.
- Calefacere oportet refrigerata. 212,
I.
- derepente malum. 76
IV.
- Calefacientibus cur egent fenestres?
14, V.
- Calida carnis effeminationem in-
ducunt. 209, IV.
- nervorum impotentiam in-
ferunt. 209, V.
- mentis torporem. 209, VI.
- sanguinis eruptionem. 209,
VII.
- animi deliquia. 209, VIII.
- Calidum quid notat? 209, I.
- quibus partibus utile? 211,
III.
- applicatum quid faciat.
215, I.
- suppuratorium non in om-
ni
- A a a a a

I N D E X.

- ni ulcere. 215, II.
- cutim emollit, attenuat. 215, III.
- dolores sedat. 215, IV.
- rigores, convulsiones, tetanos, mitigat. 215, V.
- capitis gravitatem solvit. 215, VI.
- multum confert ossibus fractis. 215, VII.
- maxime convenit denu-
datis ossibus. 215, VIII.
- capitis ulceribus conve-
nit. 215, IX.
- iis, quæ ex frigore mo-
riuntur aut exulcerantur, con-
venit. 215, X.
- convenit herpetibus exe-
dentibus, sedi, pudendo, utero,
vesicæ. 215, XI.
- quibus partibus amicum
& decretorium? 215, XII.
- innatum quid sit. 14, II.
- an incrementi causa? 14, III.
- an copiosius hyeme
& vere in ventre? 15, IV.
- Calidorum usus frequentior qua-
lia damna infert? 209, III.
- Calor partis morbi signum. 149, I.
- laxat & putredinem pro-
moveret. 81, IV.
- Caloris & frigoris mutatio morbi
longitudinem præfagit. 150, I.
- mutatio morbi longitudi-
nem præfagit. 150, II.
- Calvi an fiunt capillati a superve-
nientibus varicibus? 299, II.
- Calvis an non fiunt varices magni?
299, I.
- Cancer occultus quid sit. 303, I.
- an non curandus?
303, II.
- Capillorum defluvium quid notat?
204, III.
- cur tabidis
lethale? 204, IV.
- Capitis dolor an curetur vena fron-
tis secta? 261, I.
- doloris frequentissima causa
quæ dicatur. 275, I.
- dolor quinam solvatur evacu-
atione sanguinis, puris vel aquæ,
per os, nares, & aures? 275, II.
- post autumnum plu-
viosum & australem. 92, IV.
- fit hyeme. 101, VI.
- gravitas ab austro. 84, III.
- solvitur calidis.
215, VI.
- ulceribus convenit calidum.
215, IX.
- plaga si producat stuporem
aut delirium, malum. 339.
- καρδιωγμός qualis morbus? & est
signum cacochyliæ. 127, III.
- Cardiogmus in febribus 175, III.
- Caro livida ex osse ægrotante,
malum. 327.
- Cartilago dissecta an neque augetur
neque coalescit? 284, III.
- Catarrhi cur senioribus? 91, VIII.
- tussiculosi senibus. 110, III.
- a frigido pectori applica-
to.

I N D E X

to. 217, II.
 Cerebrum quibus percussum fuerit, his necesse est febrem, & bilis vomitum supervenire. 315.
 Cerebri vulnera. 283, III.
 Cerebro frigidum noxium. 211, II.
 Cholera adultis. 109, X.
 Chronici morbi extenuationem inducentes. 133, IV.
 si excitant alvi defluxum, malum. 408, I.
 Chronicorum refectio. 32, V.
 Chronicis diæta qualis? 4, VI.
 si adsit apoplexia, malum. 331, I.
 si adsint meracæ dejectiones, malum. 331, II.
 Cibus quoties in die capiendus? 17, II.
 copiosior in sanis. 42, II.
 in morbis. 42, III.
 in convalescentibus. 42, IV.
 morbum parit. 42, V.
 ostendit sanationem. 42, VI.
 producit tubercula aut dolores ad articulos. 155, I.
 pravus exsolvit. 61, IV.
 Cicatrices cur relinquuntur cavæ ex ulceribus vetustis? 310, III.
 Circulatio non fit sola actione cordis & elatere arteriarum. 21, III.
 Claudicatio & tabes cruris quomodo in coxæ luxatione? 325, I.

Cocta quænam dicantur. 22, II.
 ex assumptis. 22, II.
 in morbis quænam dicantur. 22, III.
 purganda. 22, V.
 movenda. 22, VI.
 Cæcitas ex melancholia. 321, V.
 Collectio sanguinis ad mammas an maniam prædicit? 233, I.
 Colli inversio in angina. 145, III.
 Comedens multum post morbum si non roboretur, malum. 33, II.
 Concocta vid. *cocta*.
 Confertum & pingue supernatans, unde? 360, I.
 cur significat affectiones hepaticas & acutas? 360, II.
 Consensus inter uterum & mammas. 230, I.
 Consuetudo deteriora insuetis minus turbare solent. 75, II.
 Consueti facilius tolerant labores. 74, II.
 Consuetis victus humidus. 16, IV.
 Consuetudo non subito mutanda. 76, I.
 longa mutat etiam figuram corporis. 75, I.
 determinans alimentorum quantitatem & ingerendi tempus. 17, IV.
 Consuetudinis mala exempla. 126, II.
 differentia. 75, I.
 Continuæ febres cur fiunt æstate?

I N D E X.

- te? 100, II.
- Contraindicationes agendi difficultatem pariunt. III, I.
- Contraria contrariis medentur. 47, VI.
- Convalescentem comedentem non roborari, malum. 33, II.
- non comedentem non roborari. 33, III.
- cum inappetentia indicat evacuationem. 33, IV.
- Convalescentes belle comedentes quid significat? 56, II.
- edere & non proficere, malum. 56, III.
- Convalescentium diæta. 33, I.
- Convalescentibus an fames vel inappetentia præstantior? 57, III.
- quomodo abscessus. 142, I.
- Convulsio a frigido. 210, II.
- cur ex Helleboro 126, III.
- quomodo ab Helleboro? 194, III.
- ex Helleboro cur lethale? 194, IV.
- vulneri superveniens, lethale. 195, I.
- ab ileo, malum. 335, III.
- ex melancholia. 321, III.
- a purgantis potione, lethale. 350.
- an non admodum afficit quartanâ correptos? 263, I.
- Convulsio an tollitur superveniente quartana? 263, II.
- febrem supervenire pejus. 51, V.
- aut delirium a sanguinis fluxu, malum. 334.
- a vigilia, malum. 343.
- lipothymia in mensium fluxu, malum. 249, I.
- singultus purgationi immodicæ superveniens, malum. 197, I.
- sanguini multo effuso superveniens, malum. 196, I.
- & singultus an a sola repletionem & evacuationem? 304, II.
- aut tetanus ab ardoribus vehementibus, malum. 338.
- & tetanus ex ulcerum detumescencia. 258, IV.
- Convulsionis & singultus convenientia. 304, I.
- definitio. 51, III.
- 194, II.
- Convulsionem indicat respiratio interrupta in febribus. 178, III.
- Convulsiones dentientibus. 104, IV.
- mitigantur calidis? 215, V.
- ex somno in febribus malum. 177, III.
- & circa viscera dolores.

I N D E X.

- lores fortes in acutis, malum. 176, I.
- & vulnera magna & prava si nullos tumores habent, ingens malum. 259, I.
- Copia ramentorum in alvi excrementis magnitudinem morbi declarat. 392, I.
- his confert, alvum inferne purgari. 392, II.
- Cordis vulnera. 283, IV.
- Corpus procerum an melius vel deterius? 79, I.
- Corporis apoplexia ex melancholia. 321, II.
- Corpora quænam egent multo alimento? 14, IV.
- Corporibus humiditas carnes habentibus famem inducere oportet. 384, II.
- Cotyledones uteri mucosæ plenæ an abortum faciant? 238, I.
- Coxæ morbus quinam dicatur. 324, I.
- dolores autumnæ. 101, XI.
- Craffi naturæ quinam dicantur. 69, I.
- cur subito magis moriuntur quam graciles? 69, III.
- Craffitudo loci vel puris suppurationem internam occultat. 306, I.
- Crisis quid sit. 20, II.
- . . . an hodie non amplius observatur? 20, III.
- . . . quot modis accipitur? 20, IV.
- Crisis divisio in perfectam, & imperfectam. 20, VII.
- perfecta describitur. 20, VIII.
- vetat moventia. 20, IX.
- purgantia. 20, X.
- Criticum tempus an definit tempus exhibendi sudoriferum? 146, IV.
- Criticus sudor quo tempore? 146, II.
- Cruda quæ dicuntur? 22, IV.
- non evacuanda. 22, VII.
- non movenda. 22, VIII.
- excrementa ab atra bile. 393, I.
- Cruris tabes & claudicatio in coxæ luxatione, quomodo? 325, I.
- an unctione curantur? 325, II.
- Cucurbitæ mammis applicatæ quomodo cohibent menstrua? 243, I.
- Curatio secundum rationem quænam sit. 77, I.
- variat pro diversitate partium. 211, I.
- empirica, conjecturalis & rationalis. 77, I.
- extrema. 6, II.
- præservatoria. 312, I.
- rationalis non facile mutanda. 77, II.
- conjecturalis. 77, I.
- Curationis ordo. 409, I.
- Cutis an rarior viris, quam mulieribus? 262, II.
- . . . quibus obtenditur arida ac dura.

dura, sine sudore moriuntur. quibus vero laxa ac rara, cum sudore moriuntur. 264.

. . . significat, an æger cum vel sine sudore sit moriturus. 264, I.
. . . emollitur & attenuatur calidis. 215, III.

D.

DEcolores menses quinam dicantur. 229, I.

Decubitus humorum periculosi morbis melancholicis. 321, I.

Debilitas in remittentibus quid notat? 159, II.

Debilitatis prædictio ex extenuatione. 53, VI.

. rigor. 156, III.

Defectus humorum morbi quinam? 47, IV.

. morbi difficilius quam repletionis curantur. 47, V.

. qualem refectionem exigit? 3, X.

. vocis & stertor post capitis dolores derepente natos in sanis, ex qua causa? 316, I.

Defluxus alvi ex morbo chronico, malum. 408, I.

Deglutitio difficilis in angina. 145, II.

Dejectiones biliosas habentibus num lac malum? 257, VI.

. meracæ in chronicis, malum. 331, II.

Dejectio meraca si producit dysen-

teriam, malum. 348.

Deliquium animi, exsolutio & vomitus a tumore intus rupto. 333, II.

Deliria cum risu accidentia, securiora: cum studio vero periculosiora. 318.

Delirii definitio. 27, II.

. causæ. 27, III.

. externæ. 27, IV.

. internæ. 27, V.

Delirium ab osse percisso, si in vacuum penetraverit. 349.

. aut convulsio a sanguinis fluxu, malum. 334.

. a vigilia, malum. 343.

. stupor a plaga in caput, malum. 339.

. & difficultas spirandi in remittentibus lethale. 160, I.

. & rigor a multo potu, malum. 332.

. quomodo solvit tremores in ardentibus? 291, II.

Dentibus frigidum noxium. 211, II.

Dentientibus quinam morbi fiant, 104, I.

Dentium visciditas cur febris vehementioris signum? 163, II.

. visciditatis causa. 163, I.

Denudatio ossis si producit Erysipelas, malum. 344.

Destillationes in pectus quo tempore suppurantur? 363, I.

Deteriora quid notet. 75, I.

Detumescencia ulcerum parit convul-

I N D E X.

- vulsionem & tetanum. 258, IV.
 parit infan-
 niam aut lateris dolores acutos. 258, V.
 parit sup-
 purationem. 258, VI.
 parit dy-
 senteriam, si rubicundi fuerint
 tumores. 258, VII.
 Diæta humida quibus conducit? 16,
 I.
 febricitantibus. 16,
 II.
 pueris. 16, III.
 consuetis. 16, IV.
 in morbi incrementi prin-
 cipio. 10, I.
 in duobus generibus acuto-
 rum. 10, IV.
 in morbo acuto. 7, I.
 inter paroxysmos. 10, I.
 plena. 5, IV.
 tenuis. 5, V.
 magis lædit. 5, VI.
 quæ dicatur. 4, I.
 remittentium. II, III.
 in intermittentibus. II, IV.
 chronicis. II, V.
 rigidissima an conducit sanis?
 62, VI.
 tenuis. 4, IV.
 in sanis. 4, V.
 in chronicis. 4, VI.
 in acutis. 4, VII.
 tenuissima in morbi paroxysf-
 mo. 8, VI.
 in morbi incremento. 9, I.
 Diæta tenuissima in morbi vigore.
 8, I.
 in quo acuto? 7,
 VI.
 qualis in acutis. 7, VII.
 Diaphoreticum an conducit sanis?
 62, V.
 Diaphragma quid sit. 128, II.
 Diarrhœa producit dysenteriam.
 400.
 superveniens a pleuriti-
 de aut a peripneumonia deten-
 to, malum. 281.
 vehemens si a leuco-
 phlegmatia detento superveniat,
 morbum solvit. 354.
 Diebus XIV. fit judicatio. 48, II.
 Dierum criticorum annumeratio?
 49, I.
 causa. 49, VI.
 observatio fir-
 matur febre quartana. 50, I.
 Dies critici num observandi? 49, II.
 horum impedimenta. 49,
 III.
 ab acutis. 49,
 III.
 a varia diæta,
 medicatione, climate, ætate.
 49, IV.
 in Inflammatoriis obser-
 vandi. 49, V.
 indices. 49, VII.
 quantum distant a cri-
 ticiis. 49, VIII.
 sextus cur difficulter judicat?
 139, I.

Difficile

Difficile ferunt evacuationem. 25,
VI.

..... crudi. 25,
VII.

..... bonorum. 25,
VIII.

..... malorum. 25,
IX.

Digiti frigidi contracti vel remif-
si, lethale. 412, II.

Directio naturæ observanda. 21,
III.

Diureticum an conducit fanis? 62,
IV.

Dolens locus abscessum recipit.
142, II.

..... ante morbum præ-
ceteris affligitur. 143, I.

Dolentibus in capite an lac ma-
lum? 257, II.

Dolor quid sit. 31, III. 71, II.
..... quomodo dicitur non sentiri.

31, I.

..... diurnus partium circa ven-
trem si producit suppurationem,
malum. 247.

..... capitis an curetur vena fron-
tis secta? 261, I.

..... hepatis vehemens solvitur
superveniente febre. 377, I.

..... oculorum qualis curatur me-
ri potu? 296, II.

..... qualis curatur per
balneum? 296, III.

..... qualis curatur per
fomentum? 296, IV.

..... qualis curatur per

venæ sectionem? 296, V.

..... qualis curatur per
purgationem? 296, VI.

..... vehemens partium circa ven-
trem si producit extremarum
frigus, malum. 351.

..... vehementior cur obscurat
alterum? 71, III.

Dolorem fere non sentire. 31, IV.

Dolores acuti lateris aut infania
ex ulceris detumescentia. 258, V.

..... capitis quinam solvantur
evacuatione sanguinis, puris vel
aquæ, per os, nares, & aures?
275, II.

..... elevati qui dicantur. 272, I.

..... ventris elevati quare mi-
tiores, non elevati, vehemen-
tiores? 272, II.

..... hypochondriorum
sine inflammatione quinam sol-
vantur febre. 305, II.

..... & tumores articulorum le-
vantur frigida multâ affusâ.
218, I.

..... circa musculos spinales, &
urina cui pingue confertum su-
pernatat, Nephriticis superve-
nientia, abscessum præfagit.
361, I.

..... sedantur calidis. 215, IV.

Doloris differentia quæ sint ob-
servandæ. 270, II.

..... capitis causa frequentissima
quæ dicatur. 275, I.

..... oculorum causa. 296, I.

Ducere quæ oportet? 21, II.
Dysenteria

I N D E X.

Dysenteria adultis. 109, XI.
 autumn. 101, X.
 carunculas deponens,
 lethale. 136, I.
 multa significat. 134, I.
 ab atra bile incipiens,
 lethale. 134, II.
 ex mania, bonum.
 330, I.
 a diarrhoea. 400.
 producit lenteriam. 401.
 a meraca dejectione,
 malum. 348.
 ex ulcerum detumef-
 centia, si rubicundi fuerint tu-
 mores. 258, VII.
 longa cur in lienosis
 mala? 308, II.
 laborantes lien-
 si, in hydropem vel lenteriam
 incidentes, pereunt. 308, III.
 lienosis superveniens,
 bonum. 313.
 Dysenteriae in siccitatibus. 95,
 XII.
 quando fiunt pituitosis?
 91, VI.
 Dyspnaea naturalis senibus. 110,
 II.
 Dysuria & stranguria solvitur vi-
 ni potu. 373, I.

E.

E Brius ex qua causa derepente
 mutus? 198, I.
 Efflorescentiae latae non admodum

pruriginosae? 274.
 Egestionem sanguinis copiosam
 passis, an noceat lac? 257,
 VII.
 Egestionem spumosaem quae dicantur,
 & unde oriantur. 355, I.
 an ex pituita
 a capite deficiente? 355, II.
 Ecstasis a mania, bonum. 330,
 III.
 Elevati dolores qui dicantur. 272,
 I.
 ventris quare mi-
 tiores, non elevati, vehemen-
 tiores? 272, II.
 Elleborus vid. *Helleborus*.
 Empirica curatio qualis. 77, I.
 Empyema quid significet. 201,
 II.
 ex pleuritide. 201, III.
 intra quod
 tempus expurgari debet? 208,
 II.
 quomodo curari possit
 per sputum. 208, III.
 si non expurgatur in-
 tra quadraginta dies, tabem in-
 fert. 208, IV.
 Ephemera quae dicatur. 165, II.
 sola cur non mala in
 bubonibus? 165, III.
 Epilepsia juvenibus. 108, V.
 Epilepsiae definitio. 70, II.
 cur facilius pueris? 70,
 III.
 in pluviosis. 95, V.
 autumn. 101, XIV.
 Epilepsiae

I N D E X

Epilepsiæ sunt vere. 99, IV.
 species quænam libera-
 tur mutatione ætatis, regionum?
 &c. 70, IV.
 Epileptici pueri quando liberan-
 tur? 70, I.
 Epiphænomena longitudinem mor-
 bi præfagientia. 12, VIII.
 Erroneæ febres autumnæ. 101,
 IV.
 Eruptio mensium quid notet? 225,
 I.
 sanguinis a forti pulsu
 in ulceribus, malum. 346.
 Erysipelatis definitio. 290, I.
 translatio ad interna,
 non bonum. 290, II.
 ad externa,
 bonum. 290, III.
 Erysipelas uteri an distingui pos-
 sit ab inflammatione? 236, I.
 cur prægnanti le-
 thale? 236, II.
 si producit putredinem
 aut suppurationem, malum.
 345.
 ab offis denudatione,
 malum. 344.
 Evacuare quæ turgent. 22, IX.
 multum & subito est
 periculosum. 76, II.
 ad animi deliquium quan-
 do? 23, VI.
 Evacuatio in sanis. 3, I.
 cur facienda athletic? 3,
 XI.
 an ex copia æstiman-

da? 23, I.
 qualis esse debeat. 23,
 IV.
 judicatur ex facili to-
 lerantia. 23, V.
 qualis confert? 25, III.
 non confert? 25,
 IV.
 facile fertur? 25,
 V.
 per locum conveniens.
 21, IV.
 copiosior salubris. 2,
 III.
 ex abundantia.
 2, III.
 mala, 2, IV.
 sine abundan-
 tia. 2, V.
 unde cognoscitur bona
 vel mala? 2, VI.
 spontanea. 2, II.
 regulam curationis sup-
 peditat. 2, VII.
 sursum quotuplex? 128,
 IV.
 facienda in abundantia.
 3, VII.
 an sola sanguinis missi-
 one minuenda? 3, VIII.
 an omnes morbos re-
 pletionis curat? 47, III.
 indicatur ex inappeten-
 tia in convalescentibus. 33, IV.
 neque vetatur neque in-
 dicatur semper in omni mor-
 bo. 2, XI.

Evacua?

I N D E X

Evacuatio per conveniens organum. 2, XII.
 nigra in extenuatis, lethale. 133, VI.
 & repletio an causa sola convulsionis? 304, II.
 Evacuatione boni sæpe præveniuntur morbi. 3, V.
 immodica an auferenda abundantia? 3, IX.
 Evacuationis necessitas. 3, IIII.
 112, I.
 quantitas æstimanda ad prædictionem. 404.
 regulæ observandæ. 2, XV.
 morbi quinam? 47, IV.
 Eunuchi non laborant podagra, neque calvi fiunt. 293.
 Exanthemata lata quæ dicantur. 274, I.
 minus pruriginosa. 274, II.
 Excrementa cruda ab atra bile. 393, I.
 Excretorius humor vel est generalis vel particularis. 193, I.
 Experimentum periculofum. I, V.
 Exfolutio, vomitus & animi deliquium a tumore intus rupto. 333, II.
 Extenuatis præter rationem lac convenit. 257, X.
 Extenuatio a multis causis. 53, I.
 per morbos acutos. 133, IIII.

Extenuatio per morbos Chronicos. 133, IV.
 ex vulneribus. 133, V.
 his si evacuatio nigra, postriedie moriuntur. 133, VI.
 Extenuationis & maciei differentia. 133, II.
 Extremarum frigus a dolore vehementi partium circa ventrem, malum. 351.
 partium frigus in morbis acutis malum. 326.

F.

Faciei motus mutatus in remittentibus mortem præfagit. 159, III.
 Facile ferunt evacuationem. 25, V.
 Facilis tolerantia iudicium facit evacuationis. 23, V.
 Fames quid sit. 29, IIII.
 quotuplex. 47, IIII.
 corpora siccat. 384, I.
 nataralis an solvitur vini potu? 46, II.
 nimia in morbis non bona. 29, VII.
 acutis. 29, VIII.
 chronicis. 29, IX.
 Famem inducere oportet corporibus humidis carnes habentibus. 384, II.
 Farinosum urinæ sedimentum longam infirmitatem significat inf-

I N D E X

febribus. 356, I.
 Fastidium cacochyliae signum est.
 121, II.
 Faucium morbis biliosa urina. 40,
 III.
 biliosa excremen-
 ta. 40, II.
 Febricitanti, nisi diebus impari-
 bus febris dimiserit, reverti so-
 let. 171, I.
 si quis cibum det,
 convalescenti quidem robur, æ-
 grotanti vero morbus fit. 390.
 unde sudor? 166, I.
 sudor superveniens
 febre non deficiente, malum.
 166, II.
 Febricitantibus annon lac dandum?
 257, III.
 humidus victus. 16,
 II.
 Febres non intermittentes, si per
 tertium diem vehementiores fi-
 ant, periculosæ. 387.
 quibus longæ sunt, his aut
 tubercula aut ad articulos do-
 lores fiunt. 388.
 acutæ annon fiunt senibus?
 14, VI.
 longæ in pluviosis. 95, II.
 dentientibus. 104, III.
 longæ adolescentibus. 106,
 III.
 omnes malæ in bubonibus
 præter ephemeram. 165, III.
 Febribus quotidie rigores si fiant,
 quotidie febres solvuntur. 173, I.

Febribus longis & languidis lac
 convenit. 257, IX.
 quartanis existentibus, si
 sanguis ex naribus fluxerit, ma-
 lum. 406.
 Febris definitio 153, I. & 51, IV.
 devotio. 153, II.
 intermittens tertio die vehe-
 mentior, periculosa. 153, III.
 & bilis vomitus ex cerebri
 læsione. 315, I.
 cacochymica describitur.
 179, I.
 nisi apprehendit, si vocis
 defectus & stertor post capitis
 dolores derepente in sanis na-
 tos, observantur, cur intra sep-
 tem dies moriuntur? 316, II.
 quosnam hypochondriorum
 dolores sine inflammatione, sol-
 vit? 305, II.
 vehemens ex dentium vis-
 ciditate cognoscitur. 163, II.
 quænam abscessu finitur.
 161, II.
 lassitudinem inducens. 141, I.
 quando solvitur alvo ex-
 turbata? 170, III.
 quando solvitur hæmorrhæ-
 gia? 170, II.
 metastasis anginam produ-
 cens. 144, II. & 145, I.
 convulsionem supervenire,
 pejus est. 51, VI.
 extenuat. 53, II.
 valida quando non extenu-
 at? 53, III.

Febris

I N D E X.

- Febris quando nimiam extenuationem facit? 53, IV.
- superveniens solvit dolorem hepatis vehementem. 377, I.
- si supervenerit & urina abunde fluxerit, quomodo liberat volvulum ex stranguria? 309, III.
- qualis non ex bile nascitur? 367, I.
- solvitur multa aqua calida in caput affusa? 367, II.
- Ferrum sanat ea, quæ medicamentata non sanant. 409, II.
- Finis cur debiliora habet omnia? 55, IV.
- Fluxui muliebri si convulsio & animi deliquium superveniat, malum. 249.
- Fluxus & tabes a puris sputo. 341, I.
- sanguinis in quibus mensibus deficientibus bonus? 226, II.
- alvi in gravidis cur periculum abortus infert? 227, I.
- sanguinis si producit delirium aut etiam convulsionem, malum. 334.
- Fœmina vel mas an ex colore gravidæ prædici potest? 235, I.
- Fœtus an manere nequeat sanus perseverante menstruatione? 253, I.
- mares quidem in dextris, fœminæ vero in sinistris magis. 241.
- Fomentum qualem oculorum dolorem curat? 296, IV.
- Frigefacere derepente malum. 76, V.
- Frigefacta calefacere oportet. 212, I.
- non calefacienda, quæ sanguinem fundunt. 212, II.
- Frigida velut nix, glacies, pectori inimica. 217, I.
- Frigiditas uteri sterilitatis causa. 255, II.
- Frigidum quomodo adhibendum in sanguinis eruptione? 216, II.
- quali inflammationi vel epiphlogismati applicandum. 216, III.
- quando erysipelati adhibendum? 216, IV.
- infert nigrores. 210, III.
- rigores febriles. 210, IV.
- quid sit & quæ mala infert? 210, I.
- spasmus & tetanum infert. 210, II.
- ulceribus mordax. 213, II.
- quibus partibus inimicum & occidens? 215, XIII.
- noxium ossibus, dentibus, nervis, cerebro, spinali medullæ. 211, II.
- cutim obdurat. 213, III.
- dolorem insuppurabilem facit. 213, IV.

I N D E X.

Frigoris & caloris mutatio morbi longitudinem præfagit. 150, I.

Frigus internarum partium unde in remittentibus? 158, III.

. extremarum partium in morbis acutis malum. 326.

. auget contractilitatem & minuit motum vitalem. 81, III.

. partis morbi signum. 149, II.

Frontis vena secta an curet capitis dolorem? 261, I.

G.

GEmellorum alteruter an nequeat abortum facere? 231, I.

Genæ pars tenuis dissecta an neque augetur neque coalescit? 284, v.

Genitura humidior quid notet. 167, II.

. humidior & nares humidiores cur minus perfectam sanitatem indicant? 267, III.

. & nares sicciora perfectiorem sanitatem indicant. 267, IV.

Genuum gravitas ex cacochylia. 130, III.

Gibbi qui ex asthmate aut tussi fiunt ante pubertatem, pereunt. 311.

Gingivarum pruritus dentientibus. 104, II.

Glaucedines in senibus. 110, XIII.

Graciles qui dicantur. 69, II.

Gravedo quid sit. 65, III.

Gravedo post autumnum pluviosum. 92, v.

Gravedines fiunt hyeme, 101, IV.

. vere. 99, VII.

. diuturnæ post autumnum siccum & aquilonarem. 93, VII.

Gravida fœmina quæ dicatur. 111, II.

. quando purganda? 111, III.

. cur de abortu periclitatur, si alvus multum fluxerit? 227, I.

. abortit a venæ sectione? 224, I.

. magis abortit, si grandior erit fœtus? 224, II.

. si corripitur febribus & vehementer attenuetur, cur huic partus difficilis & periculosus instat? 248, I.

. hæc cur abortiens periclitatur? 248, II.

. sectâ venâ abortit, præcipue si major fuerit fœtus. 224.

Gravidæ tenesmus superveniens abortire facit. 352.

. juniores & fœtus seniores in purgatione caute tractare oportet. 222.

. quadrimestres & usque ad septimum mensem, purgandæ, si turgeat materia. 222.

Gravidam acuto morbo corripì, cur lethale? 223, I.

Gravidarum color an prædicere potest, marem vel fœminam gestari.

stari? 235, I.
 Gravidis quando sanguis mittendus? III. IV.
 Graviditas an cognosci possit ex melicrato mulieri exhibito? 234, I.
 Graviditatis signum est, si menstrua sponte subsistant cum fastidio, sine horrore & febre. 254, I.

H.

H Abitus bonus an persistere nequit? 3, XI.
 Hæmoptysis mala. 135, II.
 juvenibus. 108, II.
 Hæmorrhagia vid. *sanguinis fluxus*.
 narium in febribus quartanis, malum. 406, I.
 Hæmorrhagiæ in quibus mensibus deficientibus bonæ? 226, II.
 Hæmorrhoides aut varices quamnam speciem infantiæ solvunt? 286, I.
 diurnæ an non omnes curandæ? 277, I.
 melancholicis supervenientes, bonum. 276, I.
 nephriticis supervenientes, bonum. 276, II.
 Hæmorrhoidibus diuturnis sanatis, cur periculum est, ne fiat hydrops vel phthisis? 277, II.
 Hæmorrhoidum fluxus quando bonus? 135, III.
 Hellebori usus & cautelæ. 123. ad 126.

Hellebori usus. 123, II.
 Helleborus quotuplex? 123, I.
 quomodo generat convulsionem? 194, III.
 cur inducit convulsionem? 126, III.
 Hepar si ictericis durum fiat, malum. 307.
 Hepatis abscessus si pus bonum profert, salutem portendit. 370, I.
 dolor vehemens solvitur superveniente febre. 377, I.
 hydrops si producat ventris hydropem, lethale. 380, I.
 inflammatio si producit singultum, malum. 342.
 vulnera. 283, VIII.
 Hepati inflammato singultus supervenit. 251, IV.
 Herpetibus exedentibus convenit calidum. 215, XI.
 Hippocratis peritia & sapientia excellens. 119, IV.
 Horror solvitur vino aqua diluto. 381, III.
 a sudore non bonum. 329.
 Humiditas oculorum, narium, & alvi in senibus, 110, XI.
 uteri sterilitatis causa. 255, III.
 Humorū decubitus periculosi morbis melancholicis. 321, I.
 Hydrops qualis morbis sit. 273, I.
 supervenit leucophlegmatix. 399.

Hydrops

Hydrops ex mania, bonum. 330, II.

... omenti solvitur urina multa. 379, I.

... ventris ex hepatis hydrope, lethale. 380, I.

... hepatis si producat ventris hydropem, lethale. 380, I.

... vel lienteria si corripit lienosos, longa dysenteria laborantes, lethale. 308, III.

Hydropes autumnno. 101, VI.

Hydropis solutio fit, si aqua secundum venas in alvum fluxerit. 279.

... vel phthisis periculum cur ex hæmorrhoidibus diuturnis sanatis? 277, II.

Hydropicis si aqua acervatim evacuator, cur mortem infert? 292, II.

... tussis superveniens, malum. 300.

... ulcera in corpore orta, non facile sanantur. 273, II.

Hydropicum si tussis habeat, desperatus est. 372.

Hyems facilius fert alimenta. 18, IV.

... quid faciat & quos morbos inferat. 102, I.

... quibus morbis facilis vel difficilis? 82, II.

... australis, pluviosa & tranquilla quid faciat. 91, I.

... cui naturæ inimica. 81,

III.

... sicca & aquilonia quid faciat. 90, II.

Hyemis & ætatis mediæ convenientia. 97, IV.

Hyeme an alvus ducenda? 114, III.

... magis vitanda vomitoria 116, III.

... an ventres calidissimi? 15, II.

... maxime nocet vomitorium in lienteria. 122, III.

Hypochondria quænam partes dicantur. 305, I.

... dura in ictero ex febre, non bonum. 174, III.

... murmurantia unde in febribus. 183, I.

... quibus elata murmurant an lac noceat? 257, IV.

Hypochondriorum dolores sine inflammatione, quænam solvantur febre. 305, II.

Hysterica quid notet. 228, I.]

I.

ICteri definitio. 172, I.

... species quænam ante septimum diem in febribus veniens, malum. 172, II.

Icterici non admodum flatulenti. 265, I.

Icterici si hepar durum fiat, malum. 307.

Icterus

I N D E X

- Icterus die critico in febre, bonum. 128, III.
 174, II.
 ex febre cum hypochondriis duris, non bonum. 174, III.
 Jejunium facile fert senex, difficile puer. 13, II.
 Ignis sanat ea, quæ ferrum non sanat. 409, III.
 Ileus si producit vomitum, malum. 335, I.
 singultum, malum. 335, II.
 convulsionem, malum. 335, III.
 Impetigines sunt vere. 99, X.
 Impotentia linguæ & apoplexia partis ex melancholia. 365, I.
 Impura corpora non nutrienda. 35, IV.
 Impuritas quid sit. 35, II.
 Inappetentia & fastidium quantum differant. 127, II.
 an præstantior quam appetitus in morbis? 57, IV.
 in convalescentibus? 57, III.
 Inconstantia sunt, quæ præter rationem fiunt. 52, II.
 Incrementum corporis an ab actione vitæ vel calido innato? 14, I.
 an a calido innato? 14, III.
 Infantes quando nascuntur infirmi? 91, V.
 Inferiores partes quæ dicantur. C c c c c
 Inflammato intestino recto supervenit stranguria. 251, I.
 utero supervenit stranguria. 251, II.
 hepati supervenit singultus. 251, IV.
 Inflammatio hepatis si producit singultum, malum. 342.
 Inflatio ventris in morituris. 417, I.
 Insanabilia existimare oportet ea, quæ ignis non sanat. 409, IV.
 Insaniæ & melancholiæ fiunt vere. 99, III.
 autumno. 101, XV.
 quæ species solvitur varicibus aut hæmorrhoidibus? 286, I.
 Insania aut lateris dolores acuti ex ulceris detumescencia. 358, V.
 Intemperies an nequit esse sterilitatis causa in masculis? 256, I.
 Intermittentibus febribus rigor. 156, III.
 Intermittentium diæta. II, IV.
 chronicorum diæta. II, IV.
 Intermittens febris tertio die vehementior, periculosa. 153, III.
 Interna suppuratio occultatur crassitudine loci vel puris. 306, I.
 Intestino recto inflammato supervenit stranguria. 251, I.
 Intesti-

Intestinorum tenuium si aliquod
dilectum fuerit, non coalescit.
289.

..... vulnera. 283, VI.

Invasio longitudinem & brevitatem morbi præfagiens. 12, IV.

Judicare quando dicitur? 20, V.

Judicata quæ dicuntur? 20, VI.

Judicium difficile. I, VI.

..... difficile ex paroxysmis
rimari. 140, II.

Juvenes an frequentius, quam senes ægrotant? 64, III.

Juvenum ætas. 64, I.

Juvenibus quinam morbi fiant.
108, I.

L.

LAbia livida, aut etiam resoluta & inversa & frigida lethalia. 413.

Laborandum non est, ubi fames.
41, IV.

Labor quid faciat. 41, II.

..... in morbis quid significet.
26, I.

Laboris consuetudo quid in nobis
faciat. 74, III.

Lac quid sit. 232, I.

..... quando generatur in mam-
mis ex menstruâ retentis? 232,
III.

..... in capite dolentibus an ma-
lum? 257, II.

..... an non dandum febricitanti-
bus? 257, III.

Lac an noceat, quibus hypochon-
dria elata murmurant? 257, IV.
..... an non dandum siticulosis?
257, V.

..... num malum, quibus deje-
ctiones sunt biliosæ? 257, VI.

..... an nocet, quibus copiosa san-
guinis fuit facta egestio? 257,
VII.

..... convenit tabidis. 257, VIII.

..... febribus longis &
languidis. 257, IX.

..... præter rationem ex-
tenuatis. 257, X.

Lactis examen. 257, I.

..... generatio. 232, II.

..... copiosior effluxus in gravi-
dis cur foetum infirmum signifi-
cat? 245, I.

Lachrymæ ex manifesta causa nil
boni vel mali præfagiunt. 162, II.

..... ex latente causa in fe-
bre quid præfagiunt? 162, III.

..... in aliis infirmitatibus
quid notant? 162, IV.

Languidis & longis febribus con-
venit lac. 257, IX.

Lassitudo laboriosa. 30, I.

..... spontanea. 30, II.

..... squalens. 30, III.

..... laboriosa. 30, IV.

..... ulcerosa. 30, V.

..... tensiva. 30, VI.

..... phlegmonosa. 30, VII.

..... spontanea morbos denun-
ciat. 30, VIII.

..... per febres. 141, I.

Lassitu-

Lassitudo cur præfagit abscessum?

141, II.

Laterum dolores fiunt hyeme.

101, v.

Lateris dolores acuti aut insania
ex ulceris detumescencia. 258,

v.

Lentoris mutatio varia. 22, III.

Lepræ fiunt vere. 99, IX.

Lethalia vulnera quæ dicantur.

283, I.

Lethargus adultis. 109, VI.

. fit hyeme. 101, III.

Leucophlegmatia solvitur a diar-
rhœa vehementi superveniente.

354.

Leucophlegmatiae hydrops super-
venit. 399.

Lienes autumnno. 101, v.

Lienosi qui dicantur. 308, I.

. cur his dysenteria longa
mala? 208, II.

. dysenteria longa laboran-
tes, in hydropem vel lenteriam
incidentes, pereunt. 308, III.

Lienosis dysenteria superveniens,
bonum. 313.

Lienteria causa. 122, I.

. diuturnæ ex qua causa?
266, I.

Lienteria adultis. 109, XII.

. autumnno. 101, IX.

. a dysenteria. 401.

. vetat vomitorium. 122,
II.

. vel hydrops si corripit
lienofos, longa dysenteria labo-

rantes, lethale. 308, III.

Lingua in omnibus inspicienda.

410, I.

. nigra & cruenta quid no-
tet. 410, II.

Linguae impotentia & partis a-
poplexia ex melancholia. 365,

I.

Lipothymia aut convulsio in men-
sium fluxu, malum. 299, I.

Loci vel puris crassitudo suppura-
tionem internam occultat. 306,

I.

Longitudo prædicitur ex sudore
in tempore non critico. 146,

III.

. ex sudore fri-
gido in mitiore febre. 146, v.

. morbi prædicitur ex ex-
tenuatione. 53, v.

. ex caloris &
frigoris mutatione. 150, I.

. ex caloris
mutatione. 150, II.

Longitudinem præfagit abscessus
in febribus. 161, III.

Longitudinis prædictio ex sudore.
166, III.

Lucem averfans in acutis. 415,
II.

Lumborum dolores fiunt hyeme.
101, v.

. dolor præfagiens uri-
nae copiam. 183, III.

. præfagiens alvi
humectationem. 183, II.

. ex cacochylia.

130,

130, III.

Lumbrici pueris frequentes. 105, V.

M.

Maciei species & causæ. 32, III.

..... & extenuationis differentia. 133, I.

Macrocephali cingendo caput fiunt. 75, I.

Mammæ graciles abortum præfagiunt. 246, II.

..... duræ in gravidis quid præfagiunt? 246, III.

..... solidiores cur foetum firmiorem indicant? 245, II.

..... ex improvise graciles cur abortum præfagiunt? 230, II.

Mammarum cum utero consensus. 230, I.

Mamma dextra gracilescens an abortum maris præfagit & vicissim? 231, II.

Mania ex melancholia. 321, IV.

..... an prædicitur ex sanguinis collectione ad mammas? 233, I.

..... si producit dysenteriam, bonum. 330, I.

..... hydropem, bonum. 331, II.

..... ectasin, bonum. 330, III.

Marasmus quid? 32, II.

Mares foetus quidem in dextris, foeminæ vero in sinistris magis.

241.

Mas vel foemina an ex colore gravidæ prædici potest? 235, I.

Medicus qualis est debeat. I, VIII.

Melancholia producit apoplexiam corporis. 321, II.

..... convulsionem. 321, III.

..... maniam. 321, IV.

..... coecitatem. 321, V.

..... curatio. 321, VI.

..... quo ætatis tempore præcipue generat apoplexiam? 322, I.

..... producit linguæ impotentiam & partis apoplexiam. 365, I.

..... sursum vel deorsum erumpens, lethale. 132, III.

..... cur præcipue in vena portarum colligitur? 119, III.

..... & infania autumnio. 101, XV.

Melancholiæ evacuatio in principio dysenteriae, lethale. 134, II.

..... cur quibusdam post autumnum siccum? 93, VIII.

..... & infaniæ fiunt vere. 99, III.

Melancholici cur uberius purgandi? 119, III.

..... humoris species. 131, II.

Melan-

I N D E X.

- Melancholici qui dicantur. 119, II.
 Melancholica materia describitur. 119, II.
 Melancholicis hæmorrhoides supervenientes, bonum. 276, I.
 morbis periculosi, decubitus humorum. 321, I.
 Melancholicum est, si metus & tristitia multo tempore perseverant. 288.
 Melicratum quid notet. 75, III.
 mulieri exhibitum an signum graviditatis ostendere valeat? 234, I.
 Menses decolores quinam dicantur. 229, I.
 inordinati. 229, II.
 & decolores cur purgationem indicant? 229, III.
 fluunt motu particulari. 249, I.
 ex quibus causis deficient. 226, I.
 copiosiores quosnam morbos producant. 250, II.
 non prodeuntes morbos uteri faciunt. 250, III.
 Menstrua sponte subsistentia cum fastidio sine horrore & febre, graviditatis signum. 254, I.
 erumpentia cur solvunt sanguinis vomitum? 225, III.
 retenta quando generant lac in mammis? 232, III.
 Menstruatio est evacuatio necessaria. 3, v.
 Menstruatione perseverante, an foetus sanus manere nequeat? 253, I.
 Mensium fluxui si convulsio aut lipothymia superveniat, malum. 249, I.
 naturalis quantitas. 250, I.
 eruptio quid notat. 225, I.
 Mens ægrotat, quid denotat? 31, v.
 . . . præbet signa in morbis. 58, I.
 Mentem valere in morbis bonum. 58, II.
 se bene habere ad ea, quæ offeruntur, bonum. 58, III.
 Mentis torpor a calidorum usu frequentiore. 209, VII.
 Meraca dejectio si producit dysenteriam, malum. 248.
 Meracæ dejectiones in chronicis, malum. 331, II.
 Meri potus qualem oculorum dolorem curat? 296, II.
 Metastasis observatio generalis. 302, I.
 Metus & tristitia si multo tempore perseverant, melancholicum id ipsum. 288.
 Metereologicæ tabulae forsan ab Hippocrate conscriptae. 90, II.
 Mictio noctu multa quid significet? 193, II.
 an sanitati conducat? 193, III.
 Mictus cruentus quam partem affectam.

I N D E X.

fectam denotat? 185, I.
 Morbus acutus quinam. 24, III.
 raro exigit purgans.
 24, V.
 constans & inconstans.
 87, II.
 facilis & difficilis judicatu.
 87, III.
 judicatu facilis ex con-
 stitutione temporis. 87, IV.
 difficilis ex consti-
 tutione temporis. 87, V.
 facilis & difficilis. 12, II.
 longus & brevis. 12, III.
 ex invasione.
 II, IV.
 ex morbi na-
 tura. 12, V.
 ex temporibus
 anni. 12, VI.
 ex paroxysmo.
 12, VII.
 ex epiphæno-
 menis. 12, VIII.
 ex sputo 12,
 IX.
 ex urina. 12,
 X.
 ex alvi excre-
 mentis. 12, XI.
 ex sudoribus.
 12, XII.
 extremus. 6, II.
 periculosior naturæ diffi-
 milis. 59, II.
 ex dissimilitudine
 ætatis. 59, III.

Morbus periculosior ex dissimili-
 tudine habitus. 59, IV.
 tem-
 poris. 59, V.
 morbo sæpe supervenit.
 51, I.
 Morbi brevitās cognoscitur. 10,
 VI.
 longitudo cognoscitur. 10,
 VII.
 ex mensibus copiosioribus,
 quinam? 250, II.
 ab utero fiunt a mensibus
 non prodeuntibus. 250, III.
 vigor tenuissimam diætā
 exigit. 8, I.
 sæpe præveniuntur evacua-
 tione boni. 3, V.
 paroxysmus tenuissimam di-
 ætā exigit. 8, VI.
 qui fiant ex derepente dis-
 parentibus tumoribus circa ul-
 cera. 258, III.
 principium. 24, IV.
 incrementum qualem diæ-
 tam exigit? 9, I.
 facile & difficile ferentes
 hyemem. 82, II.
 ex temporis mutatione.
 80, II.
 magis fiunt suis tempori-
 bus & magis exacerbantur.
 98, III.
 fieri possunt omni anni tem-
 pore. 89, II.
 ex aëris mutatione. 80,
 III.

Morbus

I N D E X.

Morbi omnes neque egent neque vetant evacuationem. 2, XI.

. . . ex consensu & metastasi. 258, I.

Moribundus jam est, qui in rabiem actus fuit intrepide, & non agnoscit, & neque audit, neque intelligit. 416.

Morituris ventres attolluntur atque inflantur. 417, I.

Mors ex acutis quomodo? 418, I.

Motus vitalis cur facilius quam animalis turbari potest? 67, III.

. . . corporis dolores & lassitudinem parit. 73, I.

. . . derepente factus nocet. 76, VI.

. . . major an faciendus in principiis? 54, II.

. . . promovet vomitum. 125, II.

Movere quæ turgent. 22, IX.

Movenda non sunt cruda. 22, VIII.

. . . sunt cocta. 22, VI.

Movendum quid significet. 54, I.

. . . corpus post datum vomitorium. 124, II.

. . . corpus an sit ante cibum. 41, V.

Moventia vetantur in crisi perfecta. 20, IX.

Muci abundantia in coxæ articulo unde, & quid faciat? 324, II.

Mulieres præter naturam, tenues quæ dicantur. 237, I.

Mulieres præter naturam tenues cur hæ abortiunt, priusquam crassescunt. 237, II.

Mulier non laborat podagra, nisi menses ipsi defecerint. 294.

. . . num sit fœcunda vel sterilis, an suffitu cognosci possit? 252, I.

. . . ambidextra non fit. 368.

Mulieri, mensibus deficientibus sanguinis fluxus bonus. 226.

. . . sanguinem vomenti cur menstruis erumpentibus solutio fit? 225, III.

Multum naturæ inimicum. 76, VII.

Mutatio non subito facienda. 76, I.

Mutus ex qua causa derepente in ebrietate? 198, I.

. . . ex ebrietate convulsus cur moritur. 198, II.

. . . solvitur febre. 198, III.

. . . loquela tempore crapulæ redeunte. 198, IV.

N.

NAres humidiores & genitalia humidior cur minus perfectam sanitatem indicant? 276, III.

. . . & genitalia sicciora perfectiorem sanitatem indicant. 267, IV.

Nares

I N D E X.

Nares naturâ humidiores quid notent? 267, I.

Narium hæmorrhagia in febribus quartanis, malum. 406, I.

..... humiditas fenibus. 110, XI.

Natura quid notet. 81, II.

..... quæ non fert hyemem. 81, III.

..... quæ non fert æstatem. 81, IV.

Natura morbi longitudinem præfagiens. 12, V.

Navigatio cur nauseam & vomitum inducit? 124, III.

Nausea cur ex navigatione? 124, III.

Nephriticis hæmorrhoides supervenientes, bonum. 267, II.

..... urina, cui pingue confertum supernatat & dolores circa musculos spinales, supervenientia, abscessum præfagit. 361, I.

Nephritides fenibus. 110, VI.

Nervis frigidum noxium. 211, II.

Nervus dissectus an neque augetur neque coalescit? 284, IV.

Nigrores a frigido. 210, III.

Nocturna sitis unde? 220, I.

Nox gravis ante crisin. 38, II.

Nutrientia confertim. 43, II.

Nutrimentum quot modis ingeritur? 36, II.

Nutrire quid denotet? 35, III.

..... quæ vetant? 40, VI.

..... quando licet? 40, VII.

Nutritio quid sit. 22, II.

Nutritionis necessitas. 3, III.

O.

Occasio celeris. I, IV.

Oculi in somno observandi. 317, I.

..... conniventes in somno, ex qua causa? 317, II.

..... sine alvi fluxu vel ductione prægressa, cur lethale? 317, III.

..... rubri & singultus a vomitu, malum. 328.

Oculorum doloris causa. 296, I.

..... dolor qualis curatur meri potu? 296, II.

..... qualis curatur per balneum? 296, III.

..... qualis curatur per fomentum? 296, IV.

..... qualis curatur per venae sectionem? 296, V.

..... qualis curatur per purgationem? 296, VI.

..... humiditas fenibus. 110, XI.

Oculos mordent aquiloniae constitutiones. 96, VIII.

Omenti hydrops solvitur urina multa. 379, I.

Omentum os uteri premens, an sterilitatis causa? 239, I.

..... prolapsum in ventris vulneribus, cur citius putrescit? 323, I.

Ophthalm-

Ophthalmiae cur fiant aestate?
100, VI.
..... in siccitatibus. 95,
IX.
..... siccae cur biliosis? 91,
VII.
Ophthalmia sicca post autumnum
siccum & aquilonarem. 93, V.
..... laborantem ab alvi
profluvio corripere, bonum. 282.
Ordo curationis. 409, I.
Oris amaritudo cacoehyliae signum.
127, V.
..... exulcerationes cur fiant aestate?
100, VIII.
Os an semper abscedere faciunt
ulcera vetusta? 310, II.
..... dissectum an neque augetur,
neque coalescit? 284, II.
..... quodcumque, aut cartilago aut
nervus in corpore dissecta neque
augentur, neque coalescunt.
353.
..... percussum si in vacuum pe-
netraverit, producit delirium.
349.
Ossis abscessus a sphacelo. 402.
..... denudatio si producit Erysi-
pelas, malum. 344.
Ossi aegrotanti si adsit caro livi-
da, malum. 327.
Ossibus fractis & denudatis convenit
calidum. 215, VII. & VIII.
..... frigidum noxium. 211, II.
Oscitatio solvitur vino aqua di-
luto. 381, II.

P.

Paroxysmi quomodo difficile ju-
diciū suggerunt? 140, II.
Paroxysmus longitudinem morbi
praesagiens. 12, VII.
Pars tenuis genae dissecta an ne-
que augetur, neque coalescit?
284, V.
Partes circa vesicam laborare si-
gnificat, si quis sanguinem & gru-
mos mingat, & stranguriam ha-
beat, & dolor incidat ad peri-
naeum & anum ventrem & pe-
ctinem. 364.
..... dissectae quanam, quae ne-
que augentur, neque coalescunt?
284, I.
..... superiores & inferiores quae
dicantur. 128, III.
Partium circa ventrem diuturnus
dolor si producit suppurationem,
malum. 347.
..... circa ventrem dolor vehe-
mens si producit extremarum
frigus, malum. 351.
..... extremarum frigus in mor-
bis acutis malum. 326.
Partus cur difficilis & periculosus,
si gravida corripitur febribus
& vehementer attenuetur? 248,
I.
Partui difficili superveniens ster-
nutatio, bonum. 228, IV.
Pavores ex somno in febribus, ma-
lum. 177, II.

Pavores puerorum morbus, 103 ,
VIII.

Pectoris dolor ab aquilone. 84 ,
IV.

..... dolores fiunt hyeme. 101 ,
V.

..... dolorem augent aquiloniæ
constitutiones. 46 , IX.

Pectori inimica frigida, velut nix,
glacies. 217 , I.

..... applicata frigida cur in-
ducunt tussim, sanguinis eruptio-
nes, catarrhos? 217 , II.

Peracutus morbus. 7 , III.
..... futurus conjicitur.
7 , IV.

..... exigit tenuissimum
victum. 7 , V.

Peripneumonia si producit phreni-
tidem, malum. 337.

..... quomodo ex angi-
na? 203 , II.

..... a pleuritide, ma-
lum. 336.

..... adultis. 109 , V.

Peripneumonix aut pleuritidi di-
arrhœa superveniens, malum.
281.

..... fiunt hyeme. 101 ,
II.

Pernitiosissimi morbi qui dicantur.
88 , III.

..... morbi cur autumno?
88 , V.

Pharynges ab aquilone. 84 , IV.

Φρένες notat Diaphragma. 128 ,
II.

Phrenitis a peripneumonia, ma-
lum. 337.

Phrenitides adultis. 109 , VII.

Phrenitici qui fiunt supra quadra-
ginta annos, non admodum sa-
nantur. 405 , II.

..... minus periclitantur, quo-
rum ætati & naturæ morbus si-
milis fuerit. 405 , III.

Phreniticis urina alba pellucida.
182 , III.

Phthisis quid & quotuplex? 32 ,
III.

..... autumno. 101 , VII.

..... quam fit ætate? 202 ,
I.

..... futuræ signa. 118 , IV.

..... ab empyemate, quod in-
tra quadraginta dies non expur-
gatur. 208 , IV.

..... vel hydropis periculum
cur ex hæmorrhoidibus diutur-
nis sanatis? 277 , II.

Phthisi confirmatæ & instanti no-
cet vomitorium. 118 , III. &
IV.

..... laborantibus si capilli de
capite defluunt, hi alvi fluxu
superveniente, moriuntur. 205 ,
I.

Phthisicis sputum olens carbonibus
injectum & capillorum deflu-
vium, lethale. 204 , IV.

Pingue & confertum supernatans,
unde? 360 , I.

..... cur signi-
ficat affectiones hepaticas & a-
cutas?

- cutas? 360, II.
- Pituitosis quando fiunt Dysenteriae? 91, VI.
- Pleuritis adultis. 109, IV.
- ... si producit peripneumoniam, malum. 336.
- Pleuritidis mutatio. 201, I.
- ... commutatio in empyema. 201, III.
- ... in peripneumoniam translatio triplex. 336, I.
- Pleuritidi aut peripneumoniae diarrhoea superveniens, malum. 281.
- Pleuritides fiunt hyeme. 102, II.
- Pleuritici non admodum fiunt, qui acidum eructant. 298.
- Podagricis an conducit vere venam secare? 312, II.
- ... & arthriticis an conducit vere alvum ducere? 312, III.
- Podagrici morbi quo tempore finiuntur? 314, I.
- ... morbi vere & autumnomoventur ut plurimum. 320.
- πόνοι quid notet. 121, II.
- Potu facilius quam cibo replentur corpora. 36, III.
- Potus multus si producit rigorem & delirium, malum. 332.
- ... meri qualem oculorum dolorem curat? 296, II.
- ... vini solvit stranguriam & dysuriam. 373, I.
- Præcordia. 60, II.
- Prædictionis fons. 44, II.
- Prædictio non omnino certa. 44, II.
- Prædictio in acutis. 44, IV.
- ... difficilis est. 44, V.
- Prægnans femina vid. *gravida*.
- Præparatio quid significet. 34, II.
- ... in convalescentibus. 34, III.
- ... in acutis. 34, IV.
- ... in chronicis. 34, V.
- ... ad alvi ductionem. 34, VI.
- ... vomitus. 395, I.
- Præputium dissectum an neque augetur, neque coalescit? 284, VI.
- Præsagium abortus ex mammis ex improvviso gracilescentibus. 230, II.
- ... in suppuratis seclis vel ustis ex pure peti potest. 369, II.
- Præservatoria curatio. 312, I.
- Præter rationem sunt inconstantia. 52, II.
- ... permanentia non sunt. 52, III.
- ... nec credenda nec timenda. 52, IV.
- Principia morbi cur debiliora? 55, II.
- Principiis morbi an antidota danda. 54, IV.
- ... moventia vel refrigerantia adhibenda. 54, II.
- Principium morbi vid. *morbi principium*.

I N D E X

- pium.*
 Pruritus totius corporis in senibus. quomodo fitim inducit ?
 110, X. 129, I.
 Pudendis convenit calidum. 215, raro in acutis. 24, v.
 XI. cum qua cau-
 Pudendorum putredines cur fiant tione ? 24, VI.
 æstate ? 100, IX.
 Puer difficile fert jejunium. 13, Purgantia vetantur in crisi perfecta.
 II. 20, X.
 inter hos minime qui Purgantis potio si producit con-
 alacriores. 13, IV. vulsionem, lethale. 350.
 . . . non laborat podagra ante ve- Purgare qualia oportet ? 25, II.
 neris usum. 295. Purgatio qualem oculorum dolo-
 Pueris humidus victus. 16, III. rem curat ? 296, VI.
 Puerorum morbi quinam ? 103, III. Puris generatio quid sit. 72, II.
 quo tempore judi- per quam actionem ?
 cantur ? 107, II. 72, II.
 post dentitionis tem- ex qua materia ? 72,
 pus. 105, I. III.
 circa pubertatem, qualia symptomata in-
 aut menstruorum eruptiones non fert ? 72, IV.
 cessantes perseverare solent. 107, . . . boni & mali signa. 369, I.
 III. . . . vel loci crassitudo suppuratio-
 & veris convenientia. nem internam occultat. 306, I.
 97, II. . . . sputum a sanguinis sputo,
 Pulsus fortis in ulceribus si produ- malum. 340
 ducat sanguinis eruptionem, ma- producit tabem &
 lum. 346. fluxum. 341, I.
 Purganda sunt cocta. 22, v. Pus acervatim effluens in suppurati-
 non sunt cruda. 22, VII. tis cur mortem inferit ? 292, I.
 Purgandi melancholici uberius. 119, . . . bonum in hepatis abscessu fa-
 III. lutem portendit. 370, I.
 Purgandum in cacoehyia. 130, I. . . . velut amurca mortem præsa-
 Purgans veterum. 24, II. git. 370, II.
 cito resolvit. 61, II. . . . unde in urina ? 184, II.
 an depurat ? 61, III. Pustulæ ulcerosæ fiunt vere. 99,
 quando dandum in gravi XII.
 Putredo aut suppuratio ab Ery-
 sipe-

si pelate, malum. 345.
Putredines in pluviosis. 95, IV.

R.

Q.

Quantitas naturalis mensium.
250, I.

..... evacuationis æstimanda ad prædictionem. 404.

Quartana febris. 50, II.

..... vernalis cur brevior? 50, III.

..... autumnalis cur longior? 50, IV.

..... superveniens an tollit convulsionem? 263, II.

..... correpti an non admodum convulsione corripiuntur? 263, I.

Quartanæ febres autumnæ. 101, III.

..... cur fiunt æstate? 100, III.

Quartanis febribus existentibus, si sanguis ex naribus fluxerit, malum. 406.

Quies humectat. 123, VI.

..... & somnus compescunt vomitum. 125, III.

..... subito inducta nocet. 76, VI.

..... curat lassitudinem & dolores ex labore. 73, II.

Ramentorum copia in alvi excrementis magnitudinem morbi declarat. 392, I.

..... his confert, alvum inferne purgari. 392, II.

Ratio in morbis quid sit. 52, I.

..... in curatione quænam sit? 77, I.

Rationalis curatio. 77, I.

..... non facile mutanda. 77, II.

Raucedo quid sit. 65, II.

..... post autumnum pluviosum. 92, V.

Raucedines fiunt hyeme. 101, IV.

..... & tusses fiunt vere. 99, VIII.

Recidiva quid sit. 37, II.

..... duplex. 37, III.

..... a relictis post crisin. 37, IV.

..... prædicitur post imperfectam crisin. 37, V.

..... prædicitur ex sudore in tempore non critico. 146, III.

Recidivat febris, quæ non dimittit diebus imparibus. 171, I.

Recto intestino inflammato supervenit stranguria. 251, I.

Refectio quid sit. 32, II.

..... quanta debeat esse in defectu. 3, X.

..... post chronicos. 32, V.

Refectio

Refectio post acutos. 32, IV.
Regio quid faciat ad cognitionem.
2, VIII.

. ætatibus magis minusque
conveniens. 82, V.

. determinat assumptionem a-
limentorum. 17, VI.

Regionibus omnibus an ventorum
observationes quadrent? 84, II.

Remittentes febres producentes de-
bilitatem, mortem præfagiunt.
159, II.

. motum faciei in-
ducentes, quid præfagit? 159,
III.

Remittentibus febribus sputa mul-
ta, malum. 157, IV.

. qualis uri-
na & alvi egestio bona & mala?
157, V.

. qualia sputa
mala? 157, II.

. qualia sputa
bona? 157, III.

Remittentium febrium ardor unde?
158, II.

. frigus unde
in partibus internis? 158, III.

Renibus suppuratis stranguria su-
pervenit. 251, III.

Renum & vesicæ vitia in senibus
difficulter sanantur. 271.

Repletio quotuplex? 47, II.

. & evacuatio an causa so-
la convulsionis? 304, II.

Replere derepente malum. 76, III.

Repletionis morbi quinam? 47, II.

Repletionis morbi an omnes cu-
rantur evacuatione? 47, III.

Res externæ quales debeant esse.
1, XI.

Resolutio qualis morbus. 68, I.

Resolutionis causa. 68, II.

Respiratio consumit aërem. 80,
II.

. difficilis & delirium le-
thale in remittente. 160, I.

Respirationes luctuosæ in acutis af-
fectionibus, quæ cum febre fi-
unt, malæ. 319.

Respirationis observatio in morbis.
178, I.

. interruptio in feбри-
bus, malum. 178, II.

. convulsionem
indicat in febribus. 178, III.

Rigoris definitio. 156, I.

. causæ. 156, II.

Rigor & delirium a multo potu,
malum. 332.

. superveniens quando solvit
ardentem? 168, II.

. in febre intermittente. 156,
III.

. in debilitatis. 156, IV.

Rigores sexto die cur mali? 139,
II.

. cur magis ex lumbis in-
cipiunt? 262, I.

. quotidie in febribus si fi-
ant, hæc quotidie solvuntur. 173,
I.

. febriles a frigido. 210,
III.

Rigores

I N D E X.

Rigores mitigantur calidis. 215, v.

Rifus si adsit in delirio, securius : adultis. 109, studium vero, periculosius. 318. xiii.

Ructantes acidum non admodum si producit deli- pleuritici fiunt. 298. rium aut etiam convulsionem, malum. 334.

Ructus acidus in lienteria diuturna bonum signum. 266, ii. fluxiones fiunt vere. 99, v.

Ruptiones quæ ex dorso ad cubi- missio an sanis conveni- tum descendunt, quomodo sol- at? 62, ii. vuntur venæ sectione? 287, missione sola an minuen- i. da abundantia? 3, viii.

S.

Sanguis quando mittendus gra- vidis? 111, iv.

. in cavitatibus effusus an vomitus sine febre, an semper suppuratur? 285, ii. salutare? 362, i.

Sanguinis collectio ad mammas cum febre, an an maniam prædicit? 233, i. malum. 362, ii.

. eruptiones a calidorum an adstringen- frequentiore usu. 209, vii. tibus & refrigerantibus curan- dus? 362, iii.

. eruptio a forti pulsu in cur solvitur menstruis erumpentibus? 225, ulceribus, malum. 346. iii.

. eruptio quomodo alvum copiosam egestionem humectat? 137, ii. passis an noceat lac? 257, vii.

. eruptiones a frigido pe- Sanguini multo effuso, convulsio, ctori applicato. 217, ii. aut singultus superveniens, ma- lum. 196, i.

. evacuatio sursum vel Sanguinem spuere quando dicitur? deorsum quæ bona & quæ ma- 206, i. la? 135, i.

. fluxus quando solvit fe- cur ex pulmo- brem? 170, ii. nibus? 206, ii.

. in quibus mensi- sponte mingere quid bus deficientibus bonus? 226, significet. 188, i. an ex reni- ii. bus. 188, ii.

Sanguinis fluxus adolescentibus. 106, iv.

. adultis. 109, xiii.

. si producit deli- rium aut etiam convulsionem, malum. 334.

. fluxiones fiunt vere. 99, v.

. missio an sanis conveni- at? 62, ii.

. missione sola an minuen- da abundantia? 3, viii.

. sputum si producat pu- ris sputum, malum. 340.

. vomitus sine febre, an salutare? 362, i.

. cum febre, malum. 362, ii.

. an adstringen- tibus & refrigerantibus curan- dus? 362, iii.

. cur solvitur menstruis erumpentibus? 225, iii.

. copiosam egestionem passis an noceat lac? 257, vii.

. Sanguini multo effuso, convulsio, aut singultus superveniens, ma- lum. 196, i.

. Sanguinem spuere quando dicitur? 206, i.

. cur ex pulmo- nibus? 206, ii.

. sponte mingere quid significet. 188, i. an ex reni- bus. 188, ii.

Sanguinem

- Sanguinem quibus de venis auferre conducit, his vere venam secare oportet. 378.
- Sanas carnes habentibus cur hel-lebori usus periculosus? 126, II.
- Sanis an conveniat alvi ductio? 62, III.
- diureticum? 62, IV.
- sudoriferum & diaphoreticum? 62, v.
- diæta rigidissima? 62, VI.
- venæ sectio? 62, II.
- diæta tenuis. 4, v.
- Sanitas definitur. 3, II.
- an egeat curatione? 3, II.
- Satietas definitur. 29, II.
- non bona in morbis. 29, IV.
- acutis. 29, v.
- chroni-cis. 29, VI.
- Satyriasmī pueris frequentes. 105, VIII.
- Scotomos cacochyliæ signum. 127, IV.
- Secretio speciale exigit organum. 21, III.
- Secundæ an expellendæ sternuta-torio? 242, I.
- Sedi convenit calidum. 215, XI.
- Sedimentum biliosum in urina su-perne tenui, in febribus acutum morbum significat. 357, I.
- Sedimentum urinæ farinosum lon-gam infirmitatem significat in febribus. 356, I.
- Senectutis divisio. 65, I.
- Senex facilius fert jejuniū. 13, II.
- Senes cur egent calefacientibus? 14, v.
- an rarius quam juvenes æ-grotent? 64, III.
- Senum & ætatis convenientia. 97, III.
- naturalis mutatio, & mor-bi. 110, I.
- ætas. 64, I.
- morbi diuturni cur ad mor-tem durare solent? 64, IV.
- vitia in renibus & vesica difficulter sanantur. 271.
- Senibus cur gravedo & raucedo fre-quens? 65, IV.
- non concoquuntur? 65, v.
- an non fiunt febres acu-tæ? 14, VI.
- Senioribus cur catarrhi? 91, VIII.
- nimium purgatis si sin-gultus superveniat, non bonum. 366.
- Sentire quid sit. 31, II.
- Septi transversī vulnera. 283, v.
- Siccitas aëris quid faciat. 86, I.
- cur producit febres acutas? 86, II.
- uteri sterilitatis causa. 255, IV.

I N D E X.

- Signum ex cute, an æger cum vel
fine sudore sit moriturus. 264, I.
- Singultus ab ileo, malum. 335,
II.
- ab hepatis inflammatio-
ne, malum. 342.
- & convulsionis conve-
nientia. 304, I.
- & convulsio an a sola
repletione & evacuatione? 304,
II.
- aut convulsio sanguini
multo effuso superveniens, ma-
lum. 196, I.
- purgati-
oni immodicæ superveniens, ma-
lum. 197, I.
- & oculi rubri a vomitu,
malum. 328.
- solvitur sternutationibus
supervenientibus. 278.
- si superveniat senioribus
nimium purgatis, non bonum.
366.
- supervenit Hepati in-
flammato. 251, IV.
- Siticulosus an non dandum lac? 257,
V.
- Sitis minuitur in ardentibus tussi
sicca. 164, III.
- constans febris ardentis sym-
ptoma. 164, I.
- nocturna unde? 220, I.
- quando per somnum optime
sedatur? 220, II.
- quomodo a purgante? 129,
I.
- Somnus in morbo. 26, IV.
- in acutis. 26, V.
- in chronicis. 26, VI.
- in delirio. 27, I.
- quid facere debeat in fe-
bribus. 177, I.
- laborem faciens. 26, I.
- juvans. 26, II.
- & quies compescunt vo-
mitum. 125, III.
- vigilia, utraque modum
excedentia, morbus. 396.
- modum excedens. 28, II.
- in acutis.
28, III.
- in chroni-
cis. 28, IV.
- an multo alimento egeat?
15, III.
- Somno & ardore multo detentus
in acutis, desperatus. 415, III.
- Somni effectus. 26, III.
- Spasmi & tetani differentia. 167,
I.
- Sphacelus quid sit. 375, I.
- cerebri qualis post tri-
dum sanari potest? 375, II.
- producit ossis abscessum.
402.
- Spinali medullæ frigidum noxium.
211, II.
- Spumosæ egestionis quæ dicantur
& unde oriantur. 355, I.
- an ex pituita
a capite defluente? 355, II.
- Spumosa urina ex qua causa? 359,
I.

E e e e e

Spumo-

I N D E X.

Spumosa urina cur renum affecti-
ones significat? 359, II.

..... cur longam fore
invaletudinem significat? 359,
III.

Sputum carbonibus injectum olens
quid notat? 204, II.

..... olens
cur tabidis lethale? 204, IV.

..... longitudinem & brevita-
tem morbi indicans. 12, IX.

..... quomodo curat empye-
ma? 208, III.

..... retentum in tabidis mor-
tem instare significat. 341, II.

..... multum in remittentibus
malum. 157, IV.

..... puris a sanguinis sputo,
malum. 340.

..... producit tabem &
fluxum. 341, I.

Sputa qualia mala in remittenti-
bus. 157, II.

..... bona in remittenti-
bus? 157, III.

Sterilitatis causa an est omentum
os uteri premens? 239, I.

..... an nequit esse in-
temperies in masculis? 256, I.

..... uteri frigiditas.
255, II.

..... uteri humiditas.
255, III.

..... uteri siccitas. 255,
IV.

..... uteri caliditas. 255,
V

Sternutationis causa. 376, I.

Sternutatio fit ex capite, percale-
facto cerebro, aut perhumecta-
to, quod est in capite, vacuo.
376, II.

..... in hysterica passione.
228, II.

..... in secundinis retentis,
bonum. 228, III.

..... in partu difficili, bo-
num. 228, IV.

Sternutationes a singultu detento
supervenientes, solvunt singul-
tum. 278.

Sternutatorium an exhibendum ad
expellendas secundas? 242, I.

Stertor & vocis defectus post ca-
pitis dolores derepente natos
in sanis, ex qua causa? 316, I.

..... cur hi
moriuntur intra septem dies,
nisi febris apprehenderit? 316,
II.

Strangulatio qualis morbus? 68, I.

Strangulationis causa. 68, II.

Strangulati & resoluti non sunt
mortui. 68, III.

..... se non recolligunt, qui-
bus spuma circa os. 68, IV.

Stranguria autumnno. 101, VIII.

..... senibus. 110, IV.

..... quomodo producit vol-
vulum? 309, I.

..... supervenit intestino re-
cto inflammato. 251, I.

..... utero inflam-
mato. 251, II.

Stran-

I N D E X

- Stranguria supervenit renibus sup-
puratis. 251, III.
- & Dysuria solvitur vini
potu. 373, I.
- Stranguriæ in siccitatibus. 95, XI.
- σφόδρα quid notet. 121, II.
- Strumæ pueris frequentes. 105,
IX.
- Studium si adsit in delirio, peri-
culosius; risus vero, securius.
318.
- Stupor aut delirium a plaga in ca-
put, malum. 339.
- Sudamina cur fiant æstate? 100,
X.
- Sudor unde in febribus. 166, I.
- febricitanti superveniens, fe-
bre nondeficiente, malum. 166,
II.
- talis significat longitudinem.
166, III.
- multam hu-
miditatem. 166, IV.
- frigidus in acuta febre præ-
dicit mortem. 146, IV.
- in febre mitiore
prædicit longitudinem. 146, V.
- multus cur in æstate veri-
simili? 85, II.
- si relinquit horrorem, non
bonum. 329.
- multus a somno quid indi-
cat? 151, I.
- ab uberiore potu.
151, II.
- sine uberiore alimen-
to an evacuatione egeat? 151, III.
- Sudor multus semper fluens, ma-
lum. 152, I.
- & frigi-
gidus majorem morbum indicat.
152, II.
- & cali-
dus semper minorem morbum
indicat. 152, III.
- calidus aut frigidus,
semper fluens, humidi redun-
dantiam significat. 386, I.
- an hæc abundantia educen-
da? 386, II.
- criticus quo tempore? 146,
II.
- partis detegit latentem mor-
bum. 148, I.
- longitudinem morbi præsa-
giens. 12, XII.
- die non critico præfagit la-
borem, longitudinem & recidi-
vam. 146, III.
- diebus criticis unde veniat.
407, I.
- Sudores in diebus criticis oborien-
tes, vehementes & veloces, pe-
riculosi. 407, II.
- ex fron-
te velut guttæ & aquæ salientes
& frigidi valde ac multi, peri-
culosi. 407, III.
- frigidi quinam dicantur?
146, II.
- causa. 146, III.
- Sudoriferum an conducit fanis?
62, V.
- an exhibendum tem-
pore

I N D E X.

pore critico? 146, IV.
 Suffitus aromatum muliebria ducit. 221, I.
 ad alia sæpius est utilis, nisi capitis gravitates induceret. 221, II.
 an dignoscere valeat, num mulier sit fœcunda vel sterilis? 252, I.
 Suffocationis ex improvise causa. 144, I.
 Sumen. 60, II.
 quæ viscera recondit. 60, III.
 melius est crassitudinem habere, quam eliquari. 60, V.
 Superiores partes quæ dicantur. 128, III.
 Suppuratio quid sit. 285, I.
 ex ulcerum detumescencia. 258, VI.
 a dolore diuturno partium circa ventrem, malum. 347.
 septimo die ex angina. 203, III.
 interna occultatur crassitudine loci vel puris. 306, I.
 aut putredo ab Erysipellate, malum. 345.
 Suppuratis renibus stranguria supervenit. 251, III.
 sectis vel uctis, ex pure peti potest præsagium. 369, II.
 si pus acervatim effluat, cur mortem infert? 292, I.

Suppuratus coxæ incumbens uterus. 240, II.
 quid producat. 240, III.
 curatio. 240, IV.
 Surditas ex minuta alvi egestione biliosa, malum. 138, IV.
 quænam tollitur alvi fluxu bilioso? 138, II.
 Surditatis in febribus causa. 170, I.
 Symptoma vehemens & mite quid differat. 9, VI.
 Syncope quid sit. 66, I.
 cur minus periculosa, quam apoplexia. 67, II.
 prehensus cur improvise moritur? 66, II.

T.

T Abes vid. *Phthisis*.
 quid? 98, II.
 purulenta. 89, III.
 catarrhosa. 89, IV.
 colliquativa. 89, V.
 cruris & claudicatio in coxæ luxatione, quomodo? 325, I.
 & fluxus a puris sputo. 341, I.
 juvenibus. 108, III.
 in siccitatibus. 95, VIII.
 Tabidis convenit lac. 257, VIII.
 Temperamenta uteri. 255, I.
 Tem-

I N D E X.

Tempestatis mutatio quid producit?
90, v.

Tempestates siccae vel humidæ,
quæ præstantiores? 94, 1.

Tempestas alimentorum assumptio-
nem determinat. 17, 1v.

Tempora ætatibus magis minusve
convenientia. 82, IV.

... anni præfagientia morbi
longitudinem. 12, VI.

• • • • • anni constantia & inconstantia. 87, 1.

Temporis divisio. 80, 1.

. mutatio maxime parit
morbos. 80, II.

... constitutio morbos judi-
catu faciles producit. 87, iv.

..... difficiles
facit. 87, v.

Tempus quid faciat ad cognitionem
evacuationis. 2, IX.

Tenebricosa vertigo in acutis. 415,
I.

Tenesmus mulieri in utero gerenti
supervenienti, abortire facit. 352.

Tenues præter naturam quæ dicantur. 237, 1.

..... cur hæ a-
bortunt, priusquam crassescunt?
237, II.

Tenuium intestinorum si aliquod dissectum fuerit, non coalescit.

Tertiana exquisita quænam dica-
tur. 169, 1.

..... septem paroxysmis
solvitur. 169, 11.

Tertianæ febres cur fiunt æstate?
100, II.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ intermittentes periculo
vacant. 153, IV.

Testis dexter frigidus & convulsus;
lethale. 411.

Tetanus qualis morbus? 199, I.

Tetano correpti in quatuor diebus
pereunt. 199, II.

. quartum diem effugien-
tes, fervantur. 199, III.

Tetanus aut convulsio ab ardoribus vehementibus, malum. 338.

... ex impetu & calore ma-
jore. 214, 11.

. . . & convulsio ex ulcerum
detumescencia. 258, IV.

Tetani & spasmi differentia, 167,
I.

Conſillæ pueris frequentes. 105,
II.

Translatio Erysipelatis ad interna,
non bonum, 290, II.

..... ad externa;
bonum. 290, III.

... pleuritidis in peripneumoniā triplex. 336, 1.

Transversi septi vulnera. 283, v.

remores in ardentibus unde? 291,
I.

..... quomodo
solvuntur delirio? 291, II.

ristitia & metus si multo tempo-
re perseverant, melancholicum
id ipsum. 288.

40, IV.

Tuberculis urina biliosa. 40, v.

Tubercula fiunt vere. 99, XIII.

..... ad articulos vel dolores ex febribus longis, iis qui utuntur cibo copiosiore. 155, I.

..... quibus diutina, aut ad articulos dolores ex febribus fiunt, hi cibis utuntur copiosioribus. 389.

Tuberculum quibus fit in fistula urinaria, his suppurato eo & perrupto, solutio fit. 382.

Tubercula quænam pueris frequentia? 106, x.

Tumor ex qua causa intus rumpitur? 333, I.

..... & rubor ab angina detento in pectore superveniens, bonum. 374.

Tumore intus rupto, exsolutio, vomitus, & animi deliquium. 333, II.

Tumores quibus apparent in ulceribus, non valde convelluntur aut infaniunt. 258, II.

..... si fuerint rubicundi circa ulcera, ex ulcerum detumescencia dysenteriam pariunt. 258, VII.

..... nulli in magnis & pravis vulneribus & contusionibus, ingens malum. 259, I.

..... circa ulcera derepente disparentes quos morbos pariunt? 258, III.

..... & dolores articulorum sine ulcere, magna ex parte

affusio multa frigidæ levat. 218.

..... molles boni, duri vero mali. 260, I.

Tumorem fieri in collo, in angina bonum. 302, II.

Turgentia evacuare & movere. 22, IX.

Turgescentia quando dicatur. 120, II.

Tussis ab aquilone. 84, IV.

..... post autumnum pluviosum. 92, v.

..... a frigido pectore applicato. 217, II.

..... fiunt hyeme, 101, IV.

..... si habeat hydropicum, desperatus est. 372.

..... hydropicis superveniens malum. 300.

..... puerorum morbus. 103, VI.

Tusses & raucedines fiunt vere. 99, VIII.

..... siccæ paululum irritantes in ardentibus unde fiant. 164, II.

..... in ardentibus minuunt sitim. 164, III.

Tympanitis quomodo generari possit. 121, III.

..... cur post ventris tormina? 121, IV.

Tympanitidem præfagientia signa 121, I.

V.

Varices magni an non fiunt calvis? 299, I.

. supervenientes an calvos faciunt capillatos? 299, II.

. aut hæmorrhoides quamnam speciem insanix solvunt? 286, I.

Vena frontis secta an curet capitis dolorem? 261, I.

. portarum cur præcipue colligat melancholiam? 119, III.

Venæ sectio quibus conducit vere? 312, II.

. an conducat podagricis? 312, II.

. quomodo solvit ruptiones, quæ ex dorso ad cubitum descendunt? 287, I.

. qualem oculorum dolorem curat? 296, V.

. solvit difficultatem urinæ: secundæ vero internæ. 301.

Venam secato in doloribus oculorum, postquam merum bibendum dederis, & multâ calidâ laveris. 371.

Ventriculi vulnera. 283, VII.

. oris morsus signum cacochyliæ. 127, III.

Ventris significatio. 15, II.

. æstus & cardiognus in febribus malum? 175, IV.

. ardor in febribus unde o-

riatur. 175, I.

. dolores elevati quare mitiores, non elevati, vehementiores? 272, II.

. hydrops ex hepatis hydrope, lethale. 380, I.

. inflatio in morituris. 417, I.

. tormen a cacochyliæ. 130, II.

. tormina quomodo generant tympaniam? 121, IV.

. vulneribus si omentum prolapsum sit, cur citius putrescit? 323, I.

Ventres an hyeme & vere copiosius calidum innatum habent? 15, IV.

. an calidissimi hyeme. 15, II.

Ventus quid sit. 84, I.

Ventorum observationes an omnibus regionibus quadrent? 84, II.

Ver facilius fert alimenta. 18, V.

. . . saluberrimum & minime exitiale. 88, VI.

. . . quales morbos producat. 99, II.

. . . siccum & aquilonium quid faciat post hyemem australem pluviosam. 91, III.

. cur faciat abortum frequentiore. 91, IV.

. . . pluviosum & australe quid faciat. 90, III.

Vere & autumno ut plurimum moventur

- ventur dolores podagrici. 320.
 . . . quibus conducit venam fecare? 312, II.
 alvum ducere? 312, III.
 Veris & puerorum convenientia. 97, II.
 Veratrum vid. *Helleborus*.
 Vermes sæpe in pueris. 105, VI.
 Vernales nonnulli morbi curetiam fiant æstate? 100, I.
 Verrucæ pueris frequentes. 105, VII.
 Vertebrarum luxationes pueris frequentes. 105, III.
 Vertigo fit hyeme. 101, VII.
 tenebricosa cacochyliae signum. 127, IV.
 in acutis. 415, I.
 Vertigines senibus. 110, VII.
 faciunt austringæ constitutiones. 96, XI.
 Vesica perfecta. 283, II.
 Vesicæ & renum vitia in senibus difficulter sanantur. 271.
 calculus an cognoscatur ex sedimento arenoso? 189, II.
 adjacentium partium laborantium signa. 190, I.
 exulcerationis signa. 191, I.
 scabies ex urina furfuracea cognoscenda. 187, I.
 Victus ætatibus magis, minusve conveniens. 82, V.
 conf. *Dieta*.
 Vigilia puerorum morbus. 103, VI.
 modum excedens in acutis. 28, V.
 in chronicis. 28, VI.
 somnus, utraque modum excedentia, morbus. 396.
 si producit convulsionem aut delirium, malum. 343.
 Vigor cur omnia validiora habeat. 55, III.
 febris quietem indicat. 54, III.
 Vini potio an solvit famem? 46, II.
 potus solvit stranguriam & dysuriam. 373, I.
 Vino aqua diluto solvitur anxietas. 381, I.
 solvitur oscitatio. 381, II.
 solvitur horror. 381, III.
 Viris an cutis rarior, quam mulieribus? 262, II.
 Viscerum dolores fortes & convulsiones in acutis, malum. 176, I.
 Visciditatis dentium causa. 163, I.
 Visciditas dentium cur signum febris vehementioris? 163, II.
 Visus caligo ab austro. 84, III.
 extinctio in remittentibus mortem prælagit. 159, IV.
 hebetudo in senibus. 110, XII.
 Vita brevis. I, II.
 Vitæ generi an assuescendum? 75, III.

Vitiliginēs fiunt vere. 99, xi.

Ulcera circum glabra maligna.

269, i.

..... vetusta. 310, i.

..... an semper os ab-
scedere faciunt? 310, ii.

..... cur relinquunt ci-
catrices cavas? 310, iii.

..... hydropicis in corpore or-
ta, non facile sanantur. 273,
ii.

Ulceribus frigidum mordax. 213,
ii.

Ulceris fortis pulsus si producit
sanguinis eruptionem, malum.
346.

Ulcerum detumescētia parit con-
vulsionem & tetanum. 258, iv.

..... parit insa-
niam, aut lateris dolores acutos.
258, v.

..... parit sup-
purationem. 258, vi.

..... parit dy-
senteriam, si rubicundi fuerint
tumores. 258, vii.

Umbilicalis regio. 60, ii.

..... regio quæ viscera re-
condit? 60, iii.

Umbilici inflammationes puerorum
morbus. 103, ix.

Ungues nigri quando lethale si-
gnum? 412, i.

Vocis defectus & stertor post ca-
pitis dolores derepente natos in
sanis, ex qua causa? 316, i.

Volvuli autumnō. 101, xiii.

Volvulus quomodo ex stranguria?
309, i.

..... quibus ex stranguria su-
pervenit, cur septem diebus pe-
reunt? 309, ii.

..... quomodo hi liberantur,
si febris supervenit, & urina a-
bunde fluit? 309, iii.

Vomitoria frequentiori in usu ve-
teribus. 116, i.

..... in gracilibus & facile
vomentibus danda. 116, ii.

..... hyeme magis vitanda.
116, iii.

Vomitorii generales effectus. 118,
ii.

..... exhibitio qualis in non
facile vomentibus? 123, iii.

Vomitorio exhibito quid dein fa-
ciendum? 124, i.

Vomitorium qualem præparatio-
nem exigit? 123, iv.

..... dandum in cacochy-
lia. 127, i.

..... in præhu-
meato corpore. 123, vi.

..... nocet in lienteria.
122, ii.

..... maxime hyeme. 122,
iii.

..... nocet phthisi confir-
matae. 118, iii. & instanti.
118, iv.

..... an dandum in dolo-
ribus supra diaphragma. 128, v.

Vomitus cur fiat æstate? 100, iv.
..... an concitandus æstate?

114,

I N D E X

- 114, II.
- Vomitus præparatio. 395, I.
- quando permittendus? 2, XIII.
- puerorum morbus. 103, V.
- cur ex navigatione? 124, III.
- promovetur motu. 125, II.
- compescitur somno & quiete. 125, III.
- exolutio & animi deliquium a tumore intus rupto. 333, II.
- aut alvi profluvium sponte supervenientia a diuturno alvi profluvio detento, solvit morbum. 280.
- si relinquat singultum & oculos rubros, malum. 328.
- ab ileo, malum. 335, I.
- atræ bilis, lethale. 132, III.
- bilis & febris ex cerebri læsione. 315, I.
- cruentus quid notet. 225, II.
- malus. 135, II.
- sanguinis sine febre, an salutare? 362, I.
- cum febre, malum. 362, II.
- an adstringentibus & refrigerantibus curandus? 362, III.
- cruentus cur solvitur menstruis erumpentibus? 225, III.
- Urethræ tuberculum quid faciat? 192, I.
- Urina copiosa & tenuis, in febre cacochymica, bona. 179, III.
- cur præcipue si talis redditur iis, quibus ab initio, vel non multo post sedimentum inest? 179, IV.
- conturbata qualis jumentorum, quæ dicatur. 180, I.
- jumentosa quomodo generatur? 180, II.
- in febribus. 180, III.
- . his capitis dolores adsunt vel aderunt. 180, IV.
- pellucida quæ dicatur. 182, I.
- & alba mala. 182, II.
- cur maxime phreniticis? 182, III.
- crassa pilos continens quid notat? 186, II.
- furfuracea cur vesicæ scabiem indicat? 187, I.
- crassa, pauca, grumosa, quid notat in febre cacochymica? 179, II.
- spumosa ex qua causa? 359, I.
- cur renum affectiones significat? 359, II.
- cur longam fore invaletudinem significat? 359, III.

Urina

I N D E X

- Urina multa solvit hydropem o-
menti. 379, I.
- biliosa in tuberculis. 40, IV.
- in faucium morbis.
40, III.
- inæqualis in febribus vehe-
mentem turbationem significat.
358, I.
- an sit sanis similis vel diffi-
milis, videndum. 391, II.
- sanis dissimilis morbosa, sa-
nis vero similis minime morbo-
sa. 391, III.
- unde pus continet? 184, II.
- cui pingue confertum su-
pernatat, & dolores circa mus-
culos spinales, supervenientia
Nephriticis, abscessum præsa-
git. 361, I.
- si abunde fluxerit, & febris
si supervenerit volvulo ex stran-
guria, quomodo liberat? 309,
III.
- superne tenuis cum bilioso
sedimento in febribus acutum
morbum significat. 357, I.
- qualis liberat ab articulo-
rum abscessu. 184, I.
- longitudinem & brevitatem
morbi præfagiens. 12, X.
- noctu multa quid significet.
193, II.
- Urinæ inspectio necessaria. 391, I.
- arenulæ unde veniant. 189,
I.
- sedimentum arenosum an
notet vesicæ calculum? 189, II.
- Urinæ difficultatem venæ sectio
solvit: secandæ vero internæ.
301.
- copia præfagitur dolore lum-
borum. 183, III.
- carunculæ quid notant? 186,
I.
- nubecula quid sit. 181, I.
- rubra quid significat?
181, II.
- quarto die appa-
rens cur notat crism septimo
die futuram? 181, III.
- sedimentum farinosum lon-
gam infirmitatem significat in
febribus. 356, I.
- inspectio necessaria. ibid.
- Uterus coxæ incumbens suppura-
tus. 204, II.
- quid pro-
ducat. 240, III.
- curatio. 240,
IV.
- Uteri caliditas sterilitatis causa.
255, V.
- cotyledones muco plenæ an
abortum faciant? 238, I.
- erysipelas an distingui possit
ab inflammatione? 236, I.
- cur prægnanti
lethale? 236, II.
- cum mammis consensus. 230,
I.
- os durum cur clausum? 247,
I.
- clausum an graviditatis
signum? 244, I.

I N D E X.

- | | |
|---|---|
| <p>Uteri temperamenta. 255, I.
 . . . frigiditas sterilitatis causa.
 255, II.
 . . . humiditas sterilitatis causa.
 255, III.
 . . . siccitas sterilitatis causa. 255,
 IV.
 . . . caliditas sterilitatis causa.
 255, V.
 Utero inflammato supervenit stran-
 guria. 251, II.
 convenit calidum. 215,
 XI.
 Vulnera extenuationem inducen-
 tia. 133, V.
 magna & prava atque</p> | <p>contusiones si nullos tumores
 habeant, ingens malum. 259, I.
 quæ dicantur lethalia.
 283, I.
 cerebri. 283, III.
 cordis. 283, IV.
 septi transversi. 283, V.
 intestinorum 283, VI.
 ventriculi. 283, VII.
 hepatis. 283, VIII.
 Vulneri superveniens convulsio
 lethale. 195, I.
 Vulneribus ventris si omentum
 prolapsum sit, cur citius putref-
 cit? 323, I.</p> |
|---|---|



E M E N D A N D A.

Aph.	2. par.	1. Lin.	2. abortis. l. obortis.
	5.	4.	11. fit. l. sit.
10.	1.	1.	8. l. 7.
ibi.		2.	eandem l. eundem.
ibi.		3.	& deleatur.
16.	1.	13.	humida copiosius. l. humida si copiosius.
18.	2.	1.	æstate solis. l. æstate ob solis.
26.	3.	13.	compactos. l. compacti.
27.	5.	8.	evacuatur. l. evacuentur.
29.	9.	6.	graviorum. l. graviozem.
35.	4.	12.	emacietur. l. emaciabitur.
36.	2.	5.	deferentiam. l. differentiam.
36.	4.	9.	quoque deleatur
44.	4.	2.	seleget. l. selegit.
53.	5.	6.	desinere l. adesse.
54.	1.	9.	majorem. l. major.
54.	1.	10.	motum faciendum. l. motus faciendus.
54.	3.	13.	incipit. l. incipiunt.
55.	2.	10.	mutabilis. l. mutabile.
55.	3.	16.	per tam. deleatur.
57.	1.	16.	morbi. l. morbi sed.
57.	3.	11.	medicorum. l. medici.
57.	4.	30.	regulam generalem. l. regulæ generali.
57.	5.	29.	veniens. l. venientes.
60.	1.	7.	externe l. externa.
60.	2.	4.	relinquens. l. relinquit.
60.	3.	2.	esset. l. est.
62.	2.	ult.	regulam generalem. l. regulæ generali.
62.	3.	ult.	hanc regulam. l. huic regulæ:
6.	3.	16.	ferunt. l. fert.
63.	5.	7.	nunquam. l. unquam.
64.	2.	9.	istas. l. istos.
65.	3.	ult.	exaptare. l. exagitare.
68.	2.	31.	utcunque. deleatur.
82.	2.	4.	ventus. l. venti.
82.	5.	9.	quum. l. quam.

E M E N D A N D A.

Aph.	82. par.	6. Lin.	7. quoque. deleatur.
	83.	1.	ult. fiant. l. fiunt.
	84.	3.	5. motum. l. notum.
	84.	4. 2. &	9. Belgia. l. Belgio.
	84.	5.	1. ventus. l. venti.
	89.	2.	penult. detractatione. l. detrectatione.
	89.	6.	19. quæ. l. qua.
	90.	1.	18. solo. l. sole.
	90.	1.	27. voluisse. l. voluisse tradere.
	90.	5.	19. minus. l. nimis.
	93.	5.	2. æstatem. l. hyemem.
	93.	5.	11. calida. l. calidus.
	94.	3.	9. non. l. nam.
ibidem.			veres. l. vires.
	95.	12.	3. reliquia l. reliqua.
	95.	12.	11. natas. l. natos.
	98.	3.	6. morbum. deleatur.
	101.	9.	15. contenta & præparata alimenta. del.
	105.	6.	13. denegare. l. degenerare.
	105.	6.	17. intestinorum. deleatur.
	109.	13.	26. facilis. l. facile.
	110.	3.	1. aër. l. acer.
	119.	2.	19. multis. l. multorum globulorum.
	120.	1.	10. quæ. l. qua.
	128.	3.	18. corripere. l. concipi.
	219.	1.	5. integra doctrina. l. integram doctrinam.
	221.	1.	6. myrrham. l. myrrha.
	221.	1.	26. oromata. deleatur.
	224.	2.	17. paruisse. l. peperisse.
	232.	3.	21. morbosa. l. morbo.
	250.	3.	12. mensibus. l. mensium.
	256.	1.	27. sterilitatem. l. sterilitas.
	257.	1.	24. circulantibus l. circulanti.
	257.	2.	ult. medemur. l. medeamur.
	258.	1.	11. superioribus. l. superioribus demon- stravimus.

Reliqua quæ occurrunt vitia typographica, B. L. facile corriget.]

(3-)

